

30




Ex Bibliotheca
majori Coll. Rom.
Societ. Jesu


5-37

73
C
371

73
C
371

12
13
C
72





IOANNIS
HVCHERI

BELLOVACI, CONSI-

LIARI, MEDICIQUE

regij, & Monspeliensium

Medicorum Can-

cellarij,

DE STERILITATE

VTRIVSQUE SEXVS,

*Opus in quatuor libros distributum, & nunc
primum in lucem editum: cui annexus
est liber DE DIAETA ET THE-*
RAPIA PVERORVM.

*Lib. Tac. Tac. coll. Hor. S. S.
de leg. 8.*



AVRELIAE ALLOBROGVM,
APVD SAMVELEM CRISPINVM.

M. DCX.







PRÆFATIO TOTIVS
OPERIS.



VS QUAM naturæ
maius, quàm in propa-
gâda sobole studium:
nusquam naturæ ma-
ior, quàm in educan-
da fouendâque sobole charitas & be-
neuolentia; nusquam naturæ præcla-
rior quàm in erudienda sobole operi-
bus ad vitam necessariis prudentia re-
luxit. Neque verò in sublimi tantùm
hominum, medióque brutorum: sed
infimo quoque stirpium ordine, ista
naturæ indoles semper viguit. Omni-
bus enim viuentium generibus com-
mune generationis principium semen
largita est, ex quo speciei suæ simili-

P R A E F A T I O.

mum foetum excitant. Hæc enim
 vniuoca generatio est, sicuti quæ
 ex putredine fit, suoque ortui dissi-
 milis, æquiouoca dicitur. Semen au-
 tem hoc maxima naturæ solertia ad-
 uersus externas iniurias vbique con-
 seruatur. Aliàs enim in plantarum ge-
 nere corticibus pulpæque fructuum,
 pomorûmque tegitur: aliàs nucleis li-
 gneis munitur, aliàs denique aculea-
 tis aristis ambitur. In animalibus quo-
 que quàm accuratè idè semen in parti-
 bûs eorum genitalibus elaboret, & ad
 opportunum generationis vsum accu-
 mulet, neminem sane nisi amentem,
 suique ipsius ignarû latere potest. Sci-
 licet propria viuentium omnium na-
 tura, diuina quædam est facultas, æter-
 nitatis suæ conscia, cuiusque in omnibus
 viuentibus percupida: quam cum in
 singulis ob constitutionis suæ primor-
 diorum repugnantiam non possit: in
 p̃lis certè speciebus vniuersim conse-
 quatur.

quatur. Itaque amborum sexuum coitus, feminumque mixtionis flagrantem cupiditatem animantibus omnibus generationis causa indidit: quæ homines quidem omni tempore ob exquisitam suam temperiem seminisque vbertatem; bruta autem certis tantum spatiis, laceffat. Platarum quoque confusis sexibus eandem libidinem nullus detraxerit, qui earum radices, stolonisque luxuriose pullulare, ratis statisque tempestatibus meminert. Communis ergo est viventibus omnibus maximæque naturalis procreandi facultas, quæ sese à mortali & dissolubili conditione quodammodo vindicent.

Iam verò singularis naturæ eiusdem industria in conseruandis foeminarum conceptibus quem nisi prorsus stolidum præ admiratione non stupefaciat? Illa enim primum vtero muliebri tanquam marsupio quodam

arctissimè obsignato commissâ sexuum semina tantisper continet, dum partibus suis omnibus, foetus ipsi exornati sint, quos deinceps cohibito intus materno sanguine sic alit sensimque auget, dum grandiores ipsos recluso angustiori utero, tanquam patefacto quodam ergastulo foras excludat. Mox verò eodem sanguine in lactis speciem mutato eosdem semper sustinet, donec solidiores & duriores cibos exertis dentibus conficiant.

Vnde quæso ista in gignendis alendisque foetibus tanta parentum propensio & beneuolentia, nisi à vehementi quadam insitæ naturæ sollicitatione oriri potest? Quæ enim vis nisi naturæ ipsius, matres cogit ut puerperij vix dum defunctæ cruciatibus, infantes cruore, mucò & sordidissima illiuvie fluentes protinus excipiant, abstergeant, & linteolis molli-

lissimis foueant, suisque vberibus & pectori admoueant, atque exosculentur? Vnde ista liberorum cura, cum primùm adoleuerint, vt disciplinis omnibus Philosophicis, politicis, ethicisque, quæstuosis etiam, & ad vitam tuendam necessariis artibus ipsos erudiendos maximis suis sumptibus curent? Neque enim parentes ipsi labescente ætate sua mutuum ab illis subsidium maturè affuturum sperare possint, aut emolumentum aliquod, quale ipsi agricolæ ex vinearum agrorumque cultu, gallinarum accubitu, vaccarumque enixu percipere solent: cum sit infantium educatio difficilis admodum, anxia & sollicita, accretio lenta, atque indoles dubia valdè & perobscura. An liberos diligant, quòd viaticum imbecilli senes, aut sepulturæ honorem & epitaphia ab illis mortui expectent? Atqui diuites & opulenti parentes expectatio-

ne ista facillimè careant , multoque plures orbis senibus clientes, quàm Danao filia affidere solent , à quibus vigilantius multò quàm à pueris ipsis etiam coluntur, quòd illi alienam hæreditatem ficto obsequio ambient, hi propriam sibique iure ipso debitam vendicent. Inde accidit vt multis clientum penuriam fœcunditas sæpè attulerit, quorum copiam orbitas paulò ante iisdem conciliaffet. An quòd à liberis eximium aliquod stemmatis sui decus promittant? At ignotum vitæ eorum spatium est, vt immaturis eorum funeribus parentes mœrere sæpius, quàm pueros parentum casibus contingat. Omitto quàm sit ingenium puerorum fallax, lubricum & ad vitium procliue, vt ab illis contemni, derideri, illudique & clarissima sua nomina dedecorari, opésque obscœnissimo luxu, sumptúque profusissimo dilapidari, moribundi senes

misera-

miserabiliter ingemiscant. Quòd si qui fortasse egregiis virtutibus & facinoribus eximiis, virili ætate sua excellant, ab illis tamen parentes mortui non delectentur. Neque enim Platonem Athenis in Academia, neque Aristotelem in Lyceo disputantes, neque Euripidem & Sophoclem suas in theatro recitantes comœdias, neque Cæsarem de orbe triumphantem sui patres viderunt.

Nequaquam ergo priuatis suis commodis homines, sed tacitis naturæ institutis stimulisque intestinis ad gignendam, alendam, & erudiendam prolem suam concitantur.

Sedenim brutorum connubia cœtibusque spontaneos, nullo aut legum metu coactos, aut præmio inuitatos, aut voluptatis venereæ spe inflammatos, qui sedulò animaduernerit, profecto libidinem eorum, & procreandi cupiditatem prorsus naturalem esse,

nunquam dubitet , multóque minus si quàm fortiter prolis suæ securitati consulant, studiosè perspexerit. Nota est gallinarum aduersus miluorum, canum & serpentum insidias, pro salute pullorum suorum audacia. Nota perdicum in abducendis à suo grege venatoribus astutia. Notus canicularum ardor, vt catulos suos periculo subducant. Noti denique leonum, vrforúmque in obuios insidiatores pro incolumitate suorum furor & impetus. Quod si eorundem brutorum in educanda prole sua diligentiam summam exploremus, vt pusillam primum proprio alant cibo, deinde grandiore quæritando pastui assuefaciant, eandémque ad vitam operibus necessarijs volatu & natatu erudiant, an naturæ vim in illis non admiremur, cùm timidis audaciam, ignauis industriam, voracibus frugalitatem & temperantiam pro salute suorum afferat?

Iure

Iure itaque hominum cœlibatus olim nuptiarumque tarditas apud clarissimos populos Athenienses, Lacedæmonios, Romanos tanquam turpissima crimina, & à naturæ iustissimis legibus alienissima fugillabantur: quin etiam apud sanctissimam Israelitarum gentem foecunditatis naturale desiderium tantum valuit, vt eius gratiâ quorundam etiam incestus & adulteria apud illam tolerata videantur. Sic puellarum cum patre Lotho concubitus poena caruit, quòd creditum sit illarum hoc fuisse consilium, vt hominum genus quod Sodomitano incendio consumptum opinabantur, instauraretur. Sic Sara Abrahami vxor nonagenaria quòd se effœtam esse putaret, Agaram ancillam marito suo tradidit, ex qua Ismaelem sustulit. Sic Tamar focerò suo Iudæ conceptus desiderio sese prostituit: tanta est in natura sobolis & propagatio-

nis cupiditas , vt sacras etiam leges ac non profanas tantum per ipsam pessumdari , & sterilitatem tanquam teterrimum hostem ab omnibus abhorreretur odióque haberi contingat, eò quòd præstantissimis naturæ muneribus, liberorum successione, nostrique nominis clarissima memoria, tanquam nunquam fuerimus, nos ipsos orbare soleat. Inde est, quòd Anna illa Samuelis mater orbitatem suam miserè luxisse legitur. Inde, quòd Hebræi olim sterilitatem tanquam Deo odiosam, qui Abrahamo numerosissimam prolem ex Isaaco promiserat, execrati sunt: & defuncti fratris sine liberis uxorem à superstite fratre duci oportuit, vt hic illi veluti semen suscitaret. Multi propterea quotidie nuptias diutius neglectas orbitatis tædio seniores contrahere videntur, vt in recentem prolem, fugacem animam suam vitamque veluti deponant,

nant, sicque quodammodo reuiuiscant.

Mihi quidem duplex coniugium contigit, vnum cum lectissima optiméque morata & habita puella Petronella Dauide: alterum biennio ab illius obitu, cum cordatissima & ingeniosissima foemina vidua, Ioanna de Metreau. Prius illud per viginti perpetuos annos infœcundum & mihi sterile fuit: posterius fœcundum, ex quo liberos duos Henricum & Petrum corpore animoque satis præstantes intra proximos duos annos sustuli, quorum educatione & domestica in primis literis institutione tam valde iam senior oblector, vt istam senectutis meæ fœlicitatem maximam esse ducam.

Cùm ergo mulieres meas saepe inter se compararem, multùmque & diu mecum cogitarem, cur cùm vtraque optimè morata, sana & integra ata-

te esset , vna tamen orba , altera fecunda mihi fuerit, omnes interim sterilitatis manifestas & naturales causas quaecumque vtrique sexui seorsum possunt esse infensæ , diligenter obseruaui, earumque remedia , tum ex recentium veterumque monumentis annotata, tum industria nostra excogitata, crebroque & longo usu comprobata, duobus libris explicauit: obscuras autem, & à natura ipsa hominumque sensu remotas, quibus potuimus coniecturis perscrutati sumus, easque libello vno complexi. Hanc enim artis nostræ particulam vnā quam seriò excolerem mihi selegi , reliquas verò collegas nostros Saportam, Varandæum, Pradilleum, Bellouacum, & Dortomannum foelicissimis ingeniis suis , & diuturnis lucubrationibus studiosè elaboraturos esse confido.

Enimuero summotis ferè omnibus

bus ab utroque sexu sterilitatis causis, foecundoque coniugum adornato congressu : mox grauiditatis nonimestres, vel decimestres potius ærumnae, partusque impatibiles ferè labores mihi occurrerunt, quos cum salutaribus auxiliis nostris carere iniquissimum duxissem, eadem alio libello explicari volui. Puerorum denique difficilis & laboriosa educatio, variæque primæ illius ætatis mollissimæ & molestissima symptomata therapeuticis præceptis nostris multò magis quàm reliquæ ætates indigere visæ sunt : eaque subinde alio libello à nobis decursa sunt.

Fuit ergo tandem ex his partibus cõstitutum opusculum, totidémque libellis expositum ; quod in lucem prodire hominúmque nostrorum examen subire maturius fortasse volumus, idque tantum ut audi-

tis doctorum sententiis idipsum accuratiùs recoquamus, elaboremus, perpoliamus. Sic enim Horatianum illud de perpetua per annos nouem poematum suppressione consilium interpretor, pro cuiuslibet operis diuturna & accurata elaboratione: quæ tamen non tam priuata & domestica meditatione, quàm alienorum iudiciorum per multiplicatas editiones comparatione constet. Sic enim Apelles post tabulam latitans exceptis spectatorum iudiciis mirabilem illam Veneris imaginem perfecit. Sic vrsi vrsulorum suorum infirmitatem sensim diùque lambendo reformant. Sic denique scientiæ artésque omnes mutuis doctorum & artificum dissidiis semper creuerunt.

Multis sanè veterum recentiumque Medicorum remediis nostra locupletari, eorùque consiliis artem nostram

nostram ne quando turpiter erraret diligenter communiui, suppressis tamen interim auctorum nominibus, librisque, tum quòd doctrinæ breuitati studerem, tum quòd apud eruditos qui doctrinæ fontes agnoscent, istorum gloriæ tacendo etiam satis: apud ineruditos nominando nunquam satis consultum fore considerem. Ergo omnibus istis studij mei ducibus & magistris gloriam penè totam, discipulis nostris vsum plurimum reseruauit.

Mihi certè vni totum inueniendi colligendique & describendi huiusce argumenti laborem assumpsit, quem si ab vtrisque laudari probarique sensero, summas à me illis debitas gratias libentissimè agnoscam. Illum enim doctis nunquam: sed discipulis nostris aliquando profuturum esse speravi, omninoque

**

PRAEFATIO.

ab illis veniam pro laude peto: lau-
datus abundè, non fastidi-
tus si tibi lector
ero.

INDEX





INDEX

CAPITVM OMNIVM QVO
ORDINE IN HIS LIBRIS
de Sterilitate tra-
ctantur.

LIBRI PRIMI,

Q uibus signis coniciendum sit utrūm mari an fœmina insit sterilitas	pag. 1.
Curatio sterilitatis à causis externis	6
Prognostica	15
De fœtore alarum	16
De graueolentia totius corporis, & quomodo curanda	19
De sterilitate à causis internis tum naturalibus, tum non naturalibus, & quomodo curanda sit	21
Signa diagnostica	27
Signa prognostica	ibid.
De deiectione inuoluntaria	31
De sterilitate à causis internis præter naturam	33
Testium historia anatomica	39
Testium morbi similes	40
Diagnosim intemperiei insitæ	41
Diagnosim intemperiei adscititiæ	ibid.
Prognosis	ibid.

INDEX.

<i>Intemperiei calida curatio</i>	42
<i>De testiculorum vitiosa magnitudine, eiusdemque curatione</i>	48
<i>De situ mutato testiculorum, eiusdemque curatione</i>	50
<i>Scroti p̄uosis vel mollificatio</i>	52
<i>Testiculorum occultatio</i>	ibidem
<i>De morbis communibus</i>	53
<i>De compressione & contusione testiculorum</i>	54
<i>De affectibus parastatarum & vasorum deferentium</i>	ibid.
<i>De Gonorrhœa virulenta</i>	59
<i>Signa diagnostica</i>	61
<i>Signa prognostica</i>	ibidem
<i>Curatio gonorrhœa contagiosa</i>	62
<i>Gonorrhœa simplicis curatio</i>	67
<i>Penis historia anatomica</i>	ibidem
<i>De magnitudine penis</i>	74
<i>De colis paruitate</i>	76
<i>De præputij morbis</i>	81
<i>De breuitate præputij</i>	ibidem
<i>De adhesionibus</i>	82
<i>De rhagadibus</i>	ibidem
<i>De phimosi & paraphimosi</i>	84
<i>De inflammationibus præputij glandisque</i>	86
<i>De priapismo</i>	87
<i>De signis diagnosticis</i>	90
<i>Signa prognostica</i>	ibid.
<i>De morbis glandis</i>	94
<i>De thymo</i>	95
	Cura-

INDEX.

<i>Curatio thymorum</i>	97
<i>De ulceribus penis</i>	100
<i>Symptomatum mitigatio</i>	104
<i>De ulceribus internis</i>	<i>ibid.</i>
<i>Curatio internorum ulcerum</i>	106
<i>Epuloticorum usus</i>	107
<i>De prae cautione ulcerum à lue venerea</i>	108
<i>De urethra affectibus</i>	109
<i>Signa diagnostica caussarum astrictiōnis & obstructiōnis</i>	110
<i>De catheteris usu</i>	113
<i>De tuberculo carnosō</i>	115
<i>Differentia tuberculorum</i>	116
<i>Astrictiōnis caussarum curatio</i>	<i>ibidem</i>
<i>Symptomatis curatio</i>	119
<i>De gangrana</i>	<i>ibid.</i>
<i>De sphacelo</i>	120
<i>De furunculo & carbunculo</i>	<i>ibid.</i>
<i>Curatio tumoris aquosi</i>	122
<i>De scirrho</i>	123
<i>Specierum obstructiōnis urethrae curatio</i>	<i>ibidem</i>
<i>De obstructiōne à grumis</i>	125
<i>De obstructiōne à pure</i>	126
<i>Curatio obstructiōnis à mucilagine</i>	127
<i>Obstructiōnis urethra à callo, verruca & tuberculo carnosō siue phymate curatio</i>	129
<i>Methodus curatiua carunculae absumenda</i>	<i>pag.</i>
133	
<i>Indicatio generis remediorum</i>	135
<i>Locus applicandi remedij</i>	136
<i>De forma remediorum</i>	<i>ibid.</i>

<i>Recidiva praeantio</i>	143
<i>De correctione symptomatum</i>	146
<i>Abscessus curatio</i>	149

LIBRI SECVNDI.

D <i>E intemperiebus uteri</i>	166
<i>Signa diagnostica</i>	ibid.
<i>Prognostica signa</i>	167
<i>Methodus curatiua generalis omnium intemperierum uteri</i>	171
<i>Methodus particularis curatiua intemperierum uteri</i>	174
<i>Diaphoretica potionis efficacioris exempla</i>	181.
182	
<i>Pessarium exemplum</i>	187
<i>Exemplum purgationis minoratiua dicta</i>	191
<i>Exemplum iulepi alterantis & concoquentis bilem</i>	
192	
<i>Vomitoria vacuationis exempla</i>	194
<i>Exemplum electarij mollis</i>	ibid.
<i>De uteri tumoribus</i>	198
<i>Methodus curatiua phlegmonarum communia</i>	
201	
<i>Curatio phlegmones uteri</i>	202
<i>De abscessu uteri</i>	211
<i>De erysipellate uteri</i>	221
<i>De oedemate</i>	225
<i>De scirrho</i>	228
<i>De cancro</i>	234
<i>De hydropse uteri</i>	242
<i>Exempla hydragoge purgationis lenioris, media, validis</i>	

<i>lidiſſima</i>	246.247
<i>De calculo uteri</i>	249
<i>De repletione uteri à grumo ſanguinis, aliove humo-</i>	
<i>re</i>	253
<i>De uteri ſuffocatione</i>	254
<i>De ſignis diagnosticis</i>	263
<i>De ſignis prognosticis</i>	264
<i>De præſervatione</i>	267
<i>Curatio acceſſionis hysterica</i>	269
<i>Curatio extraordinaria</i>	272
<i>De furore uteri</i>	273
<i>Curatio extraordinaria</i>	276
<i>De morbis uteri in ſitu mutato</i>	277
<i>De aſcenſu uteri</i>	278
<i>De ſignis diagnosticis</i>	279
<i>De deſcenſu uteri</i>	281
<i>De procidentia uteri</i>	287
<i>De perverſione uteri</i>	289
<i>De morbis colli uterini</i>	295
<i>De leuitate & mollitie uteri</i>	297
<i>De anguſtia colli uterini</i>	299
<i>De obturatione colli uterini</i>	302
<i>De hiatu uteri</i>	304
<i>De morbis cernicis pudendi</i>	305
<i>De leuitate & lubricitate cernicis pudendi</i>	306.
<i>de eiſdem aſperitate</i>	307. & anguſtia
	308
<i>De amplitudine vel hiatu colli pudendi</i>	310
<i>De cernicis pudendi clauſura vel obturatione</i>	
	311
<i>De rhagadibus cernicis & alarum pudendi</i>	
	317

INDEX.

<i>De condylomate</i>	320
<i>De thymo</i>	321
<i>De verrucis</i>	324
<i>De affectibus pudendi muliebris</i>	326
<i>De cleitoride</i>	328
<i>De pruritu pudendi muliebris</i>	329
<i>De hemorrhoidibus</i>	332
<i>De hernia inguinali</i>	337
<i>De hydrocele</i>	338
<i>De cirsocele</i>	339

LIBRI TERTII.

D E fluxus mensium, conceptus partúsque sympto- matis	341
<i>Curatio intemperierum uteri</i>	362
<i>Exempla cholagoga & phlegmagoga purgationis</i>	364
<i>De menstrui suppressione ob habitus crassioris vitium</i>	371
<i>De habitu gracili</i>	377
<i>De mensium translatione ad alias partes pagina</i>	380
<i>De immoderatis mensibus</i>	383
<i>De stillicidio uteri</i>	395
<i>Sympathia & idiopathia distinctiva signa pagina</i>	401
<i>De conceptione</i>	414
<i>De conceptionis symptomatis</i>	442
<i>De conceptu prohibendo</i>	450
<i>De superfætatione</i>	452
<i>De mola</i>	454

De

INDEX.

<i>De monstrosis conceptibus</i>	461
<i>De conceptus adiumentis</i>	465
<i>De conceptus legitimi signis</i>	667
<i>De geminorum conceptu, & sexuum discrimine</i>	471
<i>De conseruatione conceptus incolumis in utero</i>	475
<i>De symptomatum conceptus correctione</i>	476
<i>Methodus curatiua symptomatum</i>	478
<i>Pica & malacia curatio</i>	ibid.
<i>De singultu, nausea & vomitione</i>	484
<i>De bulimo & appetentia canina</i>	488
<i>De cibi fastidio</i>	491
<i>De siti pregnantium</i>	495
<i>De connexione & sympathia uteri cum uniuerso prope corpore</i>	499
<i>De dolore uteri & vicinarum partium</i>	500
<i>De rigore, horrore & frigore</i>	503
<i>De cachexia, tumore pedum, & hydropo leucophlegmatia</i>	507
<i>De palpitatione</i>	510
<i>De palpitatione cordis</i>	512
<i>De lipothymia</i>	516
<i>De febribus pregnantium</i>	519
<i>De affectibus capitis ex sympathia uteri, & primum de cephalalgia</i>	525
<i>Mitigatio cephalalgia</i>	527
<i>De peruiigilio & somnolentia</i>	529
<i>Mitigatio peruiigily</i>	531
<i>Mitigatio somnolentia</i>	533
<i>De melancholica deliratione</i>	533

INDEX.

<i>Curatio melancholica hypochondriaca</i>	538
<i>De epilepsia pregnantium</i>	542
<i>Mitigatio symptomatis</i>	546
<i>Curatio epilepsia idiopathica</i>	547
<i>De dolore dentium in pregnantibus</i>	549
<i>De fluxu alui pregnantium</i>	555
<i>De precautionione deformitatis ventris</i>	559
<i>De mammarum & uteri sympathia, lactisque generatione</i>	561
<i>De lactis generatione</i>	563
<i>De differentiis mammarum in pregnantibus</i>	565
<i>De mammis gracilibus</i>	569
<i>De mammis pregnantium durioribus</i>	571
<i>De partu</i>	572
<i>De partus symptomatis</i>	576
<i>De prima depravati partus specie</i>	576
<i>De abortus precautionione ante conceptum</i>	578
<i>Pracautio abortus post conceptum</i>	579
<i>De secunda depravati partus specie</i>	584
<i>Tertia species partus depravati</i>	585
<i>Retentio lochiorum</i>	594
<i>De partu naturali, & non naturali</i>	595
<i>De excrementis fœtus</i>	597
<i>De excrementis puerperarum</i>	ibid.
<i>De affectibus puerperarum</i>	600
<i>Diaeta puerperarum</i>	ibid.
<i>Rugarum ventris puerperarum curatio</i>	602
<i>Dilacerationis perinæ curatio</i>	603
<i>Rhagadum pudendi curatio</i>	ibid.
<i>De puerperarum torminibus</i>	604
<i>Curatio tumoris uteri</i>	605
	Curatio

INDEX.

<i>Curatio motuum uteri</i>	605
<i>De affectibus mammarum</i>	606
<i>Remedia incrementi</i>	611
<i>De caseatione lactis</i>	613
<i>De alia phlegmone mammarum</i>	616
<i>Vt regenda sint puerperæ post finita lochia ibi-</i> <i>dem</i>	
<i>Balneorum astinorum primi diei exemplum</i>	618
<i>Partium cosmetice</i>	ibid.
<i>De erugando ventre, & contrahendis densandisque</i> <i>mammis</i>	619
<i>Pulvis exemplum</i>	620
<i>Faciei remedia</i>	ibid.
<i>Aqua dealbens & leniens magis</i>	ibid.
<i>Alia aqua erugans, leniens & dealbens manus ibi-</i> <i>dem</i>	
<i>De lacte</i>	621
<i>De corruptela lactis</i>	625

LIBRI QVARTI.

D <i>E occultis sterilitatis causis, seu de maleficiis</i>	628
<i>De Lamiarum imaginatione, eiusque viribus</i>	642
<i>De fascinatrice magorum visione</i>	653
<i>De Lamiarum fascinante tactu</i>	656
<i>De falsis verborum viribus</i>	658
<i>De amuletis & periaptis</i>	668
<i>De philtris</i>	674
<i>De numeris</i>	680
<i>De imaginibus, figuris, characteribus, & annulis</i>	683

INDEX.

<i>De morbis demoniis seu diuinis</i>	690
<i>An daemones immortales & incorporei</i>	699
<i>De coitu demonum cum Lamiis</i>	708

EX LIB. DE DIAETA PVERORVM.

D <i>E signis salubribus infantis</i>	730
<i>Editi infantis cura</i>	ibid.
<i>De victu recens editi infantis</i>	734
<i>De delectu nutricis</i>	ibid.
<i>De lactis exploratione</i>	736
<i>De victu nutricis, & lactis vitiosi correctione</i>	737
<i>De victu infantium</i>	738
<i>De ablactatione infantium tempeſtina</i>	740
<i>De victu infantium ablactatorum, & ablactationis modo</i>	741
<i>De differentiis morborum puerilium</i>	744
<i>Aphoriſmus Hippocr. ex lib. 3. 34.</i>	746
<i>De aphtharum curatione</i>	ibid.
<i>Curatio aphtharum puerilium</i>	748
<i>De vomitu</i>	751
<i>De tuſſi infantium</i>	755
<i>De vigiliis infantium</i>	758
<i>Curatio februm puerilium</i>	762
<i>De humiditate aurium</i>	767
<i>De umbilici inflammatione</i>	771
<i>De dentitionis ſymptomatis</i>	772
<i>De diarrhoea</i>	780
<i>De procidentia ani</i>	781
<i>De tarditate alui</i>	784
<i>De conuulſione</i>	ibid.

De


INDEX.

<i>De epilepsia</i>	787
<i>Pulvis pro cucufa</i>	792
<i>Pulvis pro fuffitu</i>	<i>ibidem</i>
<i>De tonsillarum inflammatione</i>	795
<i>De luxatione vertebra</i>	799
<i>De afthmate</i>	800
<i>De acrochordonibus</i>	804
<i>De fatyriafi</i>	808
<i>De calculo</i>	811
<i>Signa loci demonstratiua</i>	812
<i>Præfervatio à calculo, & curatio</i>	813
<i>Exempla remedium</i>	814
<i>De lumbricis</i>	818
<i>Signa vermium</i>	820
<i>Præfervatio</i>	822
<i>De stranguria</i>	827
<i>Curatio ifchuria & dysuria</i>	831
<i>De strumis</i>	837
<i>De phymate</i>	843
<i>Exempla digerentiæ debilis & validioris</i>	845
<i>De pernionibus</i>	849
<i>De intertrigine</i>	851
<i>De fiffuris labiorum</i>	<i>ibid.</i>
<i>De aduftione puerorum</i>	852
<i>De cafu</i>	855
<i>De achoribus & fanis</i>	860
<i>Exemplum leuioris topici in principio</i>	863
<i>Exempla validioris in ftatu & declinatione</i>	<i>ibidem</i>
<i>De tineæ faciei puerorum</i>	864
<i>De hydrocephalo</i>	865
<i>De phtheuriafi</i>	867
<i>Exemplum lotionis fatufque relaxantis poros, doter-</i>	

INDEX.

<i>gentisque pituitam putrem, & pediculos necantis</i>	
869	
<i>Vnguentum pro feris pediculis</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lotio pro cironibus</i>	870
<i>De pilorum vititiis</i>	<i>ibid.</i>
<i>Therapeia</i>	875
<i>Curatio alopecia & ophialeos</i>	877
<i>Exempla topicorum lenium, mediascrum, & vehementissimorum</i>	880
<i>De ramicum differentiis</i>	881
<i>De causis</i>	<i>ibid.</i>
<i>Therapeia & victus</i> 884. <i>curatio</i> <i>ibid.</i> <i>usus</i>	885
<i>De pustulis & maculis cutis</i>	890
<i>Therapeia uniuersalis</i>	892
<i>Particularis curatio macularum</i>	<i>ibid.</i>
<i>De impetigine</i>	900
<i>De scabie</i>	903
<i>De variolis & morbillis</i>	905

IOAN.







IOANNIS HV-
CHERI BELLOVACI
CONSILIARII MEDICIQUE
REGII, ET MONSPELIENSIVM
Medicorum Cancellarij, de Sterilita-
te vtriusque sexus,

LIBER PRIMVS,
DE STERILITATE VIRILI.

*Quibus signis coniiciendum sit utrū mari
an fœmina insit Sterilitas.*

STERILITAS gentibus omnibus po-
pulisque odiosa semper fuit, cuius
causa sanctissima coniugia, aut Iudi-
cum sententiis, scīugari, aut implaca-
bilibus coniugum ipsorum luctibus
& dissidiis solent infestari. Est autem Symptoma
hoc mari, fœminæque cōmune: suum enim vterque
sexus symbolū ad generationē confert & principiū:
Mas quidem energeticum in semine suo fœcundo,
quod in muliebre sinū per penem instillat, fœmi-
na verò patheticum in sanguine suo menstruo, &
in fœcundo semine; ac præterea locū ad conceptio-
nem fœtus eiusdēque gestationem idoneum sub-

ministrat. Quare ex vitiis tum virilis seminis, & pudenti: tum muliebris sanguinis, seminis, & vteri, sterilitas oboritur. Huius peculiarem in virili sexu therapiam hoc libro prosequemur, eas duntaxat causas attingentes, quæ Medico & physico iudice possunt explicari: occultas autem & trans naturæ ordinem positas suo loco enodabimus. Est igitur Sterilitas symptoma primi generis, functio scilicet generatricis facultatis læsa vel impedita: Infit autem est facultas illa in semine, & in eo tria ad fecunditatem requirit: conuenientem quantitatem, iustam temperiē, & decentē immissionē, vnde fit vt tribus ex causis, sterilitas in maribus oriatur: Primò quidē ex inconuenienti seminis quantitate. Sicut enim ex minore quātitate partes omnes fœtus suscitari, ritēq; cōformari nō possunt, ita maior eiusdē moles à fœminino vndiq; peruadi nō potest, neq; muliebri vtero cōtineri, sed eum emollit laxatq; impensius. Secundo ex vitiata tēperie. Quum enim seminis tēperies instrumētum sit facultatis generatricis, læso instrumento consequenter læditur actio ad quam erat destinatum. Tertio ex inconuenienti eiusdē immissione. Quamuis enim iustam habeat tū quantitatem tum qualitatem, nisi tamen rectē & conueniēter immittatur & infundatur, irrita erit talis immissio. Ex his tribus sterilitatis causis duæ priores facultatem generatricem lædere, posterior impedire eandem dicitur. Porro violantur seminis temperies, & substantia à causis tam externis quàm internis. Externarum quidem aliæ calorem natium extinguūt, vt rigor aëris, submersio in gelidam, cibi crudiores & frigidiores: cuiusmodi sunt fructus præcoces, acetaria, frigide intemperantior potatio: aliæ

aliæ eundem calorem dissipant, vt labor vehementior, d' arrhœa, lienteria, inedia, & vigiliæ immodicæ, diuturnus mœror: aliæ denique eundem opprimunt, vt ebrietas, & ingluuies, quorum omnium soboles est cruditas, à qua semen liquidum, tenue, & quod consequens est, infœcundum suscitatur. Itæ etiam si causæ externæ in caliditatem, siccitatem, aut humiditatem conspirent, similem intemperiem inurant semini, ob quã sterile quoque fit, nisi à contrariis sceminini seminis, & menstrui, intemperiebus temperetur. Ad externas quoque & euidentes causas referri potest coniugum ipsorum disidiũ, quod vel ex morum dissimilitudine, vel deformitate, similisue causa suscitatur. Debent enim duo illa semina mutua quadam beneuolentia copulari, & quasi ex duobus animalibus fieri vnum. Internarum causarum, aliæ sunt insitæ, vt ætas iunior, seniorue: habitus plus æquo vel obesior, vel macilentior: & natura intemperata; aliæ aduentitiæ, vt contracta immoderato victu intemperies, aut in toto corpore, aut in aliquo viscere, eiusdem obstructio, tumor, vlcus, à quibus hydrops, icterus, febris lenta, aliiq; huiusmodi morbi suscitatur, quibus qui tenentur, aut nullum aut omnino infœcundum semen produciunt, vtpote quod neque utili constet materia, neque spirituum benignitate perfundatur. Peculiariter verò sterilitatem accerunt testium vasorumque seminalium affectus, vt intemperies, contusio, attritio, exilitas, occultatio in ventre & alij id genus. Atque hæ omnes causæ lædentium serie continentur.

Facultatem verò generatricem impediunt solius mentulæ affectus, qui vel à natura insiti sunt, & à

mala conformatione, vt breuitas, vel lōgitudō immodica, tenuitas, crassities, atonia, obliquitas, reflexio; vel ascititij vt paralyſis, obſtructio à caruncula in vtero ſubnaſcente, gonorrhœa, priapiſmus, ſatyriasis, atque hæ omnes cauſæ ſigillatim hoc libro ſunt examinandæ, ſi prius docuerimus quibus indi-
ciis coniectādum, utrū in mare an in fœmina in-
ſit ſterilitas.

Experimentorum locus eſt apud Ariſtotelem li. 2. de generatione animal. cap. 7. Primum eſt de ſemine vtriuſque ſexus in aquam infuſo. Quod enim ſubſidet fœcunditatem, quod per ſuperficiem fluitat, ſterilitatem arguit: hoc enim cruditatem, illud probam concoctionem ſequitur. Alterum experimentum mulierum proprium eſt ex ſuffitu aromatum ſubtus ad pudendum facto veſtibus circumtēſis. Si enim odor ad os per nares euehatur, fœcunditatem, ſecus ſterilitatem denūciat: hoc experimentum Ariſtoteles mutuatus eſt ab Hippocrate 5. Apho. 44. Certius tamen eſt experimentum ex allio expurgato & peſſi forma dormiturę ſubdito: neque tamen omnem ſterilitatem ſignificat hoc experimentum: ſed eam tantū quæ ex obſtructione vel aſtrictione, tum vteri, tum vaſorum oritur: his enim occluſis aditus ad nares vaporibus intercluditur. Quartum experimentum petitur ex collyriis in oculos inſtillatis, quorū colore infecta ſaliua fœcunditatem, aliàs ſterilitatem denūciat. Hoc enim experimento colligimus, utrū meatus oculorum clauſi ſint an aperti, ex quibus maximam ſeminis copiam deſluere colligit Ariſtoteles ex oculorum languore & attenuatione poſt effrænem concubitus; qui tamen caſus potius ab exhaustis ſpiritibus eſt,

est, quibus tumere & lucere oculi solent. Aliud experimentum est de sulphure viuo vining insperso, ex qua si prodeat vermiculi fecunditas, secus sterilitas denūciatur. Aliud desumitur ex hordeo in vrina cōiugū seorsim macerato: si deinde sepultū decimo die germinet fecunditatem, aliās sterilitatem indicat. Aliud est de manipulis duobus foliorum viridium maluę, vel lactuę, vel alterius herbę seorsim vrina cōiugum irroratis per aliquot dies. Quę enim prius tabuerit, eius sterilitatem prodit, cuius vrina fuit irrigata. Aliud deniq; est de furfurib. pari portione in vrina quoque seorsim maceratis per decē dies. Qui enim citiūs vermes proferent, fecunditatem illius declarant, cuius vrina immersi fuerant. Ex his omnibus experimentis vnicum ab Auicenna probatur tanquam indubitatum, scilicet de semine in aquam infuso. Cætera minus certa, fallaciaque sunt. Fecunditas igitur seminis dignoscitur ex crassitie, lentore, albedine, spuma, quantitate mediocri, & eiusdem eiaculatione cum voluptate: quodcunque autem ab his notis longius euariat, infecundum & sterile censendum est. Calidius igitur semen est, si crassius, parciusque est (presertim si caliditati iuncta sit siccitas) nonnihil flauescens, pruriginosum, genitalia acrimonia quadam feriens, vnde natura est libidinosa, & genitalia vicinæque partes pilis abundant. Quod si ad caliditatem accedat humiditas, copiosius magis quàm albicans, sed minus crassum & pruriginosum euadit semen. Frigidius semen crudū & liquidū est, nullo pruritu coeuntes afficiens, tunc venus ignauior est, eiusq; desiderium aut nullū aut exiguum, fœminini mores, & verecundi: penis tardior erectio, eiusdemque & vicinarū partium gla-

brities. Quod si frigiditati iuncta sit humiditas, copiosum, sed aqueum, si siccitas, perpaucum emittitur semen. Atque hæc omnes intemperies, vbi excesserint sterilitatem arguunt. Vt igitur certa methodo progrediamur, primò de causis sterilitatis externis & euidentibus agemus, postea ad internas accedemus.

Curatio sterilitatis à causis externis.

Sterilitas quæcunque ex praua diætâ sine vllis corporis, viscerum, aut pudendi virilis præter naturâ affectib. marib. accidit, contrariio victu remouenda est. Calidius ergo sicciusque semen dissimili victu tēperandū, ac primò cibis euchymis quidem, sed frigidis humidisque, cuiusmodi sunt carnes capreolorum, agnorum, vitulorum, præsertim lacte educatorum, porcellorum, pullorum, quæ vel frigidiorib. herbis elixandæ, vt lactuca, borragine, buglossa, oxalide, portulaca: vel assandæ & succis acidis condiendæ, vt omphacio, granatorum succo, aurantiorum, oxalidis. Ex vsu quoque erunt panatellæ, amygdalata, pisces fluuiatiles elixati, æstiuu fructus, vt pruna & cerasa; refrigerat quoque & humectat lac asininum & caprillum, aut potius eius serū mane sumptum. Panis sit albus sed insulsus: vinum oligophorum album vel rubellum, mediocriter lymphatum; aer temperatus sit vel frigidiusculus: conueniet etiam balneum vel ex aqua fluuiatili tepida, vel ex decocto herbarum frigidiorum: denique labor immoderatus, immodicæ vigiliæ & iracundia fugiēda. Frigidiori verò & humidiori semini corrigendo conueniunt, panis albus, salus, anisatus, carnes veruecum, gallinarum, caponum, passerum,

rum, perdieum, pipionum, vel tostæ & aromate aliquo conditæ, vel elixatæ cum herbis calidiorib. cuiusmodi sunt cruca, nasturtium, mentha, hyssopus. Cōueniunt etiam pisces saxatiles tosti, & aromate aliquo conditi, vt cinnamomo, nuce moschata, zingibere, fructus sicciore, vt dactyli, passulæ, pistacia, carica, nuclei pinei, conditura zingiberis, corticum mali aurantij, seminum anisi, fœniculi, carui, in vltima mensa: vinum quoque competit rubrum generosum modicè lymphatum, vigiliæ, & exercitatio moderata. Quod si accadat seminis inopia ex aëre æstiuo vel hyemali (ille enim seminis substantiam digerit, hic extinguit, vnde paucissimæ aues mēse Iulio & Ianuario fœtificare solēt) ex inedia, labore, vigiliis, mœrore, iugibus curis, attētōq; nimis studio, hæc omnia seminis detrimenta declinabit sapiens coniux, splendidā, opiparā, & hilarem vitam venereis sermonibus, lectionibus, muliebribusque lasciuiis conditam traducens. Et quia vt dictum est frequentissimæ sunt dissidiorum & sterilitatis inter coniuges causæ, tū ingeniorū disparitas, morūq; peruicacia, tū corporū deformitas, & alieni amores, horum omnium propria sunt & opportuna apud sapientes remedia. Primū enim alieni amores celeriter profligantur, mutuæque coniugum beneuolentia, quæ fœcūditatis parens est, redintegratur non solum morum indole, aut corporum venustate, sed multo magis voluptate, quæ veneri concubitus comes est. Hęc vero accendi solet tum internis remediis cardiacis & calidis, à quibus caloris & spirituum omnium substantia ingeminitur, impetūsque eorundem concitetur: tum externis etiam, partes obscenas odore suo, calore & acri-

monia quadam titillatibus. Huius generis sunt præstantissima Ambra, moschus, ciueta, liquore conuenienti aut oleo soluta, sed quia cariora hæc sunt, viliora vsurpatur: penis igitur ciueta perunctus aut moscho soluto cum paucō oleo liliaceo, nō solūm ad venerem excitatur, sed mulieris quoq; ignauiam ad venerem discutit. Simile est pessarium ex ladanī 3 s pyrethr. 3 ij galliæ moschata 3 iij simul solutis in puluerem, & exceptis paucō cottone moschato & serico rubro, vt fiat pessarium digitali magnitudine, altissimè in vuluam dormituræ inserendum. Simile & hoc est. ʒ rad. galangæ cyperi, pyrethri, calam. arom. an. 3 j. trochiscorum galliæ mosch. 3 s: vel moschi optimi ʒ j. fiat puluis, excipiat paucō melle instar opiatæ: obducatur testibus & peni cum multa fricatione coituri mariti. Simile & hoc sit. ʒ olei laurini 3 j de spica 3 s muschatellini 3 ij nucis mosch. piperis longi, zingiberis an. 3 j rad. pyrethri 3 s ciueta, vel moschi ʒ j ceræ parūm: fiat unguentum illinendum in introitu lecti vesperi. Simile denique est cubearum masticatorum cum salvia admotarum. Ad voluptatem quoq; confert virginalis pudendi muliebris astrictio, præsertim à partu, ex balneo, potūque astringente, vel ex pessulis similibus, aut emplastris à lotionē fortūe appositis. vt, ʒ rad. bistortæ 3 j balaustiorum, nucum cupressi, calycum glandium an. 3 s foliorum taphi barbati, vel caudæ equinæ & absinthij an. m. j. rosarum rubr. p. j. decoquantur in aqua pluuiali & vino astringenti, vel ʒ pulueris gallarū nucum cupressi & aluminis an. 3 s excipiat paucō cottone & serico rubro, fiatque pessulus ex vino astringenti, immittendus post finitum lochio-

rum

rum exitum. Ex eodem pulvere cum oleo myrtino & cera alba fiat emplastrum ori pudendi admoendum, post lotionem & fotum.

Quæ sequuntur philtra amatoria coniugum amorem mutuū reuocare tuerique proprietate occulta creduntur. Huiusmodi est corniculæ cerebrum, quæ viua capta sit & necata, cum melle mixtū, pudendōque virili applicatum ante coitum. Eadem est vis ouorum eius fractorum & appositorum: Item damarum stercus, & cum oleo tepido dissolutum, item fel apri & hirci & lupi cum oleo calido mixtum & applicatum. Cor quoque hirundinis vstum & ex vino deglutitum mulierem à viro secedere prohibet, sicuti adulteri quoque odium inducitur si ranæ fluuiatilis naturâ arundine transfixâ, furculus eiusdem in menstruis mulieris defigatur, sicque ait Plin. lib. 32. ca. 5. ranæ ad cauenda adulteria legibus sunt vtiliores. Electariū deniq; ad veneris oblectationem & incendiū ita fingatur. ℞. Cinnamomi electi & lumbarum scincorū an. ʒj. seminis nasturtij, erucae, pastinacæ, ceparum alb. an. ʒj trium piperum, rad. pyrethri & gummi arabici an. ʒj ʒ nucleorum pini, pistaciorum, dactylorū & auellandarum, amygdalarū dulc. pulpæ nucis Indicæ, corticum citri & zingiberis viridis conditi an. ʒj lingue anseris, cerebri passerum an. ʒj ʒ lingue auis, testiculorum vulpis, taurique an. ʒij misceantur omnia simul cum melle, addēdo moschi optimi ʒj ambre grizæ ʒj fiatque opiata, de qua dētur mane, sed præsertim vesperi ʒij cum paucō vino dulci.

Iam verò conceptum ex prauitate morum odiū cōsilio & ratione delendum est, monenda sedulo vxor est, vt honesto proboque suo viro morem gerat,

petulantia & contumelioso tātisper blandiatur, dum obsequium suū aut ætas, aut proborum consuetudo peruersitatem mariti, morūque asperitatem mitigauerit. Mariti quoq; erga morosam & peruicacem uxorem simile sit cōsiliū & officium: obsequium enim amicitiam & familiaritatem: dissidium, inimicitiam & sterilitatem parit.

Deformitas denique eiusque tædium sanitate virtutum leniēdum est, quæ prima est maximēque expetenda pulchritudinis species, & animis cōiugum inter se dissidentium conciliandis aptissima: quam corporum quoque pulchritudo negligenda nō est, quin potius quæ à natura est studiosè conseruāda: sunt enim artis partes duæ, vna cosmetica, quæ naturalem tuetur: altera commotica, quæ deficientem asciscit. Ac naturalis quidē pulchritudo ex moderata corporis tēperie & symmetria, quam vegetus calor, eufarchus habitus, & cōgrua partiū compages cōsequatur, à Galeno definitur libro ad Thrasylulū, & ab Aristotele primo Rhetoric. ex actionibus partium integris & ad vitā necessariis. Cosmetica igitur medicinæ pars est Galeno lib. I. κατὰ τόπον, cuius est ea quæ secundū naturā sunt, omnia accuratè custodire, cōstātque mundicie corporis cultusq; nitore & cōcinnitate, qualis ab Ouidio in viris probis priuatim laudatur, tametsi in honestis matronis & pudicis virginibus minus laudanda sit: ait enim ille:

*Mundicia placeant, fuscantur corpora campo,
Sit bene conueniens, & sine labe toga:
Linguaque nec rigeat, careant rubigine dentes,
Nec levis in laxâ pes tibi pelle natet:
Nec mala deformat rigidos tonsura capillos,*

Sit

*Sit coma, sit doctâ barba resecla manu:
Et nihil emineant & sint sine sordibus ungues,
Inque cauâ nullus stet tibi nare pilus:
Nec male odorati sit tristis anhelitus oris,
Nec ladat nares, virque patêrque gregis.*

Altera artis pars Commotica scilicet, fallacem & ascititiam pulchritudinem inducit, & apud plerasq; gētes olim probrosa fuit, ideoq; à Philippo Macedonum rege magistratus quidā mendacio capillorum suorum exultans, ex ordine iudicum, teste Plutarcho, motus est, quòd nullam iudicij integritatem in eo esse diceret, qui capillis etiā fucum prætenderet: Gal. quoq; à medicorum munere eam remouit, lenonūque & mangonum propriam esse statuit lib. κατὰ τὴν πρῶτην; multi tamen præclarissimi olim medici eam sibi notā esse voluerunt, vt Heraclides Tarētinus, Archigenes Crito, neque eius exercitacionem sibi indecoram esse duxerūt, quoties reginarū & heroinarum votis satisfacere cogerentur, quibus etiā addo quædam pudicarum virginum & honestarum matronarum vitia formam dedecorantia, posse sine vlllo artificū dedecore dissimulari: Itaque veterum exemplis permoti posteriores medici, vt Fallopius Rondel. multiq; alij muliebres fucos studiosè prosequuti sunt, quib' omissis, vnus scœtoris curationem ex quacūque parte prodeat breuiter attingā, quippe ad disiungēdos amātium animos, hoc nullū maius, magisq; tetrum venenū est. Est autem pulchritudinis ad amorem & beneuolentiam tanta vis, vt in quibuscunque hominibus ipsa elucet, vnūquemque ad eos amādum mirificè inflāmet, neq; id quidē stultè & leuiter: quidquid enim animę cognatū est, pulchrū sit oportet, ideóq; amādū & expetē-

dum. Quod rursus appetendū est, aut est aut videtur bonum (ita quidē disputāte Cælio) Itaque pulchrū bonūque eodē nomine Hebræo vocatur רֵעוּן quod à pulchritudine bonitas vix vnquam sciungatur, id eōq; vulgusetiā cōspecto homine formoso gaudet, informis occurſu dolet: scilicet illū faustū & auspīcatum, hunc infautum & ominosum arbitratur.

Est igitur fœtor duplex, vnus nō naturalis, à cibis vel multis & corruptis, vel putrefactis. Alter est præter naturā, nēpe symptoma odoris deprauati, quod vel corruptela substātiæ partium, vel antiquum aliquod vlcus, vel obstructio à putrido humore suscitauit. Est autem odor qualitas odorabilis in vapore cōsistens qui expirare solet à corpore calido tenuique & modicè humido, vel parum sicco. Nam à sicciori crassōque, siue calido, siue frigido nullus odor spirat. Odorum genus duplex est, vnum bene olentiū ob familiaritatem & sympathiam cum spiritu animalis: alterum graueolētium ob antipathiam, estque sine nomine multiplex: odoris percipiēdi vnus est sensus, scilicet odoratus, vnū instrumentū princeps, vel vētriculi cerebri anteriores, vel potius propagines duę māmillares & papillares ob similitudinem dictæ, cum ventriculis continuæ, & ad initium ossis ethmoidis cōtinentes, quæ intra cranium conditæ sūt mollissimæ & rarissimæ, vt vapores odoratos facillime admittāt & diiudicēt, vel certè ad vētriculos ipsos transferāt. Nāsi meatus duos, qui nares dicūtur, ossisque ethmoidis peruia foramina principi parti subseruiunt, conferūt tamē etiā ad ventriculorū cerebri pituitæ expurgationem & ad respirationem. Quamobrē obstructis illis cerebri propaginibus ab excrementis ventriculorum, vt per grauedines

uedines & destillationes, & meatib. nariū vt à poly-
po tuberculo, ossisq; ethmoidis foraminib. à crassā
& resiccata pituita, odorandi vis perit, aut certè de-
bilioꝛ fit, sicuti ab excellenti odore obliterari solet.
Pariter à corruptela substātię nariū, ab vlcere an-
tiquo & ab humoris putredine in processibus, vel
osse ethmoide idē sensus deprauatur. Fœtoris spiri-
tus origo duplex est, vna à causis nō naturalibus, vt
à putribus eduliis esitatis, aut quæ celeriter putre-
scant; altera interna eaque per idiopathiam nasi &
oris partiumque, ex quibus componuntur: tum per
sympathiam partium vicinarum, quarum vapores
suscipiunt, vt cerebri, pulmonum, thoracis.

Curatio duplex est, vna methodica & artificiosa,
altera fucata, vel vt dicunt palliativa. Hæc constat
medicamentis quibusdam odoratis vel ore conti-
nendis, vel in ventriculum deuorandis, cuiusmodi
sunt inter simplicia, radix Zedoariæ, angelicę, semē
anisi, cumini, mastiche, cortex citri, vel limonis, agal-
locum. Hæc enim cōmanducata, aut eorundem de-
coctum spiritus graueolentiam emēdāt. In eundē
finem vsurpantur composita, vt, ℞. Galliæ mosch.
nucis mosch. macis, spicæ nardi, corticis citri, xyla-
loes an. ʒ. j. bulliant simul cum vino ad ablutionem
oris, vel ex iisdem pulueratis, vinoque exceptis fiāt
globuli inter dentes gestandi, vel pilulæ, de quibus
deuoret duas mane, & totidem ore cōtineat inter-
diu. Tales sunt muscardini vulgo dicti. Fiunt item
Italis trochisci vocati muscardini vel à figura, vel à
facultate cardiaca, à quibus spiritus gratia mirificè
iuuatur, si ore contineantur diutius versenturque.
℞. Gummi Ammoniacy ʒ. β terræ sigillatę ʒ. ij. ma-
cerentur in aqua rosarum per duos dies: deinde in

mortarium coniiciantur, addanturque sacchari \mathfrak{z} vj amyli \mathfrak{z} iij. moschi ex aqua rosacea dissoluti \mathfrak{z} j. Cōtundantur omnia simul pistillo, & exquisitè misceantur in mortario, tandēque in pastillos digerantur ad ignem vel solem siccandos.

Legitimæ curationis quæ simul cū symptomate affectum præter naturam excindit duo sunt scopi: vnus vt excrementa putria diligēter abstergeātur, omnisque obstructio aperiatur: alter vt vlcera post deterfionem relictā, carne impleantur, & cicatrice tegātur. Duo sunt instrumēta, diætā & chirurgia, sed hæc præsertim; ac diætā quidē cōmunis esto, tum vt satietas fugiatur, putres & molles, humidiorēsque ac putredini opportuni cibi declinētur, cuiusmodi sūt panis impurus, carnes iuniorum animalculorum, vt porcellorum, agnorum, capreolorū, auīū aquaticarum, tales quoque sunt pisces nō saxatiles neque salsi; fructus horæi, vt pruna præcocia, melones, cucurbitæ, vinū crassum & dulce, omnia iuscula, allia quoque, cæpe & brassica. Contra quæcumque sunt euchyma & cupepta, edulia & cōdimenta omnia acida aut acris, indēque putredini aduersa seligātur. Ante pharmaciam affectus curandi signa exponēda sunt. Idiopathia igitur narium ab vlcere sordido, cancro, polypo, oculis notatur. Sympathia cerebri processuū & ossis ethmoidis dignoscitur ex pari fœtore ante & post pastū, quodque cōpressis naribus nullus fœtor ex ore erumpat, quodque clauso ore vicissim ex apertis naribus, fœtidus spiritus exhalet: Sympathia stomachi noscitur, quod à pastu aut nullus aut cibi odore mixtus efflatur. Idiopathia oris, ex gingivarū vlcere sordido, dētīsque corruptela sensu detegitur, ex intēperie calida oris, siti & caliditate. Sympathia
pulmonis

pulmonis vlcerati ex vlcere signis: thoracis empyici, ex sputis purulentis albis, spissis, lentisque: sympathia denique ventriculi ex fœtore post paltum obscurissimo sese prodit.

Prognostica.

OMnis fœtor malum signum est, & putredinis interioris index: sed in phthificis perniciosū & tabificum. Fœtor simorum & gibbosorum est incurabilis. Fœtor anhelitus per febres cōtinuas nallum signū est: libidinosorum & eorum, qui crapulæ indulgent fœtor facile curatur. Itaq; idiopathia narium ex vlcere, post reuulsionem, per purgationem & phlebotomiam si vtriusque indicationes adsint, & post deriuationem per cucurbitulas cum scarificatione, collo, summisque scapulis infingendas, & apophlegmatifinos, tum demum curabitur per propria vlcere remedia, tergentia, maximēque siccātia & epulotica, de quibus vide chirurgicos libros. Sympathia cētrebri processuum, & ossis ethmoidis, post eādem reuulsionem & deriuationem, curabitur errhinis, tergentibus, incidētibus & aperientibus obstructions partium prædictarum, tādēque sternutatoriis. Idiopathia oris ex gingiuarū exulceratione, curanda quoque est per easdem reuulsiones & deriuationes si sint ex vfu, tādēque per validam detersionem fricationēque gingiuarum cum linteo aspero, donec sanguis effluat, cui astrictio, siccatioque validior subiungatur, his formulis.

℞. rad. bistortæ ꝑj foliorum tapfi barbati & caudæ equinæ an. m. j. gallarum, nucum cupressi, balustiorum, calycum glandiū an. ꝑj mastichis ꝑss rosarū rub. boli armeniz an. ꝑj coquātur in aqua ferrata, vel vino tortiuo. vel ℞. Aluminis rochæ vss ꝑss

balauftiorum, baccarum myrti an. ʒ ij cornu cerui & ambræ citrinæ an. ʒ j moschi gra. ij. fiat puluis, excipiatuꝛ paucō melle: (vel per se etiā sumatur) fiatque linimentum.

Idiopathia ex cavitatē dentis & ciborū in ea retentorū putredine, curatur pꝛemissis reuulsionib. & deriuationib. iisdem, tū extractione eius per forcipem dentarium ὀδοντομαχῆν dictum si vacillet, vel vltione & tabefactione (si non vacillet) per cauteriū actuale, vel medicamenta acerrima, vt tādē siccatuꝛ decidat, vel denique limatura cariosæ & rubiginosæ partis, si superficiaria sit: postmodum lotionē ex aceto scyllitico mane & vesperi, vel ablutione ex decocto galangæ, caryophyllorum, spice nardi in aceto, repletionē denique cavitatis per frustulum ladanī, storacis, benioini aut radicis galangæ &c.

Sympathia ventriculi curatur, primū vitiosi humoris alteratione per syropos frigidos, si calidus exsiti noscatur, vt acetosum simplicē: deinde purgatione per pilulas Rufi, de hiera; postremo corroboratione per electarium refrigerans vt triasantalum, diamarg. frigidū: si verē humor frigidus putrescat, per syropos calidos, vt de mētha, oxymeli scylliticū coquatur, deinde purgetuꝛ pilulis alephanginis & assaieret: Postremo intemperies ventriculi relicta curetur electario aromatico rosato & diagalanga. Sympathia denique pulmonis curabitur propriis phthisicos remediis.

De fœtore alarum.

PArticularis alius quoque fœtor est, axillarum, pedū, pudendique muliebris. Axilla enim pars corporis cum sit concaua & glandulosa, multisque
vasis

vasis maioribus prædita, atque calido humidoque temperamento & substantia rara, sudoribus multis patet, inualefcente calore, qui cum non perspirent, ob partis abditum situm, vestiumque munimentum facillime putrescunt, in viris præsertim & fœminis rufis vt pote sanguineis, & hominibus libidinosis, vnde Martialis,

*Inde Tragus celerésque pili mirandæque marri
Barba.*

Fœtor hic axillarum Horatio *Hircus* dicitur. Catullus *caprum* vocat, quando
Sub alis trux habitat caper.

Huius remedia sunt in diætâ & pharmacia, vt illa sit non modò temperans & frugalis, sed sicca quoque vel frigida, vel calida, pro naturarum & tēporis anni varietate, pharmacia autem sit, tum purgans & phlegmagoga, tum alterans partē, id est adstringens laxitatē eius, tergensque & exsiccās cohibitos in poris liquores putres, tum denique odorata: sed instituatur tantum alteratio hæc post pilorum rasionem & quidem liquida, aut media forma. R. Summitatum myrti, oleæ, laurique an. m. i. rosarum rub. santali citrini, calami arom. an ʒ ij aluminis rochæ ʒß coquantur in vino rubro & hoc decocto quotidie in introitu lecti pars cum linteolo tepide abluatur, deinde sequenti puluere aspergatur. R. Aluminis rochæ ʒß myrrhæ & santali citrini an. ʒ ij galliæ mosch. ʒß fiat pulvis, aspergatur loco dicto. Pedū quoq; molestissimus est fœtor per æstatē præsertim motusque violentos, ex sudore commoto & putrefacto ob tegumenta perspirationem impediētia, quoties accensus calor serum, id est sudoris materiam è proximis venis in cutem rapit te-

nuem, raramque: Huic foetori opitulantur præter diætam & purgationem præscriptam crebra mutatio calceorum, caligarum & linteolorum, quæ sudoris putris madefactione olere pessime solent: sed maxime frequentes lotiones è simili materia amara, acri, tergente & adstringente, vt & summitatum myrti, foliorum cannarum, vitium, tempore æstiuo, hyberno verò saluæ, melissæ, sampsi, lauri, hederæ, lauendulæ an. m. i. rosarum, centaur. minor. an. p. i. salis & aluminis an. quartar. j. coquantur omnia vel in lixiuio debili cineris sarmentorum vel in portionibus paribus aquæ & vini rubri.

℞ lithargyri arg: ʒ ij santalorum omnium & rosarum an. ʒ ij fiat puluis, aspergatur superficiei pedū post lotionem. Pudendi denique muliebris foetor marito displicere solet, cuius origo pariter est à sudore, vel etiā humore putrido præ calida & humida loci temperie, rara substantia, humorum alienorum descensu, menstrui feminisque reliquiis cohibitis, quorum omnium procliuis est obtectum secretumque ab aere locum putredo. Hic quoque foetor abigendus post diætam & pharmaciam præscriptam, primū quidem rasure pubis ne qua sordes illi obhærescat, deinde lotionem & embregmate simili axillarum, cui aliquid pulueris cyperi admisceri possit.

Eiusdem putredinis soboles est pediculorū proventus planorum & multipedum, quorum agerrima est euulsio: necantur autem celeriter post lotionem amaram, acrem detergentemque vnguento sequente.

℞ olei ʒ iij argenti viui ʒ j starungia porci ʒ ij misce diligenter in mortario fiatque vnguentum
bis

bis aut ter inducendum partibus obscœnis.

*De graueolentia totius corporis, &
quomodo curanda.*

Beneolentia in brutorum genere rara est, vni-
que pantheræ Aristotele & Plinio testibus pe-
culiaris: sed tamen cōmunis etiam est iectidibus, hoc
est martibus zebellinis, cercopitheco & hiænæ,
quæ cato maiori similis est, & zebeth Arabibus di-
citur, è cuius vesiculâ inter pudēda sita, odoramenti
species (ciueta dicitur) cochleari argenteo semel
per singulas hebdomadas deraditur: Rarissima quo-
que in hominibus est nisi fortasse in Alexandro
Magno referente Plutarcho, è cuius corpore tam
iucundus odor expirabat vt odorata fragrantia in-
dusium eius satiaret. Graueolentiæ autem pro-
xima causa est putredo sudoris non abstersi, aut
humotis serosi in poros cutis impacti, neque liberè
& perfectè discussi. Ea quidem quibusdam natio-
nibus gentilitia est, vt Recutitis quod Christum
non colunt Campesio credente, sed multo po-
tius, quod à sale, falsisque eduliis ex lege sua ab-
stinere cogantur. Origo duplex est, vna ab ex-
ternis causis vt crapula & ingluvie, aut caco-
chymia humida: ab ytraque enim multiplicatur
in sanguine serosus, crudusque humor. Ab aliis
humor hic ex venis in cutis poros euocatur vt ab
exercitatione impuris corporibus adhibita, ab æstu:
vel impellitur in eundem vt à ficibus, maxime
vero si immundities corporis adsit, vestiumque
mutatio negligatur, vel à libidine & veneris in-
temperantia à qua tum coctiones perturbantur,
tum crudi humores in habitum expelluntur.

Alia origo est ab internis caussis vt temperie humidiori siue calida, siue frigida. Huius graueolentiæ vniuersalis remedium primum est diæta sicca & euchyma, vel calida, vel frigida pro naturarum cœlique varietate, à qua cibi omnes humidiores, crudiores, fatui, molliorisque substantiæ arceantur. Eadem quoque frugalis sit & temperans vt omnis cruditas declinetur. Alterum genus remediorum est tum vacuantium caco-chymiam pituitosam è prima secundâque capitis regione, per phlebotomiam vel deiectionem, vel vtramque; tum alterantium & vacuantium causam coniunctam, id est humores cuti impactos à tertia regione, idque per sudores laconicos commouédos, balneis thermalibus & lauacris quæ ex decoctis calidis siccisque tergentibus & odoratis constent, addito etiam sale & alumine ad cutis corroborationem. Talia sunt pro lotionem pedum antea descripta; Interna quoque sunt eiusdem causæ coniunctæ præsidia vacuantia vel per vrinam, sic enim cardui radix in vino decocta, bibitaque copiosam foetidamque vrinam mouet: vel per sudores vt decoctum guaiacinum. Eadem est ~~phlegmæ~~ *pedicularis*, id est pedicularis morbi curatio. Eandem quoque graueolentiam vestium & indusiorum fragrantia consopit, per sacculos sericeos odorato aliquo puluere refertos & vestibus indusisque intermixtos, vt. ℞. pulueris violacei lib. i. pulueris cyperi ℥j misce condantur in sacculos. vel.

℞. Iridis Florent. ℥ iiij. santali citrini ℥ viij. benioini xylaloë, cyperi calami aromatici, schænathi, corticis citri an. ℥ ss seminis ocymi, lauendulæ an.

3 ij moschi optimi ʒ j fiat puluis pariter condensus.

Sic flosculi rosarum pauca zibeta allinuntur & pariter contunduntur.

De sterilitate à causis internis tum naturalibus, tum non naturalibus, & quomodo curanda sit.

Proximæ sunt sterilitatis internæ & naturales causæ tres, natura, ætas & habitus. Natura quidem intemperata, simile seminis vitium profert unde sterilitas existit, nisi à diuersa seminis scemini & sanguinis temperie ita reprimatur, vt ex vtriusque mixtione vnum quid temperatum emergat, quod arte non eget ad fecunditatem. Quod si vtriusque sexus eadem intemperies in sterilitatem conspiret: tum in altero sexuum mutanda est: sed in scemina potius quam mare, quæ agrorum fertiliū instar, vbi temperata est, quodlibet semen fecundare solet. Duæ autem temperatæ coeuntes naturæ, sunt fecundiores, sicuti quando temperata vna concurrat cum altera, quæ minus insigniter intemperata sit. Quando autem propriis signis perspecta fuerit naturarum species, tunc illa primum victu contrario abrogetur qualis mox exponebatur, deinde medicamentis alterantibus vt calida frigidis, cuiusmodi sunt electuaria dura, molliaque. Illa quidem vt triasantalum, diamarg. frigidū, diarrhodium Abbatis: hæc conseruæ rosarum, violarum, cichorij: item syrupi de endiuia, acetosus simplex, de agresta, de succo mali aurantij, de limonibus. Hæc omnia ieiuno ventriculo mane multoque tempore ingerantur. Sic frigidiorem reuocant electuaria ca-

b 3



lida, vt aromaticum rosatum, diagalanga, diambra, conditura corticis citri, radicis satyrii, florum roris marini & saluæ. Iam verò quoad ætatem, fecunditas definitur ætate duodecim annorum, & sexaginta annorum in senioribus. Intra supràque nullum veneris incitamentum, aut seminis remedium, est vtile aut necessarium. Aristoteles autem matrimonium celebrandum suadet septimo Politicor. in fœminis quidem à decimo septimo anno, quod tum defierit earum accretio, sintque robustæ & ad ferendos partuum labores & coitus violentiam: in viris à vigesimo quinto ad trigesimum, quia illi tum desinente accretione mentis corporisque præstant robore, possuntque liberos bene valentes tollere, eosque consilio regere & educare ad adolescentiam usque. Prius verò, vel inualidos vel tardiùs procreant liberos. Tertia naturalis sterilitatis causa, est habitus vitium duplex, auctæ quantitatis, & eiusdem diminutæ (habitus nomine complectimur externam musculorum corporis superficiem) illa græcis πολυερκία, παχυσμός vel παχύτης, latinis obesitas, crassities, crassitudo, corpulentia & ventricositas; hæc λεπύτης tenuitas, ἰχνότης gracilitas & λεπτοτισμός attenuatio dicitur. Obesitas igitur est latitudinis & profunditatis excretio ad partes anticas & posticas, extimāsque & intimas. Duplex autem est, vna naturalis instar temperiei humidioris modicæque frigidæ vel calidæ. Altera non naturalis ascititiæ & ex consuetudine contractæ intemperiei soboles. Vtraque rursus duplex est, vna salubris quæ cum sanitate coniuncta est, possuntque obesi sani, omnino obire negotia ciuilia, vigilare, dormire, appetere

re , concoquere , ambulare , currere , spirare , denique generare. Altera morboſa eſt , quæ ad extremum craſſitudinis perducta eſt , adeo vt lædat functiones omnes , ideóque ſtupores ſenſuum , inertiam mentis , torporem in motu ob luxuriantem mollitiem cerebri , & ſpirituum craſſitiem inducit , item dyſpnœam , indéque cordis tremorem & palpitationem ob thoracis grauitatem , faſtidium , ob redundantem in ventriculo pituitam , ſitis , ſanísque impatientiam , ob paucitatem ſanguinis & venarum anguſtiam , artuum mouendorum impotentiam , vt neque manus ad fricandum aut caput , aut ſcemur porrigere poſſint , multo minus generare , tum quod coniungere pudendum nequeant cum muliebri , tum quod ſemen paucum , idque ſterile ſuggerant , vnde neque venerem appetunt , neq; eadẽ delectantur. Mulieres quoque eadem ſeminis incommoda perſentiſcunt , neque etiam ſemen virile in ſinum vteri excipiunt , ob eius compreſſionem ab augmento pinguiori , neque immiſſum retinent ob mollitiem , aut ſi conceperint abortire ſolent , aut certè pariunt imbecilliores fœtus. Obefitatis generatrices cauſæ externæ ſunt , quæcumque aut calorem hebetant , aut alimentum augment , aut vtrumque præſtant , vt aër frigidus , humidus (hinc Scytharum corpora obefiſſima Ariſtoteli) otium , quies , animi tranquillitas , ſomni diuturnitas , cibi enchymi , plures , & alimentoſi , vt vinum præſertim clarum & dulce , ſiue album , ſiue rubrum. Internæ cauſæ ſunt intemperies humida quidem : ſed non impenſè frigida , calidave , quæ ſanguine eiúsque oleoſa materia abundet , cuius , quia venarum

angustia totum capere non potest, magna pars extrudatur foras, quæ vel in partes frigidas, calidasue, vel in pinguedinem vertitur, vel in habitum, eius deinde accessione & caloris temperati robur, & carnea moles exaggeratur, assimilatione & coctione. Porro obesitas omnis odiosa quidem est: sed differentiarum eius propriis internoscendæ signis, ut putat naturalis à colore albo, mollitie cutis, giabritie, & venarum angustia, non naturalis & ascititia colore subrubro nigroque, cutis duritie, pilositate, venarum amplitudine, morbosa ex symptomatis functionum ante commemoratis, salubris ex functionum integritate, obesitas denique ex pinguedine detegitur ex albo colore, laxitate totius corporis & frigiditate ad tactum. Quæ ex carne provenit, illa ex colore albo cum rubore mixto, ex soliditate habitus, ex caliditate ad tactum, agnoscitur. Obesitas omnis tam salubris quam insalubris omni ope declinanda est ut pote quæ non solum senibus gravis, sed & iuuenibus indecora, & vitæ plerumque noxia sit. Patet enim hic habitus multis obstructionum, phlegmonarum, febrium acutarum hæmorrhagiarumque & suffocationis caloris nativi periculis, teste Hippoc. aphor. 44. lib. 2. & Galen. secundo de temperamentis capite 12. quod paucus in venis concludatur sanguis, sicuti pauca vis caloris & vitalis spiritus in arteriis. Omnis porro obesitas arte superabilis est: quæ tamen naturalis & diuturna difficilior remouetur. Obesitatis cuiuscumque quum effectrix causa, sit temperies præsertim humida: sed modicè tantum frigida vel calida, aptè quidem curabitur diætâ cali-

calida, siccâque, quæ tum temperiem mutet, tum materiam obesitatis dissipet. Aër igitur comparetur calidior sicciorque, vel sole vel igni sub quo maneat nudus si possit, aut arena vel cinere à sole calefactis sæpissimè obruatur: motus sint vehemētes & acuti, quique laborem, sudorem & lassitudinē accersant, eiusmodi sunt luctatio, equitatio, lusus pilæ parvæ vel follis magni, fossio agrorum, dimicatio gladiatorum, cursus vehemens, idque à cibis coctis, somnus breuior super cubile durum non plumaceum, negotia ardua, graues curæ, frequens iracundia, sæcum quotidiana excretio, vel clystere acri paulò post pastum, vel pilulis stomachicis ante pastum sumendis, vt chyli distributio impediatur. Ad pharmaciam quoque spectat crebra & vehemens purgatio pituitosi humoris, copiosi sudores, vel ex decoctis guaiacinis, vel aquis thermalibus vel laconicis: phlebotomia quoque crebra, sed pauca ob paucitatem sanguinis, & hirundines non hæmorrhoidibus tantum, sed artubus, aut toti corpori admotæ, electaria denique acerrima qualia sunt mithridatium, theriaca, confectio anacardina, trochisci viperini, quorum crebro longoque usu quosdam adeò attenuatos fuisse testatur Gal. libro 14. meth. cap. 15. vt mortui sint.

Iam verò obesitati contraria est, vt diximus, affectio illa, quæ macies, tenuitas & gracilitas vocatur: nempe carnez substantiæ infra naturalem modum diminutio, quæ sterilitatis quoque effectrix causa est: tum ob seminis & sanguinis inopiam, tum ob facultatum naturalium, vitaliumque & animalium ruinam. Gracilitatis differentiæ sunt tres præcipuæ. Vna naturalis, secunda non naturalis, ter-

tia præter naturam : atque istarum ynaquæque vel confirmata vel imperfecta est, salubris vel morbo-
sa, vniuersalis, toti corpori communis, vel particu-
laris. Naturalis temperiem natiuam sequitur im-
pensiùs siccam frigidamque vel calidam. Alia non
naturalis & ascititia è consuetudine est, victùque
sanguinem aut non gignente laudatum, aut lauda-
tum promptius resoluente. Quæ præter naturam
est, illa morbi symptoma est, vel acutissimi vt febris
ardentis & colliquantis, vel diuturni vt febris he-
ctica, lentæ, humidi, lienis & hepatis, vlcerationis
pulmonis, vermium in intestinis puerorum, & ab-
scessuum in visceribus. Salubris actiones omnes in-
tegras tuetur. Denique confirmata est, cum non so-
lum primæ & secundæ humiditates : sed pinguis
quoque & carnea substantia, atque adeo primige-
nius humor partium spermaticarum confectus est,
tùmque cutis contracta siccataque cernitur. Non
confirmata censetur illa, in qua pinguis tantum &
carneæ molis iactura est, ideòque cutis mollis, laxa
flaccidaque occurrit tactui, atque hæc omnia ex
Gal. 6. Epid. comment. 3. textu 29. Causæ gracilita-
tis non naturalis externæ sunt, eòque spectant, quæ-
cumque sanguinis copiosi generationem prohi-
bent, vel eundem genitum violentius dissipant, vt
aer impendiò sicciior, idemque calidior, vel frigi-
dior, (siue temporis, siue regionis ratione) in eòque
diuturna nimis mora, item quælibet euacuatio ve-
hemens, vel diuturna vt hæmorrhagia, diarrhœa,
sudor, lotium immodicum, laconica, aquarû ther-
malium, frequentia balnea, exercitationes immo-
deratæ, vel etiam nullæ (vt enim labore vires dis-
soluuntur, sic & desidia) frictiones validæ, multæque
vigi-

vigiliæ, iracundiæ, curæ graues, & litigatio, victus tenuis tum actu, vt cum paucum rarumque alimentum, tametsi alimentosum sit, exhibetur, tum potentia, vt cum copiosum quidem alimentum sed minimum alens assumitur, vel attenuans etiam vt acres & calidi cibi, vel etiam enchymi, qui aromatis aerioribus & multo sale conditi sint. Electaria quoque acerrima eadem gracilitatis commouendę facultate diuturno vsu præstant vt theriaca, mithridatium, pastilli viperini, quorum longiori vsu quidam non modo attenuati, sed necati etiam sunt apud Gal. 14. meth. capite 15. Naturalis maciei causæ internæ sunt, temperies natua impensè sicca, eadēque vel calida vel frigida, hæc enim sanguinem parcius gignit, illa citius & copiosius genitum digerendo conficit.

Signa Diagnostica.

MAcie naturalē à calida, siccāque temperie ortam demonstrant venarum latitudo, color subniger & hirsuties: sed eam quæ est à natura frigida, siccāque, affectiones corporum contrariæ, venarum angustia, pauca pilositas, colorque non nigricans designant, insalubrem tum morbus præsens, cuius symptoma est, tum actionum læsio, quarum integritas salubrem adhuc maciem denotat.

Signa Prognostica.

MAcies naturalis & non naturalis, vtræque si salubris sit, expetitur potius quam accusatur, nisi fortasse à mulierculis obèsam & turgidulam pulpam pulchritudini tribuentibus. Quæ morbosa est, sere incurabilis est etiam si confirmata non

fit, ob morbos comites. Quæ confirmata est curationem quoque non suscipit, cum partes solidæ humectari nequeant, ex Gal. 7. meth. licet enim siccitas difficilius, quam humiditas & obesitas curetur, hæc tamen periculosior est ob facilem exigui caloris & spiritus suffocationem.

Curatio.

Curationis scopi sunt tres, vnus est multiplicatio sanguinis temperati ex primæ & secundæ coctionis probitate; alter eiusdem ad tertiam regionem habitumque deductio. Tertius est sanguinis attracti retentio dum assimiletur. Instrumenta duo sunt, victus & pharmacia. Ille sit totus analepticus, id est resectorius, ab eoque remoueantur quæcumque pusillum calorem offendunt, extinguendo digerendove vñ albor, æstus, lassitudo, cruditas, vigilæ, mœror, ira, omnesque animi grauiore affeetus. Aër igitur sit humidissimus, idemque calidus, vel frigidus modicè & temperato proximus, qualis natura sua est veris & autumnii tempore, aut arte comparetur vt luculentis ignibus per hyemem in conclau accensis, per æstatem patefactis ad Aquilonem fenestris, stratoque foliis & ramis frigidarum platarum cubiculo, motus sit moderatus, somnus multus in cubili molli, hilaritas vitæ, curarum, negotiorum arduorum, grauiumque animi symptomatum & veneris securitas. Cibi sint euchymi & eupepti, quorum facilis sit concoctio & distributio, vt quod robur deest suppleatur, quodque vacuum est cito resarciatur, sint plurimum humectantes & modicè vel refrigerantes, vel calefacientes, vt lac asininum, capillum, quotidie mane & ab vber
re ani-

re animalis calens recensque haustum, vt carnes recentes vitulorum, veruecum, caponum, gallinarum saginatarum, fasianorum, perdicum, & similes rarius tostæ, crebrius elixatæ, earumque iuscula vt vocant consummata, expressiones, contusiones, cremor hordei, fabarum, cicerum, auenæ, medulla panis albißimi cum multo iure pingui carniū, aut cum aqua & butyro diutius cocta: alioqui enim viscera obstruerent, neque citò facilèque distribuerentur, amygdalatum deniq; ex amygdalis, nucleis pineis & auellanis simul contusis & cum iusculis carniū decoctis. Vinum subcrassum sit, siue rubrum siue album. Hic autem victus parcè & sæpe exhibendus est: egent enim multo cibo macilentis, quem tamen pusillus eorum calor affatim non conficiat: Atque sic primus curationis scopus de multiplicatione sanguinis expeditus est. Secundus expediatur de sanguinis in habitum deductione, quam iuuat cutis & habitus moderata calefactio, totusq; pertinet ad pharmaciam & remedia. Ex iis primum est balneum aquæ dulcis & calidiusculæ, & diutina pro viribus ægri in eodem mora, idque post coctionem vtramque ventriculi & hepatis absolutā, vt sanguis in habitum laxatum tepido calore alliciatur & excipiat. Alterum est frictio mollis vel ex manu nuda, vel linteolo etiam veteri, tantumque ad ruborem & tumorem cutis, vt habitum soluat, poros laxet, sanguinem attrahat & attenuet. Hæc frictio balnei vicem supplebit, dum infirmior est æger. Vtrique, balneo scilicet & frictioni, vnctio rectè subiicitur, præsertim balnei frigidi loco quod macilentis noxiū est. Fiat autem ex oleo aliquo crasso lentoque & dulci, non resolvente, quale est

commune, rosatum, omphacinū, quod attracti sanguinis exhalationem per poros suo lentore infartos cohibeat. Quartum & quintum remedium non solum sanguinis ex hepate maioribusque venis penetrationē in habitum : sed eiusdem etiam morana in habitu dum assimiletur, calore & lentore suo adiuuant. Illa sunt dropacis species duæ veteribus cōfuetæ, nostris ob mollitiem & doloris impatentiam ferè exoletæ. Simplex pice arida sola, exiguo oleo liquata densoque & recenti linteolō inducta constat, quæ vniuerso corpori vel parti alimentum non sentienti subinde calefacta, recalefactaque obducatur vicissim & auellatur, tandēque diutius hæere sinatur. Vis ei calefaciendi & humectandi inest, & ex altis partibus ad summas & cutaneas sanguinis inuitandi, ibidēque cohibendi, ne ante assimilationem exhalet : mouet enim calorem & spiritum remissum, tum per se, tum ex accidenti præ dolore inflictō. Imponitur autem sæpius rariūque, vno vel pluribus diebus, pro affectus magnitudine viriūque ægri, quæ si robustæ sint, reperitum ad-mouendi auellendique dropacis laborem ferunt, idque non prærasis pilis cum affectus magnitudo requirit. Aliàs rasuram præuiam doloris mediocritas suadet. Compositus dropax non sola pice pariter liquata, sed varia præterea materia in varios vsus liquatæ pici admixta constat, vt ad calefaciendum pipere, pyrethro, euphorbio, semine rorisinarini ad siccandum sale, cinere, sulphure. Vterque dropax substantia aliàs liquida fingitur, cum vires sunt debiles, sensimque auellitur prærasis pilis, aliàs solidiori, qualis est cerati & emplastri, cum vires sunt constantiores, tūque non radendi pili, & dropax
 affa-

affatim auellendus est. Alia denique sunt interna remedia augendo sanguini tantum destinata, ut turriones, biscocta, pandaleones, panis marcius & bellaria: tum quæ ex medicamentis thoracicis concinnata sunt, cuiusmodi est opiata sequens.

R. pulpæ nucis Indicæ recentis & non rancidæ ℥ij amygdalar. dulc. excorticatarum, nucleorum pini lotorum, auellandarum, pistaciorum an. ℥j. seminis papaueris albi ℥vj gumm. arabici ℥ß. Contusa omnia exceptaque saccharo, dissoluto in aqua communi, fiat opiata de qua capiat mane cochlearia duo vel tria, superdormiendo.

De deiectione inuoluntaria.

INter non naturales causas sterilitatis, proponitur deiectio mictioque per coitum inuoluntaria, cuius symptomatis causa proxima est musculi sphincteris, alui & vesicæ relaxatio, cui facultatis re-
tentricis debilitas succedit. Porro relaxatio hæc à penuria spiritus animalis oritur, quem vel ingens voluptas ex affusione acriori seminis, & eius quæ vehementius appetita fuerat mulieris fruitione, vel immodicus coeundi labor dissiparit. Accedit tertia causa sine qua non tripertita: tum paucitas raritasque spirituum animalium vitaliumque, tum habitus totius raritas, tum denique mollities & laxitas nativa sphincteris eiusque fibrarum, quæ non nisi magna vi spirituum contendere possunt: neque enim multus, crassusque spiritus per habitum densiorem, à graui etiam labore coitus ingentique voluptate tam promptè discutiatur, aut à tantula spiritus penuria, firmus constansque musculus relaxetur. Eadem est lipothyiniæ, syncopes & mortis aliquando

coitum nimis effrænem consequentis occasio. Proinde duo sunt scopi curationis. Vnus vt copia & crassities spirituum comparetur: Alter vt sphincter ante coitum roboretur: Instrumenta duo, diætæ & pharmacia: illa quidem constet victu copioso & quanto concoqui possit, euchymo, crasso, lentoque, calido & humido, vt ex pane albissimo, carnibus recentibus porcellorum, porcorum, vitulorum, bouum, maiorum piscium, ex iusculis crassioribus vt panatellis, hordeatis, orizæ, quibus aspergatur pulueris dulcis plurimum, ex vino rubro crassoque & dulci, somno denique longiore, & hilari vita. Pharmacia sit calida, humida, spiritiuosa & acris. vt \mathcal{R} . pulpæ auellandarum & nucleorum pini an. \mathfrak{z} β seminis nasturtij \mathfrak{d} j ambre grizee gra. ij moschi gra. iij fiant pilulæ cū vino deuorandę in introitu lecti. Simile est electarium hoc.

\mathcal{R} . rad. eryngij & satyrionis condit. an. \mathfrak{z} ij corticis citri conditi, carnis cydoniorum & myrabolanorum, confectionis alkermes an. \mathfrak{z} β medullæ nucis Indicæ, auellandarum tostarum & pistachiorum an. \mathfrak{z} j lumborum stictorum \mathfrak{z} vj seminis erucæ, rapī, napi, & cepulę an. \mathfrak{z} ij, ambre grizee \mathfrak{d} β moschi electi \mathfrak{d} j cum syrupo de pomis fiat opiata, capiat \mathfrak{z} iij in introitu lecti.

Sphincter vterque roboratus sæpe & per plures dies fotu & vnctione astringente calidaque regionis ani perinei & pubis.

\mathcal{R} . summitatum myrti, oleastri, absinthij an. m. j. mastichis & corticis thuris an. \mathfrak{z} β . scorie ferri, balustiorum & nucum cupressi, gallarum viridium an. \mathfrak{z} j rosarū rubrarū p. j coquatur omnia in aqua sisternæ & vino rubro. vel \mathcal{R} . olei myrtini & nardini

dini an. ʒ ij mastichis, sanguinis dracon. gallarum vistarum, carabes & cornu ceruini an. ʒ ij ceræ albæ parum, fiat vnguentum admouendum post fotum iisdem partibus.

De sterilitate à causis internis præter naturam.

Variæ cū sint sterilitatis species, ad duo veluti genera contrahi possunt. Vnum seminis: alterum pudendi virilis vitium spectat. Illius quidem naturales & non naturales causæ earumque remedia hæcenus proposita sunt. Causæ præter naturam vitiosi seminis deinceps enarrantur curanturque quæcumque vel per sympathiam, vel per idiopathiam testiculorum ex vitioso semine sterilitatem proferunt. Illæ vero sunt morbi & symptomata tū totius corporis communia: tum singulorum viscerum propria, quæ si insigniter intemperata, obstructa, tumefacta & exulcerata fuerint, seminis materiā aut diripiunt, aut temperiem eiusdem labefactant, ex qua à testibus etiam temperatissimis semen euandum, infæcundum & sterile proferri necesse est, nēpe ex vitiosa materia productum nec caloris & spirituum puriorum vbertate perfusum, qui è partibus animalibus, vitalibus & naturalibus in semen corriuari solēt. Occurrit igitur primū sympathia ab intemperie insalubri eaque vniuersali & toti corpori communi, cuius origo duplex est: vna à causis externis impensius frigidis, calidisve, humidis aut siccis, altera à causis internis, humorum scilicet & viscerum vt hepatis, cordis, lienis, pulmonis vitio. Talis accidere solet cachecticis, ictericis, hydropicis, tabidis, lentæque febre aut hæctica

laborantibus. Prius genus intemperiei vniuersalis fere sine humore est, victuque solo contrario abigitur, vbi prius species eius tum ex caussarum externarum exuperantia: tum ex symptomatum comitantium conditione explorata fuerit. Calida igitur intemperies, siccaque vt ab æstu, vigiliis, inedia, amoribus &c. abigatur cibis paucis euchymis actu & facultate frigidis, balneis aquarum fluuiatilium, somno multo, quiete, animique tranquillitate: frigida contra vt quæ provenit à cœli rigore imbribus hyemalibus, natatione in gelida vel submersione in eandem, discutienda est victu calido, laconicis & balneis aquarum thermalium, litibus & vnguentis ex oleis calidis. Posterius genus intemperiei vniuersalis ex sympathia viscerum, curatur pariter diæta repugnante & remediis internis externisque contrariis vt balneis, litibus, vnguentis hic breuiter indicandis: hoc enim compedio sola remediorum genera quæ quifque affectus per sympathiam tam vniuersalem quam particularem fecunditati efficiens indicarit, mihi consilium est annotare, paucorum tantum quæ in vnoquoque affectu efficacissima sunt explicatione adhibita, quæ tamen omnia in idiopathia testiculorum & colis studiosè prosequemur, omnesque non solum indicationes, quæ ad remediorum genus: sed & eas quæ ad rectum vsum vt puta quantitatem spectant, depromemus.

Particularis viscerum sympathia ex functionum cuiusque propriarum noxâ, vitioque excrementorum & qualitatum corporis sensibilibum dignoscitur, vt putà intemperies humida, frigidaque cerebri & calida enim siccaque partis exanguis rarior est,

est minúsque fecunditati incommodat) ex dolore graui stupore sensuú motuúmque torpore & mentis inertia, cataphora & veterno, expiruitosi excrementi multitudine. Vulnus autem & fractura à quibus intemperies frigida inferri solet, signis diagnosticis non egent sed sensu solo. Multo minus venarum pone aures incisio. Cordis intemperies frigida humidáque dignoscitur ex tarditate respirationis, palpitatione, lipothymia, dyspnæa, verecundia, ignauia, timiditate, & inde fit vt à frigido corde paucus spiritus, calorque proueniat qui semen fecundet. Calidæ siccæque intemperiei signa sunt contraria.

Intemperies hepatis omnis innotescit ex atrophia sensim inualecente, cachexia, prauoque colore, vel nigricante, aut liuescente vel albicante, vel flauescente pro intemperiei scilicet calidæ frigidæque & humorum discrimine. Hepatis obstructio ex dolore graui dextrî hypochondrij, tumores tactu dignoscuntur vel cum febre, vel sine eadem. Lienis affectus eadem ratione dignoscuntur. Ventriculi intemperies vomitu, dolore, coctionis appetentiæ sitisque læsione. Vlcus pulmonis ex spiritu foetido, febre lenta, vel hecätica, sputo cruento & purulento, vnde viciantur spiritus animales vitalésque. Renum intemperies frigida ex rara crudáque mictione, frigoris ad lumbos sensu, veneris fastidio, & difficili erectione penis. Obstructio à lapide & vlcus ex propriis signis detegenda sunt. Iam verò vt horum omnium therapeia rectè instituatur, cerebri imbecillitas ex intemperie frigida, humidáque quæ multo frequentior est quam calida, curabitur primum diætâ calida, siccáque, deinde purgatione vniuersali

cacochymia pituitosa per pilulas coccias, de agario, & sine quibus: tum particulari deriuatione eiusdem è cerebro per apophlegmatismos, errhina, & phœnigmos capiti abrafo applicandos: postremo intemperies ipsa capitis deletur lotionibus ex decocto plantarum cephalicarum, id est calidarum & siccarum in lixiuio cineris sarmentitij & vino albo sæpius & mane repetitis, pulueribus cephalicis vel capiti aspersis in introitu lecti, vel cucupha noctu diuque gestata, pomis odoratis de collo suspensis & suffitibus: sed efficacissimè quoque curatur electariis mollibus, durisque intrò sumendis in introitu & exitu lecti, vt electario pleres archonticon, theriaca, mythridatio, & conseruis radic. acri, corticis citri, florum anthos & saluiæ & stachados. Sterilitas ex venarum & arteriarum pone aures præcisione incurabilis est, non ob interceptum quidem seminis materiae com meatum: sed ob capitis refrigerationem desinente sanguinis affluentia consueta: Eadem est ratio imbecillitatis relictæ à contusione vel vulnere.

Intemperies humida frigidaque cordis post præscriptam diætam calidiorem eandemque cacochymia purgationem discutitur electariis calidis siccisque & odoratis intus sumptis, vt diambre, de gémis, diamoschi dulcis, diamarg. calidi, laticificante Galeni & confect. alkerim. conseruis anthos & borraginis, denique epithematis regioni cordis appositis. Ventriculo frigidiori opitulantur, intus quidè electarium aromaticū rosatum, diagalanga, diatriū pipereon, cōserua cortic. citri, zingib. viridis, florum anthos, vinū absinthinum & syrupus, foris vērò ceratum Galeni pro stomacho, litus ex oleo absinthino,

anthino, nardino, de mentha, muscatellino, ex quibus etiam cum puluere prædictorum electariorum aut simili paucâque cera alba fiat vnguentum. Conferunt denique sacculi puluere stomachico farti.

Renibus frigidioribus peculiariter medetur intus quidem conseruæ radic. satyrionis & eryngij, & electar. diatrium pipereon, theriaca & mithridatium: foris vnguentum, quod regioni lumborum mane & vespere impingatur. Tale est hoc ꝑ. olei costini ꝑb ꝑ olei de spica ꝑj pulueris rad. pyrethri, seminis staphisagriæ, assæ odoratæ, mastich. storacis calamitæ an. ꝑ ꝑ seminis crucæ & nasturtij an. ꝑij ceræ albæ. q. s. Puluini quoque calido & odorato puluere repleti lumbis dormientium substernantur. Hepati frigido humidoque succurrit intus quidem elect. aromat. rosatum, diagalanga, conserua cortic. citri, mali limonij, zingib. viridis, vinum absinthinū vel cinnamomites: foris vero linimentum ex oleo costino, mastichino, de spica, absinthino, nardino, laurino, muscatellino, ex quibus addita cera alba fiant linimenta: & admixtis pulueribus electariorū calidorum vnguenta concinnentur. Obstructiones & tumores scirrhusi hepatis propriis remediis, id est incidentibus, tergentibus & roborantibus profliguntur. Eadem prorsus therapia est splenis intemperierum, obstructionum, tumorūque. Pulmonū quodque tabidorum & vlceratorum remedia ex tergentibus & consolidantibus mixta sint.

Vasorum etiā seminariorum noxa sterilitatē inuehit. Sunt autem vena vna, & arteria vna ex vtroq; latere cum exili propagine nerui sextæ coniugationis ad testes vsque producta, ad quos seminis materiam, id est sanguinem deferunt, à qua seminaria

dicta sunt : sicuti ab officio deferentia siue latores. Itaque sanguine rubere cernuntur nisi paulo supra testem ubi albescere incipit , tum ex propria vi vasorum istorum varicosorum assimilatrice, in quibus flexuosis diutius cunctatur , tum ex irradiante facultate testium spermatopoietica, estq; tum proximi futuri feminis. rudimentum quod à testibus excoquitur & perficitur. Est quidem munus idem vasorum istorum : sed ortus diuersus : dextrorum quidem à vena caua & aorta infra renem , sinistro- rum à renalibus, siue emulgentibus venis & arteriis, vnde vulgatum est à dextris & in dextris mares procreari , sicuti à sinistris & ex sinistris scēminas, Neutra substantiam subeunt testiculorum à quibus illæsa integræque diuelli possunt : sed eorum superficiem tantum amplectuntur super epididymidas. Contingit autem ea vasa vel obstrui vel astringi vel contundi, vel denique rumpi, sicque sterilitatem induci: obstructio enim astrictioque, sanguinis ad testiculos comineatum prohibet. Illa à copia : sed multo magis à crassitie & lentore humoris alicuius oritur, hæc à contusione, ab ictu, casu, pressuue grauioris armaturæ à quo visa mihi est in nobili adolescente vtriusque testium atrophia & tabes incurabilis , aut à tumore aliquo grandiori vt bubone, aut à cicatrice inguinum arctiori post curatam enterocalem. Aliàs ruptio eorundem vasorum sed rariùs accidit ex casu sublimiori , ictu aut saltu , cuiusmodi ruptio à ferocioris equi equitatione comperta mihi est in milite funesta , effuso in ventrem & per vesicam omni sanguine. Obstructio curanda est attenuante primum diætā: mox medicamento vacuante cacochymiam pituitosam, &

& phlebotomia, postremo iulepis incidentibus, aperientibus, & balneis, fotibúsq; tum laxantibus, tum etiam incidentibus & digerentibus. Astrictio ex contusione externis remediis emollientibus, attenuantibus & resoluentibus fotibus, balneis & vnguentis. Quæ autem à cicatrice nimis stricta provenit, eiusdem cicatricis resolutione & divisione curatur, nouèque sed amplioris inductione. Ruptio sicuti & sectio irreparabilis est.

Testium historia anotomica.

Testes siue testiculi dicti sunt tanquam virilitatis indices, gemini à numero (quem tamen variare in quibúsdam familiis à Fernelio notatum est) dexter maribus, sinister fœminis gignendis magis idoneus est. Vterque maribus foris extráque perineum pendet ex musculo cremastere dicto oblongo scilicet & gracili à quo releuatur sine andagonista, quia sua gravitate satis reuelluntur in senibus præsertim debilibus & egris: Animalibus tamen multiparis auibúsq; omnibus intus conditi sunt ob vitæ breuitatem, sicuti fœminis omnibus ob situm vteri cuius ad latera annexi sunt, vt in eius sinum semen suum deponant per vteri cornua. Figura donati sunt rotunda vel potius ouali, temperie calida, humidáque, substantia glandulosa, alba scilicet, molli & friabili instar glandiam & quòd venulis arteriisq; frequentibus variè implexis abundant, rara, laxa, atque cauernosa. Sic enim semen copiosum continent & melius percoquant quàm si cauitas adesset. Quatuor membranis vestiti sunt, duabus communibus vt oscheo,

id est scroto à cute, altera à panniculo carnosio (vocatur *σπέρμας*) & duabus propriis vna ἐπιδιδυμὶς, id est rubea, altera interiori, duriorique & nervosa. Epididymis autem particula est capiti testium virilium adhærens instar parui testiculi, qua muliebres carent. Testiculorum naturalis propriaque functio est seminis fecundi generatio cui subseruiunt, vasa spermatica & parastata, deferendo eius materiam eamque præparando: tum vasa eiaculantia, idem semen postquam perfectum est emittendo ad prostates vesiculas ad cervicem vesicæ accubantes ubi asseruatur ad necessarios vsus. Itaque in partium principum numero testes collocantur non quod ad vitam præsentem sint necessarij, sed ad futuram feriem natorum propagandam, quæ species quædam est immortalitatis. Neque enim propagatio speciei sine procreatione, sicuti neque hæc sine semine esse potest, quod à solis testibus absoluitur. Est eorundem testium insignis vsus in calore nativo conservando augendoque non tam ex insita eorum caliditate siquidem exangues sunt, & glandibus similes, quàm influente & ascititia à seminis præsentia inulto spiritu caloréque turgentis, quem per venas, arteriasque in cor & hepar totumque corpus refundunt. Itaque testium morbi, temperamenti habitus morumque mutationem inferunt. Illi enim corpus mediata recalefaciunt, eor autem & hepar immediate.

Testium morbi similes.

SVnt autem testiculorum morbi omnium generum. Similes quidem sunt, intemperies tres, frigida sicca,

sicca, frigida humida, & calida sicca (nam calida humida fecunda est sepius) Porro testiculorū intemperies aut insita & naturalis est, aut adscititia, hæcque duplex tum non naturalis ex victus ratione intemperata, tum præter naturam, idque tum ex sympathia totius, aut visceris alicuius, tum idiopathia & propriis affectibus.

Diagnosıs intemperiei insita.

INsita intemperiei morbosæ calidæ, siccæque (calida humida fecundissima est) signa sunt: venarum scroti, penisque amplitudo, tenuitas cutis & caliditas, pili vicinarum partium vt pubis perinei & fœmorum multi, densi, crispī, rudēsque, libidinosæ natura, frequēsq; & prompta mentulę erectio ex caloris spirituumque multitudine, paucum semen, sed acre parūque flauescens. Frigidæ contraria sunt signa, cutis frigida rugosa, male colorata, pauci, rarique pili & læues, tarda vel nulla erectio, deficiente calore & flatu.

Diagnosıs intemperiei adscititiæ.

Adscititiæ intemperiei calidæ signa sunt, cutis scroti calida venosa rubea & aliquando tumida ex caloris & spirituum affluentia. Frigidæ signa sunt frigiditas manifesta, venæ exiles, rugæ & scabrities cutis eiusdem si iungatur siccitas, vel læx ab humiditate.

Prognosis.

Intemperierum insitarum maior est quam adscititiarum aduersus fecunditatem vis & efficacitas. In utroque genere frigida siccæque, vel humida

maximè nocet. Quoties enim frigiditatis comes est siccitas, paucum & frigidum, quando vero frigida intemperies iuncta est cum humida, liquidum semen eoque euavidum redditur, nisi fortè concurrat calidius & vberius muliebri semē. Calida siccāque intemperies minus obest, dummodo tamen totum semen frequentiori coitu non exhauriatur, aut crudum adhuc & illaboratum emittatur. Intemperierum denique quàm organicorum & communium morborum facilior est curatio. Intemperiei adscititiæ per sympathiam totius corporis, aut viscerū, tres sunt curationis scopi, Primus ut sanguis temperatus deinceps eumuletur idonea diætā. Secundus ut sanguis antea congestus temperetur, tum per phlebotomiam (si eius indicatio adsit) tum per purgationē excrementitij humoris cū sanguine mixti. Tertius ut ipsa viscerum & testiculorum intemperies amoueatur. At eius intemperiei quæ idiopathica est, tam insita quàm aduentitia duo tantum scopi sunt necessarij, nēpe ut victus sit intemperiei contrarius, sicuti & remedia quæ parti affectæ applicantur, quæ topica dici solent.

Intemperiei calida curatio.

QVare in intēperie calida siccāque; diætā frigida, humidāque qualis antea descripta est, deinde purgatio cholagoga instituatur ex rhei infusione, medulla cassiæ, syrupo rosato, electuario diaprun. solut. & de succo rosarū. Phlebotomia in cubito purgationi præponenda: sed emollienti clysteri postponenda est. Postrema est refrigeratio per topica testium & scroti, pubis & perinei regioni admouenda, tantisper dum calor alienus restingua-
tur

tur incipiente partis leui liuore ne in contrariam intemperiem frigidam testes labantur, magisque desperatam sterilitatem inuehant. Topica autem hæc, fotsus embrochationis, vnguenti & cataplasmati forma vsurpentur. Exempli gratiâ.

℞. aquarum lactucæ, nenuph. solani, rosarum an. ʒ iij aceti rosati ʒ ij camphoræ ʒ j foveantur partes hoc liquore tepido cum spleniis, inebriatis, expressisque & appositis mane & vesperi, idque sæpius.

Ex herbarum istarum decoctis validiores, ex succis earundem validissimi fotsus fiant. Mox à fotsu vnctio vel cataplasma huiusmodi administretur.

℞. olei nenuph. papau: & rosacei an. ʒ ij aceti ros. ʒ β albumen oui vnus, camphoræ ʒ β misce diligenter, fiat oxyrrhodinum, quod multo efficacius euaserit addita vnguenti populeonis ʒ β vel mucilag: feminis psillij ʒ j.

Similia prostant in pharmacopoliis. vnguentum refrigerans Gal. vnguētum alb. camphoratum, populeum, ceratum santal: & vnguentum rosaceum. Simile & hoc est,

℞. olei nenuph. & papau: an. ʒ ij feminis lact. & papau. alb. an. ʒ j feminis psillij ʒ ij camphoræ ʒ j ceræ alb. q. s. fiat vnguentum.

Cataplasma autem fiat è succis frigidarum plantarum lactucæ, solani, papau. albi, & hyoscyani coctis ad ignem cum farina hordei, vel denique ex ipsiis herbis contusis mixtisque cum eadem farina. Sua etiam vis est refrigerandi internorum præsidiorum vt syruporum de nenuphare, de papaue-re, de acetositate citri, de limonibus (qui vel per se,

vel cum aqua acetosæ & lactucæ iuleporum instar mane fumantur) vt etiam conseruarum ros. rub. viol. nenuph. florum & electariorum frigidorum vt triasantali, diamarg. frig. quale etiam est hoc. ʒ. sem. papau. alb. hyoscham. alb. & lact. an ʒ ij feminis acetosæ ʒ j coralli rubri, santal. alb. rubrique an. ʒ β fiat puluis, qui excipiatur saccharo aqua ros. dissoluto, & formentur tabellæ ponderis ʒ iij capiat vnā duabus horis ante singulos pastus.

Eiusdem intemperiei calidæ symptomata sunt libido insatiabilis, nocturna pollutio, habitus extenuatio, virium omniū ruina. Libido ardens sterilitatē tandē accersit, quia per hāc eiicitur crudius semen. Nocturna pollutio eandem ferē noxā foecūditati infert, eiusque caussa proxima est facultatis expultricis irritatio ab imaginatrice facultate percepta, per somnum non solum nocturnū sed etiam diurnum. Antecedens caussa est titillatio testium & vasorum spermaticorum vel à copioso minis semine (vt in sanguineis & iuuenibus lautē victitatibus) vel acri, eoque vel à victu calidiori, vel à viscerum testiumque intemperie calidiori. Per somnum autē ferē incidit, sicuti & per vigilias ex attenta veneris, cogitatione, quod tum collecto calore præcordia æstuent, renésque & vasa spermatica, maximè si incubili plumeo & calido super lumbos dormiatur, quanquam accidit etiam ab imaginatione nocturna formosæ mulieris alicuius. Quare quæ à victu calido est, frigidioribus epulis, obsoniis & potionibus arceatur: quæ à copioso nimis sanguine vel acri, eodem victu refrigerante prohibeatur, phlebotomia, purgatione, multoque labore & studio, peculiari denique testiculorum refrigeratione. Præceps quoque

que per coitum & à coitu virium dissipatio, lipothymia & syncope confestim reuocetur, electariis calidis, siccisque odoratis & vaporosis quibus spirituosâ substantia instauretur; talis est confectio alkermes, de hyacintho & de moscho, quæ cōfectiones cum aqua cœlesti, aut imperiali, aut ardenti sumantur, quanquam harum etiam aquarum per se eximia vis est ad lipothymiâ, odoramētâ quoq; profunt naribus obiecta moschi, diambrae, ciuetæ, aspersio denique faciei ab aqua frigida ne præ raritate habitus prætenues spiritus digerantur. At quæ sensim incidit viriû omnium ruina & habitus extenuatio, sensim refocillanda est victu analeptico antè exposito qui calidus sit humidus euchymus & eupeptus.

Frigida intemperies testiculorum quæ vel à victu frigidus, vel per sympathiam viscerum aliorum frigidiorum orta est tribus scopis curatur, primo ut sanguis calidior victu idoneo multiplicetur, altero ut serosus & pituitosus humor ab utili sanguine secretus vi purgantis medicamenti excernatur, tertio ut intemperies ipsa contrariis topicis deleatur. Quæ idiopathica est siue insita, siue adscititia præ refrigeratione peculiari ut aëris rigentis, aquæ aliosæ, & medicamenti frigidi diutina appositione, curatur tantum duobus aliis scopis excepta purgatione. Diæta itaque sit calida humidaque vel sicca, euchyma, eupeptos, sed vaporosa etiam & æcris: ut non solum sanguinis sed vaporum quoque æcrium & spirituum copia multiplicetur, à quibus tum vasa seminaria, testésque ad deiectionem sollicitentur, tum penis ipse distendatur & erigatur. Huiusmodi est victus analepticus

paulo ante descriptus cui ad flatuū, cumulationem addantur radices rapi, napi, pastinacæ, cepæ, allia &c. folia viridia menthæ, nasturtij, erucæ, legumina vt fabæ, pisa, cicera, lentes, faseoli elixata cum iure pingui: sed horum obsoniorum genera omnia condienda sunt puluere aromatico vt non solum copia, sed acrimonia etiam subsit flatuum, vt.

℞. cinnamomi ʒ ss zingib. nucis mosch. piperis longi an. ʒ j moschi optimi ʒ j sacchari albiss. ʒ iiij fiat puluis.

Ex eodem puluere & lib. i. panis sacchari conficiatur sal sacerdotalis dictus, id est cōdimentarius.

Pharmacia autem duplex esto: vna interna, altera externa. Illa viscerum testiumque calorem foueat, flatūsque acres excitet; Eiusmodi sunt conseruæ rad. eryngij, satyrionis, zingiberis viridis, cardui radix cruda vel cocta, semina cepæ, erucæ, nasturtij, raphani, napi, rapi, vrticæ, macropiper, cinnamomum, cardamomū, macis & mux moschata, amygdalæ dulces, auellanae, scinci & à proprietate occulta roborantes penem, priapi tauri, arietis, hirci, veris, apri, vulpis eorumque testiculi.

Eiusmodi quoque sunt electarium diamoschum, confectio alkerm. & de hyacintho, mithridatium pleres archonticon cum moscho. Formulæ tales ex tempore præscribantur. ℞. rad. eryngij & satyrionis an. ʒ ij nucleorum pini, amygdalarum dule. auellandarum, pistachiorum, nucis indicæ an. ʒ ss seminis erucæ, napi, rapique, linguæ auis, piperis longi an. ʒ ij caudæ scincorum ʒ iiij cinnam. & zingib. an. ʒ j moschi optimi ʒ ss ambræ griz. ʒ ss fiat puluis excipendus melle vt fiat opiata mane & vespere
ri ad

ri ad semunciam vsurpanda superbibendo parum vini hippocratici.

Efficacissima est & sequens opiata.

℞. butyri rec. \bar{z} iiij vitellos ouorum sex, rad. ze-
doarię, satyrionis, eryng. & zingib. cond. an. \bar{z} ij nu-
cis indicę, pulpę auellandarum tostarum, amygd.
dulg. dactylorum & pistachiorum an. \bar{z} j β lumbo-
rum stinctorum \bar{z} vj, priapi tauri, testiculorum le-
poris, vulpis & gallorum an \bar{z} j seminis erucę, na-
sturtij, cinnam. caryoph. piperis lōg. nucis moscha-
tę & seminis sinapi an. \bar{z} β contusa leuiter omnia
coquantur in lacte quod primę coctioni superfue-
rit; tandēque adde mellis optimi lib. ij moschi
optimi \bar{z} ij fiat opiata vtenda pariter.

Externa pharminacia sit quoque calida humidā-
que vel sicca, constetque fotibus, embrochationi-
bus, vnguentis, & emplastris quę non solum regio-
ni testiculorum, sed perinei quoque pubis & lūbo-
rum regioni admoueat quod seminaria vasa testi-
bus intemperatis sæpe condolescant. fetus ergo fiat
ex decocto plantarum calidarum verbenę, saluię,
pulegij, menthę, melissę, summitatum lauri, hede-
rę, roris marini, lauendulę, in vino generoso. Em-
brochatio ex oleo costino de castoreo, de spica,
laurino & muschatellino, quibus addita pauca cera
fiat linimentum. Quod si addatur plusculum pulue-
ris vnguentum euadet, aut etiam emplastrum in
eum qui sequitur modum. ℞. olei laurini, costi-
ni an. \bar{z} ij olei despica & muschatellini an. \bar{z} β pul-
ueris cyperi \bar{z} ij baccarum iuniperi, cardamomi,
seminis erucę & sinapi an. \bar{z} j ciuetę \bar{z} β cerę pa-
rum, fiat vnguentum. Horum denique omnium tā

internorum, quam externorum prorogetur in tres menses vel dimidium annum, aut integrum etiam annum. Tunc enim nisi vir generarit, aut mulier conceperit, desperanda fecunditas est, & sterilitatis remedia omnino respuenda. atque hi sunt qui frigidi dicuntur, non quidem maleficiati de quibus postea.

De testiculorum vitiosa magnitudine, eiusdemque curatione.

IN morbis organicis testium prima numeratur magnitudo vel supra vel infra naturam, utraque autem aut insita est aut adscititia. Amplitudo quidem insita ab utili & abundante fit semine validâque natura seu facultate conformatrice, deinde à nutritionis ubertate. Adscititia duplex quoque est. Vel enim non naturalis est ut à crebra frictione, unctiōne, pice, aliisque calefacientibus causis sanguinem & alimentum copiosum deducuntibus : aut contra naturam est ex intemperie frigida siccâque, vel humida, à tumore aliquo præter naturam nec suppurato nec resolutō. Paruitas naturalis contra, tum ex seminis penuria, tum ex facultate cōformatrice invalida debiliq̃ calore oritur. Non naturalis à multiplici concubitu exhauriēte semen propriūque testium alimentum & ab aliqua perfrigeratione externa, ob quam neque seminis materiam trahere, neque proprium alimentum concoquere possunt. Quæ præter naturam est, ab aliquo præter naturam affectu inducitur, vel proprio ut vulnere & ulcere: nam cum sanie seminalis quoque substantia effunditur parsque ipsa refrigeratur: vel per sympathiam vasorum deferentium obstructorum ut præ
con-

contusione lumborum ab ictu, casuve: vel astrictorum vt à tumore vel cicatrice inguinis in curanda enterocoele, aut præcisione simul cum teste. De vtraque magnitudinis specie historiam legeris Nicolai Massæ in epistolis.

Porro magnitudo aucta tum naturalis, tum non naturalis fœcunditati non officit: sed auget porius salacitatem multiplicato semine: sed quæ contra naturam est curatione eget sicuti & duæ priores ob deformitatem & ambulationis impedimentum. Paruitas autem omnis fœcunditati aduersa curationem indicat.

Curationis igitur auctæ magnitudinis scopi duo sunt, vnus ne distributio copiosi alimenti ad testes fiat. Alter ne ab iisdem attrahatur. Primus comparatur diætæ tenuitate & testiculorum quiete: si non modo vitetur coitus: sed suspensi etiã apta deligatione per linea subligacula sequentur: sic enim ex otio frigidiore & ad tractionem alimenti languidiore euadunt, deinde vacationibus frequentibus tum insignibus, vt phlebotomia & purgatione, tum obscuris vt sedulo studio, vigiliis, & labore, à quibus sensim fit sanguinis & caloris resolutio. Alterum scopum consequimur testium refrigeratione qua non solum substantia eorum densior reddatur: sed facultas etiam tractrix obtundatur. Topica ergo refrigerantia, tum liquida vt fodus, litusque, tum mediâ forma vt linimenti, vnguenti, & cataplasmati singatur, apponanturq; non modo ad testium regionem sed peritonei etiam pubis & lumborum. Fodus ergo fiat ex decocto foliorum & radicum hyoscyami albi, papaueris albi, lactuæ, solani, cicutæ in oxycrato. Cataplasma ex iis-

dē foliis coctis & cōtusis, mixtisq̃ue cū polenta, vel certē ex succis eorundem crudorum cum farina eadem ad ignem confusis; Litus ex oleo papaueris, nenuph. & rosarum mixta aceti albi parte sexta, quibus oleis addita pauca cera linimentum fiat, sicuti puluerum mixto triente vnguentum. Horum materia sit ex seminibus lactucæ, papaueris & hyoscyami albi cerusæ lotæ & terræ sigillatæ: sed vtendi modus esto dum liuescere pars incipiat, ne in intemperiem frigidam incurabilem sterilemque testes præcipitentur. Paruitas autem contrariis omnino scopis curanda est. Prior est vt ad testes alimentum prouocetur, posterior vt ab iisdem validè attrahatur. Est igitur ad priorem scopum consequendum necessaria analeptica diætā & vacuationum omnium tã insignium quam obscurarum fuga: moderata venus colatur quo sint testes alimenti auidiores. Posterior comparatur crebra frictione, picatione, vnctione, fotu & cataplasmate ex materia calida vt excitatus testium calor plus alimenti attrahat concoquatq̃ue, & substantiam laxiorem & copiosioris sanguinis capacem reddat. Neque interim electaria calida & vaporosa omittenda sunt, quæ omnia sicuti & topica calida in curatione intemperiei frigidæ eorundem sunt annotata.

*De situ mutato testiculorum, eiusdēque
curatione.*

AD organicos quoque testiculorum morbos pertinent, cremasterum musculorum à quibus fulciuntur, paralysis & conuulsio. Hæc quidem vel à sicca & præcalida intemperie nuda, vt per febres

bres acutas, vel à repletionè fluxûque crassi, lenti-
que humoris pituitosi, substantiam nerui intus di-
latantis & contrahentis oritur. Illa verò prouenit
ab astrictiōe natâ aut ex tumore aliquo aut con-
tusione, præ ictu graui casuque. Alias prouenit ab
obstructione nerui aqueo humore perfusi: traque
enim causa spiritus animalis & facultatis sensitiuæ
motiuæque in neruum distributionem prohibet.
Signa sunt quod conuulsionis, dolor perpetuus co-
mes est, permanente sensu propter spiritus liberè
per superficièi poros influentes, cum alioqui in pa-
ralysi tollatur sensus. Præterea conuulsionis ab ina-
nitione caussa est febris ardentior, sicuti paralyseos
ab astrictiōe signum est contusio ab ictu, casuue.
Quæ ab inanitione cōuulsio fit, lethalis est Hippo-
crati primo progn. quæ verò à repletionè, illa sicuti
& paralytis curanda est obseruatis iisdem qui ad-
uersus intēperiem frigidā testiculorum scopis, sci-
licet vt victus calidus siccusque adhibeatur, deinde
vt cacochymia pituitosa expurgetur, postremo vt
caussa cōiuncta humorque neruum distendens vel
emollens discutiatur, tum per insignes vacuatio-
nes vt sudores, laconicis, aquis thermalibus & deco-
ctis guaiacinis aut similibus excitandos: tum etiā
obscuras & insensiles per topica calida siccâq; sen-
sim & sine sensu discutiētia, qualia sunt exposita in
intemperie frigida curanda. At verò paralytis ab a-
strictiōe & contusione præter expositos scopos
phlebotomiam reuulsoriâ exigit ab initio, victum-
que frigidiorē & topica repellentia quæ tandem
in declinatione mutantur in resoluentia.

Scroti pânaris vel mollificatio.

Situs quoque mutati species est *παύσις* Paulo dicta, relaxatio scilicet vel mollificatio scroti, testibus nihilominus in sua sede remanentibus, id est non conuulsis neque resolutis. Est autem scrotum vel scortum testium inuolucrum, cutis nempe tenuis & valde rugosa testes obuoluens, vnde græcis dicta *ὄρχις* & *μαρσῦρον* quasi bursa, & *ἀγέρων*, id est vasculum, ab officio. Latinis autem à similitudine sacculi coriacei. vocabant enim scortea quæcumque aluta aut pelle constabant. Porro relaxatur cutis hæc ab intemperie humida per sympathiam hypogastrii partiumque eius. Ea quidem fecunditati non officit: sed fecunditatem viro infedendique difficultatem, mulieri tædium parit. Curatur itaque iisdem scopis tribus & instrumentis, ut diæta calida siccaque, purgatione cacochymię pituitosę, & exsiccatione, astrictiōneque per topica calida, sicca & astringentia, de quibus antea in intemperie humida frigidaque testium. Chirurgicam curationem leges apud Paulum lib. 6. cap. 6.

Testiculorum occultatio.

Vitiosi situs: sed tamen naturalis, species quoque est testiculorum intra ventrem & peritoneum occultatio, vnde foras in scrotum cum suis vasis spermaticis per peritonei productionē emergunt, per ætatis aut coitus vehementis auctam caliditatem, de qua testiū eruptione Iphidis fabula vltima lib. 9. metamorph. nec non historię de multis aliis è sceminis in mares mutatis, apud Pliniū lib. 7. cap. 4. audiendæ sunt, aut de clitoride nimis longa apud Æthiopes, & Ægyptios, cuius amputandæ modū docet Paulus. Neque verò propterea existimandum geni-

genitales partes vtriusq; sexus solo situ inter se differre. Nam & quoad formam, & quoad structuram differunt. In fœminis, ceruicis vteri inuersæ, vna est cauitas, eaque per ampla, penis verò trës sunt, binæ quidem duorum ligamentorum, tertia verò vrinæ seminiq; cõmunis est, sũntque omnes exiguæ. fundũ quoque inuersum vteri scroto dissimile est, hoc enim cutis quædam tenuis & rugosa est, vteri verò membrana interna crassa densaque est, & carnea, omnique genere villorum contexta. Vide Aueigam in vltimum caput lib. 6. de locis. Porro hic testium situs per se quidem fœcunditati nõ officit, cùm testibus præter situm nihil desit ad perfectã seminis elaborationem, non vasa præparantia & eiãculantia: sed proba tantũ temperies & valida facultas, quæ ob caloris infirmitatem illos foras extrudere non potuit. Quamobrem tentanda curatio est non tam reductionis quàm intemperiei temperandæ caussa, sicuti expositum est in frigida testiculorum intemperie.

De morbis communibus.

VTriusque testiculi auulsio excisiõque saluis etiam integrisque ambobus vasis spermaticis sterilitatem incurabilem inuehit, quod testiculorum proprium munus sit seminis fœcundi perfectio: alterutrius tamen sed dextri potissimum integritas fœcunditatem fouet, ideoque temperies eius accuratè conseruanda roborandaque est remediis in frigida intemperie propositis.

Vlcus vulnúsque vtriusque, vel alterius testiculorum sterilitatem sæpe inuehit ob intemperie frigidiorẽ: vel exhalãte eorum calore natiuo, vel

aura substantiam eorum subeunte, vel proprio alimentó cum sanie & excrementis excluso, vel medicamentorum frigidorum appositione, vel denique cicatricis astrictione. Eadem est tumorum præter naturam phlegmonosorum, scirrhororú aliorúmq; noxa, ob eandem testiculorum intemperiem frigidam, calore scilicet vel oppresso à multitudine fluxionis, vel extinctó à frigiditye eiusdem & medicamentorú repellentiú, vel dissoluto per medicamentá digerentia, proinde isti sterilitatis speciei quam vulnus, vlcusque aut tumor aliquis inuexerit medendum erit, vt intemperiei frigidæ.

De compressione & contusione testiculorum.

DVæ sunt solutionis reliquæ differentiæ, aliàs fortuitæ ex inopinato ictu, casuæ & violenta corporum grauium durorúmq; occursione vel incurfione: aliàs volutariæ & artificiosæ in eunuchis olim ita vocatis *ἡμῶν τῶν δούλων* à lecto & verbo *ἔχειν* habere, quod thalamis mulierum sine vlla pudicitie earum suspitione præficerentur, Fuerunt autem eorum species duæ. Alij enim dicti sunt thlasia *ἡμῶν τῶν δούλων* quod comprimere est, & spadones *ἡμῶν τῶν δούλων* trahere, quod eorum adhuc iuniorum testes aqua calida præmolliti tantisper comprimerentur donec tota earum substantia dispulsa nusquam appareret.

De affectibus parastatarum & vasorum deferentium.

Vasa deferentia & eiaculantia à proprio mune-
re dicta sunt, quod excoctú in testibus semen
deferant, in quibus contineatur & asseruetur ad
coi-

coitus vsque tempus, quo calore multoque spiritu turgens in proprium eiaculantium ductum euadat. Hic enim ex duobus vnus fit ad radicem penis: ad cuius medium cum vrethra coit, fitque vnicus ex duobus semini vrinaeque communis. Sunt autem vasa illa duo deferentibus continuata, & à testibus per eandem peritonei productionem per quam in scrotum præparantia deuoluuntur, supra idem pectinis os reuoluuntur ad vesicæ latera eiusque ceruicem, vbi in multiplices eius glandulas inseruntur semenque deponunt quæ parastatae *ad vesicæ* id est glandulosi, vocantur, præter quas alia duæ sunt glandulae ad penis radicem quarum vnus est oleosa & veluti saluiali quadam humiditate vrethram irrigare ne vrinae acrimonia lædatur. Parastatarum glandulosarum & eiaculantium vasorum affectus sunt Gonorrhœa; phlegmone, mictio cruenta & purulenta. Est autem Gonorrhœa duplex, vna vera, altera falsa: vtraque duplex quoque est. Vna seminis cocti, & est naturalis actio facultatis expultricis irritata à copia vel acrimonia seminis & calida earum partium intemperie quæ antea curata est sub nomine nocturnæ pollutionis. Altera est symptomatica ex debilitate retentricis facultatis earundem partium, ideoque assidua inuoluntaria sine tentigine & voluptate vlla, semine aquoso cruentoque continenter fluente. Symptoma igitur est intemperiei tum humidæ & naturalis (sicuti sphincteris vesicæ) tum frigida, vt à frigidiori aliqua causa externa vt sessione super lapidem, crebra natatione in gelida, vel applicatione frigidiorum medicamentorum, aut ab inanitione immodica,

aut immatura, qualis impuberum est, aut recens etiam maritatorum aliquando symptoma est conuulsiui cuiusdam affectus non proprii quidem cum musculi non sint; sed per sympathiam totius corporis aut partis conuulsæ. Contractis enim illis semine exprimitur e parastatis in vrethram ut per epilepsie accessionem accidere solet. Condolescunt etiam partes illæ toti corpori paralytico aut parti paralyticæ cum qua simul laxantur & emolliuntur. Debilior itaque facultas retentrix vasorum deferentium & parastatarum glandulosarum assidue quidquid affluit tum semen tum alimentum diffluere finit. Plurimum autem affluit sanguinis ob consuetudinem.

Prognosticum.

QUare inueterata Gonorrhœa non solum fecunditatem delet: sed omnes quoque functiones animales, vitales, naturales subuertit, hinc mentis inertia, fatuitas, obliuio, sensuum stupor, motuum torpor, tremorq; & artuum dolor, hinc ignauia, mœror, metus morumq; peruersitas, hinc cruditas, vomitus, facies decolor, totus denique habitus, extrema tandem macies & irreparabilis marcor propter assiduam seminis effluxum coctionumq; noxam.

Curatio.

ERgo Gonorrhœa, ut symptoma est retentricis facultatis debilitatæ, idq; ob humidam vel etiã frigidam vasorum deferentium & parastatarum intemperie, duobus curatur scopis & instrumētis, vnus est ut sanguis crassior sicciorq; cumuletur, ex quo semen minus tenue & liquidum excitetur per dietam siccior-

rem

rem & astringentem, posterior vt partium intemperies deleatur per topica, internaque modicè siccantia, calefacientia & astringentia.

Diæta igitur constet aëre calido siccoque, pane albo, vino rubro, crassoque, iusculis crassioribus ex oriza, semoula, phidiis & leguminibus, fructibus, vt amygdalatis & auellanis tostis, nucleis pincis & pistaciis item tostis ne plus seminis congeratur, sorbis, mēspillis, cydoneis.

Topica medicamenta fatus vnguenti & cerati specie è calidis, siccisque & astringentibus mixta adhibeantur perineo, pubi, lumbisque & scroto: sed præmissa leui purgatione phlegmagoga.

℞ rad. bistortæ & cyperi an. quart. s. foliorū saluix oleastri, menthæ & myrti an. m. j. seminis viticis & cumini torrefactorum an. ʒ j santal. citr. calam. arom. mastich. balauft. & aluminis an. ʒ s rosarum p. j. coquantur in æquis partibus aquæ ferratæ aut cisternæ & vini rubri tortiui post finitam coctionem additi, hoc decocto foueantur regiones prædictæ cum filtris mane & vesperi per horam.

℞. olei de castoreo costini & myrtini an. ʒ ij olei muscat. ʒ s. olei caryophyllorum ʒ ij. mastic. cortic. thur. santal. citr. aluminis vsti an. ʒ ij seminis viticis, cumini & plantag. torrefacti an. ʒ j s boli arme. terre sigill. an. ʒ j adde ziuete ʒ j moschi optimi ʒ s ceræ alb. parum. fiat vnguentum applicetur iisdem partibus post fotum fricando multum cum pauco vino. Ex iisdem oleis sine cera fiat embrochatio, cum cera linimentum simile, & hoc est efficacissimum.

℞. olibani ʒ j acaciæ hypocist. sanguinis drac. gal-
larum vstarum & ladani an. ʒ ij olei mastichini &

de spica an. \mathfrak{z} ij ceræ albæ parum, fiat vnguentum.

Interna præsidia calfaciendi siccâdique & astringendi semenque incrassandi facultate eadem polleant.

\mathfrak{R} . rad. symphyti \mathfrak{z} ij confer. rosarum & acori an. \mathfrak{z} j conditura cortic. citr. carnis cydonior. nucis iuglandis & myrobal. an. \mathfrak{z} ij seminis viticis, menthæ, nasturtij tostorum an \mathfrak{z} j terræ sigill. & mastic. an. \mathfrak{z} β moschi optimi \mathfrak{g} j ambre griseæ gr. octo cum syrupo de mentha fiat opiata, capiat singulis matutinis cum paucio vino tortiuo.

\mathfrak{R} . santal. citr. mastic. & rosarum rub. an. \mathfrak{z} ij cinnam. nucis mosch. seminis viticis, menthæ & nasturtij torrefactorū an. \mathfrak{z} j zingib. viridis, caryoph. balaustiorum & corall. rub. an. \mathfrak{z} β moschi ambre griseæ gra. vj. \mathfrak{g} β sacchari ros. ad pondus omnium: fiat pulvis capiat \mathfrak{z} ij horis duabus ante pastum superbibendo vt suprâ. idem pulvis exceptus saccharo aqua rosarum dissoluto redigatur in tabellas ponderis \mathfrak{z} ij vel trium quarum vsus sit idem.

Quod si gonorrhœe ortus sit per sympathiam ex conuulsione aut paralyti totius corporis vel partis (vt in accessu epileptico contingit) remediis quæ vtrique affectui propria sint & præterea topicis curetur. Quod si ex eiusdem retentricis infirmitate per effrænem concubitum effuso toto semine hæmorrhagia, sanguinisque excretio obrepserit, tum cohibenda est promptissimè per reuulsiones omnes vt frictions, ligationes brachiorum, applicationes cucurbitularum in hypochondriis, in ilibus & in lumbis, per topica refrigerantia & astringentia ad perineum, pubem & lumbos adiuuenda, tum denique per potiones frigidas & astringentes ex quibus succus

fuccus plātag. efficacissimus est ad ℥ iij vel quatuor, denique corporis moles & facultatum robur instaurandum est victu analeptico, frequenter antea descripto ex carniū euechymarum decoctis vt vocant consummatis expressionibus carniū iuribus concretis vino rubro & dulci. Hanc quoque instauracionem plurimum adiuvet hoc electarium.

℞. Ben albi & rubri, zedoar. macis nucis mosch. cinnā. & croci an. ℥ β ligni aloes, seminis basiliconis an. ℥ j margarit. hyacinth. smaragdi, gummi Arab. rasuræ ebor. cepæ crudæ an. ℥ β nucleorum-pini, pistaciorum, amygd. dulc. auellandar. an. ℥ β moschi optimi ℥ β ambræ griz. ℥ β panis sacchari q. s. fiat pulvis, capiat cochlear vnum ante pastus.

Regio quoque stomachi in hac gonorrhœa debiliore, vnguento calido siccoque & astringenti mane & vespere munienda est, quale est ceratū stomachicum Gal. & hoc sequens.

℞. olei nardini & mastich. an. ℥ ij muscatellini ℥ β ladani mastic. & benioini an. ℥ ij nucis mosch. macis acaciæ & hypocist. an. ℥ j ceræ alb. parū moschi optimi & ambræ griz. an. grana vj.

De Gonorrhœa virulenta.

Est Gonorrhœa falsæ species quædam, qua non semen coctum crudumve sed corruptū excrementum nunc albicans & purulentum, aliàs liuidū, virescens, citrinum, idque vel liquidū vel crassum & semper acerrimum per penem redditur. Est autem huius gonorrhœæ falsæ ortus in parastatis ex earum inflammatione vel vlcere, & quidem vel sine coitu vel post coitum. Illius gonorrhœæ causa est inflammatio vel à semine in illis retento & pu-

trescente quod assiduo sensimque extillans pudendum madefacit, indusium inficit, penē cum dolore erigit & ardorem vrinę infert, aut à defluxione humorum ob equitationem longam, celerēmque, aut ab acriorum eduliorum aut medicamentorum usu, vel denique à sympathia alicuius partis inflammationē quę vicina sit vt in hæmorrhoidibus. Apertę ruptęque inflammationi vlcus succedit, ex quo maior quidem puris quantitas sed ardor vrinę minor est & tentigo minus molesta. Post coitum cum sana muliere & casta aut solus ardor vrinę exoritur è parastatis & prostatitis nimium resicatis & inanitis, aut etiam inflammatio & gonorrhœa: sed cum leuiori vrinę ardore minúsque molesta tentigine. At verò ex coitu cum impura spurcāque muliere, gonorrhœa illa virulenta, id est malignissima & acerrima excitatur, vnde penis pariter & indusia commaculantur, vrina cum cruciante dolore redditur quem vulgus apud Gallos vocat peculiariter *chandepisse*, & tentigine molestissima, cui iungitur etiam contractio penis cum dolore acerbior ob repletionem vel phlogosim & inanitionem non ligamentorum quidem, sic enim erigeretur potius quā inflecteretur penis, sed meatus vrinarij in inferna penis parte. oritur autem ab intemperie calida, siccāque & contagiosa parastatarum & prostatarum, cui contagio comes accessit ex tetro quodam putrique & lento excrementorum muliebri genitalis per coitus incendium in molles laxasque partes illas per penis ductum raptò, ex qua intemperie contagiosa, tum semen, tum alimentum istarum partium, tum denique quilibet affluens ad illas humor corrumpitur in varias alieni excrementi species foetidi

foetidi albicantis, virescentis, flavescentis & virulenti vel etiam mucosi.

Signa diagnostica.

Distinguitur vtraque species falsæ gonorrhœæ tum ab origine: nam contagiosa vnico coitu contrahitur, simplex non nisi multiplici glandulas inflammante & inuasiuente: tum symptomatis duobus ardore scilicet vrinæ & erectionis dolore, in contagiosa multo magis quam in simplici grauius tum curatione quod simplex per se, aut à medicamentis saltem topicis promptè exolecat, contagiosa non nisi prægressis vacuationibus per purgationem, phlebotomias & sudores. Distinguitur denique eo quod simplex minus, contagiosa longius perdurat. Quæ autem sine coitu est, aliis non eget signis.

Signa prognostica.

Contrahitur autem facilius virulenta gonorrhœa quibus est præputium longius, penis cutis, & tota substantia mollior, habitus calidus, humidusque, quique serius aut emittunt semen aut eo etiam emissio diutius scortorum amplexibus hærent, qui denique scortis sunt chariores, æstuant enim illa concubitu expedito vehementius, indeque sentinam suam magis commouet. Gonorrhœa contagiosa neglecta in luem veneream transit, sicuti & eadem repressa maturius vel iniectionibus frigidis vel exercitatione vehemente pure sursum conuerso phlegmonem excitat. In testiculis, vel perineo, gonorrhœa virulenta parastatas & vrethram exulcerat vnde stranguria, dysuria, & subnascente tuberculo carnosio ischuria.

Curatio gonorrhœæ contagiosa.

HÆc maturè inchoanda est ne alioqui dilatio-
ne in luem venereâ mutetur. Scopi eius sunt
tres, vnus vt totus sanguis & vrina temperentur (ne
in transitu acrimonia suâ phlogosin parastatarum
exasperent) secûdus vt humores ex toto corpore ad
parastatas decurrentes vacuet & reuellat. Tertius vt
parastatarum sordes leniter abstergeantur simulq;
phlogosis & intemperies calida extinguatur. Pri-
mus scopus victu frigido, humidoque & leniente
expletur vt hordeatis amygdalatis, iusculis carniū
recentium, vt vitularum, hœdinarum, vervecina-
rum, gallinacearum elixatarum cum lactuca borra-
gine buglossio spinaciis, summitatibus maluæ vio-
larie & rad. altheæ, piscibus recentibus elixatis,
prunis, pomis, pyrisque coctis & saccharatis, sed sal-
sa omnia acria & aromatibus condita, vt & grauif-
sima animi symptomata, motus vehementes & vi-
gilie fugiantur, venus quoque intermittenda est
quæ ad parastatas sanguinem, omniâque eius excre-
menta calefactione deducat, vnde tum phlogosis,
tum symptomata eius dysuria & tentigo exasperē-
tur, quanquam recentem aliquando profuso omni
humore vaporêque infecto cum semine persana-
re solet.

Secundi scopi instrumentum duplex est, phar-
macia & chirurgia, illa quidem præcedat, per cly-
sterem & purgationem lenientem siue minorati-
uam. Clyster constet ex decocto emolliente siue
communi dicto in quo mellis violati & olei viola-
cei an. ℥ iij looth de cassia vel diacathol. vel diapru.
simpl. ℥ j dissoluta sit. hæc verò ex medullæ cassiæ,
electarij diaprun. simpl. aut diacathol. ℥ j, vel coa-
cta in

Qua in bolum cum saccharo, vel dissoluta cum decocto florum & fructuum cordialium, talis est mēna ad ℥ ij vel iij & pulpa tamarind. ad ℥ ij sic enim non solum deriuatio fit excrementorum acrium à viis vrinariis sed viæ quoque assumendis medicamentis aperiuntur, fitque phlebotomiæ tutior vsus sine raptu cacoehymix primarum viarum in vrinarias distantiores. Postridie purgationis axillaris vena tundenda est dextri cubiti, sanguisque maiori vel minori quantitate demendus pro apparentibus vtriusque plenitudinis indiciis & vrgentibus symptomatis ardore vrinæ & tentigine. Eadem gonorrhœæ incipientis phlogosis temperanda est, partisque affectæ dolor leniendus frigidis quidem humidisque & lenientibus remediis non repellentibus aut astringentibus ne repulsa sursum, testes vel inflamm et vel sanguinem, heparque & corpus totum simili labe commaculet. Frigida autem illa intus forisque vsurpentur: sed externa vnguenti specie, renum, lumborumque & testium præsertim verò pubis & perinei regioni bis, ter, aut sæpius, diu, noctuque admouenda & cum pauco aceto albo multum & leuiter affricanda, talia sunt officinarum vnguentum album camphoratum, vnguentum populeum, vnguentum refrigerans Galeni recens paratum, vnguentum rosatum & ceratum santal. similia quoque ex oleo rosato, violato, nenuph. papau. & mandrag. conuenienti addito puluere concinnentur. vt.

℞ vnguenti alb. camph. ℥ iij trochisc. albi rhafis cum opio ℥ β olei nenuph. q. s. fiat vnguentum. vel

℞ olei rosarum, nenuph. an. ℥ ij succi lact. quart. j. bulliant simul ad succi consumptionem deinde ad-

de mucilag. feminis psyllij extractæ ex aqua nenu-
ph. ʒ ij sem. papau. alb. hyoscyami & lactuc. an ʒ ij
camphor. ʒ j cum cera alba fiat vnguentum.

Interna remedia sunt tum sumenda per os, tum
iniicienda per vrethrā cum cathetere. profuerit e-
nim nō mediocriter, phlogoseos parastatarum ex-
tinctioni, iniectio per mentulam refrigerāns, hu-
mectānsque, tergens leuiter & desiccans ab initio
sed nullo modo alstringens. Ea autem fiat vel ex la-
cte asinino & caprillo recenti admixta sacchari
rosati parte sexta. Fiet quoque commodè ex deco-
cto rad. altheæ & liquir. foliorum maluæ violar. ro-
sarum rub. & hordei mundati.

In assumendis reponuntur iulepi emulsiones &
opiatæ sed præterea lactis prædicti potio matutina
à ʒb β ad ʒb. j.

Iulepi è simili decocto & syrupis conficiantur.

℞. rad. liquir. rec. polyp. querc. & alth. an. ʒ j fo-
liorum capill. vener. summit. viol. & malu. hordei
mund. florum violarum & rosarum an. m. j. passul.
mundatar. paria xx seminum melonum & cucurbi-
tæ an. ʒ β feminis papau. alb. hyoscyami albi & la-
ctucæ an. ʒ j fiat decoctio in aqua fontana & in co-
lat. ʒb j β diss. syrupi adiantini, violati & de althea
an. ʒ ij trochisc. alkekengi ʒ j sacch. ros. ʒ iij fiat iu-
lepus capiat ʒ vj vtrisque diluculis continuando ad
remissionem vsque ardoris & tentiginis. Emulsionū
efficacissima vis est.

℞. Amygd. dulc. excortic. & in aqua frigida per
duodecim horas maceratarum paria duodecim, nu-
cleorum pini pariter lotorum & pistaciorum an.
par. viij. seminum quatuor frigidorū maiorum an.
ʒ ij seminum lactucæ, papau. alb. & hyoscyam. alb.
an.

an. ʒj contundantur in mortario affundendo sensim ꝑ ꝑb ij decoctionis vulgaris ptisanæ & colentur. Colaturæ addantur sacch. cand. ʒ ij vel syr. viol. capill. vener. ʒ iiij capiat ꝑb ꝑ vt dictum est.

℞. conseruæ florum malu. & viol. an. ʒ j ꝑ seminū acetosæ & maluz, vel althææ, vel gossipij ʒ ꝑ pulueris elect. diatrag. frig. & trochisc. alkekengi an. ʒ ij cum syrupo de althæa vel violato, fiat opiata de qua capiat ʒ iiij mane & vesperi superbibendo parum ptisanæ vulgaris.

Terebinthina quia in principio caliditate sua, parastatarum phlogosin accendit & præ tenuitate substantiæ suæ excrementis primæ secundæque regionis easdem opprimit, omittenda est, sed sub initium declinationis mitescente iam ardore & tentigine lota eadem vel aqua pariet. vel ptisana vulgari, dabitur vtiliter ad ʒ iiij in bolos ex cochleari cū pauco syrupo viol. & nebulis transglutiendos. Dabitur etiam dissoluta in mortario cum pauco vitello oui: sed in fine declinationis extincta iā phlogosi omnique ardore & tentigine remissa eadem terebinthina non lota (vt magis abstergeat) vtilius exhibebitur mixto rhabarbari puluere ad ʒ j vel ʒ j ꝑ eaque sæpius repetita, quanquam puluere etiam sumi potest siccata prius, vel in furno super lauri folia, vel super laminam ferri candentem igni ad eundem declinationis finem. Harum quoque pillularum eximia vis est.

℞. Aloes optimæ ʒ j rad. gentian. aristol. rotund. & myrrhæ alabastri & carabe an. ʒ j mithrid. veter. ʒ j ꝑ thereb. ʒ iiij cum syrupo viol. fiat massa ex cuius ʒ j fiant pillulæ vj, capiat quatuor singulis dosibus matutinis.

Quod si gonorrhœa represso ardore & tentigine nihilominus protrahatur diutius vnde morbi Gallici periculum impendeat sparsa à parastatis per vasa deferentia in hepar, totumque corpus venenata labe, tū præmissa purgatione vehementiori & phlebotomia labis huius seminaria sudoribus dierum 15 aut 20 exhaurienda sunt ex decocto guaiacino vel falsæparillæ. Topica quoque validius tergentia, siccantiâque per penem altius inferenda & per os etiam admittenda.

℞. fol. agrim. absinth. hord. integ. rosarum & centaurij minor. an. p. j. coquantur & in colat. ℞. j. dissol. mellis mercur. ℥ ij vnguenti apostolorum aut Ægyptiaci ℥ j fiat iniection quinquies aut sexies iteranda singulis diebus, & in pene diutius continueatur corpore resupinato constrictâque manu vræthra.

℞. cineris siliquarum fabacearum ℥ iiij infundantur in ℞. j aquæ pariet. vel decocti eiusdē per duodecim horas, deinde colentur & colaturæ addantur syr. viol. vel adiantini ℥ iiij capiat ℥ iij vel iiij horis tribus ante cœnam sudoris tempore, eodem tēpore vnguenta & emplastra mercuriata vt de ranis pubi, & perineo tuto apponantur contagiosæ qualitatis delendæ causâ. initio autem metuendum esset ne ab illis augeretur phlogosis.

Gonorrhœæ virulentæ grauiora symptomata sunt. Subest vlcus in ceruice vesicæ & in vræthra vnde Ischuria, de quibus deinceps in penis affectibus curandis. Dolor autem acerbior ardorq; inter meiendum qui in ceruice vesicæ & glande penis potissimum sentitur demulcendus est inter meiendum penis demersione in lac recens, tepidumque, vel in decoctum leniens cuiusmodi mox expositum est.

Sic

Sic tentigo molestior demerso pene in aquam frigidam vel impositis linteolis eadem imbutis reprimenda est ne scissuræ fiant.

Gonorrhœa simplicis curatio.

QUæ ab inflammatione orta est retenti seminis, ea quidē tenui frigidōq; victu & medicamentis leniētibus primū quidem minus sed tandē validiūs abstergentibus, siccantibusque tum iniiciendis, tum adimouendis caretur, de quibus omnibus paulò ante. Eadem est eius curatio quæ ab inflammatione & fluxione excitatur præ equitatione, acritūque nimio usu, sicuti & quæ ex congressu importuno cum casta muliere genita est. Si vero adsit solus ardor urinae ex inanitis & resiccatis prostaticis tum alteratio sola, id est refrigeratio & humectatio per topica molienda est.

Penis historia anatomica.

PENIS pars est organica partium testiculi subsequēntium vltima, propriūque in maribus urinae & seminis transmittendi instrumentum, vtrumque enim per communem meatum foras exponit non expellit. Pars corporis est pendula, prælonga, fistulosa, è ligamenti duobus meatu urinario, quatuor musculis, venis & arteriis quāplurimis & maximis nervisque, membrana nervosa, cute, glande, & præputio constituta. Ligamenta autem ex inferiore ossis pubis parte exerta sunt numerosis venarum & arteriarum plexibus, & sanguine crasso, nigroque plena, supernè quidem immota, infernè diiuncta, quantum meatui urinario deducendo sufficit ad glandem. Nam inter hæc duo ligamenta urethra,

id est meatus urinae feminique emittendo communis conspicuus est, ex nervosa tunica intus fistulae instar caua. Nihil enim aliud est quam vesicae ceruix ad extremam usque glandem exporrecta, qua parte quam in reliquo ductu suo voluptatis causa multo arctior est. Musculi quatuor sunt ex quibus duo à lateribus ossis pubis orti per latera penis feruntur eius erectioni & dilatationi adminiculantes. Alij duo à superiore ossis ischij parte secundum eius longitudinem & posteriorem partem feruntur qui penem erectum continent & amplificant, venae & arteriae magnae, multaeque à sacris utrinque expropterea sanguinem, spiritumque vitalem affatim & copiose coitus tempore impertiuntur quo flaccidus penis tendatur & attollatur. Nervi motores musculorum à spinali medulla sacra sentifici voluptatis à sextae coniugationis ramis ad costarum radices desumētibus. Ad ligamentorum fines, penisque extremum adnata glans est è carnea prorsus substantia glandis specie efficta, communem urinae, feminique meatum complectens. Totius denique penis substantia structuraque membrana nervosa cute & epidermide obuallatur sine ullo adipe, ne aut mollior, aut grandior euaderet. Glans quoque cute tegitur, praeputium dicitur quod glandi annectitur inferne vinculo dicto (canis) Glandis furculus corona vocatur sicuti spatium peni & ano interiectum (perineum) quod supra pubis os est (sumen) Est autem colis usus transmissio seminis & urinae. Actio propria est erectio distensioque infundendo in uterum semini necessaria non tamen excernendae urinae quod in alienum corpus non exponatur. Porro distensio haec non naturalis prorsus, aut animalis sed mixta quaedam

dam actio est. Naturalis quod sit causæ omnes demonstrant tum instrumentariæ (vt ligamenta duo fistulosa & spongiosa) tum efficiens quæ insita à natura est & vernacula huius partis facultas vt distendi possit, tum adiuuans calor scilicet, & spiritus per hiantia multarum, magnarumque arteriarum ora turgente libidinis pruitu affluens. Finalis denique propagatio nempe speciei quæ ad procreationem refertur. Eandem actionem animalem quoque esse nec modo comitem: sed naturalis etiam veluti duccem declarant tum imaginatio præuia, attentaque cogitatio rerum venerearum & coitus cupiditas voluntasque, quæ in vigilantibus magis clara, in dormientibus obscura magis est tantumque à speciebus commota diurnorum sensuum, vel seminis nocturno calore spiritumque turgentis vaporibus in cerebrum efflatis vt in brutis, tum musculi quatuor à quibus erectus à natura penis continetur porusque; vreticus dilatatur, tum denique voluptas huius actionis socia neruorum sextæ coniugationis ope suscitata. Ergo erectio penis quæ secundum naturam est, illa quidem ab affluente spiritu iuuatur, sed in ea quæ præter naturam est prius implentur ligamenta à flatu quam à natura distendantur. Idem cordi, arteriisque pulmonis accidit, vt secundum naturam prius distendantur quam impleantur: sed in motu contra naturam prius impleantur. Est igitur penis organum ex compluribus particulis adornatum quarum princeps est ligamentum duplex tensionis & erectionis author, cuius reliquæ particulæ administræ sunt & adiutrices vsumque tantum conferunt.

De morbis penis.

Penis morbi à quibus actio eius læditur, id est vel tollitur omnino, vel imminuitur, vel peruertitur, omnium sunt generum, tum similes ut intemperies frigida humidæque, vel sicca: tum organici ut breuitas, prolixitas, exilitas, crassities, obliquitas, curuitas, conuulsio, paralysis, præputij breuitas, astrictio adhæsióque cum glande, phimosis, paraphimosis, glandis inepta, vel nulla perforatio, meatus vrinarij obstructio ab impactu lapillo, aut tuberculo carnosio; tum denique communes ut vlcus internum, externumque, priapismus, satyriasis.

Mollities penis, tum cum erigi, distendi, inflarique nullo modo aut perbreui spatio possit, quando ex idiopathia laborat symptoma est, nempe abolita erectio, & coeundi impotentia nata ex intemperie plus satis frigida, vel calida ligamentorum ipsius aut ex eiusdem musculorum paralyfi. Aegri dicuntur frigidi differuntque à maleficiatis de quibus postea. Intemperies autem frigida ut caloris & sanguinis tractricem debilitat; sic calida eandem quidem roborat sed tractum spiritum continuo disperdit, ob partis substantiæ laxitatem pororumque amplitudinem: frigida quidem intemperies alias secundum naturam est, vel ex formatricis debilitate à seminis parentum frigiditate vel ratione ætatis in senioribus & iunioribus: sed in illis sicca insuper est, in his humida. Alias præter naturam est ex immodico partis orio & ueneris abstinencia: siue propter vitæ institutum ut in athleticis, siue propter vota & religiones, ut in monachis,

nachis, siue propter sapientiæ studium vt in philosophis. Aliàs denique contra naturam est, ab externa aliqua vehementique perfrigeratione siue aëris siue medicamentorum calido affectui vt phlegmone, carbunculo erysipelati oppositorum, Paralysis musculorum penis oritur neruulo illo qui ab osse sacro per foramen ossis pubis ad penem contendit, vel obstructo, à destillatione externa capitis, lumborum regionem irrigante, vel astricto à tumore aliquo per casum ictumve excitato, vel denique inciso ex vulnere, vel punctura. Eadem molities aliquando oritur ex sympathia vel totius corporis, obesioris, tenuioris, vel aliorum viscerum præsertim principum intemperatorum & frigidiorum: illinc enim seminis inopia, hinc eiusdem frigiditas: vel denique vasorum spermaticorum siue obstruatur siue astringantur sic enim seminis aut generatio aut eiectio intercipitur.

Curatio.

OMnium sympathiæ specierum diagnosi & therapia antea enarrata est. Nunc idiopathiæ curatio inchoanda est à frigida intemperie cuius signa sunt penis rugæ, exilitas, decoloratio & glabrities (si insita à natura sit) pubis & perinæi. Nā in adscititia pilositas nō deest, quæ autem ab ætate est senili incurabilis habeatur, quæ à puerili non eget curatione. Aliàs curabilis fere est idque cum diætâ calida, humidâque & omnino analeptica, quæ tamē mixtis quibusdam acris aromatis & flatuosis cibis vt radicibus & leguminibus condita sit quibus seminis substantia multiplicetur & spirituum

impetus irriteretur, de quo diatē genere plura antea.
Pharmacia externa internaque medicamentis con-
stet calidis, flatuosis, & odoratis vt.

℞. rad. conferuæ satyrion. & eryngij an. ʒ ij con-
dituræ cortic. citr. & zinzib. viridis an. ʒ j confect.
alkerm. ʒ β priapi tauri, cerui & lumborum scincor-
um an. ʒ iij sem. pastinac. erucæ, cæpularum & vr-
ticæ an. ʒ ij moschi optimi ʒ j ambr. griz. ʒ β cam
syrupo de pomis, fiat opiata de qua capiat ʒ ij vel
iij vtrisque diluculis superbibendo cochlear vnum
vel alterum vini hippocratici. Item,

℞. seminis fraxini, erucæ, menthæ, pastinacæ,
vrticæ, & cæpularum an. ʒ ij lumborum scincorum
ʒ β auellan. amygd. dulcium, pistaciorum, grano-
rum pini, medullæ nucis indicæ an. ʒ j testiculorum
vulpis & leporis, zinzib. virid. conditi an. ʒ β con-
tundantur omnia & excipiātur pauco melle despu-
mato, addendo moschi optimi ʒ j ambr. grizeæ ʒ j
fiat opiata vtatur pariter.

Topica calida, humidaque acria quoque & odo-
rata, fofus, vnguenti, linimenti & emplastri specie
toti coli, ossique pubis & perinæi regioni appo-
nenda sunt vt ex oleo costino, laurino, de spica,
muscatellino, sinapino & caryophyllorum addito
pauco moscho, ambra, aut ciucta ex quibus etiam
vnguentum fiat vt,

℞. olei costini & de castoreo an. ʒ j olei caryoph.
ʒ β euphorbij, seminis synapi, baccarum iunipe-
ri an. ʒ j moschi gran. vj ceræ parum, fiat vn-
guentum.

Crebræ quoque & validæ frictions ex manu vel
liniteolis calidis penis sopitum calorem exsusci-
tant vt spiritus & sanguinem validius deinceps
ad

ad sese protrahat, quorum tractum frigidior intemperies indèque attractricis facultatis imbecillitas impedire solet. Calida quos validius attraxit spiritus promptissimè discutit ob vasorum latitudinem propriæque colis substantiæ laxitatem, quæ tamen quod rarior sit peculiarem curationem vix exigit nisi ex Topicis refrigerantibus modicèque astringentibus, & electariis frigidioribus intro assumptis.

Mollities à paralyfi & obstructione musculorum penis curâda est diætâ calida siccâque, & pharmacia alterante & vacuante. Vacuatio autem ex pilulis phlegmagogis aut electariis similibus tentanda est post sedulam pituitosi humoris coctionem & alterationem per detergentia, attenuantia, tum apoze-mata, tum syropos & electaria vt theriacam & mithridatium.

Phlebotomiæ autem in hac obstructionis specie rarior sit vsus, nisi alterutrius plethoræ manifesta adsint indicia. Derivationis multo crebrior opportunitas est per errhina, apophlegmatismos & sudores ex decocto Guaiacino aut simili prouocandos. Topica calida, siccâque sint & resoluentia humore neruorum propagini infixum, ideòq; perinæo, pubi, & ossi sacro è quo neruorum spiritum animalè in musculos colis deferentium exortus est inducenda, qualia sunt vnguenta & olea modo præscripta pro cole frigido, multaq; alia istis vehementiora vt embrocationes & stillicidia aquarum sulphurearum ex balneis naturalibus, dropaces compositi, sinapismi & phœnigmi de quibus antea. At tumor ex contusione in eadem ossis sacri regione delèdus est ab initio quidem post reuulsionem per phlebotomiam & purgationem topicis attenuantibus &

discutientibus tanto validioribus quanto partis substantia densior est & nervosior. quod si fluxionis metus absit multoque ante tempore excitatus tumor fuerit, solis prædictis topicis locus futurus est nulla proposita reuulsione, nisi fortasse per purgationem quæ suspectam fluxionem à calore topicorum excitandâ anteuertat, mixtis tamen etiam malacticis quibusdam ne exsiccata nimis resoluentium vsu materia in duritiem scirrhosam abeat vt.

Re. olei de castoreo de costo an. \bar{z} j olei amygd. dulc. vel lilior. \bar{z} ij adipis suilli rec. axungiae galinæ vel cuniculi an. \bar{z} β sem. sinapi, nasturtij, sulphur. & stercoris columbini an. \bar{z} ij ceræ citrinæ parum, fiat vnguentum, applicetur parti post for-
tum qui constet ex decocto similis materiæ emollientis, attenuantis, resoluentis. Incisionis eorundem neruorum vel muscutorum ab inflicto vulnere nulla curatio expectanda est.

De magnitudine penis.

Magnitudo & crassities & longitudo enor-
mis & immoderata penis virilis fecunditatem duobus nominibus interpellat, Primùm quidem eo quod muliebri pudendum vt & vteri ceruix immaniter dilacerantur, vnde cicatrix relinquitur, quæ maris semen ante effluere foras sinat quam id ipsum vterus prolektarit (sic fœminam vnâ vrinæ incontinentia, alteram perpetua diarrhœa laborantem videre mihi contigit, diuulso ab eiusmodi violento concubitu, vesicæ aluique sphinctere) Deinde quia interno vteri osculo gra-
uiter

riter impulso per coitum contusóque, ita præ dolore mulieris voluptas interturbatur, vt neq; proprium semen emittat, neque virile admittat, excipiatque. Nam in tantula viæ prolixitate quãta vteraræ esse potest, maris semen vix adeo refrigescat, quod tamen Aristoteli persuasum est, locis præsertim muliebribus calidioribus vt infœcundum fiat.

Ista autem penis magnitudo insita & naturalis curationem quidem habet valde difficilem, tendanda tamen hæc est, in iuuenulæ præsertim virginis marito, vel adultæ etiam pudendo angustiori vteróque depressiori.

Curatio.

Curationis scopi duo sunt, vnus vt alimentum ab ipso pene reuellatur: alter vt ab eodem repellatur, extrudatúrque. Prioris scopi instrumenta tria sunt. Vnum est diæta vt sit victus attenuans frigidus & siccus, totum corpus exerceatur vno pene excepto qui veneris vsum intermittat, neq; pëndulus sed suspensus; neque multis calidisq; vestibus sed paucis & tenuibus vestitus, tectúsque sit. Alterum chirurgia est, vt sunt frictiones sublimarũ partium & deligationes externarum, cucurbitulæ hypochondriis & lumbis applicentur, crebræ quoq; sed leues phlebotomiz & hæmorrhoidũ profluuiũ. Tertiũ deniq; instrumentũ pharmacía est vt purgatio frequens & sudor per laconica aut decocta Guaiacina. Posterioris scopi vnicum est instrumentum pharmacía: vt sunt topica ex frigidis siccisque astringentibus & repellentibus medicamentis constituta, sine frigore manifesto à

quibus non solum alimentū obuiō frigore affluens extrudatur densata partis substantia porisq; astrictis: sed tractrix eiusdem facultas obtundatur. Eiusmodi sunt aluminē vstum, tuthia præparata, abortan. & cuminum, rutæ etiam semen, eaque omnia vsta. Illius generis sunt solanum, plantago, cauda equina, hyoscyamus, cicuta, balauftia, psyllia, nuces, cupressi, calyces glandium, gallæ virides, semina plantaginis, acacia, hypocist. scorïa ferri, squamæque, sanguis draconis, bolus armena, opium, olea cydoniorum, nenuphar. myrtin. lentiscinum, rosat. omphacinum. Tota hæc materia fots, cataplasmat, litus, vnguētī & emplastri specie vsurpetur, in lumborum, pubis, inguinum, perinæ & penis ipsius regione. Fots ergo fiat tum ex decocto prædictorum foliorum & fructuum in oxycrato vel aqua ferrata, tum ex succis eorundem viridum expressis, admotisque per linteola sæpius interdū & tepidè. Sic ex iisdem succis tum cum farina hordei mixtis cataplasma fiat sicuti ex eadem materia cocta tusa cretæque additis iisdem farinis.

Litus sine embrochatio prædictis oleis constet quibus addito triente pulueris scorïæ ferri, sang. drac. seminis plantag. & portul. vsti & similium auctaque ceræ albæ dosi vnguentum euadat: sed emplastri ex eadem materia singularis vsus est, quod parti diutius adhærere sine remotione possit.

De colis paruitate.

Colis paruitas id est breuitas & exilitas, ex inualida facultate, tum formatrice, tum alimentī spiritūsque attractrice, præ frigida intemperie oritur, siue hæc insita sit ab ipsis generationis principiis

cipiis frigidioribus, siue adscititia aut ob interdictionem, aut spretam venerem, aut ob epigastrij saginam, genitalium mutuos coitus prohibentem, siue ab aliquo morbo contracta ut à vehemente refrigeratione externa, vel excisione cancrose particulæ ut glandis, vel à cane arctiori de quo postea. Paruitas colis olim probrosa fuit maribus & indecora cum nudis corporibus publica certamina ab illis obiretur quorum consuetudo cum penitus nostris temporibus exoleuerit non deformitas quidem vlla sed sterilitas sola inde metuenda est. Neque enim idonea titillatione venerem accendere satis potest ut simul cum viro semen suum mulier effundat, nisi fortasse seminis virilis auidior vterus ad pudendum usque obuiam prouoluatur. Curationis scopi sunt tres, primus ut auctioris penis impediementa tollantur, secundus ut propria penis substantia & ligamentum laxetur, tertius ut ad eandem spiritus & sanguinis affluentia inuitetur indeque distendatur nisi iactura partis excisionis incurabilis interuenerit aut impax breuior. Primum igitur in eanis astrictione detegenda glans est, per transversam illius excisionem. Est autem canis vel caninum vinculum vel frænum *filetum* vulgus vocat colis particula præputium ad glandis inferam regionem iuxta urethram annectens. Quod si breuior sit penis paulo longiorem extensionem sine dolore non concedit vnde incrementum eius perhibetur contra quam mulierosis viris accidit quibus ob congressus frequentiam penis grandior, & crassior esse consuevit.

Ganglia tumores sunt exigui granorum milij instar alias nodi, duri, concolores indolentes ex crassa lentaque pituita concrefcente iuxta nervos & arti-

culos concidentēs à quibus ligamentorum penis productio impediri solet. Emollienda igitur & resoluenda illa sunt crebra vnctione & fricatione ex oleis liliorum amygd. dulc. catellorum, lini, vulpis, costini, laurini, quibus si axungia porci, gallinae, medullae vituli, veruecis, butyri, mucilaginis seminis lini, maluae althaeae cum paucō puluere florum chamamelis seminis scenugr. iridis floren. & baccharum iuniperi cum cera citrina aliquid addiciatur, vnguentum euadet efficacissimum praesertim mixto moschi momento. Atque sic primus, secundusque scopus expediuntur. Tertius qui in sanguinis caloris & spiritus deductione ad penem versatur, remediis comparatur calidioribus tam internis quam externis. Atque his quidem vt crebro coitu fricationibus duris saepiusque vt decies per diem repetitis idque cum linteolis tepidis, aut manu solas sed lacte praesertim ouillo, aut aliquo pingui vt oleo imbuta. Ab his enim tum substantia ligamentorum laxatur, vt produci & dilatarī possit, tum meatus offarciuntur ne quidquam deducti spiritus disperdatur ac exhalet. Eiusmodi sunt oleum de castoreo, costinum, nardinum, de spica, laurinum, lumbricorum. Similia sunt succus acrior ex similacis foliis, lac ficulneum & tithimalinum, si toti pudendo, vel soli glandi inungantur, ita tamen vt mox ab inunctione ardor, dolorque ex acrimonia inustus foris lactis vel decocti lenientis, aut ex olei violati nenuphar. & ros. litu temperetur. Similem facultatem augendi penis sed tantum occultam quidam ascribunt vermibus terrenis vino lotis exsiccatis & in puluerem reductis mixtisque oleo dulci aut amygdalino. Idem dicunt de hirudine, postquam per dies

dies septem nucis indicæ succo macerata sit, si confusa peni allinatur. Cōposita eiusdem facultatis rectè vsurpentur dropax, sinapismus, de quibus antea, vnguentum denique ex thapsia. Interna autem remedia petenda sunt ex formulis antea descriptis aduersus frigidos testiculos & feminis penuriam. Victus denique deligendus est totus quidem analepticus, calidus, humidusque, sed flatuosis cibis & acribus vt puta aromatis mixtus vt à multo acri & vaporoso semine expultrix facultas vehementius lace ssatur, penisque violentius distendatur. Quæ autem breuitas à mole nimia ventris orta est præscriptis aduersus obesitatem præfidiis restituetur. Sed quam excisio causauit nulla ars emendet aut amoliat, sicuti neque illam quam breuior *ὑπαρχὸς* attulit, arctius enim reuulsa ad vmbilicum vesica vrethram colémque contrahit.

De curuitate & obliquitate penis.

Penis curuitas & obliquitas hoc nomine fecunditati obsunt quod rectam seminis virilis eiaculationem in vteri interiori sinum præpediant aut in cervicis latera conuertant, vnde euavidum paulo post effluat. Curuatura autem penis eiusque meatus sit vitio vinculi canini quod ad penis finem glandisque initium definit, quoties breuius & contractius vt sit à natura contigit: de quo vitio loquitur Gal. cap. 3. lib. 15. de vsu partium, ægrósque vocat *ὑποσπασιαίς*, & libello de definitionibus medicis. Sic idem ad latera torquetur & inflectitur paralyfi & conuulsione alterius musculorum ex pectinis ossis

prodeūtiū, penēmq; ipsum arrigentiū. Curatur cur-
 uiras continui vinculi productione per emollitio-
 nē & relaxationē, vel transuersam sectionē. Emol-
 lientia, laxantiāque medicamenta calido, humidō-
 que temperamento temperata sint, vt butyrum, æ-
 lipus, oleum chamæ. irinum, amygd. dulcium, ca-
 tellorum, lini, adipis suilli, vitulini, hædini, verue-
 cini, anserini, gallinacei, medullæ ceruinæ, verueci-
 næ, caprinæ. Hæc omnia fots litūsque & vnguen-
 ti specie, peni eiūsque infernæ parti frequenter ob-
 ducantur. Fotus quidem fiet ex radicibus althææ, li-
 liorum alborū, ebuli, cucumeris agrest. folijs qua-
 tuor remollient. summitatib. ebuli, sambuci, anethi
 viridis, seminis lini maluæ fœnugr. in hydræleo de-
 coctis. Hoc decocto imbuta spongia vel aliquo
 prædictorum oleorum, applicetur quotidie & qui-
 dem sæpius. Ex iisdem oleis simplicibus litus &
 embrochationes fiant, vt & vnguenta additis nimi-
 rum adipibus, medullis, mucilaginis & cera no-
 ua. Tale est istud.

℞. olei amygd. dulc. & semin. lini an. q̄r̄ β mucil-
 lag. seminis lini & maluæ extractæ ex decocto ficuū
 ʒ ij butyri recentis, axungia suillæ & medullæ cru-
 rum vituli an. ʒ j ceræ nouæ parum, fiat vnguentū.
 Vsu ergo istorum emollientium penis, canisq; sub-
 iectis puluillis extensus & directus seruetur. Quod
 si per emollitionem & relaxationem directio
 obtineri nequit, tunc fieri debet canini ligamenti
 ad glandis radicem transuersa excisio, inuiolatâ in-
 terim intactâque manente vrēthra, vt ita carne in-
 ter ipsas sectionis oras subnascente penis protra-
 hatur dirigatūq;. Obliquitas autem remediis ad-
 uersus paralyfim & conuulsionem antea præscriptis
 diri-

dirigenda est.

De præputij morbis.

NVmerantur etiam in Organicis penis morbis breuitas præputij, adhæſio cum glande, rhagades, phimosis & paraphimosis.

De breuitate præputij.

Breuitas quidem est nimia, cum glandem tegere præputium nequit siue ea insita sit: siue adſcititia ex artificiosa eius præcisione suscepta vel ob religionem popularem Iudæorum & Mahumetanorum quam Albuchraſis Arabs mundificationem vocat, eiusque rationem tradit (hæc Græcis sicuti & nostris Christianis insueta est) vel ob curationem Gangrenæ & Sphaceli: dum tota præputij nigricantis & emortui pars orbiculatim præeiditur sanguine interim si immoderatus è vulnere fluat vſione represso, aliàs subinde cicatrice inducta per epulotica topica vt à puluere squamæ æris, vel plumbi, vel tuthiæ, vel malicorij in vnguenti speciem melle excepto. Neutra autem breuitatis species actioni penis quæ extensio est & seminis eiactatio aut fecunditati incommodat (tamenſi venereæ voluptati mulierum ob pudendi minutam titillationem nonnihil detrahât) quin potius à sordium putrium, acrium aut contagioſarum etiam inflammatione & exulceratione, denique ab ipsa lue venerea tutatur ideoque curatione non indiget, neque enim ob palæſtram & publica certamina nudis corporibus obiri olim solita quæ his temporibus prorsus exoleuerunt deformitas

excēſæ & detectæ glandis noſtris hominibus metuenda eſt. Legi tamen illa curatio poteſt apud Paul. cap. 53. lib. 6.

De adhaſione.

Præputij cum glande adhæſio præpedire cōi-
tum præſertim cum virgine, & fœcundita-
tem interturbare ſolet. Hæc autem accidere ſo-
let carne quadam ſpongioſa, ob neglecta aut ma-
lè curata neque ſatis accuratè reſiccata iſtarum
partium vlcuſcula, ſubcreſcente & vtraque in-
ter ſe committente. Eiuſmodi coalitus & adhæ-
ſio frequens eſt in digitis, labiis & pudendo mulie-
bri. Curatio igitur adhibenda eſt, per nexus ſo-
lutionem & ſubnatæ carnis exciſionem cum ſcal-
pello chirurgico, ea tamen cautione vt neutra
pars ferro violeſcat, ſi fieri poſſit, ſin minus glan-
di potius quam præputio viſ inferatur: ne ob
tenuitatem ſuam prorsus ipſum pertundatur. poſt
diſſolutionem autem carniſque exciſionem mox
litneolum aqua frigida madidum præputio &
glandi interponendum eſt: ac deinceps poſt-
quam calor dolorque reſtinctus fuerit ex vino
tortiuo & aſtringenti ſæpius uſurpādum. Vnguen-
tū etiam epuloticum vt quod rubeum & ex minio
inſcribitur crebro inferēdum eſt dum cicatrix du-
cta ſit, ne rursus partes diuulſæ coeant & coale-
ſcant.

De rhagadibus.

Rhagades extremas præputij oras moleſtia gra-

ei aliquando discindunt. Hæc autem vlcera sunt oblonga, angustaque extremis multarum partium poris fibrosis infensa, idque alias ex diuulsione violenta vt ani prætransitu fecum duriorum, & præputij præ violenta eius reductione à glande siue ob proprium siue ob glandis tumorem. Alias à vehementi exsiccatione & refrigeratione vt hyberno tempore per Aquilonarem flatum, in manibus & labris, vel etiam à calore nascuntur. Nonnunquam non à simplici intemperie sed ab humore acris aut falso vt in pudendo muliebri & papillis mammillarum in nutricibus, excitantur.

Recentes rhagades cruentantur, inflammantur & dolent grauiter, antiquæ obcalescunt iisque symptomatis carent. Recentes ergo curentur lenientibus frigidis humidisque & astringentibus mixtis quale est sequens vnguentum.

℞. olei ros. & de papau. an. \mathfrak{z} j vnguenti alb. camphorati \mathfrak{z} ss terræ sigill. & sang. drac. an. \mathfrak{z} ij albumen oui vnius ceræ alb. parum, fiat vnguentum.

Plumbea lamina tenuissima in medio dissecta & noctu super labra gestata certissimum est rhagadum in labris remedium. Antiquæ rhagades primum emolliendæ sunt mixta pauca agglutinantium portione sicuti hac formula.

℞. olei de semine lini \mathfrak{z} j ouum vnum litharg. \mathfrak{z} ij fiat vnguent. vel ℞. olei de semine lini & de amygdal. dulc. an. \mathfrak{z} j mucaginis seminis altheæ & butyri rec. an. \mathfrak{z} j ss nucum cupressi & gallarum an. \mathfrak{z} ij ceræ nouæ parum, fiat vnguentum.

Quod si durior callus emolliiri non possit, rhaga-

dum labra superficie tenus scalpello primum sunt exterenda, deinde coniungenda vnguentis prædictis lenientibus & astringentibus. Atque hæc esto curatio rhagadum quæ à diuulsione violenta aut à siccitate eximia fiunt. Quod si adsit acris humor ut biliosus in aliis partibus & pituitosus, salsusque sub balano præmissa deterfione cum linteolis, vnguentis lenientibus & astringentibus prædictis tergentia ut aloë myrrha & erui farina sunt admiscenda. Quod si adsit suspicio venereæ luis, lithargyri extincti moimentum iisdem vnguentis permiscendum est.

De phimosi & paraphimosi.

VTerque affectus est organicus in situ præputij murato, nam per phimosim detegi nudarique balanus, sicuti per paraphimosim obtegi, vestiri que à præputio non potest. Est autem phimosis dicta *ὑπὸ τῷ φίμῳ* gallis *chenestre*, unde *φίμω* & *φίμωσις*. Hæc quandoque insita est, sæpius adscititia, ex cicatrice interna præputij, vel hyperfarcomate, vel ex inflammatione, comitantibus sæpius vlceribus. omnis quidem phimosis non coitum tantum sed seminis etiam vrinæque liberam excretionem cohibet atque adeo molestissimā ischuriam accersere solet. Quæ ex callo & cicatrice est à curatis vlceribus relicta, hoc pacto à vulgo chirurgorum curatur; nempe si præputium per vncos eiusdem oris impactos validius extendatur & dilatetur, eiusque interior cutis (intacta & incolumi quæ externa est) scalpelli subtus admissi acie tribus vel quatuor pari spatio distantibus inter se vulnusculis diffindatur. Si tamen præputij foramen tam

angustum sit: vt vix excipiat specillum, tum immiffa fistula plumbea in vrethram: vt per eam affuefcatur meiere æger, aliquo pingui vt oleo, vel axungia gallinæ emollitur & dilatatur callus & præputium quod fit per octo dies. Sic hyperfarcoma quod male curatis neque fatis ficcatis vlceribus præfertim venereis præputij, glandis que expullulare folet, præputium pariter extenfum, adacto scalpello densis que & crebris incisionibus elidendum & extirpandum eft, ita tamen vt deinceps circulo plumbeo interiecto quod charta obuolutum fit glans & præputium à mutuo coalitu contactuque prohibeantur. Phlegmone denique huius quoque partis qualis impuræ fcortationi cum vlceribus fuccedere folet & quidem cū dolore, aliarum infiar profliganda eft, tum diætā tenui, frigida, ficcāque, tum reuulfione per phlebotomiam & purgationem, tum repercuffione ab initio mōxque refolutione adhibita per topica remedia, immiffa interim in vrethram fistula plumbea vtrinque pertufa per quam æger toto curationis tempore meiere affuefcatur. Atque hæc quidem foris admouenda. Sed propria vlcerum, exficcan- tia validè & tergentia modice inter præputium & glandem ac fedem vlceris funt inferenda. vt ℞. ligni indiei qrt. j. foliorum agrim. scab. beton. plantag. pilosellæ an. m. j. rad. tormentillæ ꝑ j. tutthiæ præpar. squamæ eris, aloes hepaticæ boli armeni an. ꝑ j. ꝑ bulliant fimul liquôrque siphunculo vel cathetere fepe vt decies in die infundatur & deinde vnguentum rofatum pauco puluere præcipitato afperfum in linamentis indatur. foris autem pars linteolo eadem decoctione madido mu-

piatur. Quæ autem insita est phimosis curatur præputij incisione vel simplici, vel si angustius sit duplici ab oris eius exterius ad glandis coronam figura triangulari perducta iuxta caninum vinculum ut referat equum anhelosum naribus dilutis.

Paraphimosis adscititia oritur ex tumore glandis phlegmonoso aut hyperfarcomate alterutrius glande præputiū non admittente. Itaq; curetur aut excisione carnis ante exposita, vel si sola adsit phlogosis, qualis violento aut impuro concubitu succedere solet, refrigeratione partis ut per lotionem & vñtionē ex vnguento albo cāphorato, quod si vera & humida phlegmone fuerit, aliarū phlegmonarū instar curetur reuellentibus & discutientibus remediis, tūmq; præputio obducatur nisi vlcera adsint prius obsignanda: ne aut glandi sauciatæ adhærescat præputium: aut sanies vlcera inter vtramque particulam desideat. Paraphimosis insita si glandis coronæ adhæserit, ea primum adhæsiō scalpello subtus admissio excidēda est, deinde præputiū super glandem mox reductum fasciola linea molli ter astringente cōtinendum ne remeet interposito etiam linteolo ne partes rursus coeant. Quod si præputium liberum sit scarificationibus pluribus multoque tepentis olei illitu laxatum foras super glandem protrahendum est.

De inflammationibus præputij glandisque.

Præputij glandisq; vlceribus frequēter superueniunt præ dolore phlegmone, gāgræna, sphacelus, ex quibus neglectis vel temere curatis mors incuitabilis. Phlegmonarum igitur vtriusq; partis curatio cōstet tum victu tenui, frigido siccoque, & sum-

summa corporis animique quiete, tum matura reuulsione per clysteres molles, purgationes lenientes & per phlebotomiam copiosam in cubito dextro quæ tamen viribus respondeat, deinde percussione & resolutione per topica pro temporibus varianda. Quod si in Gangrænam vergere ex liuore partis & indolentia videatur, ea quidem crebris scarificationibus curetur quæ fluxionis impactique sanguinis copia, ex qua natui caloris suffocatio imminet, partem exoneret: moxque scarificata pars aqua salsa aut oxycrato aut vtroque mixto ter aut quater in die abluenda est. Si tamen victis remediis alterutram partem sphacelus inuasisse ex nigritie & integra indolentia deprehendatur extincto prorsus calore, tum pars emortua tota & nigricans scalpro resecanda est, moxque sectioni ferramentum candens superinducendum (hæmorrhagiæ comprimendæ causâ) ita tamen vt escharæ casus, ante nouæ carnis regenerationem non acceleretur. Eodem tempore fistula plumbea ad mictionis necessitatem & consuetudinem vtrinque pertusa in vrethram inferenda est. Est etiam sphaceli alia non infrequens origo sine phlegmone aut gangræna præuia ex sola vlcerum malignitate aut penetrabili frigore quo celeriter ad scrotum & vesicam peruadente mors propinqua est nisi integra corruptæ partis amputatione promptaque succurratur & vstione succedente tum ad escharæ mollitionem ne hæmorrhagia fiat, tum ad corruptæ substantiæ absorptionem.

De priapismo.

Priapismus nō naturalis est & morbosa penis erectio, vel auctio penis inuita & sine veneris desi-

derio in longitudinem orbemque, stabilis & permanens. Quæ secundum naturam est erectio partim naturalis, partim voluntaria est, sequiturque veneris cogitationem & cupiditatem vel manifestam ut in vigilantibus, vel obscuram ut in dormientibus, citòque desinit ob tenuitatem resolvablem spiritus instantis. At in Priapismo neque naturæ neque voluntatis ius ullum est, eiusque duratio longior est & permanens ob difficilem crassioris flatus dissolutionem, inflatur ergo quia impletur: sic cor naturaliter impletur sanguine & aere quia dilatatur. At non naturaliter dilatatur quia flatibus crassis impletur per palpitationes. Nomen ortum est vel à parte affecta (pudendo virili) vel à gentilitio hortorum numine tam enormi mentula à poetis & pictoribus effictò descriptoque. Alij satyriasum vocant à simili: sed libidinosa Satyrorum tentigine,

Hoc Symptoma est tumoris nervi cavernosi qui propriam penis substantiam constituit ab halituoso quodam spiritu repleti. Porro halituosus spiritus gignitur in animalis corpore ex alimentis & humoribus lentè excalefactis & diminutè concoctis idque vel ob caloris partium debilitatem, vel ob humoris crassi viscidique cruditatem quem calor vegetior in vapores crassos resolvit. colligitur autem vel in manifestis cavitatibus partium ut cerebri, pulmonis, ventriculi, renibus, vesicæ, vteri, scroti, vel occultis ut inter partes similares: sed quia perpetuò movetur ubicumque sit in cavitatibus maioribus varias sonorum species edit ut in vetriculo ructum, in intestinis strepitus & murmur in podice crepitus sonoros & sine sono, in cerebro sternutationes, in vesica & utero efflationes, in oc-
cul-

cultis palpitaciones tantum vt corde, penē, aliisque partibus. Est autem huius tumoris & symptomatis origo duplex, vna per idiopathiam nerui fistulosi à flatuoso crassoque spiritu impleti, ibidemque collecto & densato à calore valido vel inualido ex frigido crassoque & viscido succo neque transpirante, tum ob crassitiem propriam, tum ob densitatem substantiæ ligamētosæ nerui cauernosi. Huius idiopathiæ signum est palpitatio præcedens nullaque veneris libido. Altera origo est per sympathiam arteriarum penis magnarum multarumque, quarum ora frequenti & matura venere laxiora sunt & dilatantur spiritu vel multitudine vel ex retento præter consuetudinem semine, vt in iuuenibus & sanguineis, vel ab acrimonia eiusdem seminis & sanguinis post diutinum alimētorum acrium vsum, vel denique à multitudine flatuum spiritibus mixtorum, vt dum soluitur diuturna ligatura, tum enim qui cohibiti fuerunt aut præ astrictione excitati flatus ad inferas & genitales partes præcipites erumpunt.

Hæc quidem sympathica origo priapismi Gale-
no frequentior videtur qui tres hoc modo laborā-
tes curauit, vnum autem tantum ab idiopathia. Hic
ergo Gal. vnicam priapismi speciem sed duplici o-
rigine constituit, atque adeo vnicā curationē ascrip-
sit vt videbis cap. vlt. lib. 6. de locis. cap. 9. lib. 9. se-
cūdum locos cap. 7. lib. 14. meth. cap. 3. lib. 3. de sym-
ptomatum causis, denique cap. 15. libelli de tumori-
bus præter naturam. At Paulus Ægin. & Aurelianus
duas species assignarūt vnāq; diuturniorē statuunt,
eā scilicet, quæ fit per idiopathiā, alteram acutissi-
mā quæ fit per sympathiā sed comitāte phlegmone,

convulsione, syncope, morte denique cum tumore ventris.

De signis diagnosticis.

Signa priapismi cuiusvis communia sunt tumor rigidus & rubicundus, erectio inuita & perseuerans, cum dolore cruciante. Idiopathiæ signum est palpitatio, debilis verò in parte caloris signum est præcedens veneris fastidium sicuti caloris fortis libido. Sympthiam à semine retento indicant abstinentia infusa veneris, iuuenilis ætas natura calida humidâque, habitus eusarchus, vita hilaris & otiosa. Eius verò quæ est ab acrimonia spirituum notæ sunt victus acris à multo flatu mixto spiritibus, longa strictâque lumborum cinctura qua sublata excitato calore, pressuque flatus deorsum in partes genitales per vasa seminaria irruunt.

Signa prognostica.

Priapismus qui fit per *συμπύρεταις* frequētiore est, quàm idiopathicus. Hic quoque diuturnior, ille acutior est, & aliquando lethalis quando ipsum comitatur dolor, inflāmatio aut syncope. Idiopathicus quoque rarissimus est in senibus quidem ob frigiditatem partis nullos flatus excitantem & substantiæ eiusdem partis densitatem ob quam dilatarī non potest. In pueris verò tum ob debilem calorem tum etiam ob mollitiem substantiæ partis. In iuuenibus frequens ob fortē calorem penis & crebras cruditates.

Curatio.

Curativi scopi sunt tres, vnus vt prohibeatur per idoneam diætā flatuum generatio. Alter

ter vt caussa antecedens flatuum materialis vacuetur. Tertius vt flatus ipsi digerantur. diætā igitur tenuis decernatur (quia affectus est acutus) in idiopathia ab humore crasso attenuans, tergénsque & moderatè calida ab initio nisi vehemens adsit in pene calor & sentiatur, tunc enim refrigerans præstet ne aucto calore aut phlegmone fiat, aut plures crassioresque flatus suscitentur dolorque exasperetur, sed in debili calore penis non modo attenuans, tergénsque sed calida etiam ab initio sicuti in declinatione præscribi debet. Quare alatur æger pane frumentaceo vel hordeaceo, carnibus assatis iuniorum auicularum & fructibus siccis vt passulis, pomis, pyrísque tostis & anisatis. Pro potione detur aqua simplex vel mulsæ, aut saccharata remoto vino ad declinationem vsque. At in sympathia, siue à semine retento, siue à seminis copia, siue ab eiusdem acrimoniâ aut à mixtis flatibus proueniat, tenuior magisque refrigerans diætā instituitur, tum ne spiritus multiplicati, attenuati, aut acres, arterias magis aperiant, aut phlegmonem accelerent.

Secundus scopus in vacuationibus versatur causarum antecedentium à quibus flatus gignuntur, aut phlegmone excitari potest præ acerbitate doloris tetanici. Ille sūt phlebotomia, purgatio, clyster, scapularum & brachiorum frictiones & deligationes ad reuulsionem suspectæ fluxionis. ergo in idiopathia phlebotomia sit parcior (est enim humor crudior) & in cubito dextro vt pote hepatis & venæ cavae viciniore (reuulsionis promptioris caussa) sed tamen eadem ex poplite & malleolo utroque poterit celebrari deriuationis caussa in augmento genitæ phlegmones. Clyster phlebotomiæ & purga-

tioni præmittatur leniens quidem & modicè refrigerans ad viciniorum genitalium calorem temperandum vt ex decocto betæ quatuor remollient. ũ lactucæ, hordei & florum communium in quo mel violat. oleum viol. cassia aut diaprun. simplex dissolutum fuerit, purgatio sit phlegmagoga leuior, remotis colocynthicis & diagridiatis omnibus vt ex decocto vel infuso seminis carthami, sennæ, agarici, eaque vomitoria potius quam deiectoria : ne humoribus deorsum motis irrigatæ partes genitales magis inflammentur : purgationi iulepi recte subiungantur attenuantes, tergentesque sine caliditate quales ex syr. acetos. simpl. oxyfæcharo simpl. oxymel. simpl. & melle ros. colato cum aqua agrim. endiu. graminis concinnari poterunt. In sympathia à semine copioso vel acri phlebotomia sit vberior in iuuenibus præsertim sanguineis & otiosis : purgatio sit cholagoga ex infuso rhei & agarici epithymi & syr. de cichor. compos. vel ros. pallid. Sit etiam vomitoria siquidem æger vomitioni assuetus sit. A purgatione denique iulepi vsurpentur magis refrigerantes vt ex syr. de agrestia, de limonibus, de acetositate citri, de granatis acidis aqu. acetosa, lactucæ nenuph. Tertius scopus topicis expeditur initio quidè frigidis etiam in idiopathico affectu mitigandi doloris & caloris causa si forte acriter urgeat ne oriatur phlegmone, aliàs modicè digerentibus. Illius generis sunt vnguent. ros. aqua frigida sæpius lotum, ceratum rosatum ex oleo & cera, huius generis leniter scilicet digerentium ceratum est ex oleo chamæmelino cū cera. Sed in declinatione vbi dolor, calorque resederunt, vehementiora sunt adhibenda vt oleum rutaceum & aliud cui discutientia

tientia semina, vt cumini, ameos, petrosel. rutæ & cardamomi incocta fuerint. At in sympathia siue à copia, siue ab acrimonia seminis: tum ob vehementiorem penis calorem, maioremque astringendarum arteriarum, arcendæque phlegmones necessitatem multo frigidiora topica pubi, peni, perinæ, & lumbis sunt applicanda. Tales sunt succi lactucæ, hyoscyami, semperuiui, solani, plantag. vel soli, vel cum farina hordeacea in cataplasma informati. Interim verò suspecta fluxio fortibus frictionibus, & deligationibus scapularum & brachiorum, & cucurbitularum appositionibus studiosè est reuellenda. Sed tandem in declinatione vbi dolor, calorque partis resedisse videbuntur medicamentis digerentibus initio quidem leuioribus tandem vehementioribus reliquū negotium dissipandorum flatuum conficietur. Inter leuiora sunt litus ex oleo chamæmel. anethino, liliaceo, sambuctino & cerata ex iisdem & noua cera conflata. similis fodus est ex decocto florum chamæmel. meliloti, anethi, seminis lini & ficuum cum linteolis spongia vel xylo ad mouendis quorum omnium vires post sedatum omnino dolorem & calorem augebuntur. litus ergo fiat ex oleo rutaceo, aut eiusmodi aliquo in quo semina discutientia coxerint, fodus verò ex lixiuio.

Quod si post triduum à reuellentium vacuationum & refrigerantium topicorum vsu penis neque detumescat neque minus indolescat, & incalescat: tum demum affixis eidem cucurbitulis cum scarificatione, aut sanguisugis gangræna præcauenda est exonerata phlegmones iam conceptæ portione, à quibus mox pars ipsa ablucenda erit oxycrato, aut

aqua falsa, aut vnguento ægyptiaco dissoluto, tandemque post repressam gangrænam impacti humoris reliquiæ & flatuum traditis digerentiû formulis discutiendæ sunt, alioqui ex sphacelo superueniente moriendum erit.

De morbis glandis.

Glandis insitus vnus morbus est & à conformatione ingeneratus, plures adscititij vt thymi, plegimone, gangræna, sphacelus, & vlcera. Est autem balani vel glandis substãtia carnosâ quidem densâ, durâque & læuis, & acutæ glandis quercinæ instar vnde nomen, extremum penem ambiens & meatum vrinæ feminique excernendo communem complectens & transmittens. Meatus quidem ille secundum naturam angustior est ad maiorem voluptatem in coitu excitandam per longiorem feminis in angustia illâ moram & titillationem: sed vicissim doloris acerbioris causa est in transitu vrinæ acrioris (vt per dysuriam & stranguriam) aut lapilli asperioris. Partis huius vnus est insitus & à cõformatione ingeneratus morbus organicus. Qui eo laborat, *ἰσχωρία* & *ἰσχωριασμός* à Galeno dicitur libro de definitionib; medicis, Albuchrasi autem libri secundi cap. 55. triplex est. Secundus quando perforata quidem est sed exiliter nimis arctèq; & angustè. Tertius quando glans decenti loco suoque apice perforata non est: sed sub vinculo quod Canis dicitur quo cutis membri genitalis cum glâde colligatur. A prima specie ischuria est, vrinæque & seminis integra suppressio. A secûda tardior, exilior fili instar, difficilior magnoque accedente conatu vrinæ & seminis exclusio est. A tertia libera qui-

quidem est: sed deprauata vtriusque excretio, neque enim vrina antrorsum nisi pene sursum ad vētrem reflexo excludi: neque semen in sinum muliebrem vibrari rectà potest. Paulus tertiam speciem curat cap. 55. lib. 6. Gal. primam & secundam citatis libris, primam quidem si perforetur glans stilo argenteo vel aureo candenti, atque post escharæ casum per emollientia vt butyrum & basilicum vnguentum si inserta plumbea cannula labra vlceris tantisper diducantur dum omnino occalluerint ne denuo inter se coeant & conglutinentur. Hæc curatio secundæ speciei communis est: quæ dum expeditur inflammatio prohibenda est, dolore ardorēque mitigato per linteolorum aqua rosarum aut succo refrigerantium herbarum, vt lactucæ, solani, semperuiui, madentium appositionem ad glandem ipsam, tum per defensiuam vocatam inguinibus & pubi admota, quæ fluxionem arceat. Tertiæ speciei apud Paulum curatio instituitur per excisionem glandis ad coronam vsque, & cicatrice quamprimum inducta nisi hæmorrhagia obstet comprimenda vel ischæmis medicamentis vel si profusior sit per cauteria actualia.

De Thymo.

EX adscititiis morbis glandis thymi sunt, verrucarum species scilicet sicuti verrucæ ad pustularum genus pertinent. Porro verrucæ siue porri exigua quidem omnes sed tamen molestæ & morbosæ mole sunt, quarum duæ sunt species vna sessiliū: altera pensilium. In eo conueniunt quod sæpius complures quam solitariæ extuberant diuersa tamen origine, quod reliquæ sua sponte internæque fluxio-

ne ab hepate transmissa oriuntur, thymi autem ex coitu fere, sicuti calli ex attritu. Ad primam speciem sessilium pertinent myrmecia clauus callus, ad alteram pensilem referuntur acrochordon & thymus siue thymium, ille quidem apice lato, duro, aspero, cuti concolore sed basi prætenui, ex qua quasi funiculo quodam pendet, & à similitudine apicis chordæ resectæ nomē inuenit, hic basi quoque est satis tenui, apice ampliori subrubro minúsque aspero acrochordone minor, ex quo tamen vulnerato hæmorrhagia maior accidit quam paruitatem eius deceat. Thymorum differentię desumuntur tum à mole, ex qua alij mediocres propriè thymi, alij maximi, qualis est, qui ficus vel *ovxwos* dicitur, à similitudine subrubri coloris & asperitatis quæ in ficu inuersa cernitur. tum à more, vnde alij mites sunt, alij feri & maligni: Illi à sanguine temperato, hi ab atrabilario ortum habent. Illi nihil aliud sunt quàm carnes excrementitiæ parum asperæ, subrubræ & indolentes, hi inagis scabri duri colore liuido & dolore pungente molesti, præsertim à manuum contrectatione & medicamentorum appositione. Sumuntur denique differentię à natura, vt alij simplices sint ex coitu difficili cum muliere munda, alij contagiosi ex consuetudine cum immunda tantum muliere, vel etiam quæ luc veneret infecta sit, vtriusque enim putrida excrementa penis partes acrimonia sua exulcerare solent, quibus vlceribus neglectis exiguæ carunculæ supercrescunt & pullulant. Penis glandem potissimum pudendum muliebrem & podicem sæpius inuadunt thymi.

Cura-

Curatio thymorum.

Thymorū curatio topica duplex est post causarum antecedentium remotionem à quibus augeri fouerique possint vt plethoræ alterutrius per phlebotomiam, cacochymia per purgationem contagionis venereæ per sudores ex decocto Guaiacino vel etiam vnguento Neapolitano pro varietate substantiæ moris & sedis ipsorum vna scilicet chirurgica, altera pharmaceutica. Illa rursus duplex est per ligationem & per excisionem, ligatur enim basis eius nisi fortasse laxior sit cum filo serico aut pilo caudæ equinæ donec nigrescat suæque sponte decidat, imposito interim parti eidem linteolo aqua rosarum madido vt à calore, dolore & inflammatione vindicetur. Siqua autem radice portio superest cathetico puluere deraditur (de quo postea) Secunda curatio est per excisionem: vt volsella apprehensus thymus forcipe succidatur (neque enim dolor in obtuso carnis excrementitiæ sensu succisionem remorari debet) & permittendum vt sanguis copiose fluat, maximè si plures aut maiores thymi sint. copiosior tamen fluxus tandem inhibendus est puluere sarcotico vt metallicorum vistorum quidem: sed non lotorum, qualia sunt alumen vstum, atramentum sutorium, squama æris, æs vstum, antimonium, plumbum. Aëtius post succisionem cauterium adhibet actuale tam sistendi sanguinis quam prohibendæ recidiuæ & consumendæ prorsus materiæ residuæ gratiâ, deinde post escharæ casum per emollientia vt butyrum & vnguentum basilicum, vlcus vbi carne impletum est cicatrice tegatur per epulotica. Curatio thymorum pharmaceutica leuissima constat vehementi exsiccatione &

astrictione per medicamenta epulotica quæ sint
 crassioris substantiæ terrenæ & frigida & sine ullo
 calore, morfu & doloris sensu, cuiusmodi sunt bolus
 armenus, terra sigillata, cerusa lota, malicorium ba-
 laustia, myrti baccæ & folia, tuthia, cadmia, plum-
 bum, antimonium, vitrioli species, squama eris, vñ
 quidem omnia: sed sæpius lota ad deponendam acrimo-
 niam & tenuitatem substantiæ sub forma pulue-
 ris vsurpantur super linamenta sicuti & vnguenti
 formâ cum cera alba & oleo myrtino vel ompha-
 cio. Quod si nec excisioni nec ligaturæ locus sit,
 quando scilicet occultas partes vt puta podicem &
 pudendum muliebrem. malam inuasit, neque vehe-
 mens illa siccatio, astrictioque satis valida sit ad
 duros & inueteratos thymos consumendos, tum co-
 rum absumptio cathæreticis medicamentis tentan-
 da est qualia sunt quarto gradu calida & quæ insi-
 gni substantiæ tenuitate præstant: suntque omnino
 epuloticis contraria: ita enim fungosam putridam-
 que vlcera quorumlibet carnem, thymosque mi-
 tes & feros & verrucas omnes necnon callos & cla-
 uos sensim tabefaciunt non quidem sine acrimonia
 & doloris sensu vt epulotica neque affatim vt cau-
 stica. Eiusmodi sunt metallica omnia quæ vñtione
 acrimoniam exedentem sortita sunt quam lotionem
 non exuerunt, talis est etiam hydrargyrus præcipi-
 tatus. Illud exemplo sit.

R. Ammoniâcî aceto dissoluti ℥j vitrioli vñti &
 antimonij vñti an. ʒj æris vñti. ʒß fiat vnguentum
 quod quotidie mutetur, partem abluendo donec
 tota excrementitia caro extrita fuerit. Quod si inte-
 rim pruritus ab acrimonia excitetur compescendus
 ille quidem est lineteolo ex aqua rosarum madido
 super-

superposito vel potius vnguēto de cerusa probe cōfecto, scalpūq; æger diligēter prohibendus est: par est & eadem curatio partis ex calore & dolore extumescētis. Si deniq; duritie & magnitudine thymorum vincantur medicamentorum cathēreticorum vires, tum ad caustica decurrendum est quæ sint talia vel actu vt ferrum candens quod tamen ob doloris acerbitem in glāde præsertim eximij sensus metuendum est ne fluxionem proritet, vel potentia qualis est aqua fortis secunda aut oleum vitrioli, vel sulphuris guttula vna apposita: & pulvis ex auripigmento & arsenico crySTALLINO præparatis qui exigua quantitate, scalpelli salua madefacti apice exceptus vnaq; tantū vice appositus thymū exedit. Præparatur autem vtrumque si super marmor sedulo contritum, & ter in aceto toties mutādo maceratum soli exponatur, donec acetum cōsumptum sit & deinde totidem vicibus in aqua pura maceretur ad solem vsque absumenda. Hactenus de Thymis eorūque curatione de qua lege Paulum lib. 6. cap. 58. sicuti & de reliquarum verrucarum curatione lege eundem cap. 88. libri eiusdem. De omnibus promiscuè lege Aëtium cap. 4. lib. 14. Sunt autem verrucarum aliæ species pensilium, & sessilium. colem quoque magno tædio obsidentium quarum duplex curatio est, vna quidem ligatio, vel excisio vt acrochordonum quorum radices amputari possunt: alia vstio vt myrmeciarum, clauorum, & calorum, sunt enim cathēretica imbecilliora per caustica remedia vt aquam fortem papyro dentibus attrita exceptam, vel per sublimatum præparatū, pulueratum & appositum vel aliud causticum: sed dum causticum appositum est pars ipsa vnguēto refri-

gerante vt populeonis vel linteolo in aquam rosaceam merso tegatur doloris & fluxionis inhibendæ caussa post vñtionem & escharæ casum, sicuti post excisionem cicatrix inducatur medicamentis epuloticis admixtis tamen paucis sarcoticis implendæ cavitatis caussa. Tale est vnguentum de plumbo & de minio. Interea etiam dum ligatur secatur, vel vritur verruca pars etiam superior vt inguinum pubis & perinæi astringente & emplastico medicamento munienda est, quale est quod constat bolo armenia sanguine dracon. & albuminibus ouorum vt ita sistatur fluxio quæ à calore aut dolore excitari posset.

De ulceribus penis.

VLcera penis interna externaque sunt, atque hæc quidem frequentissimè in præputio & glande (mollioris scilicet rariorisque substantiæ) in reliquo cole rariora ob densam magis detectamque cutē. Horum origo est aliquando à caussa externa vt à coitu difficili & violento cū virgine vel fœmina etiam angustioris pudendi siue à natura (neque enim genitalium, neque aliarum partium fœminis omnibus eadē est magnitudo) siue ab arte meretricia per lotiones, forūsque ex aquis & decoctis astringentibus: vel à coitu non difficili quidem, sed multiplicato nimis, penemque calefaciente, sicuti ab equitatione dura longaque, vulgus illam speciem vocat sconationem & excalefactionem. Alias oriuntur à caussis internis vt à sorde simplici & non contagiosa inter glandem & præputium retenta ibique putrescente, consortio mulieris venerea lue non infectæ. Hinc enim pustulæ exiguæ instar granorum

norum milij è superficie glandis emicare solent, quibus maturatis ruptisque vlcuscula rotunda & in medio punctum aliquod albicans habentia expul-
lulant aliàs dispersa, aliàs ita densa vt ex pluribus v-
num tandem fiat, atque istorum simplicium vlcerū
& non contagiosorum facilis est & intra biduum
absoluta curatio per topica refrigerantia siccantiā-
que (neque enim in his causse antecedentis ratio
vlla habenda est) vt per lotionem vel ex aquis solis
plantag. solani & peculi rosarum: vel mixta etiam
aluminis portione quinta aut sexta, vel ex oxycrato
à qua lotionem vnguentum album camphoratum
parti ipsi vlcerae aut excoriae illinendum. Aliàs
sordes, saniēve non simplex quidem est sed conta-
giosa ex impuro excepta scorto (dum pudendum
vtrumque libidinis incendio mutuāque collisione
vehementer exardescit) siue vlcera in illo sint, siue
excrementa tantum putria, sordida saniosa & visco-
sa. Vlcera autem hæc non curentur nisi post causse
antecedentis præmissam vacuationem, vel per phle-
botomiam (alterutrius plethoræ) vel per purgatio-
nem cacochymie peccantis, vel per serosorum hu-
morum ex habitu digestionem per sudores ex de-
cocto guaiaci, vel salsæparillæ, tum verò curanda
sunt topicis tanto validiùs siccantibus vel tergen-
tibus quanto sordes, saniēque contumacius hæse-
rit, altiusque insederit. Porro exsiccationis & deter-
sionis materia (vtriusque enim indicatio est ab vl-
cere vel sordido, vel virulento) seligenda est, tum ex
animalium genere vt cornu cerui & ebur vltum, &
omnia ostrea vsta, tum ex lapidibus vstis, lotisque
cum aqua plantag. vt corallium, hæmatites, bolus
armenia nō vsta, tum ex plantis vt cortex ligni gua-

iacini, thuris, radix bistortæ, tormentillæ, aristol. rotund. cucumer. agrest. serpentariæ minoris: folia marrubij, agrim. scabiosæ, nicotianæ, cortex cucurbitæ vstus: tum denique ex metallis vstis, lotisque vt alumen, æs vstum, flos æris, squama æris, plumbum, antimonium, cadmia, cerusa lota & lithargyrus; hæc quidem materia tota, triplici forma vsurpatur lotionis, pulueris, & vnguenti. Ac primum quidem in virulentis vlceribus desiccandis, sub forma lotionis in hunc exempli gratia modum vsurpabitur.

℞. aquæ cisternæ, vel ferratæ, vel plātag. lb j. rasuræ cortic. ligni guaiac. ℥ ij aluminis ℥ ss rosarū rub. ℥ j coquantur ad ℥ ij consumptionem & colentur. Abluantur vlcera linteolo imbuto hoc decocto per decem dies mane & vesperi. vel hoc modo.

℞. rad. tormentillæ qrt. j. fol. plantag. solani & ros. an. m. j. balaustior. & aluminis an. ℥ ss coquantur in vino albo, vel rubro. Similis est lotio ex aqua aluminosa quæ constat ex succo agrestæ, plantagin. portulacæ, albuminibus ouorum & alumine, omnibus scilicet distillatis instar aquæ rosarum.

Simili facultatē fiat puluis ex ossibus, purpuris & buccinis vstis alumine vsto, tuthia, plumboque. vt & hic qui ℞ pulueris tormentillæ ℥ ij eboris cornu cerui, coralli rub. vstorum an. ℥ j fiat puluis excipiat melle rosato, vel potius solus aspergatur. Tandem comparabitur vnguentum quod exempli gratia.

℞. Cineris costarum cucurbitæ vstarum, florum anethi, aluminis, & squamæ æris vstorum & lotorum an. partes æquales excipiat cera alba & oleo myrtino, fiatque vnguentum post ablutionem partis

partis apponendum.

Quod si fuerint sordida non virulenta tantum vlcera tum siccantibus topicis tergentia miscebuntur, vt aloe, myrrha radix aristol. rotundæ, gentianæ, folia prassij, nicotianæ &c. sicuti vbi quædā cauitas est sarcoticorū aliquid vt thuris mastich. aloes, ireos iisdem topicis addatur.

Validissimæ exsiccationis & deterfionis vis quæ indicatur ab antiquis putribus & depascentibus vlceribus materia idonea sumetur ex metallicorum vstorum non lotorum cinere. Tale est vnguentum Ægyptiacum, tale vnguentum rosat. cuius vnciæ vni misceatur pulueris præcipitati 3 j, talis est quoque aqua rosarum, vel ferrata mixta ærugine æris, vel vitriolo ad 3 j pro libra aquæ, validissimum quoq; est Lanphranci hoc collyrium.

℞. vini albi ℥ j. aquæ rosarum & plantag. an. qrt. j. auripig. rub. 3 ij floris æris 3 j terantur hæc subtilissimè & misceantur cum aliis fiatque collyrium quod auctore Guidone mortificat, sanat. hæc autem validiora remedia ter, quaterve, raro quinquies repetenda & singulis vicibus breuiter auferenda donec vlcera ipsa rubra & æqualia cernantur. Quod si denique cancrofa euaserint vlcera, pars ipsa nigricans & emortua amputetur & subinde vratur, vel ferro candenti, vel caustico medicamento vt arsenico, atque tunc post escharæ casum vnica supererit scopus carnis refarciendæ & cicatricis inducendæ talis sit forma & materia.

℞. Tuthiæ præpar. aloes, sarcocollæ, thuris, lapidis hæmatitis vsti, lotique radicis cannæ combustæ, gallarum & balaustiorum an. partes æquales, fiat puluis & cū oleo rosato cerâq; alba, fiat vnguētum.

Symptomatum mitigatio.

DVm topica hæc cathēretica vsurpantur, ardor partis dolorque leniendus est admoto vnguento populeone vel succo solani & plantagin. excepto linteolis, vel in cataplasma cum farina hordei conformato, vel oleo violat. & albuminibus ouorum cum aqua rosata multo verberatu concorporatis, quæ omnia non solum pudendo vlcerato sed inguinibus etiam perinæo & lumbis sunt inducenda, prohibendæ fluxionis & phlegmones gratiâ.

Ischuria denique vitetur immissa in foramen glandis fistula plumbea vtrinque pertusa per quam æger meire consuecat si forte phlegmones magnitudine vrethra nimis constringatur.

De vlceribus internis.

VLcera interna vřethræ variis ex causis generantur: ex scæda scilicet, acri & virulenta gonorrhœa neglecta & diuturna. Item ex ardore & acrimonia vrinæ nata vel ex simplici intemperie calida: vel à praua nimisque acri victus ratione, à vehementi febre, à diabete, à partium vicinarum vt hæmorrhoidum phlegmone, siue ab humoribus excitetur vt pituita salsa, bile & pure, ex partibus sublimioribus, vt suppuratis renibus & pulmonibus per vesicam effluente: siue ab arenularum crassiorum & lapillorum angulosorum transitu difficili, siue à calculo grandiori vesicæ, cervicem eius contundente & atterente, siue denique à temeraria & violenta catheteris incisione. Vlcerum eiusmodi signa petuntur ex dolore inter meiendum & puris spontaneo fluxu, vel vrinæ exitum antecedente.

Regio-

Regionis vlceratae in vrethra signum desumitur ex doloris situ, & mictionis tempore, modoque: nam in vtraque regione supera inferaque nec non in media vlcerata mictio quidem cum dolore est: sed in vlcere ceruicis vesicae frequenter & guttatim fit: vnde stranguria dicitur, quando vesicae facultas expultrix caque robusta, & ab vrinæ acrimonia irritata, ad eius expulsionem statim insurgit antequam copiosa colligatur. Aliquando tamen contingit praedebilitate retentricis: sed sine dolore ex intemperie praesertim frigida ut in senibus. At in vlcere reliqui ductus tempestiua quidem est mictio: sed cum magno quoque dolore (haec dysuria est) Porro ceruicis dolor & totius ductus glandem etiam mire torquet inter meiendum ob continuitatem fibrarum rectarum vrethrae, quae à vesica propagata est. Saepe etiam purulenta materia ex vrethra effluit ab vlcere parastatarum diuturno, post gonorrhoeam virulentam, idque in plures annos totamque aliquando vitam sine vlllo valetudinis incommodo: sine stranguria aut dysuria ex natura partis frigidioris vel ex seminali materia cruda & diluta à seminariis vasis diffusa. caussarum denique discrimen à relatu aegri & familiarium quaerendum est.

Prognostica signa sunt quod neglectis internis vlceribus tuberculum carnosum ingenerari solet cui ischuria tandem & integra vrinæ suppressio succedit, aliquando etiam phlegmone & gangraena accedit morsque immatura acceleratur, tum denique quod diutius neglecta tam alte partes vlceras ad summam usque cutem exedunt ut per varias partes vicinas ut anum, scrotum, penemque ipsum vrina quasi cuniculis factis continenter effluat.

Curatio internorum ulcerum.

INterna hæc penis vlcera à quacunque causa ortū habeāt, curantur obseruatis iisdem scopis qui ad curationem externorum propositi fuerunt. - Vnus est vt amoueātur causæ omnes antecedentes, à quibus vlcera hæc foueri, augerique possint aut fluxiones inter curandum proritari vel leuissimo dolor e partium sensus exquisitissimi ex quib. phlegmon e & gangrænæ lethales accendātur. Tales igitur causæ vt plethora & cacochymia designatis antea vacuationum speciebus remoueantur. Alter scopus requirit vt causæ coniunctæ sordes sc. & ichor siccantur & abstergeantur (hæc propria curatio est) Postremò vlcera cicatrice tegantur medicamentis epuloticis, mordacitate omni carentibus. horum omniū materia vsusque ante expositus est. Ab vlcere igitur indicatur genus medicamentorū tergentiū & siccantiū & quidē magis aut minus pro regione vlcerata, nā ceruici magis tergentia, reliquo ductui membraneo magis siccantia conueniunt; forma liquida vel media & situ & cōformatione partis indicatur, liquida remedia per siphonem infundātur: vnguenta verò cum cereolo intromittantur, vtraque alternatim vsurpanda sunt, liquor quidem ter aut quater per diem & tepidè intrudatur vbi diutius cōtineatur, glande manu pressa, & vlceris loco altera manu sæpius contrectato, postremo effuso liquore vnguentum cereolo obuolutum ad locū vsque vlceris hora somni inseratur: eique per totam noctem adhærescere sinatur, formulę sunt eiusmodi præter expositas antea,

℞. hord. integ. rosarum rubrarum, fol. agrim. an. m. j. coquantur. In colat. lib. j. dissolue syr. de ros
sis

sis siccis ꝯij fiat iniection. Mel rosatum aliquando nimis tergens & mordax est. loco syrupi dissoluitur aliquid aloes aut aluminis, aut tuthiæ.

℞. rad. arist. rot. ꝯj fol. plantag. absinthi agrim. nicotianæ ceterac, caudæ equinæ an. m. j. flor. rosar. centaurij minor. & hord. integ. an. p. j. coquantur & in colat. lib. j ꝯ dissolue mell. ros. colat. vel de absinthio ꝯ iij hoc priori magis terget siccâtque in corporibus durioribus.

℞. cadmiæ & tuthiæ præparatarum, cerusæ lotæ an. ꝯ ij puluer. plumbi vsti, lotique & camphor. an. ꝯ ꝯ succi absinth. ad mellaginem cocti ꝯ ꝯ versentur omnia diligenter in mortario plumbeo & pistillo plumbeo in vnguenti formam.

Epuloticorum usus.

VBi satis detersū vlcus ex nullo destillâte pure maiorique inter meiendum dysuria aut stranguria coniicietur, tum epuloticis locus esse debet tantisper vsurpandis dum cicatrice obsignata vlcera indicentur ex libera & indolenti mictione.

℞. Aqua aluminosa huic scopo est idonea sicuti & hæc.

℞. Aquæ plantag. & peculi rosar. an. lib. ꝯ boli armenæ, balaustiorum & gallarum contusarum an. ꝯ ij bulliant ad duarum vnciarum consumptionem & colentur fiatque iniection.

℞. Gallarū vstarū, balaust. tuthiæ & plūbi vstorū lotorūmq; an. ꝯ j caphuræ & cadmiæ præparatæ an. ꝯ ꝯ concorporentur cū oleo myrtino vel omphacino in mortario plūbeo & cera alba fiat vnguentū.

Dum hæc curatio expeditur si suspicio adsit luis veneræ vnguenta mercuriata perinæo & pubi quotidie affricentur, vel emplastrum Ioannis de Vigo.

Quod si vsu topicorum tergentium præsertim dolor, ardor que penem atrociter exerceat, tum infundetur in eum lac caprillū, vel bubulum mixta quarta parte mucilag. seminis psyllij extracti ex aqua rosarum vel succo plantaginis.

De præcautione vlcærum à lue venerea.

PRæcautio vlcærum à lue venerea tota in sedula deterfione & exsiccatione saniei scædæ, in poris balani, præputij, colis, & inguinum exceptæ versatur. Deterfio autem fiet si statim à coitu partes illæ abluantur vino aqua aut vrina, addita earundem frictione ex panno aspero: sed interim linteolum aut gossipium inter præputium & glandem inferatur: vtriusque enim vis exsiccatoria magna est, adeo ut flaua, rubra, liuida, aliterue tincta remoueantur. quod si adsit indicium altius hæsisse virus & saniem poris præsertim mollioribus glandis, vt in iunioribus & sanguineis & aliis quibusuis formoso scorto intemperantius fruentibus, tum linteoli vires abstergentes siccantésque augebūtur si linteolum in decocto conuenienti maceretur, deinde in vmbra exsicceetur. Tale est decoctum sequens.

℞. vini generosi albi, aquæ scabiosæ & agrim. an. lib. ij in quibus infundatur per spatium viginti quatuor horarum scobis ligni guaiacini qrt. j. deinde adde rad. gentianæ, aristol. rotund. & dictamni albi an. ʒ ss fantali citrini calami aromatici cortic. citri & baccarum iuni peri an. ʒ ij cornu cerui, eboris, coralli rubri, squamæ æris an. ʒ ij bulliāt omnia simul ad medias & colentur atque exprimantur, in expressione infundatur linteum vicissimque sicceatur in vmbra per tres vices, & ita insuccatū à scortatoribus in lupanaria vtiliter gestari poterit.

Pro-

Profuerit quoque plurimum suffatus hic, cui linteolum ita insuccatum substituatur.

R. thuris, myrrhæ, aloes, benjoini & cinabaris an. ʒ ij pulueris præcipitati ʒ j ros. rubr. comarum absinth. scordij, calam. arom. & camphor. an. ʒ j fiat puluis crassior, iniiciatur in ollulam carbonibus ardentibus refertam vt vapor partibus genitalibus & vicinis excipiat & subinde præparato linteolo supertegantur.

De vrethra affectibus.

VRehra meatus est à ceruice vesicæ ad extremam vsque penis glandem productus, in viris quidē oblōgus, angustus & obliquus instar literæ maiusculæ S. Romanæ; in mulieribus autem breuior magis latus, rectusq;. Totus membraneus est vesicæq; similis ex qua deducitur, nisi q̃ in ortu suo sphinctere cingitur musculo quæ pars priuatim vocatur ceruix: infra quam est vrehra, vel meatus vrinarius. Huius ceruicis dolores ad glandē vsq; ob continuitatē rectarum fibrarū exporrigūtur in vrehræ mediū ferè ductū. alter quoq; meatus à parastatis glandulis vasorumque seminatorū finibus inseritur vt ex duobus vnus fiat excernēdo semini, vrinæq; cōmunis. Vtrūq; tamen quod à diuersis prodeat partib. diuerso quoq; tēpore erūpit: quodq; vrinæ musculi sphincteris relaxatione, semē prostaticarū astrictione excutiat. Vrehræ morbi duo sunt organici, astrictio, obstructioque: à quibus seminis, vrinæq; transmissio, quæ eius est propria actio, impeditur id est aboletur, imminuitur, & deprauatur.

Astrictionis autē causa proxima & cōtinens est insignis & durus tumor aliquis vt phlegmone, scirrhus, abscessus (nam erysipelas & œdema molliores

sunt) vel alius quilibet vicinā partē vt perinæū, hæmorrhoidas, rectū intestinū prostates occupās, ad eoque vrethræ cavitatē coangustās vt vrinæ, seminisq; exitū intercludat dum meatus latera tam arcte cōmittūtur inter se & cōiunguntur vt ab erupturo lotio aut semine seiungi nequeāt. Horū humorū origo aliàs spōtanea est pēdēs ex humorū ab hepate defluxu aut eorūde corruptione hoc est à plethora aut cacochymia, aliàs violēta à causſæ externę insultu vt vulnere, ictu, casūve, equitatione lōga, durāq;.

Obstructionis autem proxima causſa est quodeūque corpusculū vel aliūde in hunc meatū illapsum, vt lapis, grumus, pus, & crassus, lentusque humor mucilaginosus, vel illi ipsi meatui innatū vt tuberculū carnosū, tophaceū, callosūq;. Ac lapidis quidē origo in renibus ferē est incrementum in vesicā ex mucilaginu accretione: Grumi ex vesicæ & vrecturum rarissimē: sed sēpissimē ex renum affectu qui cruorem effundunt qui in vesicæ cavitatē concreſcat. Pus aperti abscessus soboles est vel in rene, vel in sublimiorib. partibus vt pulmonibus. Crassi deniq; lentique humoris & mucilaginosi parens est sēpissimē ventriculi cruditas tū à calore imbecillo vt in senibus, tū à crasso, lentōq; cibo & vita otiosa. Tuberculi tophacei eadem origo est à crasso illo lētōq; humore in vrethræ flexibus paulatim excocto sicuti carnosī ex vlcere à quacūque causſa ante cōmemorata, quod neq; maturē neq; accuratē satis deterſum, exſiccātūmq; est, ideoq; callosum etiā tādē euadit ab vrinæ ſalſugine vehemētius exſiccātū.

Signa diagnostica causſarum aſtrictionis

& obstructionis.

Signa aſtrictionis diagnostica, tumorisq; species &

& sedes, tū ex actione laxa, abolita, vel diminuta, tū ex doloris proprietate & situ innotescūt. Scirrhus. n. hebetior & sine febre est: sed phlegmone & abscessus cū febre & dolore magno est. Obstructio à lapide detegitur, tum ex vrina aquosa & pleno quidem ductu copiosēque reddita: sed tamē inter mediendū repēte & in medio cursu & cū vehemēti dolore interrupta, vel quod lapis minor, leuiorq; & innatās affluente vrina in ceruicē vesicæ intrudatur vel quod grādiōr ceruici repente obtrudatur, siquidem solutus & vagus est, sæpe enim plures annos de fundo suspensus latitat: Deprehenditur quoque ex perpetuo penis scalptu (ob pruritus lapidis obuiā ceruicem titillātis) eiūsque frequēti inflatione euocatis spiritibus à pruriginoso dolore: Itē ex pōdere & vrinæ retētæ prouocatione per demissum catheterem: à quo dum lapis minor quidem obstruens ipsum meatum, maior verò opprimēs ceruicē extrudatur, cohibitus vrinæ cursus expeditur. Innotescit etiam per crurum sublimiorū reliquo corpore depresso supinōque, multiplicē agitationē, si modò lapis ceruici contiguus tantum sit non in eādē intrusus, tū per liberā, faciliūq; catheteris per totā urethram penetrationē ad vesicæ vsque cavitatē vbi grādiōr lapis extra meatū est: paruus enim & impactus catheteri sæpe renititur. Agnoscitur etiam eo quod mediendi tēpore & in ipso conatu anū vel grauitate sua pressam (si grādiōr sit & extra ceruicē) vel cōpressionē sola musculorū abdominis siquidē pulsill⁹ & impactus sit, egerēdi desiderio sollicitertū deniq; quod nephriticis dolorib. prēgressis æger infestat⁹ fuerit: Obstructio à grumo sāguinis internoscitur ex præcedente aliquo affectu hēmorrhagiā mouente, visceris vicini vt vlcerē, aut contusione renū

& sphincteris aut vasorū spermaticorū apertione. Dignoscitur eodem modo obstructio à pure & abscessu aliquo rupto in partibus sublimioribus vt renibus, pulmone, hepate, liene, denique à mucilagine si nihil neque puris, neque grumi cōpertū sit in vrinis, siq; vita otiosa, opipara, multisq; cibis aut crassis & viscosis addicta præcesserit. Certū quoque horum trium signū est si immissus catheter prōptē in vesicā vsq; penetret, referatque mucroni suo adherescētē, aut in parte sui caua exceptam obstructentis materiæ portiunculā. Obstructio deniq; ab innato tuberculo carnosio deprehēditur & à prægresso vlcere vrethrę, & quod catheter ægre in vesicā vsq; impellatur occurrente vel in vno, vel duobus, vel pluribus vrethrę locis tuberculi offendiculo. deprehēditur etiā ex mictionis læsæ specie, non enim repēte quidem vt à lapide aliisque causis vt muco, grumo, pure, sed paulatim fit ischuria pro generandæ, augendæq; carnis modo in interno hoc non secus quā externo vlcere: Indiciū etiā sumitur ex dolore post mictionem excruciante, ob relictā vrinæ portionem inter vesicā & carūculā vlcus interim vellitantis, mordentisq; donec maximo conatu exprimatur, Itē ex eo quod vrina tenuiter fili instar, magnóque conatu ob impeditum vrethrę ductū trāsfuat, neq; recto cursu, sed obliquo sæpe & tortuoso ob variū tuberculi sitū, modò sursum versus, si inferiorē vrethrę partem obsideat, modò deorsum si superiorē, & aliter si lateralē: aliquando etiā diuariato cursu cū meatū in duas partes carūcula & iuxta glandē diuiserit: altius enim diuisa, rursus coire ad glādē solet, Ex eo deniq; detegitur quod demissa in vrethrā fistula carūculā frāgat, atteratq; vnde cruor

& ra-

& ramenta carnis detrita cum vrina prodeunt. Obstructio denique à tuberculo tophaceo dignoscitur ex tumore duro manui tractanti foris obuio & catheterem intus repellente, quòdque prægressi vlceris & carunculæ nulla sit suspicio.

De catheteris usu.

ATque hæc quidem est obstructionis causarum artificiosa dignotio: sed quæ per catheterem sic tuberculi, sedisq; eius in vrethra exploratio, hæc vero constantissima est minimèque fallax. Est autem catheter ab usu dictus quasi intromissorium instrumentum scilicet oblongum, tenue, solidum, apice rotundo, prorsusque æquabili (ne obuias particulas offendat) in vrethram intromitti solitum, tum ad exploranda, extenuandaque tubercula & eorum notandas in vrethra sedes: tum ad calculum è ceruice vesicæ, vel vrethræ cavitatē deturbandum.

Catheteris materia in varios usus varia comparatur: prima eius & blandissima species sunt herbarum quarundam turiones, siue cauliculi longiores, leuiiores & duriusculi vt maluarum, petroselinii, fœniculi, qualis etiã est palustris iuncus præeunte radice. quibus omnibus vrethræ & ceruicis vesicæ impedimenta percontari leuiter & tuto licet. Altera species est candela cerea alba, quæ ne per hyemem præsertim frangatur, relicto in vrethræ aut vesicæ cavitatē fragmento quod extorqueri postea nequeat: ex forti quodam filo, ceræque albæ duplo ad terebenthinam miscenda, quo magis lentescat concinnatur, cuspidē lenissima, & æquabilissima. Huius speciei usus est tum ad tuberculi durioris, quòdque mollioribus herbarum cauliculis peruium nõ est penetrationē, tum ad idonea medicamenta in vrethram inferenda

tuberculi absumendi gratia, vel vlceris implendi ac inducendæ cicatricis. Tertia species est fistula quædam, vel virga plumbea teres & flexibilis à qua tuberculum durius quam vt cereæ candelæ cedat, rumpi, aut supprimi pondere suo possit, vlceribus interim anodyna vi sua mitigatis. Quarta species est fistula ænea, argentea, aurea, quæ tubercula durissima cæteras catheterum differentias respuentia validissimè frangit, & peruadit.

Simili materia constat & figura argalia dicta: sed intus caua, per quam ductilis quædam virgula argentea inducitur vicissimque reducitur, idque tum ad impellendum liquorem quendam in vesicam & vrethram siue tergentem, siue epuloticum, tum ad extrahendum perfugam vacui excrementum mucilaginosum, grumosum, purulentum, arenosum vrethram aut ceruicem vesicæ obstruens. Vtriusque tū catheteris, tum argaliæ crassities tanta sit, quāta capi à meatu vrinario potest, vt toti tuberculo occurrat, longitudo quoque tanta, quanta perducì in cauitatem vsque vesicæ per totam vrethrā queat. æstimatur quidem hæc iusta longitudo palmi vnus ac præterea duorum digitorum transuersorum mensura vt palmus sit spatiū inter minimū digitum & pollicem ægrotātis quamplurimum inter se distractos, proinde lōgitudo in viris triplex à Celso desideratur, pro varietate curandorū corporum, maxima quidē digitorū quindecim trāsuerforū, media duodecim digitorū, minima nouem. In mulieribus duplex tantū, maior nouem digitorū, minor sex digitorū, denique vtraque illa tum catheteris tum argaliæ species nunquam nisi oleo temperato vel lini, vel lilij, aut amygd. dulc. delinita intronitti debet.

bet in vrethram.

De tuberculo carnosio.

OMne tuberculum siue carnosum, siue tophaceū in præcipiti est, tum quod nullum sponte sanescat vrinæ erodētis falsugine, quin potius iuuante natura semper, sensimq; excrescens ægrū vel tandem tabefacit stranguria, dolore, vigiliis, vel repente iugulat, dum obturata prorsus vrethra sursum in thoracem vrina reuoluitur natium cordis calore oppressura, quod comitem inflammationem ceruicis vesicæ & partium vicinarū præ dolore & fluxione sæpe accersat: cui gangræna vt pote loco calido, humidóq; aut ischuria integra facile succedat, vnde mors ægrū cōfestim rapit, rarior enim est eiusmodi phlegmones, suppuratio, præ ischuria comitante à qua tamen ægrū liberari Hippoc. docet apho. 82. li. 4. Adde quòd pluuioso, austrinóq; cœlo grauiter inualefcit: sicuti per ambulationē præcipitē, durā, lōgāve equitationē, & quod eius deprimēdæ vix vlla ratio per catheterem satis tota est per quem tamen calculus tātisper repelli potest ab vrethra, aut ceruice vesicæ, dum lotium excernatur. Sed insuper ob angustum & recōditū partis obsessæ situm, eiusque eximium sensum remedia neque facile admittuntur, neque admissa satis constanter tolerantur, siue ob ipsorum acrimoniam molestiorem, siue ob mictionis necessitatem crebriorem. Statuēdum denique inueteratorum & callosorum quàm recentium molliūque, contagiosorum & venereorum, implicitorum cum alio aliquo affectu, vel idiopathico, vel sympathico, quam simplicium arduam multo magis ancipitēque esse curationem.

Differentia tuberculorum.

Tuberculorum differentia sumuntur tum ex tempore, quod eorum alia recētia sint, mollia, & iungosa, alia inueterata, dura, callosa & contumacia: tum ex natura ipsorum propria quod quædam sint solitaria: alia cum vlcere aut inflammatione aliove affectu implicita: tum à situ: alia enim sunt summa & glandi vicina, alia media, alia profunda, in ceruice vesicæ: Sumuntur & à numero quod vel vnicum sit, vel duo, aut plura, exigua vel magna: tū denique à more quod eorum alia sint simplicia, alia contagiosa, ab vlcere Neapolitano oriunda, alia etiā eancrosa quæ leuissima irritatione catheteris aut medicamenti, inflammationem, gangrænam, sphacelum, partisque perniciem & mortem ægri acceperant.

Astrictionis causarum curatio.

PLegmone, siue ceruicem vesicæ, siue partē aliquā vicinā vt vterū, intestinū, scrotū occupet, eadēque siue primigenia, siue symptomatica vt quæ virulentæ Gonorrhœæ, vlceri parastatarū eiūsq; curationi præ dolore & fluxione accedit, curatur scopis duobus: ut vt fluxio præsens imminensq; prohibeatur: tum vt quæ facta est vacuetur. Prohibendæ fluxionis instrumenta tria sunt, primum est diætā frigida (actu & potestate) siccaque & tenuis quæ sanguinis caliditatē & tenuitatem indēque fluxionem coerceat & copiā minuatur. Secundū est chirurgicum, phlebotomia primum quidē reuulsoria facta in venis cubiti dextri & sinistri, deinde deriuatoria saphænæ in poplite vel malleolo, frictiones & deli-

deligationes brachiorum arctissimæ, cucurbitularum appositio & in utroque hypochondrio & in regione dorsi & lumborū. Tertium est pharmaceuticum per medicamenta, tum purgatiā, tum alteratiā: illa quidem lenientia sint sed paucis astringentibus mixta, qualis est bolus ex medulla cassiæ addita rhabbari puluer. dragma, talis syrupus de cichorio cōpos. aut rosatus laxatiuus addito quoq; rhabbari puluere. Hæc enim fluxionis incitatricem bilem detrahēdo, fluxionem vias astringendo cōprimunt: alteratiā verò caliditatem & tenuitatem sanguinis fluentis obtundant vt syrupus acetos. simplex, oxysaccharū simplex, de granatis acidis, de limonibus, de agresta cum aquis rosar. plātag. acetos. &c. Alter scopus qui est fluxionem factā vacuare, expletur repellendo in principio, cæteris verò temporibus digerendo vel suppurando.

Repellentia frigida siccaque sunt & terrena pariterque ipsi affectæ non solum imponenda: sed sublimioribus etiam vt inguinibus & lumbis per quas fluxio decurrit. Exempli causâ,

℞. farinæ hord. lib. j. succi solani & plantag. vel aceti ros. q. s. misceantur ad ignem fiatque cataplasma. vel

℞. cortic. malor. granat. rosar. rub. & lentium an. ʒ ij contundantur & bulliant cum aqua & oleo ros. fiatque cataplasma. liquida ægris minus molesta sunt vt.

℞. succi solani, plātag. semperuiui, portul. olei rosati vel myrtini & aceti rosati an. partes æquales misceantur & ex linteolo iis imbuto imponantur sæpius reiterando nō solū pubi, & perinæo sed lūbis etiam & inguinibus. In augmento repellentibus di-

gerentia pauciora, in statu plura sunt admiscenda quæ partim præsentem fluxionem repellât, partim factam discutiant. Tale est quod ℞. olei chamæm. lilior. rosati & myrtini an. ʒ ij. aceti ros. ʒ ss. misce & fiat embrochatio. Vel,

℞. farin. hordei & scænogræci an. ʒ ij. puluer. flor. chamæm. meliloti & rosati an. ʒ j. cum decocto summitatum myrti & oleæ fiat cataplasma cui ab igne remoto adde seui caprilli ʒ ij. & vitellos ouor. duorum. At in declinatione solis digerentibus locus est cum omnis fluxio constiterit vt ex emplastro diachylonis ireati, aut ex vnguento Agrippæ aut ex sequenti cataplasmate. quod ℞. pulpæ passularum, farinæ fabarum, ciceris & lentium an. ʒ ij. semin. cumin. ʒ j. olei liliorû & sapæ an. q. s. fiat cataplasma.

Quod si digestio desperata sit: [hæc enim multo rarior est in illa sede quam suppuratio, tum ob sedis neruosam, densam frigidamque substantiam, tû ob digestionis tarditatem dolorisque interim vrgentis ob mictionem impeditam gravitatem à quo spiritus calorisque suppurantis copia euocatur.] Si etiam suppurationis iam inchoatæ species appareat ex incremento tumoris, doloris lancinantis, & pulsantis ischuriæ, febris & vigiliarum, tum ea iuuanda erit, vel fotu ex hydrelæo, aut ex decocto radicum altheæ, florum chamæm. meliloti, passularum, caricarum, semin. maluæ & altheæ, ita vt inde confectum cataplasma protinus à fotu partim applicetur addendo triticæ farinæ purissimæ q. s. cum vitellis ouorum duorû & axung. gallinæ ʒ ij. Simile est vnguentum basilic. de althea, resumptiuum & emplastrum dyachilon paruum. Suppuratus denique abscessus nisi sponte sua & acrimonia puris tenellam, mollem,

mollem, tenuemque vrethra substantiam erodentis rumpatur, tum demum ferro candente potius quā secante, aut caustico potentiali aperiatur.

Symptomatis curatio.

ISchuria præ dolore grauis esse solet, idēq; protinus ab initio curationis, fistula plumbca, tenuis, caua, & vtraque cuspidē sua aperta penitus in vrethram ad cauitatem vsq; vesicæ inferatur vt per eā meiere assuescat æger. Partis quoque post reuulsionem relaxatio sæpe tentanda est lotionē ex aqua tepida, lituque olei calentis sæpe repetito, vt tensione partis relaxata, dolorēque nonnihil mitigato vrina liberius effluere possit, vesicæ regionem præsertim mictionis tempore blandē, sensimque manu comprimendo & deorsum deuoluendo.

De Gangrana.

Phlegmones enormem magnitudinē nullis neque reuulsam, neque repulsam, neque discussam aut suppuratā adhibitis remediis excipere gangrana solet (id est incipiens partis inflammata mortificatio) his præsertim locis decliuibus, calidis, humidisq; & ventri humidissimo vicinis, indolentia, liuore, & torpore sese prodens ob spiritus animalis vitalisque penuriam. Itaque quāprimum pars ipsa leuanda est copiosa sanguinis educatione, aut per apertionem vicinæ alicuius venæ amplioris ad deriuationem, aut per hirudinum appositionem, aut potius per crebras, altasque scarificationes ad vacationem particularem, ac deinde post fluxum sanguinis vberiore, per partis scarificatæ lotionē ex aqua salsa prohibendæ concretionis & putrefactionis gratia, moxq; per medicamentū frigidum, siccumque & tergens, qualis est sibi in die repetita

aceto mulso lotio, cui subinde subiiciendum cataplasma ex lolij, aut orobi, aut fabar. farina cū oxy-
melite cocta, tādēque vbi calor remissior est vn-
guentum Ægyptiacum ex flore æris, alumine, melle
& aceto pariter mixtis compositum, hæc enim cor-
ruptionē imminuentem prohibet, & factam à sana
parte separat. Hoc etiam valentius & sine dolore
præstat arsenicum inter vtramque applicatum ex
pulvere, vel vino cum xylo hoc est cottone aut lini-
mento.

De sphacelo.

Postremo si pars emortua iam videatur, sitque
sphacelus perfectus, sectio adhibenda est, ne ab
emortua parte tanquam veneno, sana inficiatur: ei-
dēque mox imponendum est ferramentum can-
dens tum ad inhibendam hæmorrhagiam, tunc ad
inuectam putredinem absumendam, eique vñioni
sal cum porri succo apponēdum ad vtrumque sco-
pum astringendi, siccandique. Postremo vbi putre-
do constiterit cataplasma ex farina hordeacea, vel
triticea, vel mica panis albi, cum hydreleo cocta ad
crustæ resolutionem admouendū est. vel vnguentū
tetrapharmacum quod mollit, suppuratque, deinde
post crustæ resolutionem abstergenda pars est tum
ex aceto, tū ex appposito cataplasmate ex farinæ hor-
dei & mellis an. selibra, myrrhæ ʒ ß vitellis tribus
ouor, crudor. postremo cicatrice claudatur.

De furunculo & carbunculo.

Furunculus & carbūculus partes easdem vñthre
vicinas ex lōgā durāq; equitatione, veluti cōtu-
sas aliquādo inuadūt. Horum eadē que phlegmones
curatio

curatio est, vt post prophylaxin, causęq; anteceditis
femotioem per diætā frigidā, humidāque & te-
nuē, tū per phlebotomiā reuulsoriam & deriuato-
riam, tum per purgationem cacochymię redundā-
tis biliosę & atrabiliarę (vt ex sero caprillo, agari-
co, tamarindis, myrobalanis luteis, rhabarbaro) cu-
ratio inquam propria est, per causę coniunctę va-
cuationem & mediocrem repressionem ab initio,
mixtāque resolutionem, neque enim veram re-
percussionem crassities & venenum materię pati-
tur, neque veram resolutionem, eiusdem caliditas.
Tale est cataplasma ex foliis arnoglossi, lentibus &
pane cincomisto equa portione in aqua coctis. Tale
est cataplasma ex duobus granatis, acido & dulcoa-
cido contusis & in aceto coctis. atque hæc dū parti
laboranti hærent, circumiacentibus partibus vn-
guentum circumponendum est, quod humoris à
parte obsessa retrocessionem prohibeat, constat au-
tem bolo armeno, oleo rosato, vel myrtino, & a-
ceto. Deinde remisso calore maturandus abscessus
est admotis ficibus fermento & sale simul mixtis,
vel medicamento ex vitellis ouorum & sale confe-
cto. Hæc enim sæpius admota maturant & aperiunt
carbunculum, apertus autem detergi, purus imple-
ri, impletus cicatrice tegi debet. quod si aut tardior
fluxionis impetus, aut maligna nimis & pestilens sit
materia, euocanda foras est medicamentis valde at-
trahentibus vt suctu, cucurbitula, aut caustico etiā,
tūque relictum vlcus crustosum vt reliqua vsta
curandum est. Furunculi eadem quæ phlegmones
curatio quoque est nisi quòd paulo frigidiora, mi-
nùsque calida topica remedia requirant.

Curatio tumoris aquosi.

TVmor aquosus prostaticus rarius quidem est, tantus tamen tamque durus aliquando mihi visus est in soceri mei Iacobi Davidis Iurisconsulti peritissimi dissecto cadauere, ut neque catheterem vrethra, neque clysteris siphunculum intestinum admiserit indeque morte raptus sit.

Huius curandi sicuti & phlegmones duo sunt scopi, vnus ne crescat deinceps, alter ut deleatur, ille ad causam antecedentem refertur cui diætā opponenda est euchyma calida, siccaque & attenuans qualis à Galeno proprio libello descripta est. Purgatio quoque pituitosi & serosi humoris adhibenda est, moxque alteratio per antidotos ut theriacam, mithridatium &c. deletur autem tumor topicis exsiccantibus & resoluentibus quorum exemplum est apud Gal. lib. 2. ad Glauconem & 14. meth. ex oxyrrhodino & sale, & aliud ex spongia lixiuiο perfusa: vtrique formulæ vehementioris desiccationis causa addi potest alumen, sulphur viuum, & aphronitrum. Tale est etiam emplastrum apud Auicennam, quod recipit seminis sinapi & vrticæ, sulphuris, spumæ maris, aristoloc. rot. & bdellij an. ʒj gummi ammon. olei antiqui & ceræ an. ʒij fiat emplastrum.

Quod si morosa nimis, tardaque hæc curatio morbum protrahere ad perniciem ægri sentiatur ex lipothymia, scædō colore faciei, pulsuque paruo & obscuro, tunc sicuti in cæteris desperatæ ischuriæ speciebus aperienda est angusto foramine ceruicæ vesicæ per peritonæum & ad latus linæ albæ.

De

De scirrho.

Scirrhosus denique tumor post eādem prophylaxin causſæ anteceditis & melancholici humoris per diætā calidā, humidāque & attenuantem & per purgationem frequentem melanagogam ex foliis ſennæ, thymo, veratri radiculis, ſumaria, curatur cauſſæ coniunctæ vacuatione per medicamenta emollientia detergentibus & diſcutientibus mixta, aut viciffim quod moleſtum magis eſt & tædioſum uſurpata quale eſt emplaſtrum ſequens.

℞. gummi bdellij & ammon. an. partes æquales terantur in mortario cum oleo liliorum, deinde adde mucilaginem ſemin. lini ſcœnugr. & ficuum extractam ex decocto florum chamæm. & meliloti ad pondus æquale reliquorum omnium & rursus terantur omnia ſimul fiatque emplaſtrum. Tale quoque eſt Galeni è cortice rad. althææ coctæ & cum adipe anſerino, aut gallinaceo contuſæ in cataplaſma. A calidioribus hic ſingulariter cauendum eſt ne ſcirrhum in cancrum, aut non exquisitum in exquisitū & incurabilem conuertant; quod ſi ad ſuppurationem vergere videatur ante perfectam curationem tumor hic ſicuti & quilibet alius aperiri debet ne diuturnior iſchuria ægrum perimat interea dū tumor ſuppuratur. Qui ex congeſtione denique collectus eſt abſceſſus, meliceris, ſive ſteatoma, ſive atheroma ſit, ferro protinus, aut cauſtico aperiatur.

Specierum obſtructionis vrethra curatio.

Lapis grandior ſi ceruici veſicæ occurrit vnde iſchuria grauis, moleſtāve ſtrāguria ægrum affligat in capacitatem eius repellendus eſt, tum va-

lida crurum, cluniumque; succussatione, reliquo corpore depresso supinoque, tum cathetere in sinum vesicæ per totam vrethram demisso ubi deinceps vel medicamenti lithontripticis ab erudito medico alteratur, attritique eius exigua ramenta cum urinis excernantur, vel certè à perito lithotomo incisa per perinæum vesicæ ceruice, vitata quæ id interfecat linea, extrahatur. Sin pusillus lapis in eadem vesicæ ceruicem, aut aliam vrethræ partem illapsus constiterit: non ille quidem in capacitatem eius regerendus est: sed ad glandem potius, sedula, blandaque chirurgi manu deducendus præcincta funiculo supra lapidis sedem ne retrocedat, mentula, totaque vrethra oleo intus & foris relaxata atque lubricata: quo facilius foras è glande excurrat: Quod si contumaciter nimis circa glandem hæreat: inde verò vel suctu nutricis proleceatur: vel vncinis extrahatur: vel denique terebella per fistulam gracilem adacta frustatim dissipetur. sin idem lapis distantiore vrethræ à glande regionem obsederit: tum incidenda ceruix vesicæ est, non infra tamen ne vulneris coalitum exanguis vrethræ substantia, & assiduus urinæ falsæ, acrisque transfluxus prohibeat, neque supra, ne hæmorrhagia arteriæ majoris superam penis regionem perlustrantis vulnus vberior consequatur: sed in longum à latere: ubi scilicet lapis magis extuberat & renititur, est enim latus carnosam magis, aptumque conglutinationi: sed ante incisionem vinculum supra lapidis situm ut modo dictum est mentulæ est iniiciendum, cutisque ad glandem studiosè adducenda quæ exempto lapide, confutoque vulnere protinus remutatur ut integrè vulnus obtegit vinculo

culo deinceps resolutio.

Sed enim dum ista chirurgia exercetur, dolori sedando fluxionisque sanguinis reprimendæ gnauiter studendum est. huic quidem per defensiuam vocatam, id est repellentiam & emplasticam ad pubem, inguina, perinæum, lumbosque admouenda quale cataplasma est ex bolo, sanguine dracon. mastiche cum oleo rosato, albuminibus ouorum & aceto rosato super stupas extensum. Illi vero dolori sc. per litum partis vulneratæ, vel ex butyro recenti lotove sæpius, vel ex solo oleo rosato, vel ex oleo violato, vitello oui & pauca cera alba.

De obstructione à grumis.

SI grumi sanguinis à recētibus sphincteris vesicæ, aut renum vlceribus manantis, vrethram prorsus impediunt, illi protinus dissoluantur liberandæ ischuriæ causâ à qua certissimum lipothymie, syncopes, tandemque mortis periculum impendit, idque per iniectionem in vrethram cum algalia, oxymelitis vel simplicis, vel scyllitici: decocti stæchados aut sarmentorum vitis, rerumque eiusmodi incidentium: sed interim dum grumi in vesica dissoluuntur hæmorrhagia vsceratæ partis omni ratione comprimenda est: tum per victum frigidum, siccumque & tenuem animique & corporis quietem: tum per reuulsionum species omnes vt phlebotomiam in venis cubiti dextri: frictione & deligationem arctiorem lacertorum, cucurbitulas siccas, hypochondriis & dorso affigendas: tum denique per astringentia frigida, siccâque & emplastica intus, forisque vsurpanda, qualis est hæc potio.

℞. Boli arm. lotæ, terræ sigill. sang. drac. equiseti, mastichis & thuris an. ʒ ij sem. apij ʒ β fiat pulvis capiat ʒ ij cum lacte vstulato vel cum aqua, aut decocto, aut succo plantag. addendo syr. de rosis siccis vel cydoniorum, vel de granatis acidis an. ʒ ij. Tale est electuarium tabellatum ex eiusmodi pulvere siue exhibeatur per se, siue cum aquis, succisve prædictis superbibendis. Foris autem lumborum, renūque regioni applicentur sequentia topica.

℞. Aquæ aluminosæ ℥ j foueatur subfrigide ex spleniis imbutis expressisque.

℞. olei omphac. vel myrtini ʒ iiij sang. dracon. boli armænæ acaciæ & hypocistid. an. ʒ ij spicæ nard. & mastich. an. ʒ j cum cera alba, fiat vnguentum applicandum regioni eidem cum multa frictione additōque pauco aceto rosato.

De obstructione à pure.

IAm verò si è diuturno vel sphincteris, vel penis, vel alterius visceris vt pulmonis vlcere manans purulenta materia in vrethram penitus impeggerit eiusque ductum obturarit: ea quidem grumorum instar incidenda, tergendaque est, sed lenitione intermixta ne vlceratiua partis intemperies à pure magis incendatur. Tales sunt iniectiones tum ex lacte asinino, tum ex sero lactis caprilli, tum ex decocto hordei, flor. violar. semin. melonum quibus omnibus adiiciatur pars sexta vel sacch. rosati vel mellis rosati si tergentiores desideras, térque aut quater in die repetantur: pars quoque ipsa genitalis, tum radice sua tum reliquo ductu temperanda est vnctionibus quotidianis ter, vel quater repetitis. vt,

℞. olei

℞. olei viol. & nenuph. an. q̄rt ꝑ mucilag. sem. psyllij vel cytoniorum extractæ cum aqua ptisanæ ꝑ ij, caphuræ ꝑ ꝑ ceræ alb. parum, fiat linimentum pubi, perinæ, totique peni admouendum, denique post liberatam ischuriam vlcus tergeatur & consolidetur tandem, vt potione matutina, lactis caprilli aut asinini addita terræ sigill. ꝑ j vel ex decocto hordei cum trochisc. alkek ꝑ ij vel potione hydromelitis, aut aquæ ptisanæ cum syr. de rosis siccis, tandem vero detergi vlceris consolidatio epuloticis tētanda est quales sunt hi trochisci.

℞. sem. frig. maiorum papauer. alb. lact. p. plantag. myrtillorum, gummi Arab. & tragacanth. nucleorum pineorum aa. ꝑ ij liquir. mund. hord. mundati mucag. psyllij amygd. dulc. an. ꝑ j boli arm. lotæ sang. drac. spodij, mastich. terræ sigill. an. ꝑ ꝑ cum oxymelite, fiant trochisci secundum artem capiat ꝑ ij quotidie mane cum hydromelite vel sero caprillo.

Curatio obstructionis à mucilagine.

SI crassus & mucosus humor, tum sincerus, tum arenulis mixtus vrethram intus oppresserit qualis tum ex idiopathia vesicæ ob lithiasin infirmioris, tum ex sympathia, vel totius corporis vt in senibus, vel ventriculi, cerebri refrigerati: vel renum vlceratorum redundare & deriuari in vesicam solet, ei quidem ischuriæ speciei protinus occurrendum est, neglecta ad tempus antecedente causa mucaginis topicis incidentibus, attenuantibus & abstergentibus, quales sunt iniectiones vt ex oleo scorpionum, aut petroleo, vel ex oxymelite simplici, aut scyllitico, vel ex debili lixiuio in quo mucorda dissoluta sit. Tales quoque sunt fatus, litusque

pubi, perinæo & inguinibus admouendi, tales denique clysteres. Atque post eiusmodi mucaginū præparationem, proritādæ mictionis caussa, à quo mucago extrudatur foras, acria quædam glandis meatui admouenda sunt vt galbanum, allia, cepæ, radix raphani, pediculus denique.

℞. rad. raphani, lapathi acuti, petrosel. & vrticæ an. q̄rt. j. fol. parietar. vrticæ, berulæ, cressonij, faxifrag. an. m. j. sem. lini & cumini an. q̄rt β florum genist. chamæm. & malu. an. p. j. coquantur & hoc decocto foueantur pubes, inguina, perinæum. Ex magmate contuso, cretôque cataplasma concinnetur addito oleo scorpionum, amygd. amar. butyro, & axungiiis, cuniculi, vel porci. Eadem materia cum oleo frixa vtiliter apponitur sicuti prædicta olea ad litum earūdem partium, sicuti ex iisdem vnguenta additis axungiiis prædictis cum paucopulvere seminum incidentium vt cumini, apij, ameos, dauci, cum cera noua. Ex eodem decocto clysteres subdantur in quibus olei scorpionum & amygd. amararum an. ℥ ij dissolutæ fuerint benedict. laxat. ℥ j hier. picr. ℥ β & mellis anthozati ℥ ij.

Hæc autem mucago si medicamentis non cedat, grauitérque ischuria premat, illa quidem per argalliam & fugam vacui extorquenda est. Solutâ ischuria eductâque mucagine obstruente antecedentem causam, è reliquo corpore demoliri licet, tum per victum euchymum, calidum, siccūque & attenuātem, tum per purgationem phlegmagogam cocti prius & præparati humoris per idoneos syropos vt mel rosatum, oxymel simplex & compositum, de quinqueradicib. de stœchad. de betonica, de artemisia, cum aquis stillatitiis beton. meliss. fœnic. agrim.

agrim. ex quibus iulepi in quatuor, aut quinque dies instituatur. Phlegmagoga simplicia sunt hermodact. agaricus, turbith, aloe, senna, carthamus: composita sunt confect. hieræ, elect. diasenna, de citro, diaphcea: &c. postremo vsurpanda diuretica remedia. vt,

℞. rad. eryngiorum, rubiæ tinctorū, rusci & asparagi per noctem in aceto albo infusarū an. ʒ ij fol. agrim. pariet. berulæ, cristæ marinæ, nasturtij aquatici, pimpin. saxifrag. granorum alkek. & maluarum an. ʒ j β vrticæ, & lithospermi an. ʒ β passul. purg. paria xv. cicerum rub. florum genistæ & maluæ an. p. j. decoquantur in aqua ptisana & in colat. ℥ ij dissolue sacch. penidiati ʒ iij cinnam. ʒ ij capiat calidè ʒ vj per quatuor dies.

Efficacissima est maximèque diuretica aqua stillaticia sensim facta ex alembico vitreo, quæ constet materia proxima contusa cui addita sit terebenth. venetæ ℥ β & aquæ vitæ ʒ iiij, de qua dentur mane ʒ iiij: eadem vis est succi raphani destillati, & infusionis triginta baccarum iuniperi tritarum in vini alb. ℥ j. talis denique seminis vrticæ puluerati ʒ j in vino albo, vel iusculo pulli propinata: similis facultas est puluer. elect. Iustini & eius quod lithontribon vocant si ad ʒ j vel ʒ ij cum eiusmodi vino, vel iusculo propinetur.

Obstructionis vrethra à callo, verruca & tuberculo carnosio siue phimate curatio.

CAlli & verrucæ quæ à crassa, lentâque & mucosa forde in vrethræ anfractibus ultra modum siccescente oriri solêt: Itē tuberculi carnosii curatio duplex est: vtræque quidem artificiosa: sed vna fu-

cata ferè & imperfecta, vel etiam periculosa & funesta. Altera longa quidem sed tuta magis & sapientissime salutaris. Prima illa triplex est, vna cum carnosum tuberculum duriusculum, callúsque diutius obfirmatus cathetere violentius adactó, vberiori sanguine profuso dilacerantur, eorúmque reliquæ mictionis impetu excernuntur, relictáq; vlcera urinæ eiusdè siccante facultate persanantur. Hæc curationis species veteribus vsitata fuit nostrâ pharmaceuticam therapiam ignorantibus auctore Gal. cap. i. lib. i. de locis affectis. Cum autem recetia renum, vel vrethræ vlcera, non satis illa quidem abstergeat, siccetque, aut carunculam duriorē & vetustiore eradat, quam nascentem adhuc, mollemque, eradere non potuit, quin potius coniuncta carunculæ vlcera urinæ acrimonia exasperari & carunculam magis indurari contingat, sicuti etiam violentæ isti dilacerationi, phlegmone, gangræna, sphacelus, abscessus, tamque funesta ischuria succedere potest, quæ miserum ægrum ante septimum diem rapiant, idcirco prima illa per catheterem & dilacerationem curandi ratio nusquam tentanda est: nisi fortasse urgente necessitate durioris carunculæ, callique, quæ à medicamento admouendo penetrari exedique nequeant, & legibus postea describendis.

Secunda constat hydrargyrosi (post phlebotomias & purgationes legitimas & necessarias) imique ventris, perinæi & inguinum, vnctione mercuriali, cuius multiplici repetitione liquari fortasse, fundique carunculæ portio possit, non tota tamen consumi, dissiparique: sicuti neque vlcera carne consumpta siccari, & cicatrice muniri possunt, quin
 potius

potius vacante ab istis vnctionibus agro, tum tuberculum ipsum & vlcera inualeſcunt, vel repullulantibus prioribus ſubinde ſymptomatis, vt iſchuria, ſtranguria, dyſuria, tum noua etiam emergunt ob hydrargyri cū cerebro, neruoſoque genere antipathiam, vt ſputatio moleſtiſſima, oris exulceratio, fœtorque, & faucium ſtrangulantes tumores.

Tertia in ſola ligni guaiacini potione per totum morbi decurſum uſurpanda verſatur, cuius attenuante, tergente, digerente & ſudorifica facultate vt tumores externos, tophaceos à venere impura, ſic carūculas quoque ipſas, callōſque penitus diſſolui, tādēque omnino diſparere, vlcere etiam ſanato temerè creditum eſt, cum potius à guaiaco inſigniter ſiccante carunculam indurari contingat, & ab vrinæ acrimonia ab hac guaiaci potione accenſa vlcera ipſa efferentur & augeantur: tamenſi enim tumoris tophacei externi, vtpote humoralis integra diſcuſſio & inteſtinæ morbi venerei malignitatis extinctio perfecta ab uſu guaiaci eſſe poſſit, non tamen eadem eſt vis eius in carunculam, aut in vlcera interna quæ decocto ſalſeparill. aut ching commodius percurantur.

Altera medendi via longior quidem ſed tutior eſt: quæ tuberculum carnoſum, calloſum, verrucoſum exedendo purgandōque, & tandem inſigniter ſiccando curat. Itaque medicamentorum exedentiū & conſumentium genus, magnitudinem & uſum deinceps exponemus, vbi præparationē huic pharmaceuticæ curationi præmittendam propoſuerimus: Eſt autem hæc præparatio duplex, vniuerſalis vna, totique corpori communis, particularis altera egræ parti propria. Prioris illius vnic⁹ ſcopus eſt, vt

præcaueantur quæcumque symptomata curationi superuenire eâmq̃ interpellare possunt, qualia sunt rigor febrilis, defluxio ad partes genitales, phlegmone, abscessus, gangræna, sphacelus, atque huiusce præparationis instrumenta tria sunt, primum est victus frigidus, siccusque & tenuis, cum summa animi & corporis tranquillitate, atque accuratissima veneris, equitationis, præcipitis ambulationis, aeris aliosque, æstuosique & iracundiæ fuga, per totum curationis tempus, postque illum dierum viginti spatium, ne genitalia commotis fluxionibus opprimantur, unde notatus symptomatum versus exoritur. Secundum instrumentum est chirurgia quæ plethoram puram, impuramque pro ipsius viriūque egrotantis modo per venam cubiti dextri præcisam exhauriat. Tertiū est pharmacia quæ cacochymiam omnem è toto corpore excludat, tū crassiorem vt phlegmaticam & melancholicam è prima, secundaque corporis regione per purgantia clementiora cacochymiae speciei congruentia, qualia sunt aloe, agaricus, senna, rhabar. & epithymus, carthamus & cassia: acriora enim sanguinem incendunt, attenuant, fluxūque comparant, tum serosam, aquosamque ex habitu per sudores, non quidem decocti guaiacini (ne aucta ab eo urinarum acrimonia, vrthræ vlcera exasperet) sed salsaeparillæ potius, vel chinæ, vel vtriusque medicamenti mixti potione excitandos. Altera præparatio ad carunculam duram, callosam, verrucosam & inueteratam pertinet (recens enim mollisque sine ista præparatione facile expugnabilis est) idque tum externis remediis vt infusibus, fotibus, litibus, vnguentis, & emplastris tum internis & iniiciendis.

æ, rad.

℞. rad. alth. & ebuli, apij & scenic, an. ʒ ij folior.
 malu. alth. pariet. orig. calam. an. m. j. caric. ping. pa-
 ria vj. sem. lini & cumini an. ʒ j foliorū chamæm.
 meli. l. & stœchad. an. p. j. coquantur omnia simul in
 hydrelæo, vel in iure omaforum veruecinorum, &
 spongiis hoc decocto imbutis, expressisque fouea-
 tur carunculæ sedes tepidè utroque diluculo per
 horam integram. Ex eodè decocto: sed aucta sim-
 plicium mole infessus paretur, vel eiusdem decocti
 calentis tepido vapore per sellam deiectionariam è
 lebetè, vel pelui, genitalia perfundantur: suffitus de-
 nique ex lapidis molaris, vel pyritis igne candentis,
 aceti acerrimi & aquæ vitæ paribus portionibus ir-
 rigati, vapor in perinæum, scrotumque excipiat
 per sellam quoque deiectionariam vestibis circumduc-
 tã, cohibendi vaporis causa ne dissipetur: sed quo-
 niam hic suffitus nimium digerens est, inter mala-
 ctica alia ex usu erit vnguentum tale.

℞. vnguenti resumptiui, de althea & agrippæ an.
 q̄rt. β butyri recentis, axung. anseris, vel cuniculi an.
 ʒ j seminis apij & petros. an. ʒ ij cum oleo amygd.
 dulc. & cera noua, fiat vnguentum: applicetur eidem
 regioni post fotum. Simile est emplastr. de mucil-
 lag. & emplastr. de ranis insigniter emolliens, at-
 tēnsque carunculam hydrargyri facultate, cuius ta-
 men causã, tū emplastr. ipsum, tum mercuriata om-
 nia vnguenta quidã temerè reformidant, ne ab illo
 vt censent virulenta genitalium materia sursum in
 viscera repellatur, mox sese proditura lue venereâ.

Methodus curatiua caruncula absumenda.

VTrique præparationi, tum vniuersali, tū par-
 ticulari subnectenda protinus est curatio tu-

berculi propria, quo ipsum elidatur, vlcusque tandem consolidetur. Constat autem curatio hæc medicamentorum genere triplici, epuloticorum, quæ leuissima sunt: prima illa verè epulotica validissima ficcandi, astringendique, & penetrandi facultate sua, sine vlllo doloris & acrimoniæ sensu fungosam & luxuriantem carnem consumunt: hoc genere continentur metallica omnia vltà quidem & sæpius lota liquore vel succo refrigerante, vt rosar. plantag. solani, donec acrimoniam omnem exuerint, qualia sunt cadmia, spodium, pōpholix siue tuthia, plumbum, antimon. vitriolum, æs, squama æris, ærugo, calx viva, alumen, scoria ferri. Huius quoque generis sunt, cerusa, lithargyr. terra armen. & lemmia, malicorium, balaustium, equisetum, myrtus, sabina ficcata, sicuti folia oleæ sylvestris & sumach: composita etiam sunt vnguentum alb. & rub. & diachalciteos & diapompholigos. Cathæretica eximio calore suo ad quartum vsque gradum & prætenui substantia tuberculum, verrucas, callósque sensim tabefaciunt: sed hæc quod acrius rodant sæpe partis sanæ substantiam vna cum hyperfarcosi depopulantur, doloresque, fluxiones, agróque perniciem tandem moliuntur, si sincera, immixtáque vsurpentur, ideoque à carunculæ medicatione longissimè remouenda putat Fernelius quæcumque cum æruginè, vitriolo, alumine, flore æris, eiusque squamâ & aqua chymistarum, aliisque similibus cathæreticis & escharoticis parantur, nisi fortè multa & laboriosa præparatione mitigata, vel aliorum epuloticorum mixtione retusa, atque adeo in duriori corpore & caruncula inueterata adhibeantur, semper enim longa tutáque, breuiori, & periculosa curationi est

ni est anteponenda. Tertium genus est miatorum ex clementioribus epuloticis & acrioribus cathæreticis, quibus non sola carunculæ callosæ & verrucosæ emollitio, attenuatioque præmittenda est, vt etiâ vehementioribus, sed eiusdem etiam per catheterẽ ductum sæpius & reductum dilaceratio.

Indicatio generis remedium.

Porro à recenti mollique caruncula exquisito laborantis sensu, raroque & laxo habitu primi generis remedia verè epulotica indicantur, sicuti ab eadem caruncula inueterata dura callosave densoque & duro ægri habitu & sensu hebetiori alterius generis validissimorum cathæreticorum indicatio est, idque post præmollitionem aut attritionem etiam carunculæ. Tertij denique generis mediocris insinuatio est à mediocri carunculæ substantia & ætate, sicuti ab habitu sensuque moderato, aut quoties affectus exigit validiora, quæ sensus acutus ægri contra indicat doloris vitandi causa. Vfus remedium omnium continetur tempore, loco, & forma eorundem. Tempus quidem vniuersale duplex est, liberum vnum, alterum coactum: illius vsus est, cum morbus dat inducias, neque ischuria, neque stranguria, dysuriave atrocior viget, Tale est verum tempus sub mensibus Martio, Aprili, Maio: & Autumnale sub Septembri, Octobri, Nouembri. Coactum eligitur periclitante nimis egro & ischuria presso, vt puta hyeme & æstate media, qua non sola caruncula sensim deterenda est, sed ceruix quoque ipsa confestim aperienda si vita ægri in præcipiti videatur, estque tum vtriusque temporis importuni iniuria sedulo declinanda, hyemis quidem

frigore vitato quod vesicæ aliisque; nervosis partibus inimicū est. Etatis pariter ardor temperetur, quia humores inflammat, & ad fluxum concitat. foueatur ergo hyeme decumbentis ægri conclauē igni assiduo & luculento, æstate temperetur Aquilonio vento admissio. Locus autem opportunior est huic curationi, quo siccior est & ab insigni frigoris calorisque exuperantia magis vacuus. Particulare tempus est quo & quando usurpanda sint remedia: die igitur nocteque cōtinenter usurpentur in vtrethra, donec obliterated carunculæ signa sint conspicua, de quibus postea, quæ mutantur quoties urinæ reddendæ gratia remota fuerint, rursusque post mictionem reponenda.

Locus applicandi remediij.

Immittenda quidem sunt remedia per vrethram ad sedem vsque carunculę vnus vel plurium cereolo antea exploratā, sicuti iam expositum est, idque vel candelis vel fistulis diuersis: neque enim secantis vel vrentis ferri vsum vrethre exquisitus sensus & angustia perferre potest, neque rursus ellychniis linamentis aut penicillis, tuberculo altius latitanti, medicamenta admoueri possunt.

De forma remediorum.

ITaque remediorum istorum substantia aliàs dura lentaque est & emplastica, aliàs media vt vnguenti, aliàs liquida vt liquoris, sed prima illa quam duæ posteriores multo turior est, quod hæ duæ in sanas & tenellas vrethre partes diffuāt easque; pariter atque carunculas ipsas cruciatu intolerabili & laniatu irreparabili sapissimè corrodam: præsertim si acris illa

illa veréque cathēretica sunt: leniū enim & epulotiorum nulla eiusmodi noxa metuenda est. Formantur tamen topica hæc aliquando vtraque specie media liquidāq; & caruncula aptantur quo deinceps scribemus modo.

Applicantur autem emplastra candelæ cereæ albæ iustæ magnitudinis. i. longitudinis & crassitudinis, cuius pars cuspidi propinqua modicè dērasa sit excavatāque ad latitudinem vnus pollicis, idq; vno vel pluribus candelæ locis pro tuberculorum istorum perspecto antea exploratōque numero & sede. Est quidem altera magis insolens & ardua pulueris vsurpandi species per fistulam plumbeam cauam & parum infra cuspidem suam fenestratam, per quam immissus puluisculus virgula argentea sursum impulsus in carunculam impellitur, mōxque fistula ipsa inuersa sursum fenestra eximitur. Tertia ratio est non minus quam hæc laboriosa sub vnguēti specie, quo oblitum prius linteolum tenuissimum, & candelæ cereæ obuolutum in vrethram infertur ad carunculam vsque, mōxque torsionibus contrariis reuocata candela, extremo linteoli ex vrethra foras pendente, quò retrahatur mictionis premente desiderio. Cereoli vicem virgula argentea tenuissima subire potest, cui vetustissimum & tenuissimum linteolum vnguento superpositum & superlitum obuoluatur, penitusque in vrethram ad carunculam vsque deuoluatur.

Quarta quādam ratio est eiusdem vnguēti cathēretici admoūēdi per candelæ extremum nonnihil cauatum & ad carunculam vsque deterendam promotum: In omni denique vtendi via & ratione singulariter ægro cauēdum est ne à mictione vring

guttula, aut feminis à coitu circa carūcularū obices restitet: sed tota pene diutius concussio excernatur, ne topicorum medicamentorum vires omnino retundat, aut vlceris vellicatione ægrum molestet.

Exempla debiliū & primū ex Fernelio.

℞. aloes opt. ʒ ij myrrh. & aristol. rotund. an. ʒ j β tuthiæ præparatæ ʒ β fiat omnium puluis subtilissimus, ex quo cum styrace liquida fiat emplastrum quod validissimè terget siccātque.

Simile est vnguehtum eiusdem.

℞. cerus. litharg. auri præparat. an. ʒ ij ol. ros. ʒ j ol. de myrrh. ʒ β liquefiant igne lento, deinde adde tuthiæ, stybij & spongiæ, omnium quidem vstorum & succo plantag. vel simili probè lotorum donec omnem acrimoniam deponant, & probè siccatorum in sole an. ʒ β rad. aristol. rotundæ, myrrhæ, aloes, mastich. & plumbi crudi an. ʒ j caphuræ ʒ iiij læuigata diligenter omnia super lapide marmoreo mox in mortario plumbeo diu multūmque versando in vnguentum conformētur. Ab his duabus formulis, caruncula, callus, & quidquid in vrethra extuberat, eximi leniter & sine dolore, vlcerāque siccari in molli præsertim habitu possunt.

Similia sunt ex Ferrio, sed dissimilis compositionis ratio, debiliū enim pulueres ab illo miscentur cum emplastris viscosis & siccantibus vt de mucilag. diachylo paruo, cerato de cerusa, de minio de lithargyro lento igne dissolutis, ea tamen cautione, si pulueris mixtione emplastrum durius euaserit, vt oleum & axungiam gallinæ vel similis addendo, tandem manibus tractetur donec lentescat.

℞. cort.

℞. cort. malorum granatorum acidorum in
vmbra siccatorum & pulueratorum ʒ ij alumin. ʒ
j emplastr. de cerusa ad ignem liquefacti ʒ j misce.
item

℞. mass. empl. de mucilag. ʒ ij succi cort. cap-
par, succi iugl. viridium vel nucum cupressi, vel o-
liuarum syluestrium aut immaturarum an. ʒ iij mi-
sceantur omnia ad ignem in formam cerati.

*Valentissimorum exempla ex eodem
Ferrio.*

℞. calcis viuæ & arsenici rubri, macerentur in-
terduum in aceto forti, deinde concorporentur cum
cerati de mucilag. semuncia.

*Aliud tutissimum & saluberrimum, cuiusdam Ale-
xandri Graci apud Ferrium.*

℞. vitriol. Rom. auripig. alumin. rochæ, æru-
ginis rase an. ʒ j macerentur in aceto albo, &
ad solem exsiccetur repetito toties hoc labore, do-
nec medicamenta omnem acrimoniam deponant,
postremo misceatur empl. de cerusa ʒ ij lento igni
dissoluti, donec in cerati formam coeant.

Aliud.

℞. præcipitati ʒ ij misce cum emplastri de ceru-
sa ʒ j ss.

Aliud.

℞. flor. æris ʒ j quæ horis 24. in aceto & aq. ros.
maduerit: cum cerati de cerusa ʒ j inungatur.

Item aliud.

℞. aquæ fortis ʒ ij cum cerati de cerusa semuncia
lento igne commisceatur.

Item.

Ex aluminis combusti, æruginis rasæ combusti, chalcanti id est vitrioli Rom. combusti an. ʒ j cum cerati de mucilag. ʒ ij concorporentur.

*Mediocrum exempla ex eodem
Ferro.*

℞. cerati de minio ad ignem liquefacti ʒ j succi scillæ ʒ j succi portulacæ & ol. de frumento an. ʒ ij ferueant in cerati formam.

Item.

℞. cerati de cerusa ʒ j lactis folior. ficuum ad solem densati ʒ ij misce.

Item.

℞. salis gemmæ & salis marini an. ʒ j cum cerati de mucilag. ʒ j misceantur.

Item.

℞. Rad. Ellebori nigri, stercoris murini & salis parum vsti an. ʒ j cum emplastr. de cerusa vel de mucilag. ʒ j misceantur.

Item.

℞. albumina ouor. induratorum tria vel quatuor, vitrioli Rom. ʒ β: misceatur & destilletur ex sacculo lineo in locis humidis: deinde ℞. huius destillationis ʒ β & misce. empl. de mucilag. ʒ ij ad ignem.

Item.

Ex Rad. serpentar. ʒ ij cum cerato de mucilagibus: & ex nuce cupressi & colocynth. cum eodem cerato concinnetur medicamentum. Denique tutissimum & efficacissimum omnium statuit quod ex pulueris sabinæ ad solem exsiccatæ ʒ j β mixta cum cerati de mucilag. ʒ β præparatur.

Em-

*Emplast. Philippi Hispani apud Andraem Lacunam, de quo Aveiga Comment. in lib. 1.
de locis aff. cap. 1.*

℞. ærugin. ras. auripigm. & chalcitid. vocant viriolum, alum. roch. an. ʒ ij hæc autem per 9. dierū spatiū laboriosè conterantur quotidie ex aceto acerrimo inter duos marmoreos lapides, & exsiccentur ad solem canicularem donec omnem acrimoniam amiserint, tūnque reponatur pulvis seorsum: tum vero

℞. Argenti spumæ ʒ ij ol. ros. ʒ iiij quibus per cocturam reductis ad iustam & mediam consistentiam adde extra ignem pollinis illius ʒ ij indeque conficiatur empl. duriusculum, quod candelæ cereæ vel fistulæ plumbeæ constanter hæreat. Huius emplastri vis debilis quidem est: sed augetur vel minuitur pro varia puluerum proportionē variæque indicatione ætatis, carunculæ, ægri sensus habitusque, vt mollioribus carunculis, magisque acutè sentientibus ægris ad puluer. ʒ ij emplast. ʒ iiij aptentur, durioribus verò & ægris & carunculis pares emplastri & pulueris portiones misceantur.

Hoc autem emplastrum siccantissimum est sine acrimonia & doloris sensu: emplastrum est cuiusdam Itali nomine Geofredi Ioanoti pretio suo & viribus nobile quo bis mille aureorum præmio curatus est Carolus nonus Rex Frâciæ, cuiusq; iussu in rationum publicos commetarios Gratianopoli in computorum camera relatum fuit.

℞. Cerusæ Venetæ ʒ j olei rosati ʒ iiij, camph. & tuth. aquæ ros. lotæ an. ʒ ß litharg. auri præparati ʒ vj antimonij præparati & subtilissimè puluerisati

cretique per cribrum setaceum zj β trochiscor. albor. rhasis sine opio z vj mastich. olibani, aloes hepaticę an. ð ij puluerisatis puluerandis, misceantur omnia in mortario plúbeo & simul infundantur per spatium 24. horarum in ol. rosato, postremo agitur & reducantur ad formam vnguenti, quod in pyxidem plumbeam recondatur. Est autem huius vnguēti facultas mediocris. Cōstat. n. pluribus metallicis validissimè siccantibus sine acrimonia. Vritur autem hoc vnguento hoc pacto: nempe cuspidi candelę cereę tenuissimę & tenuissimo linteolo obuolutę id ipsum admouet vt carūculam attingat, linteolo foras pendente vt dictum est, idque mutando quoties micturit æger per spatium 15. aut 20. dierum intra quos caruncula oblitterata sit.

Amatus Lusitanus decima nona curatione quartę centurię Philippi emplastrum ex Lacuna repetitum proponit ad deterendam carunculam: vbi autem detritam esse carunculam coniecere licet, idque ex facili in totam vrethram candelę cereę penetratione, ex humoris purulenti sordidique, ex ramentorum carnis cum vrina ipsa profusione, tum ex libera rectaque vrinę & seminis excretionē, tū deniq; ex stranguria & dysuria maiori, ex dolore acrius ob vlceris nuditatē inter meiendū mētulā vrente: vbi inquā ex istis signis carunculā callumve extirpatum agnoscimus, quod quidem vsurpato Philippi emplastro intra octo aut duodecim dies, aut si alia adhibentur vt plurimum intra 20. dies contingit, tum demum ad puris sordiumque deterfionem properandum est: sed interposito spontaneo effluxu per integri octidui spacium, vt ita humoris in vrethram infusi impetu ramenta adhuc hæren-

hærentia, crassum pus, & sordes in vesicæ sinum traducantur. Est autem tergentium vsus eo vsque promouendus dum nulla humiditas excrementitia ex mētula destillet, sitq; stranguria, dysuriave multo quàm antea molestior.

Exemplum tergentis iniectionis.

℥. flor. centaur. minor. fol. apij & caudæ equinæ an. m. j. hordei integr. ʒ j coquantur in lb ij aquæ purissimæ ad mediæ partis consumptionem, tum colato huic decocto adde rhodomelitis colari ʒ ij fiat iniectio per siphonem ter aut quater in die.

Huic exemplo complures aliæ tergentium iniectionum formulæ à nobis in curatione vlceris vrethræ & gonorrhœæ dictatæ cōgruunt. Est quidem tergentium facultas varianda pro diuersa puris crassitie & fœtore, ne partis corruptio sequatur, sed tamē Lanfranci collyrium in hoc casu à Lusitano suatum abhorreo in internis vrethræ vlceribus, quòd acrius omnino & mordacius sit, quàm tenelle parti & exquisitè sentienti conueniat & aptari possit.

Purgato iam vlceri post auulsam omnino carunculam cicatrix inducenda est, tum iniectionibus epuloticis citra morsum eximiè siccantibus, tum & vnguetis & emplastris, quale est illud eiusdē Philippi quod apud eundem Lacunam descriptum extat.

℥. aqu. stillaticiæ ros. & plantag. an. ʒ iiij lactis caprilli ʒ ij cerusæ ʒ vj alum. rochæ., marmoris candidissimi seu alabastri, spodij cuius succedaneus est cinis rad. cannarum an. ʒ j β capurræ ʒ j. arida hæc omnia terantur accuratissimè, cribróque excussa tenuissimo, liquoribus

prædictis permisceantur. Similia sunt iniectionum epuloticarum apud Ferrium exempla vt ex trochiscis de charabe, de spodio, ex bolo armena, terra sigili. sang. draconis, tuthia præparata, ærugine combusta lotaque, in aquis prædictis dissolutis: sed tamē in hoc genere iniectionum metallicarū calculosarū & arenosarū, & quæ in vesicā recipiuntur, calculorū collectionem metuit iure Lusitanus, ideoque periculum hoc declinādum esse præcipit crebra earum per cribrum Hippocraticum perfusione, cui puluisculus obhærescat, sola eius facultate per leuem decoctionem liquoribus impressa.

Eandem cicatricem moliri licet vnguento de minio & quocunque alio emplastro ex metallicis vstis lotisque & cum oleo omphacino vel myrtino ceraque alba contorporatis, & per ceream candelam vt dictum est immisissis. Extat in hāc rem Geofredi Ioanoti epuloticum tale. ℞. vnguenti rosati recentis aqua equiseti loti, vnguenti de cerusa camphorati & vnguenti albi rhafis an. ʒ j. pomatæ sine speciebus paratæ ʒ β. subigantur omnia in mortario plumbeo & in vase vitreo asseruentur: hoc vnguentum tenuissimo linteolo exceptum & cādela ceræ tenuissimæ obuolutum vt ante dictum est, intro-mittatur.

Simile est epuloticum Fern.

℞. aq. plantag. & ros. an. ʒ ij. trochiscor. albor. rhafis ʒ β. boli arm. ʒ β. fiat iniection.

℞. cortic. granator. vsti, gallæ vstæ, tuthiæ præparat. plumbi vsti an. ʒ j. β. macerentur omnia in aqua ros. horis duodecim, deinde ad ignem siccantur, & in lapide marmoreo cum oleo myrtino, & caphuræ ʒ β. in vnguentum concinnentur.

Paræus

Paræus efficacissimum prædicat hunc puluerem epuloticum omnisque morbus expertem.

R. lapidem calaminarem lotum, testas ouorum vstas, corallum rubrum, corticem granator. fiat pollen, & applicetur cum cerea candela vnguento de minio vel de cerusa oblita.

Recidivæ præcautio.

Vbi perfectæ cicatricis coniectura fuerit ex vrinæ sine dolore libera transfluxione: tū vero recidivæ vel potius rediuvæ carunculæ præcautio ad duos scopos referri debet: vnus est vt absit humorū & vrinatum mordax acrimonia, alter vt contagiosus aut frequens nimis & libidinosus concubitus fugiatur. Ab illa enim recens mollisque cicatrix exeditur, ab hoc præ violenta vrinæ distensione resolvitur eadem diuelliturque. Primus scopus comparatur tum diætâ frigida siccâque ciborum omnium acrium, salforum, piperatorum frixorum & condimentorum experte, improbiq; laboris, vigiliarū, iracundiæ, mœroris & curarū graviorum, tū etiā crebra purgatiūcula humorū biliorum salforumque, vt ex cassiæ medulla paucō mixto rhabarb. vel ex huius & agar. trochiscati in fero caprillo infusione, additōque syr. ros. laxativo vel de cichorio composito: Alter autem scopus comparatur tum libidinis venerisque importunæ fuga, tum denique tenellæ cicatricis confirmatione & induratione, vt per fistulam plumbeam hydrargyro illitam quæ noctu diūque gestetur, tantūque mictionis gratia extrahatur, vel per ceream cādelam, quæ vnguento de minio vel simili emplastico inducatur.

Quod si nihilominus renascentis tuberculi rudimentum quoddam ex difficili aliqua vrinæ emissionē ex immisso cathetere vel candelæ sentiatur, idipsum cera viridi vel admixto etiam olei vitrioli momento protinus elidendum est, & cicatrix vt dictum est confirmanda.

De correctione symptomatum.

CVrationi carunculæ callique vrethræ grauissima sæpe superueniunt symptomata, quæ illam nō modo interpellent, sed ægrum etiā medico quamlibet sagaci eripiant: eiusmodi sunt hæmorrhagia, dolor ardorque & inde rigor, febris, fluxio inflammatio, abscessus, ischuria insuperabilis, sphacelus, mors, quibus omnibus promiscuè occurritur tum diætā frigida humidāque & tenui per totum curationis carunculæ spatium, ita vt omnis intemperies calidior frigidiorque aeris, ciborum, animique & corporis motus longissimè arceatur: tum pharmacia, per leuem purgationē in ipso curationis tuberculi progressu frequenter vsurpandam tã per iniiciēda vt clysterem lenientē, quàm per assumenda vt mannam, cassiam, syrupum de cichorio compositū & rosatū laxatiuū, diacatholicon diapr. simplex infusum rhei & agar. thochiscatistū deniq; chirurgia per phlebotomiam sub initium curationis celebrandam. Eadem vero symptomata præsentia & iam ægrum prementia peculiariter propriisque remediis curanda sunt: Si qua igitur insignis hæmorrhagia & vberior sanguinis effusio ex rupta à cathetere vel erosa à cathæretico medicamento mentulæ venula arteriāve obrepserit, ea quidē protinus cōprimēda est tū reuulsionū speciebus omnibus

bus vt per phlebotomiam venarū cubiti paucā creā
brāq; per brachiorū frīctiones & deligationes do-
lorificas, per cucurbitularū siccarū ad hypochōdriā
& lumbos appositionem, tum verò reperiūssionib;
bus per topica frigida siccāque & astringentia ad-
mouenda immittendāque. Admouendorum exem-
plum est.

℞ succor. plantag. & solan. an. ℥ iiii acēti rosati
℥ ij foueatur inde regio pubis, perinēi & lumborū
hisdem liquoribus adde albumina ouor. duorum;
puluer. boli armenē, myrtillorum, rosar. rubrar. san-
guinis draconis, terræ sigill. cortic. mali punici an.
℥ ij mastich. ℥ β misceātur ad ignem in cataplasma
quod à fotu stupis cannabinæ exceptum eidem re-
gioni admoueatur ter aut quater in die. Ex iisdē suc-
cis cum farina hordei fiat quoque cataplasma. Salu-
tare admodum est vnguentum de cerusa eampho-
raturum, sicuti lumbis etiam post fotum prædictum
aut ex aqua aluminosa apprimē conducit lamina
plumbea superinducta quæ hydrargyro illita sit. Ex
immittendis alia liquida sunt vt per siphunculum
in vrēthram iniiciantur: quales sunt succi & aquæ
stillatiue herbarum refrigerantium, plantag. solanis
sēperuiui, equiseti, permixto oui albumine vel bo-
lo armena, sanguine draconis & corallio dissolu-
tis & excolatis: alia duriora sunt vt vnguenta &
emplastra epulotica prædicta per ceream cande-
lam intromittenda ad carunculæ sedem; dolor
ardorque vel ex catheteris attritu, vel ex cathare-
tici remedij erosione, vel ex vlcere puri nudi-
que ab vrina acri vellicatione accensus anody-
nis refrigerantibus humectantibusque sedan-
dus & extinguendus est, omīssa interim carun-

culæ curatione detractâque ad tempus candela cerea. Ex injeciendorum genere sunt lac caprillum, asininum, vel sincerum vel dilutum succo vel aqua plantaginis, solani, semperuiui.

Mucago etiam seminum psyllij & cydoniorum extracta ex iisdem succis aquisque frigidis multumque cum caphuræ ʒss agitata fit liquidior ut iniiciatur. Sic & albumen oui cum aqua rosata & caphuræ eadem dosi multum agitatum. Simile est decoctum hordei mûdati, flor. violar. ros. & seminis psyllij & cydoniorum, addito præsertim syr. violato: hæc autē omnia per siphūculum in penem sunt immittenda diūque ibidem continēda, manu etiam ne effluat glande apprehensa, sicq; per candelā intromissum vnguentum album rhalis cum opio promptissimè dolorem ardoremque omnem demulcet & extinguit. Ex admouendis autem sunt fots ex oxycrato vel ex succis aquisque frigidarum plantarum addito aceti rosacei triente: item cataplasmata ex farina hordei cum iisdem succis. In assumendis denique numerantur syr. violaceus, nenupharin. de althea ex cochleari ante singulos pastus ʒij pondere assumendus.

Quod si crucians dolor ardorque exurens ad ceruicem vesicæ aut carunculæ sedem, fluxionem prolestarit unde inflammatio & pestifera metuatur ischuria, tum verò reuulsionum species omnes in hæmorrhagiæ curatione modo enumeratæ, quantumvis eadem quoque sub initium curationis tuberculi vsurpatæ fuerint, denuo tamen vsurpandæ sunt, maximè verò purgatiō & sanguinis missio per venas cubiti, quanquam saphenæ in poplite aut malleolo apertio recentis defluxionis de-

deriuationi, partisque oppressæ leuationi primum conducit, mox quoque topica repellentia in eadem hæmorrhagiæ curatione proposita super dolentem & æstuatē partem aliásque vicinas applicanda sunt, eaque tepida non valde calida ne humores fusi concitentur: postmodum autem in augmento statūque repellentibus mixta digerentia, sicuti in declinatione digerentia sola. vt

℞. olei chamæm. liliorum, ros. & myrtill. an. partes æquales: cum cera alba, fiat vnguentum.

℞. folior. plantagin. solani, summitatum rubi absinth. oleæ, orig. calament. an. m. j. ros. rub. flor. cham. & melil. an. p. j. coquantur & hoc decocto foueatur pars dolens.

℞. residentiam contusam & cribratam, cui adde farinæ hordei & fabarum an. \bar{z} iij axung. porci quart. j. fiat cataplasma. Et illa quidem in augmento & statu, in declinatione verò hæc ℞. ol. chamæm. & anethini vel lilior. & sapæ an. ss β farinæ lentium fabar. cicer. rubror. an. quart. β seminis cumini \bar{z} β fiat cataplasma addendo puluer. flor. chamæm. & meliloti \bar{z} j.

Abscessus curatio.

IAm verò si non repulsa digestave phlegmone, vel nullis vel certè tardius adhibitis remediis in abscessum degeneret qui foras vergat manifesto tumore, rubore & dolore lancinante: tum suppuratio eius arte iuuanda est, & ecpyticiis remediis acceleranda, quale est catapl. hoc

℞. rad. alth. & lilior. an. quart. j. folior. maluæ, althææ, achanti an. m. j. flor. chamæm. melil. an. p. j.

k 3

caricar. ping. paria iiij. passul. purgat. paria xx. coquantur & colentur. Hoc decocto pars foueatur ex gossipio, deinde adde residuæ contusæ & colatæ, farinæ lilij, scænugr. & tritici an. $\frac{3}{4}$ ij butyri, axung. gallin. adipis suilli an. quart. β tandemque vitellos ouorum ij. fiat cataplasma.

Tale etiâ est basilicū vtrumque, & in frigidiori materia empl. diachylon, & de mucilagin. suppuratus autem abscessus scalpro vel cautero potius actuali aperiendus est, ante perfectam etiam suppurationem, vt emissio pure & soluta ischuria ceruix vesicæ vrinam liberè transmittat.

Gangrana & sphaceli curatio.

Quod si à magnitudine fluxionis non repressa gangrænæ tandemque sphaceli periculum impēdeat, tum cataplasmati ecpyritico pauca digerentia intermiscenda sunt, quæ redundantis partemque opprimentis fluxionis portionem dissipent, vt pars melius perspiret & à putredine vindicetur.

Eiusmodi sunt farinæ fabarum, lentium, orobi & lupinorum, sed sine hac quidem arte & cautione gangrænæ & sphaceli perniciem amoliri licet, tunc ad ferrum ignemque, & corruptæ & emortuæ substantiæ auulsionem celeriter decurrendum est, ne pars sincera trahatur vitaque ægro rapiatur. Interea dum phlegmones abscessus & gangrænæ curationi prudens incumbit medicus, resistentem vrinam sedulo proliciat vel cereolo, vel potius cathetere in vesicam demisso, qui plumbeus sit cauusque, & butyro vel oleo oblitus, per quem vrina profluat, ideoque continenter gestandus

standus donec curatio tota expedita sit. Denique
si hæc quoq; ars tumoris mole & duritie eludatur,
adeo vt catheterem non transmittat, tum cer-
uix vesicę vulnerāda est, vt ex vulnere li-
berius vrina defluat, donec tumor sub-
federit, vel digerendo suppuran-
doue, vel eradendo &
comminuendo.

* * *

FINIS LIBRI PRIMI.





IOANNIS HV-
CHERI BELLOVACI
CONSILIARII MEDICIQUE
REGII, ET MONSPELIENSIVM
Medicorum Cancellarij, de Sterilita-
te vtriusque sexus.

LIBER SECVNDVS,
DE STERILITATE MVLIE-
BRI IDIOPATHICA.

IOANNIS HVCHERI ORA-
*tiuncula ad discipulos habita de therapia ute-
rinorum morborum, & symptomatum.*

MAGNUM fanè, arduumq; valde, & præclarum aggredimur argumen-
tum (discipuli charissimi) cui haud
scio an doctrinæ varietate, necessita-
te & vsu, vllum aliud iure conferri in
tota medicina possit. Continet enim muliebres af-
fectus omnes: qui multitudine sua & frequentia, sæ-
uitia, magnitudine, notionis denique, & curatio-
nis difficultate, cæteras humani corporis ægritu-
dines longè, latèque vincunt.

Li.

Liceat mihi igitur apud vos physicarum & medicarum rerum adolescentes studiosissimos abdita quædam alinæ & procreatricis naturæ consilia, de fexuum duorum inaris & scæminæ discrimine : de officiorum & instrumentorum cuiusque opportunitate, breuiter perorare.

Hanc vniuersitatem totam, quam mundum vocamus, in superiorem & inferiorem regionem natura partita est. Illam cœli nomine, ex vnico excitauit elemēto simplici, feréque immutabili, & sempiterno. Huic enim nullum materiæ communis commercium cum aliis inferioris mûdi partibus interesse voluit : neque id ipsam cum illis ipsis inuicem commutari ; sed illi vni motum circularem perpetuum, sibi que ipsi semper similem, æternitatis suæ testem affinxit : nō tamen vt ad locum aliū accedat, cum sit cœlū perfectissimum, nihilq; ei desit, quod loci mutatione consequatur : sed vt quam simillimū primo motori suo Deo, licet immoto & constanti, euadat, & quemadmodum ille vbique est, sic vbique cœlum quoque sit quoquomodo possit.

Inferiorem autem, & sublunarem eiusdem vniuersitatis partem ex simplicibus elementis quatuor igni, aëre, aqua, & terra conglutinauit. Quorum incertam lubricam sempérque nutantem naturā, cum primarum qualitātū, quarum singulis singulæ præ sunt, coniurata inter se discordia, tum subiectæ materiæ primæ, mutabilis varietas efficit. Hæc enim ipsa nihil est aliud, quam potestas quædam excipiendis vicissim rerum dissimillimis formis destinata, ex quibus recentes nouæque excussis prioribus protinus succedant. Proinde illa tandem elementa mutari necesse est, si quidem potestas hæc,

prædictis permisceantur. Similia sunt iniectionum epuloticarum apud Ferrium exempla vt ex trochiscis de charabe, de spodio, ex bolo armena, terra sigilli. sang. draconis, tuthia præparata, æruginè combusta lotaque, in aquis prædictis dissolutis: sed tamē in hoc genere iniectionum metallicarū calculosarū & arenosarū, & quæ in vesicā recipiuntur, calculorū collectionem metuit iure Lusitanus, ideoque periculum hoc declinādum esse præcipit crebra earum per cribrum Hippocraticum perfusione, cui puluisculus obhærescat, sola eius facultate per leuē decoctionem liquoribus impressa.

Eandem cicatricem moliri licet vnguento de minio & quocunque alio emplastro ex metallicis vstis lotisque & cum oleo omphacino vel myrtino ceræque alba contorporatis, & per ceream candelam vt dictum est immissis. Extat in hāc rem Geofredi Ioanoti epuloticum tale. R. vnguenti rosati recentis aqua equiseti loti, vnguenti de cerusa camphorati & vnguenti albi rhalis an. ʒ j. pomatæ sine speciebus paratæ ʒ β. subigantur omnia in mortario plumbeo & in vase vitreo assuerentur: hoc vnguentum tenuissimo linteolo exceptum & cādela ceræ tenuissimæ obuolutum vt ante dictum est, intro-mittatur.

Simile est epuloticum Fern.

R. aq. plantag. & ros. an. ʒ ij. trochiscor. albor. rhalis ʒ β. boli arm. ʒ β. fiat iniection.

R. cortic. granator. vsti, gallæ vstæ, tuthiæ præparat. plumbi vsti an. ʒ j. β. macerentur omnia in aqua ros. horis duodecim, deinde ad ignem siccantur, & in lapide marmoreo cum oleo myrtino, & caphuræ ʒ β. in vnguentum concinnentur.

Paræus

Paræus efficacissimum prædicat hunc puluerem epuloticum omnisque morfus expertem.

℞. lapidem calaminarem lotum, testas ouorum vstas, corallum rubrum, corticem granator. fiat pollen, & applicetur cum cerea candela vnguento de minio vel de cerusa oblita.

Recidivæ præcautio.

Vbi perfectæ cicatricis coniectura fuerit ex urinæ sine dolore libera transfluxione: tū vero recidivæ vel potius rediuvæ carunculæ præcautio ad duos scopos referri debet: vnus est vt absit humorū & vrinarum mordax acrimonia, alter vt contagiosus aut frequens nimis & libidinosus concubitus fugiatur. Ab illa enim recens mollisque cicatrix exeditur, ab hoc præ violenta urinæ distensione resolvitur eadem diuellitūque. Primus scopus comparatur tum diæta frigida siccaque ciborum omnium acrium, salforum, piperatorum frixorum & condimentorum experte, improbiq̃ue laboris, vigiliarū, iracundiæ, mœroris & curarū grauiorum, tū etiā crebra purgatiūcula humorū biliosorum salforumque, vt ex cassiæ medulla paucō mixto rhabarb. vel ex huius & agar. trochiscati in fero caprillo infusione, additōque syr. ros. laxatiuo vel de cichorio composito: Alter autem scopus comparatur tum libidinis venerisq̃ue importunæ fuga, tum denique tenellæ cicatricis confirmatione & induratione, vt per fistulam plumbeam hydrargyro illitam quæ noctu diūque gestetur, tantūque miCTIONIS gratia extrahatur, vel per ceream cādelam, quæ vnguento de minio vel simili emplastico inducatur.

Quod si nihilominus renascentis tuberculi rudimentum quoddam ex difficili aliqua vrinæ emissionē ex immisso cathetere vel candelæ sentiatur, idipsum cera viridi vel admixto etiam olei vitrioli momento protinus elidendum est, & cicatrix ut dictum est confirmanda.

De correctione symptomatum.

CVrationi carunculæ callique vrethræ grauissima sæpe superueniunt symptomata, quæ illam non modo interpellent, sed ægrum etiā medico quamlibet sagaci eripiant: eiusmodi sunt hæmorrhagia, dolor ardorque & inde rigor, febris, fluxio inflammatio, abscessus, ischuria insuperabilis, sphacelus, mors, quibus omnibus promiscuè occurritur tum diætā frigida humidāque & tenui per totum curationis carunculæ spatium, ita ut omnis interperies calidior frigidiorque aeris, ciborum, animique & corporis motus longissimè arceatur: tum pharmacia, per leuem purgationē in ipso curationis tuberculi progressu frequenter usurpandam tamen per iniicienda ut clysterem lenientē, quàm per assumenda ut mannam, cassiam, syrupum de cichorio compositū & rosatū laxatiuū, diacatholicon diapr. simplex infusum rhei & agar. thochiscatistū denique; chirurgia per phlebotomiam sub initium curationis celebrandam. Eadem vero symptomata præsentia & iam ægrum prementia peculiariter propriisque remediis curanda sunt: Si qua igitur insignis hæmorrhagia & vberior sanguinis effusio ex rupta à cathetere vel erosa à cathartico medicamento mentulæ venula arteriāve obrepserit, ea quidē protinus comprimenda est tū reuulsionū speciebus omnibus

bus vt per phlebotomiam venarū cubiti paucā creābrāq; per brachiorū frictions & deligationes dolorificas, per cucurbitularū siccarū ad hypochondriā & lumbos appositionem, tum verò repercussionibus per topica frigida siccaque & astringentia admouenda immittendāque. Admouendorum exemplum est.

℞ succor. plantag. & solan. an. ℥ iiii aceti rosati ℥ ij foueatur inde regio pubis, perinei & lumborū: hisdem liquoribus adde albumina ouor. duorum, puluer. boli armene, myrtillorum, rosar. rubrar. sanguinis draconis, terræ sigill. cortic. mali punici an. ℥ ij mastich. ℥ β misceātur ad ignem in cataplasma quod à fotu stupis cannabinæ exceptum eidem regioni admoueat ter aut quater in die. Ex iisdē succis cum farina hordei fiat quoque cataplasma. Salutare admodum est vnguentum de cerusa eamphoratum, sicuti lumbis etiam post fotum prædictum aut. ex aqua aluminosa apprimè conducit lamina plumbea superinducta quæ hydrargyro illita sit. Ex immittendis alia liquida sunt vt per siphunculū in vrethram iniiciantur: quales sunt succi & aquæ stillatitię herbarum refrigerantium, plantag. solanis, sēperuiui, equiseti, permixto oui albumine vel bolo armena, sanguine draconis & corallio dissolutis & excolatis: alia duriora sunt vt vnguenta & emplastra epulotica prædicta per ceream candelam intromittenda ad carunculæ sedem; dolor ardorque vel ex catheteris attritu, vel ex cathartici remedij erosione, vel ex vlcere puri nudi-que ab vrina acri vellicatione accensus anodynus refrigerantibus humectantibusque sedandus & extinguendus est, omissa interim carun-

culæ curatione detractâque ad tempus candela cerea. Ex iniiciendorum genere sunt lac caprillum, asininum, vel sincerum vel dilutum succo vel aqua plantaginis, solani, semperuiui.

Mucago etiam seminum psyllij & cydoniorum extracta ex iisdem succis aquisque frigidis multumque cum caphuræ ʒss agitata sit liquidior ut iniiciatur. Sic & albumen oui cum aqua rosata & caphuræ eadem dosi multum agitatumi. Simile est decoctum hordei mûdati, flor. violar. ros. & seminis psyllij & cydoniorum, addito præsertim syr. violato: hæc autē omnia per siphūculum in penem sunt immittenda diūque ibidem continēda, manu etiam ne effluat glande apprehensa, sicq; per candelā intromissum vnguentum album rhasis cum opio promptissimè dolorem ardoremque omnem demulcet & extinguit. Ex admouendis autem sunt fots ex oxycrato vel ex succis aquisque frigidarum plantarum addito aceti rosacei triente: item cataplasmata ex farina hordei cum iisdem succis. In assumendis denique numerantur syr. violaceus, nenupharin. de althea ex cochleari ante singulos pastus ʒij pondere assumendus.

Quod si crucians dolor ardorque exurens ad ceruicem vesicæ aut carunculæ sedem, fluxionem prolektarit vnde inflammatio & pestifera metuatur ischuria, tum verò reuulsionum species omnes in hæmorrhagiæ curatione modo enumeratæ, quantumvis eadem quoque sub initium curationis tuberculi vsurpatæ fuerint, denuo tamen vsurpandæ sunt, maximè verò purgatiō & sanguinis missio per venas cubiti, quanquam saphenæ in poplite aut malleolo apertio recentis defluxionis de-

derivationi, partisque oppressæ leuationi primùm conducit, mox quoque topica repellentia in eadem hæmorrhagiæ curatione proposita super dolentem & æstuatē partem aliásque vicinas applicanda sunt, eaque tepida non valde calida ne humores fusi concitentur: postmodum autem in augmento statūque repellentibus mixta digerentia, sicuti in declinatione digerentia sola. vt

℞. olei chamæm. liliorum, ros. & myrtill. an. partes æquales: cum cera alba, fiat vnguentum.

℞. folior. plantagin. solani, summitatum rubi absinth. oleæ, orig. calament. an. m. j. ros. rub. flor. cham. & melil. an. p. j. coquantur & hoc decocto foveatur pars dolens.

℞. residentiam contusam & cribratam, cui adde farinæ hordei & fabarum an. ʒ iij axung. porci quart. j. fiat cataplasma. Et illa quidem in augmento & statu, in declinatione verò hæc ℞. ol. chamæm. & anethini vel lilior. & sapæ an. lb β farinæ lentium fabar. cicer. rubror. an. quart. β seminis cumini ʒ β fiat cataplasma addendo puluer. flor. chamæm. & meliloti ʒ j.

Abcessus curatio.

IAm verò si non repulsa digestave phlegmone, vel nullis vel certè tardius adhibitis remediis in abcessum degeneret qui foras vergat manifesto tumore, rubore & dolore lancinante: tum suppuratio eius arte iuuanda est, & ecpyticiis remediis acceleranda, quale est catapl. hoc

℞. rad. alth. & lilior. an. quart. j. folior. maluæ, althææ, achanti an. m. j. flor. chamæm. melil. an. p. j.

k 3

caricar. ping. paria iij. passul. purgat. paria xx. coquantur & colentur. Hoc decocto pars foueatur ex gossipio, deinde adde residentia contusa & colata, farina lilij, scænuigr. & tritici an. ʒ ij butyri, axung. gallin. adipis suilli an. quart. ʒ tandemque vitellos ouorum ij. fiat cataplasma.

Tale etiā est basilicū vtrumque, & in frigidiori materia empl. diachylon, & de mucilagin. suppuratus autem abscessus scalpro vel cautero potius actuali aperiendus est, ante perfectam etiam suppurationem, vt emissio pure & soluta ischuria ceruix vesicæ vrinam liberè transmittat.

Gangræna & sphaceli curatio.

Quod si à magnitudine fluxionis non repressa gangrænæ tandemque sphaceli periculum impêdet, tum cataplasmati ecpyritico pauca digerentia intermiscenda sunt, quæ redundantis partemque opprimentis fluxionis portionem dissipent, vt pars melius perspiret & à putredine vindicetur.

Eiusmodi sunt farina fabarum, lentium, orobi & lupinorum, sed sine hac quidem arte & cautione gangrænæ & sphaceli perniciem amoliri licet, tunc ad ferrum ignemque, & corruptæ & emortuæ substantiæ auulsionem celeriter decurrendum est, ne pars sincera trahatur vitæque ægro rapiatur. Interea dum phlegmiones abscessus & gangrænæ curationi prudens incumbit medicus, resistentem vrinam sedulo proluciat vel cereolo, vel potius cathetere in vesicam demisso, qui plumbeus sit cauusque, & butyro vel oleo oblitus, per quem vrina profluat, ideoque continenter gestandus

standus donec curatio tota expedita sit. Denique
si hæc quoq; ars tumoris mole & duritie eludatur,
adeo vt catheterem non transmittat, tum cer-
uix vesicę vulnerada est, vt ex vulnere li-
berius vrina defluat, donec tumor sub-
federit, vel digerendo suppuran-
doue, vel eradendo &
comminuendo.

* * *

FINIS LIBRI PRIMI.



Liceat mihi igitur apud vos physicarum & medicarum rerum adolescentes studiosissimos abdita quædam alinæ & procreatricis naturæ consilia, de sexuum duorum maris & fœminæ discrimine : de officiorum & instrumentorum cuiusque opportunitate, breuiter perorare.

Hanc vniuersitatem totam, quam mundum vocamus, in superiorem & inferiorem regionem natura partita est. Illam cœli nomine, ex vnico excitauit elemēto simplici, feréque immutabili, & sempiterno. Huic enim nullum materiæ communis commercium cum aliis inferioris mûdi partibus interesse voluit : neque id ipsam cum illis ipsis inuicem commutari ; sed illi vni motum circula rem perpetuum, sibi que ipsi semper similem, æternitatis suæ testem affinxit : nō tamen vt ad locum aliū accedat, cū sit cœlū perfectissimum, nihilq; ei desit, quod loci mutatione consequatur : sed vt quam simillimū primo motori suo Deo, licet immoto & constanti, euadat, & quemadmodum ille vbique est, sic vbique cœlum quoque sit quoquomodo possit.

Inferiorem autem, & sublunarem eiusdem vniuersitatis partem ex simplicibus elementis quatuor igni, aëre, aqua, & terra conglutinauit. Quorum incertam lubricam sempérque nutantem naturā, cum primarum qualitātū, quarum singulis singulæ præ sunt, coniurata inter se discordia, tum subiectæ materiæ primæ, mutabilis varietas efficit. Hæc enim ipsa nihil est aliud, quam potestas quædam excipiendis vicissim rerum dissimillimis formis destinata, ex quibus recentes nouæque excussis prioribus protinus succedant. Proinde illa tandem elementa mutari necesse est, si quidem potestas hæc,

quæ alioqui frustra sit, in actum exitura aliquando sit, eadēque ex seipsis invicem propagari, atque adeo eorum vnumquodque, mutuo præsertim symbolo iunctorum, in vnoquoque potestate desiderare, stabulari, latitare statuendum est.

Mixta autem è quatuor primis illis, & simplicibus elementis corpora, vagam pariter, fluxamque, & caducam naturam, tum ex eadem materiæ secundæ inconstantia, tum ex primarum qualitatum capitali inter se & intestino dissidio, sortita sunt. Ab hoc enim eversa tandem, ex mixtorum substantiis prior forma recedit, moxq; noua alia & recentior ad eandem accedit, quæ aut temperies est, aut certè vis quædam diuinior in temperie constituta.

Porro mixtorum genus vniuersum duplex omnino est, perfectorum, & imperfectorum. Ex quibus hæc firma constantique forma orbata, finitimam affinium elementorum speciem celeriter facillèque subeunt. Talia sunt meteora omnia. Illa autem bipartita sunt, animata nempe, & inanimata. Horum (quæ subterranea sunt) quatuor ex materiæ discrimine, notantur differentia: lapidum, succorum, terrarum, metallorum. Illorum formæ, vitæque varietas tres veluti tribus & familias digessit, vegetatiuorum, seu plantarum vnā; sentientium, seseque mouentium, & brutorum alteram; intelligentium, vt hominum, tertiam.

Hic hic vos appello (physici & medici auditores) hic physicos & naturæ velut rerum omnium sapientissimi architecti numen eximium, & singularem in conseruando hoc vltimo mixtorum genere curam, industriam, & prouidentiam accuratè attendite, animaduertite, recognoscite. Etenim cum miserram

ram prorsus hominum sortem sine vitæ æternitate illa duxisset, (quam tamen repugnantibus principiorum originis suæ viribus oppugnari, tandemque expugnari meminisset) vitam sane ipsorum propagatione specierum, insitôque generationis desiderio perpetuauit. Hinc enim ex senescente, marcescente, penitusque tabescente nouum hominem suscitât: & moribundi parentis animam veluti per manus liberis traditam, ad infinitam posteritatis seriem transmittit.

Ergo generationis principia duo, semen, & mēstruum, totidēque sexus marem & fœminam, in hominum vt & brutorum genere, naturæ solertia & benignitas commenta est: vt ab illo generatrix facultas, ab hac idonea generationis materia conferretur. Hîc rursus mentes vestras erigite: hîc acumen vestrum excitate, & admirabilem naturæ sapientiam in hoc fingendo sexuum discrimine suspicite. Vtrumque enim generationis principium ambôsque maris & fœminæ sexus, aliter quàm in plantis, (quarum est vnicum generandi, sēque ipsas alendi studium) in animâtibus: sed præsertim hominum specie discerni voluit, vt sublimioribus mentis operibus vacare possint, quibus omnes, præter alendi generandique communem plantis omnibus & animalibus facultatem, magis minúsve vigere hinc deprehenduntur, quod sensu valeant, qui cognitionis species quædam est, motus quoque tanquam functionis huius adiutor tum hominibus, tū cæteris animalibus adiunctus est: isque duplex. Vnus quidem illustrior, loci mutatione constans, in iis animalibus, quæ *κίνητα* vocantur. alter obscurior, ex partium contractione sola & remissione,

cuiusmodi est spongiarum, & ostrearum. Vterque sane declinandi, prosequendive eius causa, quod noxium, vel utile à sensu in prius perceptum, deinde à mente iudicatum sit. Itaque in animalium genere neque mas solus (quod procreationis loco, fœtusque commeatu & alimento careat) neque fœmina sola, (quod procreatrice facultate spoliata sit) propriis procreandi viribus quicquam præstitisse unquam visi sunt. Quin potius amborum sexuum coïtus ad procreationem necessarius semper fuit: non quidem ut ex iis inter se mixtis omninoque occumbentibus, novum animal reuiuiscat; sed ut eorum facultates in utero confundantur, cum semine sexus utriusque, quod subinde attracto permixtoque sanguine menstruo conformetur, alatur, & augeatur. Ergo maribus colem ad seminis emissionem, fœminis utrum ad eiusdem admissionem, fœtusque ex eo ipso & menstruo conformationem natura largita est. Sed enim omissa parumper de seminis mensurisque facultate & natura, disputatione: nunc de fœcundis sexuum congressibus, eorumque causis modicè philosophandum est.

Coitus animalium materiam, semen nimirum, item instrumenta, colem & utrum, modò designauimus: cæteras eiusdem causas deinceps apponamus. Coitum enim efferata quædam libido, & titillans voluptas incredibiliter prouocant; ex quibus illa testium vasorumque spermaticorū vrens quædam prurigo est: dum illa vel opprimente seminis copia, vel pungente acrimonia, spiritûque inflammante lacessita, vehementi eiusdem excernendi desiderio noctu, diûque sollicitantur. Hanc autem seminis excretionem tanto maior comitari voluptas solet:

solet, quanto feminis molestia, ex redundantia vel acrimonia, intolerabilior est, quanto voluptatis eiusdem præteritæ recordatio maior, quantoque exquisitior genitalium extremis ingenitus à natura sensus est. Itaque brutorum omnium coitus sola feminis exuperantia accendi solet, vt grauioribus eius tædiis liberentur: eorúmque mares expleta semel libidine sua, omnino desequiūt, fœminę quoque eorundē gravidæ factæ, omnē veneris consuetudinem prorsus abhorrent & refugiant, nullaque omnino brutorum genus voluptatis veneræ memoria ad coitum commouetur. Sed in hominum genere, vterque sexus tam vehementer ab hac percellitur, vt omni temporum corporúmque statu libidini suæ procaciter indulgeant: Neque enim virorum furor muliebrum genitalium obscœnitate reprimitur: neque fœminarum libido fœtationis nonimestris vel decimestris molestissimis tædiis, neque acerbissimis partuum doloribus: neque grauissimis biennis vel triennis lactationis ærumnis, ab istis veneris delitiis reuocatur. Tanta vis est voluptatis veneræ, & titillatio: vt molestiarum memoriam, metúmque periculorum omnium ex animis hominum deleat, penitusque euellat. Tametsi autem conueniens temperies, victúsque salubrior feminis plurimum hominibus conciliet: voluptatis tamen multò maiorem ad coitum, quam libidinis impetum esse, luculentissimè declarat, tam multiplex, tam violentus, tamque frequens multorum hymenęus coitusque, vt exhausto semine toto, sanguinem suum profundant. Eorum denique, qui spretis veneris illecebris omnibus, vnus prolis gratia, nullaque laceffente voluptate, in res ve-

nereas incumbunt, rarissimum est, vixque vñquam in vita cōmuni compertum temperantiæ exemplū.

Quare præter libidinem & seminis affluentiam, eiúsque emittendi, admittendique instrumēta duo, colem & vterum: maximā vim in coitibus animalium quorumlibet, hominum præsertim, voluptatis spes, eiúsque præteritæ recordatio sibi vendicant.

Fœminarum igitur à maribus discrimen falso confictum videtur, tum ex corporum exiguitate, cum in vrforum & aquilarum genere, roboris & proceritatis fœminarum laus præcipua sit: tum ex ingeniorum infirmitate, à quibus tamen superari, nedum æquari viros: si modo studium & industria non desit: quotidie compertum est: tum denique ex monstrosa earum natura: cum earundem multitudo vsusque ad sobolis propagationem, & vitæ cōmunis perpetuitatem necessarius, istam muliebri sexus speciem naturæ propositam fuisse clarissime testetur. Verissimum autem discrimen est ex propriis tribus fœminarum officiis, menstruo fluxu, conceptu, partuque (cuius comes est & administratio) lactatio) eorūque vnico instrumento vtero; eius morbi hac professione ordinaria septimestri explicandi curandique sunt, quod ab his sterilitas, sicuti & à genitalium virilium proximè explicatis curatisque vitiis, oriri solet.

Sunt autem vteri morbi vt aliarum partium genere triplices, intemperies, mala conformatio, & vnitatis solutio. A quibus tum communes similes naturæ functiones, quæcunque nutritioni subseruiunt, tum propriæ & organicæ tres istæ læduntur, fluxus mensium, conceptus, partusque: quarum symptomata quoque sunt tripartita. Aut enim fluxus
men-

menſium ſupprimitur & deficit: aut redundat: aut denique deprauatur: Sic conceptus aut nullus, aut rarus eſt, (ſterilitas vocatur) aut prauus: cùm mola, monſtrum, vel aliud infaſtum & inauſpicatum animalculum concipitur. Sic partus denique alias celerior & præcoçior eſt (abortus dicitur) alias tardior: vel nullus, vt mortuo fœtu ſaltem altero cum gemelli ſunt, tùmque ſuperſtes vocatur vopiſcus. Prauus eſt cùm vel difficilior, vel præpoſterus eſt. Difficilior ille eſt, qui grauibus doloribus, magnâque matricis offenſione fœtus abſoluitur: præpoſterus, cùm non capite primo, ſed alia quauis corporis parte obuia fœtus prodit, vt ſunt Agrippæ dicti qui primis pedibus. Morbos igitur vterinos omnes prima parte huius operis expediemus, alterâ ſymptomata eiufdem proſequemur: vtriuſque generis affectuum therapiam cum eorundem diagnoſi deinceps coniungemus. Solis enim indicationibus therapeutica methodus tota conſtituenda eſt, vt pote à quibus inueniendorum, & uſurpandorum remediorum omnis ars, omniſq; ratio proficiſcitur. Cùm autẽ indicationes iſtæ omnes ad tres affectus, morbos nempe, cauſas & ſymptomata referantur, à cauſis præſeruatiuæ, à morbis curatiuæ, à ſymptomatis lenitiuæ propriè deriuantur. Has igitur omnes indicationum curatiuarum ſpecies noſtra quoque hiſtoria complectetur, integrâque vterinorum affectuum omnium diagnoſin cum methodica therapia coniunget. Neq; enim quæ cuique morbo idonea ſint remedia inuenerit, aut inuenta rectè adhibuerit medicus, neglectis morborum cauſis ſignisque, & curatiuis eorundem indicationibus, à quibus ſolis iucunda, breuiſque & tuta curatio comparari poteſt.

Dixi.



PRÆFATIO IN LI-
BROS DE STERILITA-
TE MVLIBRI.



NIMALIVM generatio duplex est, vna sanguineorum, & perfecta, quæ semine constat vtriusque sexus per mutuum congressum confuso. Altera imperfecta exanguium & insectorum: quæ sine semine tribus modis absoluitur: vel sola confricatione vtriusque sexus: vel muliebris pudendi in masculinum corpus insertione: vel denique sine maris congressu intra corpus cōceptione: vide de his generationis differentiis Aristotelē lib.1. de gen. animal.& lib.3.cap.9.& 10.

Ex sexibus duobus mas in alieno corpore generat, foemina in suo. Ille autem effectuum generationis principium scilicet semen suum calidum, crassum spumosum magisque spirituosum & fecundum subministrat. Hæc semē quoque suum sed frigidius humidiusque & tenuius: atque mēstruum sanguinem confert. Ex utroque certē mixto animal novum procreatur. Ita quidem in cæteris rebus, quicquid fit ab aliquo ut agente, & ex aliquo ut patiente & materiali fieri consuevit. Sed foemina præter semen & mēstruum generationi quoque idoneum locum suppeditat, Vterum; à quo semina trahuntur, reconduntur, retinentur, miscentur & tantisper

tis per fouentur, dum insita animæ paternæ facultas procreatrix, languida & otiosa in semine effuso, ad proprium munus excitetur. Quæ uteri actio conceptio est.

Cæterum in isto sexuum discrimine, mas & fœmina essentialibus differentiis inter se non dissident: & diuersæ sint animalium species: sed potius vnica est Aristoteli, ideoque illo authore, hæc sexuum diuersitas in omni animalium genere obuia non est, lib. 1. de generatione: accidentalibus tantum differentiis discrepant: vt temperie & partium genitalium structura.

Illam enim in maribus calidiorem ficioremque esse testantur, tum eorundem conceptus in regione uteri dextra calidiori, accretio motusque in utero, & ex eodem exclusio velocior, vt quæ plerunque septimo mense accidat, purgatio lochiorum à partu breuior, vt triginta dierum: tum habitus solidior, hirsutior, vox grauior, pulsus maior vasæque ampliora, robur corporis animique maius, iudiciū constantius. Frigidiorum fœminarum vniuersam temperiem declarant: tum contraria corporum muliebrium symptomata: tum finis sexus fœminæ vt sanguine abundaret fœtum procreaturo, alituro aucturoque & confirmaturo, tam intra quam extra uterum.

Genitalium autem vtriusque sexus partium varietas, non ex sola temperiei calidioris & frigidioris varietate, sed è conformatricis animæ facultatis tacitis viribus intimoque consilio pendet, quæ cōceptui fœtusque nutritioni hoc structuræ discrimine sagaciter consulit. Muliebres enim partes intro cōdidit, internæque cavitæ ad seminum conceptum



PRÆFATIO IN LI-
BROS DE STERILITA-
TE MVLIBRI.



ANIMALIVM generatio duplex est, vna sanguineorum, & perfecta, quæ semine constat vtriusque sexus per mutuum congressum confuso. Altera imperfecta exanguium & insectorum: quæ sine semine tribus modis absoluitur: vel sola confricatione vtriusque sexus: vel muliebris pudendi in masculinum corpus insertione: vel denique sine maris congressu intra corpus cōceptione: vide de his generationis differentiis Aristotelē lib.1. de gen. animal.& lib.3.cap.9.& 10.

Ex sexibus duobus mas in alieno corpore generat, fœmina in suo. Ille autem effectuum generationis principium scilicet semen suum calidum, crassum spumofum magisque spirituosum & fœcundum subministrat. Hæc semē quoque suum sed frigidius humidiūque & tenuius: atque mēstruum sanguinem confert, Ex utroque certē mixto animal novum procreatur. Ita quidem in cæteris rebus, quicquid fit ab aliquo vt agente, & ex aliquo vt patiente & materiali fieri consuevit. Sed fœmina præter semen & mēstruum generationi quoque idoneum locum suppeditat, Vterum; à quo semina trahuntur, reconduntur, retinentur, miscentur & tantisper

tis per fouentur, dum insita animæ paternæ facultas procreatrix, languida & otiosa in semine effuso, ad proprium munus excitetur. Quæ vteri actio conceptio est.

Cæterum in isto sexuum discrimine, mas & scæmina essentialibus differentiis inter se non dissident: vt diuersæ sint animalium species: sed potius vnica est Aristoteli, ideoque illo authore, hæc sexuum diuersitas in omni animalium genere obuia non est, lib. 1. de generatione: accidentalibus tantum differentiis discrepant: vt temperie & partium genitalium structura.

Illam enim in maribus calidiorem ficcioremque esse testantur, tum eorundem conceptus in regione vteri dextra calidiori, accretio motusque in vtero, & ex eodem exclusio velocior, vt quæ plerunque septimo mense accidat, purgatio lochiorum à partu breuior, vt triginta dierum: tum habitus solidior, hirsutior, vox grauior, pulsus maior vasque ampliora, robur corporis animique maius, iudiciū constantius. Frigidiorē scëminarum vniuersam temperiem declarant: tum cōtraria corporum muliebrium symptomata: tum finis sexus scëminæ vt sanguine abundaret fœtum procreaturo, alituro aucturoque & confirmaturo, tam intra quàm extra vterum.

Genitalium autem vtriusque sexus partium varietas, non ex sola temperiei calidioris & frigidioris varietate, sed è conformatricis animæ facultatis tacitis viribus intimoque consilio pendet, quæ cōceptui fœtusque nutritioni hoc structuræ discrimine sagaciter consulit. Muliebres enim partes intro cōdidit, internaque cavitare ad seminum conceptum

foetuūque nutritum ad partum vsque instruxit. Viriles ad immittendum in alienum foeminae corpus maris semen siphunculi instar foras produxit. Itaque non temperiei tantum, sed figuræ quoque, magnitudinis siūsque ratione diuersa, partes vtræque inter se discrepant. Neque enim cervici vteri, penis virilis: neque fundo illius scrotum huius: neque vasis seminariis vtrisque & testibus muliebribus viriles vsquequaque respondent.

Quare foeminam monstrum esse naturæque erratum non satis philosophicè summo philosopho visum est: cum eadem sit vtriusque sexus eidem auctori forma & perfectio, x. metaph. eadēque ad speciei propagationem naturæ propositam necessitas: cum sine semine perfecta generatio non constet: neque idipsum à maribus intus contineri, neque concipi possit: Itaque non minor est foeminarum quàm virorum multitudo: neque rursus ad disciplinas percipiendas & exercendas maior inertia: tantūque earum corpora virilibus debiliora & ingenia inconstantiora: quanto minus calida magisque humida sunt. Sed philosophus decreti sui falsitate, quo semen mulieribus eripuit, abductus est.

Multo minus fabulosis eorum commentis assentiendum est: à quibus foeminas quasdam ipso nuptiarum die, aut incunte adolescentia, effervescente calore, in mares fuisse conuersas narratur: Vt videre est apud nonnullos tum poetas, tum historicos & philosophos, vt Plinium 7. nat. histor. quibus omnibus penis virilis hermaphroditorum, qui ante intus delituerat ob debiliore calorem, eruptio imposuit: vel clitoridis tentigo. Hac enim particula

tula est carnosa in apice pudendi foras emergens; longior per riuam ipsius, regionibus præsertim calidioribus & foeminis salacioribus; in qua particula venereæ voluptatis sedes à Fallopio rectè collocatur, cuius titillatione libido vehementer accenditur muliebris: quæ quoniam maritis molestior est, refecari solebat. vide Paulum lib. vj.

Sunt igitur generationis perfectæ animalium sanguineorum principes causæ, quatuor: Efficiens duplex: vna principalis, procreatrix scilicet animæ naturalis facultas. Altera minus principalis, eaque triplex. Instrumentaria, vt spiritus calorque seminis natiuus à parentibus deriuatus. Adiuvans, vt proba seminum menstruique temperies: & Sine qua non; vterus scilicet secundum naturam constitutus.

Altera materialis vt semen vtrunque & menstruum, ex quibus facultas foetum excitat:

Tertia formalis quæ noui est animalis productio.

Vltima finalis quæ speciei est propagatio generanti naturæ propoſita:

Vterus autem generationi multipliciter confert, primùm quidem semen virile è ceruice sua in sinu suum rapiendo; deinde illud ipsum cum muliebri per cornua vteri infuso; permiscendo, asseruando; fouendoque, donec foru suo vegetata quæ in semine otiosa languebat animæ naturalis facultas, animal efformet, formatumque rantisper alat augeatque, donec iam grandius, ab vtero tandem ipsius mole oppresso in lucem emitatur.

Gemina hæc vteri actio instrumentaria est, conceptio, partióque, cui tertia iungenda est, mensium transmissio. Est autem Cõceptio non sola seminis virilis tractio retentióque: cum plerunque paucis

post attractionē horis diebūſve aut liqueſcens diffluat, aut in molam tandem monſtrūmve faceſcat: ſed eſt procreatricis animæ facultatis quæ in ſemine potentiā tantūm latebat exſuſcitatio, & ad proprium procreandi munus deductio. Neque enim ſemen quamlibet elaboratum, temperatūmve actu animatum, animāque à generatoribus decidua inſtructum videri poteſt: cum ipſum corpus animalis nondum adſit, cuius anima eſt *εντελέχεια* ſummāque perfectio: ſed potentia tantūm animatum eſt, animāque ipſa de ſubiectæ materiæ præparatione à proprio agente, i. vteri proprietate educitur. Eſt enim hæc actio (conceptio nempe) non à manifeſta vteri temperie, ſed à tota eiſdem ſubſtantia & forma oriunda. (Sic chyloſis ventriculo, hæmatofiſ hepatis propria eſt.) Inde fit vt neque in genitalibus virilibus ſemen in actum prodeat, neque in alia qualibet corporis muliebris parte, in qua potius corrumpitur.

Conceptus autem ſymptomata vt cuiuſlibet alterius functionis ſunt triplicia, abolitio nempe, & diminutio: illa ſterilitas, hæc difficultas concipien- di vocatur: atque deprauatio, cuiuſmodi in edita mola & monſtro accidit. Læditur autem conceptio (ſicuti actio ſerè quælibet alia) dupliciter: tum per ſympathiam ineptæ materiæ vtriuſque ſcilicet principij ſeminis & menſtrui, ob viſcerum corporūque vitium à quibus vtrumque corrumpitur: (de hac læſionis ſpecie poſtea) tum per idiopathiā, idque ruruſ dupliciter: vel enim labefactatur conceptrix facultas, vt à vehementi intemperie: vel impeditur, vt à morbo organico aliquo vel cōmuni: cū enim vterus ſit pars ſimilaris & ſpermatice ſub-

substantia, actione & figura organica, vt seminis conceptioni & receptioni apta sit, tribus illā morborum generibus conflictari contingit, tum intēperie: tum mala conformatione: tum vnitatis solutione. Estque verē vterus omnium ægritudinum & calamitatum asylum: vlcus enim vbicunque sit, seminis excretionem dolore proritat. Pudendi phimosis, id est oclusio, seminis admissionem prohibet. Sicut & obstructio colli ab adnata membranula, vel tuberculo carnosio. Læuitas autem eiusdem, vel à cicatrice magna, vel à multiplici coitu, vel à mucosæ pituitæ serosæve perfusione admissum semen statim excludit.

Oris interioris amplitudo nimia, angustia, durties, tumores præter naturam, vlcus, cicatrix insignis obliquitas, peruersio, faciūt vt semen vel non admittat, vel celeriter emittat & eructet.

Vteri ipsius capacitas diminuta à tumore aliquo, vt phlegmone, scirrho, œdemate, cancro, hydrope, tumore aquoso & flatulento, conceptioni officit: quod recepti conceptique seminis effluxum ante tempus excitet.

Mutatio situs: cuiusmodi sunt ascensus, descensus, prolapsio, obliquitas, distortio, sicuti læuitas internæ superficiæ, siue natiua ob frigiditatem mensiumque penuriam coeuntibus acerabulis: siue aduentitia, ob ampliorem aliquam cicatricem, seminis adhæSIONem impedit.

Vasorum seminariorum amplitudo immodica, vel eorundem angustia & obstructio sterilitatem accersit. Illinc enim seminis effluxio & gonorrhœa: hinc eiusdem suppressio oritur.

Venarum denique hystericarum apertio, vnde

assiduus sanguinis fluxus semen deturbat. Vel eandem attritio immoderata, ex qua sanguinis suppressio est.

Constat igitur vterum conceptui conferre: tum vt organicum, semen excipiendo, alendoque foetus: tum vt similem, semen concipiendo, vnde ea actio (vt antea dictum est) interpellatur tribus morborum generibus, Similaribus, Dissimilaribus seu Organicis, & Communibus.

De intemperiebus vteri.

Differentia intemperierum: ab iis enim therapiam ordiemur, varia statuuntur: nam aliae sunt insitae & natae seu aduentitiae. Aliae modicae, vel immodicae. Aliae simplices, vel compositae. Aliae solitariae, vel humorales. Aliae sympathicae, vel idiopathicae sunt: idque vel ex consensu corporis totius, vel visceris alicuius intemperati.

Signa diagnostica.

Singulas vteri intemperies signis licet dignoscere: tum communibus vel adiuuantibus & nocentibus totoque victu praecedente: tum propriis (è Paulo libro tertio, capite 74. & Actio cap. 37. §. 1. serm.) vt frigidam ex fastidio veneris & coitus & exigua delectatione (quod mulier proprium emittat semen parcius & frigidius minusque genitalia vellicans, virile autem segnius attrahat, attractioque fruatur stupidius.

Ex mensibus aut nullis aut paucis & decoloribus iisque vel tenuibus & aquosis, vel crassis lentisque. Ex stupore & frigoris sensu partium vtero vicinarum

cinarum vt hypogastrij, lumborum femorūque. Ex pectinis glabrie seraque pubis eruptione. Ex totius corporis intemperie frigidiori victuq; præcedente simili.

Calidam ex contrariis fere omnibus agnoscimus vt salacitate, veloci per coitum seminis eiectione, mensibus paucis, flavescentibus, pruriginosis, exulcerantibus pudendum eiusque ceruicem, vt in viraginibus toto corpore calidiori, aut diæta simili morbove præcedente.

Humidam ex mensibus copiosis, tenuibus, fluxilibus, genitalium in adore perpetuo, in ipso præsertim grauiditatis tempore magnaque muliebriū per coitum perfusione ex multo & humido semine, minimaque in coitu voluptate.

Siccam denique ex mensibus paucis crassisque, muliebrium siccitate perpetua, raraque per coitum seminis effusione & simili corporis totius intemperie vel victu. Ex his simplicium vteri intemperierum signis coniunctis, licet compositas internoscere, tum humorales tum solitarias.

Prognostica signa.

Natiuæ intemperies neque arti neque remediis parent: Adventitiæ sæpius curabiles sunt. Vtræque quando leuiores raro quidem, si verò immodicæ nunquam sæcunditatem comitantur. Hæ dignoscuntur, si suffitus aromatum ad pudendum submissi aut pessarij odorati in ceruicem penitus inserti odor nares mulieris non feriat: nam aerea odoris substantia à sicca absumitur, à calida digeritur, ab humida obruitur, à frigida extinguitur (aphor. 55. lib. 5.) Simples sæpius euadunt compo-

ta, & solitaria in humores degenerant. Sympathica denique totius corporis vel singulorū viscerum insalubrem intemperiem consequuntur.

Præterea Hippocrati uterus frigidus densusque non concipit, tum quod frigore insitum seminis calorem & spiritum extinguat, à quo semen ipsum fermentari distrahi cogique in animal nouū debet; tum quod præ densitate substantiæ suæ & acetabulorum angustia, læuitas oriatur, cui semen & secundæ adhærescere non possunt, neque alimentum & sanguis crassior ad foetum transfluere, ideoque aliquot post coitum horis diebusve liquefscens semē diffluit.

Uterus calidus non concipit, vel quod calidam & spirituosam seminis substantiam attenuando resoluat: vel quod congruente mensium cōmēatu retentum semen destituat.

Uterus ficcus non concipit, quod allectum & reconditum semen inedia mensiumq; penuria tabefaciat.

Humidus denique non concipit, vel quod excrementis quibus refertus est, semen corrumpat & extinguat: vel quod mollietate & lubricitate sua, semen aut secundas non cohibeat, sed paulò post liquidum aquosumque reuomat. Hæc Hipp. prognostica de immodicis intemperiebus, audienda sunt tum simplicibus, tum compositis: ad has enim simplicium prognostica transferri facillimè possunt.

Prognostica sterilitatis ex parte mulierum hæc sunt. Sterilitas mulierum frequentior quam virorum est: ob plura earum excrementa, ex frigidiori intemperie, habitu densiori, vitæque magis desidiofa. Obesitas habitus muliebris, sterilitatem accersit, vel abdo-

abdominis & faginæ mole tam valde oppresso vteri interno osculo vt semen virile non admittat: teste Hippoc. in Aphor. & lib. de acre loc. & aquis de Scythicis mulieribus: vel seminis substantia & sanguinis redundantia in pulpam corporis faciente, teste Aristot. I. de gen. animalium. Vel certè quod mas aptè coniungi nequeat. Habitus tenuitas accidentaria & ex morbo prægresso sterilitatem inferre solet: ob seminis menstruique penuriam. Sicuti eadem natiua, ob eandem causam & quia virile ab æstuoso vtero digeritur: & à frigido restinguitur.

Proceritas corporis muliebris fœcunditati officit: quod seminis mensiumque materia in eius alitionem abeat, sintque lumbi promissi & debiliores.

Breuitas corporis, lumbi astricti, ab aduersas causas fœcunditatem iuuant. Color fuscus magis quam albus, aut rubicundus, aut flauescens fœcunditatem maturat. Steriles denique magis valetudinariæ: sed tamen viuaciores sunt habituque asperiori. Fœcundæ contra salubriores quidem excrementis in puerperio per lochia repurgatis: nisi graviditatis tempore sæpius insalubres sint oppresso à suppressis mensibus calore (vnde pica, malacia &c.) Sicuti eodem per partus dolores & vacuationes copiosas dissoluto vitæ spatium contrahitur. Sterilitas mutatione ætatis aut coniugij aliquando exolescit.

Desperata sterilitatis curatio, vt eius quæ ab intemperie immodica & natiua est, aut à cancro, vlcere vastaque aliqua cicatrice, prorsus omittatur. Quæ ab eadem intemperie modica est, suscipiatur: prædicta tamen curationis difficultate & tarditate,

ne medici aut perfidia aut ignorantia mulierculæ suspecta sit.

Ultimum prognosticum est, an conceptum liceat prohibere, aut eundem deturbare: incidere enim aiunt aliquando iunioribus scēminis, aut valetudinariis, imbecillitatem tantam, aut adultioribus etiam vteri angustiam prauamque conformationem: vt si hæreat crescātque conceptus, de funesto abortu periclitari mulierculæ istæ videantur. Itaque Hippocratem etiam lib. de natura pueri conceptus eiectionem per grauiores saltus suasisse. Hippocrati subscripsisse Aetium lib. 16. cap. eod. & Auicenn. tertia tertij tractatus secundi cap. 18. Contra verò conceptum deturbandum non esse Hippocratem in suo iureiurando edixisse constat: rationem quoque iidem dictant, quod scilicet à medicamentis violentissimis cum fœtu fœta grauiter concutiatur, & impiam esse necem non solum eius qui actū, sed potentia tantū homo sit. Quæstionis solutio ex Arist. lib. polit. ca. 16. excipi potest scribente ex veterum legibus impune licuisse fœtum nondum animatum præcipitare. Talem autem ante septimū diem Hippocrates iudicauit lib. de natura pueri: cui Democritus, Aetius, Auicennas assensu sunt. Præstet tamen puellas immaturas, aut valetudinarias & imbecilles, aut vtero infeliciter conformato à nuptiis arcere: aut certè nuptas à conceptu prohibere: tum diætā parca & ærumnosa, sanguini seminiq̃e cumulando aduersa: tum seminis sui eiectionem per coitum accelerando, tardandove: tum clunes agitando retractandoque in ipso coitu: tum denique vsu vnguentorum ciborumve semen digerentium,

vt

vt olei iuniperini circa regionem vteri, caphuræ, aceti, aquæ vite, semin. viticis & aliorum.

*Methodus curatiua generalis omnium
intemperierum vteri.*

VT sanitas cōseruationem per similia, sic morbus expulsionem sui per contraria indicat, Alio hæc curatio dicitur tribus omnino rebus absoluta: Genere remedij contrario, magnitudine remedij & vsu. Genus quidem remedij alterans ab intemperie indicatur contraria. Intemperiei differentia, remedij contrarij diuersas species indicant. Nudæ enim & solitaria: alterans tantum. Humorales, vacuans simul & alterans indicant. Porro ex nudis, simplices: simplicia, vt calidæ, frigida tantum: frigidæ calida indicant.

Humorales vt dictum est remediorum genera duo indicant: vnum vacuantium humores vitiosos, alterum alterantium intemperies relictas à vacuatis humoribus. Humorū vitia cum duo sint, vacuantium totidem genera indicantur. Plethora enim phlebotomiam: cacochymia, purgationem: Vtraque mixta phlebotomiam & purgationem indicat. Atque hætenus in intemperiebus curandis, tam solitariis quam humoralibus exposita est prima indicatio curatiua quæ generis est cōtrarij remediorū.

Altera indicatio curatiua est remediorum efficaciæ & magnitudinis ab affectu suppeditata, cui profligando remedium par esse debet. Sic vacuantium efficacia per se ab humoris copia indicatur: & per accidens à virium robore & ætate. Itaque vniuersa subitæque plethora vrgen-

tis vacuatio, per phlebotomiam copiosam & ad animi deliquium indicatur, viribus integris. At iisdem debilitatis, partita phlebotomia & modica, eoque intervallo repetita quo vires congruo victu reficiantur, eligenda est. Sic exuberantis caco-chymiae vniuersa purgatio & copiosa indicatur si vires tolerant humorque sit sequax & profluens. Alias modica eadē & in plures distributa vices, quarū intervallis vires refocillantur, præstat: & vt humor contumax, crassus, lentus & durus qualis est pituitosus & melancholicus, præparetur & percoquatur. *Ἰντερπαύσις* hæc curationis species vocatur.

Alterantium quoque magnitudo proprie indicatur ab intemperiei magnitudine, vt à leniori primus, à mediocri secundus, à vehementi tertius, (tot enim sunt salutarium remediorum gradus) quartus autē venenorum est & venenatorū: sed per accidens indicatur à partis alterandę & laborantis situ, substantia, actione & sensu. Quæ enim remotior, durior stupidiórque est, alterantis remedij vim deprimit. Itaque eius vsurpatio in plures dies mensēsque producenda est: vt diuturnitate vsus, gradus depressio suppleatur. Vbi tamen intemperies aliqua immodica est, remedio depressiori sed diutius continuato, potius quàm æquali, præsertim frigido oppugnanda est: quoniam alteratio vehemens & repentina, sicuti & vacuatio, naturæ molesta est, teste Hippocrate.

Tertia indicatio curatiua est remediorum ab intemperie eiusque causis indicatorum, tam vacuantium, quàm alterantium congruus vsus: tempore, loco, ordine & consistentia definitus.

Tem-

Tempus quoddam vniuersale est, alterum particulare. Illud propriè à præsentia affectus tollendi indicatur: Et per accidens à partibus anni temperatissimis vere & autumno coindicatur: ab æstate & hyeme contraindicatur: (quam vrgenti morbo nulla pars subtrahenda est.) Particulare spectat diem & horam, & indicatur à motu morbi & statu corporis: accessiones enim, remediorum vsum contraindiciant: sicuti & recens assumptus cibus.

Ordo diuerforum remediorum indicatur ab affectuum plurium successionis ordine, vt præcedat vacuatio humorum vitiosorum intemperiem fouentium, deinde vsurpentur alterantia intemperiem relictam. Inter vacuantia phlebotomia prior sit purgatione, illaque in cubito vniuersalis, particularis in saphena. Item alteratio humorumque coctio, purgationem antecedit, tam vniuersalem quam particularem: alterantium simplicem intemperiem, nullus ordo aut vicissitudo indicatur cum eorum genus sit vnicum.

Locus assumendorum remediorum tam vacuantium, quàm alterantium: tam externorum, quam internorum: à conformatione partis laborantis situmque indicatur: vt ei remedia quàm proximè apponantur, aut in eam per commodos & directos meatus transmittantur, viribus quàm minimis fractis & debilitatis.

Consistentia denique tum à situ partis indicatur, tum per accidens à natura ægri & consuetudine. Itaque in vacuantium genere pilularum forma ob diutinam in ventriculo moram è longiori

parte attrahunt. Sicuti media & liquida potio à viciniore. Item alterantium siue sumendorum, siue adinouendorum maior est penetratio & ad distantiore partes.

Methodus particularis curatiua intemperierum vteri.

Intemperierum vteri frequentissima est frigida humidâque & humoralis, siue communis toti corpori fit, siue vtero propria: ob similem mulierum salubrem temperiem: ex qua in insalubrem facilis lapsus est; ob earum intemperantiam & desubam vnde excrementa expullulant.

Curationis instrumentum primum est Diæta magis minùsve calida & sicca pro intemperiei frigida gradu. Constet igitur aere vel temperato vel paulo calidiori, qualis est vere, autumno & ineunte æstate, eoque æquilonari potius, quàm austrino, vigiliis & laboribus animique contentionibus maioribus. Cibis euchymis quidem & eupeptis, sed calidioribus vt pane anisato, carnibus recentibus sapius assatis, rarissimè elixatis idque cum herbis calidis siccis & odoratis vt eruca, nasturtio, scenic. hyssopo sampso saluia, quarum tamen iure abstineat femina, tantumque imbutum eo panem esitet, idque insperso puluere cinnamomi, fructibus siccis vt passulis, nucleis pineis, dactylis caricis auellanis & amygdalis tostis, nucibus iuglandibus conditis, cortice citri vel aurantij. Et post pastus seminibus
condi-

conditis coriandri præparati, anisi & fœnic. vel puluere stomachico quem digestiuum vocant.

Acetosa & acetata omnia fugiantur, hæc enim vtero exanguis & membranoso, penetrabili acrique suo frigore infensa sunt, & quidem multo magis quam ventriculo perinde nervoso magisque sentienti & obuius, vel ob eius assuetudinem, vel ob mucosi humoris tunicarum internum munimentum, aciditatem aut temperans, aut prohibens eius immediatum appulsus.

Potus sit vini rubri generosi modicè diluti.

℞. crustæ panis tribus aut quatuor vicibus tostæ & totidem vicibus irroratæ aquæ vitæ ꝑ̄ sem. coriandr. præparati & anis. an. ꝑ̄ ij pulu. electuar. arom. rosat. & interior. tunicæ ventriculi gallinarum an. ꝑ̄ quatuor, fragmentorum sapphyri hyacinthi rasur. eboris & cornu ceruini an. ꝑ̄ nucis muscat. & macis an. ꝑ̄ ꝑ̄ moschi opt. ꝑ̄ ꝑ̄ vel gr. vj (si non obnoxia sit muliercula hysterice suffocationibus) fiat puluis, capiat cochlear vnum à pastu.

Alterum eiusdem curationis instrumentum est pharminia purgatione constans primò vniuersali, deinde particulari vteri. Illi quidem id est vniuersali præparatio duplex præmittenda est, corporis & humoris purgandi. Prior illa rursus duplex est: tum ex clystere molli tergente & phlegmagogo: tum ex purgatione leniori, minoratiuam vocant. Vtraque indicatur à sede impedimentorum purgationis scilicet sæcum duriorum in intestinis & crudorum humorum in ventriculo venisque mesentericis,

quibus expeditis fiat corpus fluxile.

℞. rad. altheæ & enulæ cam. an. ʒ ij fol. betæ
mercur. pariet. matricar. & prassij an. m. j. sem. fœ-
nugr. & cumini an. ʒ β flor. chamæmel. cētaur. min.
& cicerum rub. an. p. j. coquantur & in colat. fβ j
vel etiam β dissolue mellis mercur. ʒ ij olei cha-
mæmel. & anethi an. quart. β electar. diacathol.
ʒ j hieræ picræ vel bened. laxat. ʒ β fiat clyster.
iniiciatur mane vel vesperi longè à pastu.

Licet media & solida forma vt & liquida purga-
tionem instituere vt hac varietate naturæ ægrotan-
tium consuetudini & libidini subseruiatur. vt

℞. elect. diacathol. & diaphœnic. an. ʒ β vel
pro diaphœnic. hieræ picræ ʒ ij fiat bolus cum
sacch. detur vel per se, vel cum cochleari & pau-
co syr. capillor. veneris.

℞. mass. pilul. de hiera ʒ j. de agaric. ʒ ij fiât pi-
lul. vj vel vij. capiat hora 3. vel 2. post mediam no-
ctem leui cœna præcedente.

℞. fol. hyssopi, cicerum rub. flor. anhos & bor-
rag. an. p. j. fol. sennæ oriental. mundat. ʒ β sem. a-
nif. ʒ. j. passul. mundat. paria iij. infundantur & co-
quantur secundum artem & in colat. ʒ iij dissolue
elect. diaphœn. ʒ β cinnamom. gr. iij. fiat potio,
detur mane cum custodia horis quatuor ante pran-
dium.

Posterior est præparatio humoris pituitosi, co-
ctionem largius vocant, per oppositas qualitates
primas secundasque vt calidas liccas, incidentes
& tergentes (frigidus enim est crassus & lentus)
idque liquida forma iulepi & apozematis: à situ
distantis humoris in venis indicati, cum sit
forma illa penetrationi apertionique vasorum
obstru-

obstructorum maximè idonea. Huius tamen abortio tadio solidior vt tabellarum vocatarum; vel inedia vt opiatarum expetenti ægrè adhibetur. Idque vel paucioribus diebus: vt tribus aut quatuor, vel pluribus vbi multa crassaque & lenta cacochymia pituitosa subest: vt

℞. Syr. de quinque rad. de hyssop. vel de artemisia & de prass. an. ℥ij aquarum melissæ hyssop. & artemis. an. ℥ iij cinnamoni ꝑ iij fiat iulep: detur in tribus dosibus matutinis.

℞. rad. eryngij rubiæ maioris, valerian. enulæ camp. an. ℥ ij cort. pomi citrij sicci ℥ β folior. ceterach. scabios. agrim. & summitat. absinth. pont. si qua obstructi hepatis & lienis coniectura sit; summitat. hyssop. origani, calament. & artemisiæ an. m. j. cicer. rub. flor. genistæ tamarisci & anthos an. p. j. sem. apij petros. & carui an. ℥ ij coquantur omnia suo ordine in hydromelite & in colat. ℥ β dissolue mellis optimi despumati, vel si displiceat mel, panis sacchi. ℥ iij cinnamom. ℥ ij fiat apozema clarificatum pro quatuor dosibus matutinis. Quod si multa sit cacochymia tum vtiliter iterabitur admixtis purgantibus medicamentis: vt sennæ mundatæ ℥ iij polypod. querni & semin. carthami. an. ℥ j β agarici trochisc. & hermodactyl. an. ℥ β zingiber. ꝑ iij passul. purgatar. paribus xv.

℞. Tabell. electar. aromat. rosat. vel diagalang. ℥ iij capiat vnā pōdere ℥ iij mane & vesperti horis duabus aut tribus ante pastus superbibendo parum aquæ melissæ vel vini rubelli hac aqua diluti. Sic præparatus humor purgatione eget vt putat ali:

℞. elect. indi maioris vel diacarthami ꝑ β dissolue in vltima dosi præscripti apozematis laxatiui. Alias in infusione fol. fennæ ꝑ β & agaric. ꝑ j in vino albo & aqua melissæ. Pilularum vis potionem illam (si fortasse ingrata sit) supplebit.

℞. mass. pilul. aggregat. maiorum vel sine quibus & foetidat. an. ꝑ β castorei gran. iij cum aqua artemissæ fiant pilul. vij. deauratæ quas deuoret post primum somnum cum custodia. Postridie purgationis roboretur ventriculus conditura cort. citri, vel nucis iuglandis vnus, vel bolo ex theriacæ veteris ꝑvj. conseru. florum saluiæ ꝑ j cum puluere ducis. detur mane superbibendo parum vini generosi aqua melissæ diluti.

Quod si quando fœmina in vomitionem prona sit latèque pectore & ceruice breui, citari vtiliter loco deiectionis, vomitio poterit: vt ab vteri sede in contrariam humor auocetur.

℞. rad. ari, ꝑ ij sem. raphan. attripl. & agar. trochiscati an. ꝑ. j. folior. hyssopi m. j. coquantur in colat. tb β dissolue oxymel. scillit. ꝑ ij detur manè tepide, & post dimidiam vel integram horam prouocetur vomitus vel penna vel digito in fauces inserto.

Ab hac intemperiei frigidæ humidæque specie phlebotomia remouenda est, nisi fortasse suppressis ob acetabulorum vteri obstructionem mensibus plethora cacochyma iuncta sit, quæ postridie minorationis præcisa cubiti dextri vena basilica, minuenda erit virésque oppressi caloris leuandæ.

Vni-

Vniuersali purgationi particularis vacuatio vteri mox subiungenda est per clysteres vterinos & pessulos purgantes, quibus balnea fots vnguenta & vaporations præponantur ad mucosi humoris crassarumq; vteri sordium præparationem: hæc vero consent medicamentis alterantibus, calefacientibus, siccantibus, tergentibus & attenuantibus, liquidæque forma penetrationis promptioris altiorisque causa. vt

℞. rad. Brioniz, cucum. agrest. enulæ cathp. aristol. rot. & iridis hortens. an. ℥ j folior. mercurial. anagallid. purpureæ chelidon. maioris scabios. pulegij, conisæ maior. nepetæ melissæ artemissæ matricariæ, summit. sabinæ, lauri hederæ & lauend. an. m. ij. sem. foenugr. ℥ j flor. chamæmeli meliloti centaur. min. an. p. ij. coquantur in aquâ fontanâ vel fluuiatili & colentur fiatque balneum quod ingrediatur mulier mento, vel vmbilicô tenus. (Ita indicante cacochymiz sede vel promiscuè in toto corpore, vel priuatim in vtero) per triduum mane & vesperi ante pastus, maneatur in illo sine sudore cum adsit alterationis solius & coctionis non vacuationis externæ necessitas.

In introitu & exitu balnei sumat electarij calidi vt diamargarit. de gemmis, diambraz tabellam vnâ pondere ʒ ij vel iij superbibendo parum vini rubelli aqua melissæ diluti.

Quod si balnei egram pigeat, fots ex eodem decocto toti epigastricæ & perinæ adhibeatur eodem spatio & hora. Et à fots vnguentum eidem regioni applicetur. vt

℞. olei laurini & costini an. ℥ ij olei muscatell. & de spica an. ℥ β ladanī & mastichis an. ℥ ij spicæ nard. calami aromat. schœnanthi & folij an. ℥ j cinnamom. caryophyl. & croci an. ℥ β galliæ muscat ꝑ ij ceræ albæ parum, fiat vnguentum.

Eodem tempore à balneo, fotuve pessarium purgans in ceruicem vteri altissimè inseratur mucī extrahendi causa è sinu vteri.

℞. electar. indi maior. ℥ quatuor, elect. diapheæn. ℥ ij myrrhæ ℥ β gummi opopanacis & ammon. radic. aristoloch. rot. & irid. flor an. ℥ ij pulpe colocynthid. ꝑ iij cum succo mercurial. conecorporentur, fiatque opiata de qua fingantur pessuli digitali magnitudine cum serico rubro vel linteolo vteri & pauco cottone.

At vero si balnea & fatus fortasse displiceant, vaporem decocti eiusdem ex olla subiectis carbonibus feruente per siphonem ferreum ligneumve potius lauem & oblongum ex tubulo plumbeo vel ferreo prominentem per pudendum penitus excipiat: moxque ab excepto vapore eiusdem decocti liquorem per metrenchyten & vterinum clysterem admittat capite supino, depressis humeris & natibus sublimioribus diductisque cruribus, eumque liquorem per horam contineat: ita tamen vt singulis liquoris infusionibus electarij alicuius phlegmagogi portiuncula dissoluatur vt hieræ picræ, vel benedictæ laxatiuæ, vel indi maioris ℥ β vel mellis mercuriati ℥ j. Neque tum (excluso etiam liquore) pessarium superius negligendum est.

His omnibus decoctis quacunque formula vsurpandis,

pandis, siue balnei, siue fatus, siue vaporationis, siue iniectionis, medicatæ aquæ & naturalia balnea nitrosa sulphurosa, bituminosa, chalcantiosa, aluminosa: fouendo, infundendo, balneando & potando præsent, Vt pote magis tergentia siccantia & absorbentia serosos humores, partiûmque obscenarum luxuriantem mollitiem cohibentia & coarctantia.

A purgatione eiusmodi generali & particulari, si conceptus prima mensium periodo non responderit: (inchoanda enim est medicatio verno & autumnali tempore tribus aut quatuor à consueto mensium profluvio diebus) tum demum habitus totus (quo nomine partes non solum externæ sed & internæ continentur) aquosis & tenuibus excrementis liberandus est medicamentis diaphoreticis & sudores mouentibus. Ea autem sunt tenuis calidæque substantiæ, vt attenuando & detergendo vias obstructas aperiant & humores in habitum expediant. Talia sunt, scobes ligni guaiacini, radix zarzæ parillæ, radix chiuræ & lignum Sassafras: quibus in hac intemperiei frigidæ humidæque specie lignum cæteris præferendum est: expediendis viscerum obstructionibus ob lentorem humorum & crassitiem, cum calidum ficcûmque detergens & attenuans multò magis sit, reliquis duabus radicibus & ligno Sassafras. Sæpe tamen muliebris mollities radicum decoctionis v-su blandiri sibi medicum cogit.

*Diaphoreticæ potionis efficacioris
exemplum.*

℞. scobis ligni guaiacini nigerrimi ℥b β infun-
m 3

de per xxiiij. horarum spatium in lb. vj. aquæ font. tepidæ, coquantur ad mediæ partis consumptionem addendo sub finem coctionis semin. anisi, cardui benedicti & liquirit. an. \mathfrak{z} ij postremo colentur & reponatur colatura ad vsum in ampullam vitream de qua singulis matutinis \mathfrak{z} vj. vij. vel viij bibantur calidè & pluribus vëstibus corpus tegendo.

℞. Residentiam & coquatur per sex horas in libris xv. aquæ ad tertiæ partis consumptionem tum colentur bis aut ter per cribrum Hippocraticum. Colatura recondatur in ampullam vitream qua vinum tenue & generosum diluatur sitis tempore. Alias si dolores quidam vinum contraindicent, eadem colatura cinnamomo & saccharo conditur ad gratiam saporis.

Secundum exemplum.

℞. rad. zarzæ parillæ electæ & præparatæ \mathfrak{z} iiij, macerentur in lb iiij aquæ font. per xij horas, deinde coquantur ad medias & colentur, vtatur vt supra quotidie mane. Ex magmate in lb. x. aquæ cocto ad lb ij consumptionem & declarato per duplicem aut triplicem colaturam, parabitur liquor diluendo vino idoneus vel saccharo & cinnamomo condiendus ad potionis vsum.

Tertium exemplum.

℞. rad. chiuæ per orbiculos tenuissimos sectæ \mathfrak{z} ij infunde in lb iiij aquæ fontanæ tepidæ per diem naturalem, deinde coquantur ad medias & colentur &

& hac colatura vtatur ad ζ vj vel viij calidè. Ex secundo eiusdem decocto in lb x aquæ ad tertias diluatur vinum, vel ipsum cinnamomo & saccharo conditur. Vtriusque huius radicis decoctum in intemperie calida aut vlceribus internis est conuenientius; quod calore temperatum sit: Sicuti Guaiacinum in frigidis crassisque humoribus efficacius.

Toto sudoris spatio quod erit plurium vel pauciorum dierum (vt xv. xx. aut xxv. pro caco-chymix & virium modo.) Si quando ignauior alius fuerit, clystere tergente antea præscripto proritetur: purgatio quoque in medio & fine sudoris repetenda est, vt crassior pituita quæ medicamenti attenuationem effugit nec in sudores solui potuit, sensim educatur. Priuatim etiam ex vtero eiusdem caco-chymix reliquix formulis ante præscriptis, fotuum, pessarium & clysterum euocandæ quotidie: donec nulla omnino illuies inde stillarit nullusque circa pudendum mador supersit.

Diæta denique euchyma & eupepta per sudores tenuior humorique vitioso contraria instituitur ex pane albo bene fermentato cocto & anisato: aut etiam frigidioribus humoribus viribusque; vegetioribus, biscocto: Ex carnibus animalculorum tostis, vt hædorum vitulorum gallinaceorum omnium & auicularum montanarum nemoralium campestrium: Et fructibus siccis, vt passulis exacinatedis, nucleis pini recentibus, aut lotis, caricis, auellanis & amygdalis tostis: Et initio pastus prunis damascenis elixatis & saccharatis. Et in

sine pastus conditura corticis citri & seminis anisi, fœniculi, coriandri præparati, aut puluere vocato digestiuo.

℞. Semin. anisi & coriand. præparati an. ʒ ij pulueris elect. aromat. rosat. ʒ j nucis musc. & naccis an. ʒ β cinnamomi interioris ʒ ij panis sacch. pondus duplū, capiat cochlear vnum post singulos pastus.

Finitis vacationibus omnibus primo & secundo mense tum demum intemperiei relictæ nudæ delendæ incumbendum est : siue communi, siue prinatæ etiam, idque per alterantia calida siccâque: tam sumenda, quàm admouenda immittendâque. Sumendis autem quacunque consistentia remediis permiscenda sunt, tum semen augmentia, quædam, tum conceptum etiam iuuantia. Illius generis sunt alimenta & medicamenta calida, humida & flatuosa vt cibi quidem sint euchyimi & alimentosi: cuiusmodi sunt bulbi, cardui, caules, cicera, fabæ virides, nuclei pinei, pistacia, dactyli, caricæ, auellana, amygdalæ, eruca, nasturtium & smirnum, mentha, eaque viridia.

Medicamenta sunt vt satyri & eryngij radix, scincus, semen lini & erucæ, allium, cepa cocta: huius generis quædam conceptum iuuant, quædam à proprietate & tota substantia: alia astringendo, retentricem facultatem vteri roborando qualia sunt puluis testiculorum verris, priapi tauri, coagulum leporis & cuiuslibet animalis, vulua leporis, rasura eboris, charabe & dexter testiculus mustellæ.

Admouenda quoque immittendâq; sunt nō solū
calfa-

calfacientia & siccantia: sed modicè etiam astringentia vt solutam laxamque vligine nimia vteri substantiam: vuluam nimis hiantem, & vacillantem ceruicem roborent & coerceant vt exceptum semen constanter retineat.

Hæc quoque curatio in tertiū ferè mensem differtur quartūq; vel vj. à 2. mēsiū periodo, cui præmittatur corporis præparatio per clysterem tergētem & purgationem phlegmagogam quales sunt hæc pilulæ.

℞. aloes hepaticæ, bdellij, pulpæ colocynthid. agarici trochisc. hermodactylorum turbith & diacrydij an. partes æquales vt ʒ ij cum syr. de artemisia, fiat massa omnibus simul puluerisatis, de cuius massæ ʒ j fiant pilulæ vj deauratæ quæ deuorentur mox à primo somno, idque præcedente cœna breui & parca. vel

℞. gummi ammoniaci & pulueris hieræ an. ʒ ij agaric. trochisc. hermodactyl. diacryd. & salis gemmæ an. ʒ j cum terebinth. fiat massa de cuius ʒ j fiantur pilulæ vj. pariter deglutiendæ. Inter assumenda quoque hæc ex vsu erunt.

℞. mithridat. veteris radic. eryngij & satyrionis conditar. an. ʒ ij cort. citri conditi, zinziberis virid. an. ʒ j myrobalanorum condit. ʒ β pulpæ nucis indicæ, pistaciorum & nucleorum pini an. ʒ j sem. napi, rapi, dauci hortensis erucæ, fraxini, lumborum scincorum, testiculorum verris siccator. priapi tauri, coaguli leporis, & scobis eboris an. ʒ ij pulueris elect. diamarg. calid. diamoschi dulcis & diambrae an. ʒ j moschi opt. ʒ β ambrae griseæ gr. vj cum syr. conseruationis myrobalanorum vel nucis mosch. fiat electarium molle deuorandum singulis matuti-

nis ad $\text{℥} \text{ss}$ superbibēdo parū vini Hippocratici. Vel
 \mathcal{R} . cinnamomi, cardamomi caryophyllorū an. $\text{℥} \text{ss}$
 zinziberis, piperis longi rad. bistort. & pæoniæ pri-
 pi tauri testiculorum verris, stincorum, galangæ,
 cubebæ nucis musc. rasur. eboris an. $\text{℥} \text{ij}$ croci $\text{℥} \text{j}$
 moschi optimi $\text{℥} \text{ss}$ fiat puluis, excipiat saccha-
 ro aqua melissæ dissoluto fiāntque tabellæ ponde-
 ris $\text{℥} \text{iiij}$ vtatur vt dictum est. Item,

\mathcal{R} . sol. artemisiæ siccorum rad. bistortæ & nucis
 musc. an. $\text{℥} \text{ss}$ croci $\text{℥} \text{j}$ ambræ griseæ gr. iiij moschi
 optimi gr. vj . excipiantur pariter & fiant tabellæ.

Exemplum pulueris hoc erit.

\mathcal{R} . zinziberis, piperis longi zedoariæ, galangæ ca-
 ryophyll. rad. bistortæ & ras. eboris an. $\text{℥} \text{ij}$ semin.
 pastinacæ, linguæ auis, cardamomi maior. cinnamo-
 mi, & coaguli leporis an. $\text{℥} \text{j}$ ss cubebæ ligni a-
 loes & sem. feseleos an. $\text{℥} \text{j}$ moschi gr. vj . ambræ
 gris. gr. 4. panis sacchari pondus duplum vel tri-
 plum, fiat puluis de quo capiat cochlear vnum su-
 perbibendo parum vini Hippocratici vel pigmen-
 ti melle & cardamomo constantis loco sacchari &
 cinnamomi ex quo Hippocraticum dictum. Simile
 aliud euadat medicatum ex hoc puluere cum vino
 rubello.

Eodem sumendorum tempore topica celebran-
 tur vt balneum semicupium vel infessus per tridui
 spatium manè & vesperi, ex radic. bistortæ, pæoniæ,
 enulæ campanæ foliis artemisiæ, nepitæ equiseti
 verbasci albi, hormini maior. ocymi tanacetii abro-
 tani saluæ polij montani, summitatum oleastri lau-
 ri, rorismarini lauendulæ: florum centaurij minor.
 saluæ & balaustiorum. Decoquantur aqua cister-
 næ,

næ, cuius colaturæ, sæcis vini albi pars vj. & aluminis ℥j permisceatur. In exitu vel trypheræ magnæ sine opio ʒj vel electarij mollis præscripta dosi cum paucio vino medicato exhibeatur, moxque in lecto pessarium roborans vterum eiusque ceruicem indatur.

Pessarium exemplum.

℞. ladani masticeis santali citrini. balaustiorum nucum cupressi, gallarum viridium styracis calamitæ; calami aromat. cinnamomi, nucis musc. macis an. ʒ ij aliptæ vel galliæ musc. ʒ iiij caryophyll. ʒ β ziuetæ ʒ j moschi optimi gr. vj. fiat pulvis, cuius pars media excipiatur melle anthosato instar opiatæ de qua formentur pessuli digitali magnitudine cum paucio gossipio & serico Kermesino filo pendente. reliqua pulueris pars inspergatur paucio gossipio moschato, quod serico rubro inuoluatur, fiantque pessuli ex vino rubro & calente in vuluam intro mittendi. Serici penuriam supplebit linteolum vetus & lene. Simile est valdeque efficax ex odoratis & modicè astringentibus conciannatum pessarium.

℞. ligni aloes santali citrini, granorum alker mes, calami aromat. schœnāthos masticeis ladani & styracis calamit. myrrhæ, sem. seseleos, iridis florentiæ & præoniæ an. ʒ ij balaust. nucum cupressi & gallarum an. ʒ j β ziuetæ ʒ β cum oleo laurino vel castano fiat vnguentum de quo formetur pessarium, vt dictum est.

Balnei si forte ægram pigeat (sæpe enim remedium non quidem generis aut facultatis, sed formæ varietas leuando longioris curationis tædio, profuit) fatus ex eodem decocto, iisdem horis: sed

paulo pluribus, vt vj. vel viij. continuis diebus regioni vteri per splenia inducantur, móxque à fotu indendum vt supra est pessarium, vel cataplasma ex magmate contuso applicandū, vel linimentum ex oleo laurino costino de spica cum pauca cera: vel vnguentum ex iisdem oleis addendo puluerum præscriptorum trientem, & ceræ momentum, vel emplastrum pro matrice aut simile quale est hoc.

℞. massæ emplastri ceronei ℥ iiij rad. cyperei calami aromatici folij an. ʒ ij ladani styracis calamit. & benioini an. ʒ ss galliæ vel aliptæ musc. ʒ j cum oleo laurino, fiat emplastrum super alutam bene rasam applicandum hypogastrio.

Fotui succedat suffitus iisdem horis in reliquum mensem siue humidus sit ex eodem decocto balnei (vaporatio dicitur) vel ficcus, non intermissis interrim fumendis & admouendis aut immittendis etiam post suffitum vt pessariis.

Exemplum suffitus tale erit.

℞. rad. bistortæ, cort. thuris, mastichis & rad. cyperei & myrrhæ, an. ʒ ij cort. citri nucis musc. macis, balaust. gallarum an. ʒ j β croci caryophyllorum ladani & sem. lolij an. ʒ j trochiscorum aliptæ vel galliæ musc. ʒ iiij. fiat puluis de quo cum succo radic. pzonix vel artemisiæ fiant trochisci ponderis ʒ j quorum vapor in introitu & exitu lecti excipiat ex olla carbonibus accensis referta, vel per tubulū penitus in vuluam receptum, vel per arundinem, perforato ollæ operculo insertam.

Dropax denique & sinapismus lumbis & feminibus ex Pauli consilio applicentur: quibus scilicet spiritus sanguis que in vtero vehementius protrahatur.

tur. Atque ita quidem toto mensis spatio uterus recalescat & foecundetur: paucis tamen ante instantem tertiam mensium periodum diebus, ab omnibus remediis foris intusque abstinendum, ne inchoatus sanguinis ad uterum motus auocetur, sicuti sequentibus etiam mensibus si conceptus deprehendatur. Aliis omnium roborantium internorum externorumque remediorum usus in proximum mensem & complures alios, atque adeo in annum integrum aut duos etiam reuocabitur. Omnis enim quæ diutius inualuit & radicem fixit intemperies, perpetua etiam vnius anni medicatione, ægerrimè percuratur.

Adhuc methodus curatiua vteri intemperiei è totius corporis sympathia enarrata est, eadem intemperiei idiopathicæ curatio omnino est, toto corpore per eius sympathiam laborante, multisque cohibiti menstrui excrementis oppressor: itaque post minorationem plethora inde nata per phlebotomiã minuatur: sicuti particularis vteri post vniuersalem & particularem vacuationem deriuanda est per incisas poplitis vel malleoli venas.

Nuda denique intemperies vteri vt quæ natua aut recens ab externa causa contracta, alteratione simplici & contraria eget vt calfactione, qua etiam densitas substantiæ vteri relaxetur & acetabulorum angustia diducantur.

Calida intemperies Vteri toti quidem corpori eiusque principibus partibus fere communis est, eiusque signa sunt præter salacitatem, habitus tenuitas, ingenium velox, mores iracundi, pauci menses & ob libidinem inordinati.

Adscititia autem sæpius est sympathica, tumque

intemperati & calidioris visceris alicuius signa comitantur: cum substantia ipsius vteri membranæ sit, naturæque sua frigida, sitque ex transmissione, vel receptione potius excrementorum alienorum.

Idiopathica vero quæque à cōmuni corporis viscerumque temperie aliena, rarior est ferèque externa calfaciente causâ oriunda vt vnguentis, suffitibus &c.

Nulla sane simplex aut expers humoris est, siue insita, siue aduentitia, siue idiopathica, siue sympathica, si præsertim paulo diutius inualuerit. Itaque calidam hanc vteri intemperiem non simplicem Pauli Aetij more: sed siccam quoque: neque nudam, sed biliosis excrementis comitatam: neque propriam, sed vt toti corpori communem, siue insitâ, siue aduentitiam curari oportet.

Victus ergo modicè refrigeret humectetque idque tardius: ne insigni frigiditate vtero obsit, cōstet exēpli gratia ex vini portione oligophori, tenuis albi & aquosi: ex carnibus recentibus agnorum, hœdorum, vtulorum, gallinarum, iuenculorum, pullorum: ex oleribus vt borragine buglossa endiuiâ lactuca, portulaca, atriplice, oxalide, tum in acetariis, tum in iusculis: ex piscibus recentibus & saxatilibus: ex fructibus horæis ex cōdimentis acidis, vt succo mali aurantij, omphacij: vigiliarum denique, laboris, inædiæ, æstus, iracundiæ & eurarum fuga.

Alterum curationis instrumentum est Pharmacia, remediis constans alterantibus & vacuantibus; hæc indicantur duplicia, phlebotomia & purgatio: Illa quidem rarius tantumque euentilationis non euacuationis gratia vsurpetur: cum tenuitas habi-

tus adfit, paucitas sanguinis & mensium penuria. Hæc(id est purgatio)cholagoga indicatur ab excrementi biliosi exuperantia, cui tamen phlegmatorum purgantium portiuncula permiscenda est: ob mixtam pituitam in muliebri præsertim sexu, natura & victu cruditarum feraci, cæque sit deiectionis, ita indicante sede excrementi purgandi, quod tum in præcordiis circa hepar, tum in maioribus vasis residet. Eorum ordo primus secundusque à duabus primis corporis regionibus indicatur. Sic medulla cassiæ, pulpa tamarindorum sebesten mânia, succus rosarum, aloe, looch de cassia & diaprunum simplex sunt primi cholagogorum ordinis, rhabbarum, catholicum, secundi sunt ordinis, quorum tamen tarditas & imbecillitas acriorum eiusdem generis permixtione pauca indiget vt diaprunis laxatini, electarij de psyllio & de succo rosarum. Dosis denique sit mediocris: nisi humoris indicationem vincat habitus astrictus & intestinorum sensus hebetior. Deiectionis denique est ab utero utilis deriuatio.

Altera purgationis species vomitio est & è primæ secundæq; regionis partibus & utero ipso idonea reuulsio, si modo humoris species motusque naturæ eo tendant, neque eam tempestas frigidior, inassuetudo, ægrotantis pectoris angustia, aut pulmonis aliqua noxa contraindicet. Est autem cienda hora matutina inanisque ventriculo, facile vomenti & assuetæ mulieri: sin minus, pastæ tantum & cœnatæ vel pransæ.

Exemplum purgationis minoratius dictæ.

℞. medullæ cassiæ recens extractæ ad vaporem

foliorum maluz vel \mathfrak{z} j vel \mathfrak{z} j β cum saccharo vel potius cum puluere ducis, fiat bolus, detur hora vna vel duabus ante prandium. . Vel.

\mathcal{R} . pulpæ tamarindorum & sebesten an. \mathfrak{z} β fiat pariter bolus cum saccharo, & detur pariter vel per se vel ex cochleari cum syr. violat. Item,

\mathcal{R} . electar. diacatholic. vel diaprunis simpl. \mathfrak{z} j vel \mathfrak{z} j β fiatque bolus vel potio cum sero caprillo depurato: vel cum decocto hordei & trium florum communium: vel pro delicatioribus cum pauco iusculo pulli, foliis buglossi borrag. endiuiz & acetosæ alterato. Sin intestina sola, puro ventriculo, & duro stercore obsessa sint, ea clystere molli liberanda sunt ante omnia.

Postridie minorationis aperienda vena cubiti, viscerumque æstus temperandus est, sed parcius, sanguis detrahendus ne mensium exigua materia subducatur, siquidem in eiusmodi picrocholo tenuique habitu penuria sanguinis adest.

Exemplum iulepi alterantis & concoquentis bilem.

\mathcal{L} . aquarum endiuiz acetosæ & cichorij an. \mathfrak{z} iij syr. acetosi simpl. oxymel. simpl. oxysacchari simpl. an. \mathfrak{z} ij fantali citrini \mathfrak{z} ij fiat iulepus in tres doses matutinas vel plures (pro cacochymiz pituitosæ mixtæ copia & obstructionum) distribuendus.

Efficacior fiet iulepus ex eadem aquarum dosi & syrupor. acidorum vt de limonibus, de acetositate citri, de granatis acidis si bilis feruidior fuerit, vt inde nausea aut lipothymia ex vellicatione stomachi obrepit. In eundem vsum alterationis & aperitionis apozemata ingratiore quidem, sed tamen efficaciora

ficaciora decerni solent, sicuti efficacissimi ex succis herbarum conuenientium iulepi.

℞. radicū lapathi acuti, acetosæ cichorij an. \mathfrak{z} ij
 foliorū capillorū vener. endiuiz cichorij, ro-
 stri porcini, dentis leonis oxalidis an. m. j. sem. 4.
 frigidorum maiorū contusorū \mathfrak{z} ij hordei in-
 tegri florum violariæ borrag. & cichor. an. p. j. co-
 quantur omnia suo ordine & in colaturæ \mathfrak{lb} j β dis-
 solue sacchari ros. q̄rt. j. fantali citrini \mathfrak{z} j fiat apoze-
 ma clarificatum pro tribus dosibus matutinis. In
 quo si aciditas ex vsu esse videatur ob acrimoniā
 bilis & lipothymiam ægri, in fine coctionis addan-
 tur succi mali limonij \mathfrak{z} ij vel finita coctione dis-
 soluantur syrap. de limonib. aut consimilis \mathfrak{z} iij
 vel iiij.

Efficacissimi denique iulepi fient ex earundem herbarum vt cichorij acetosæ endiuiz expressis suc-
 cis & per quietem aut ebullitionē & despumatio-
 nē depuratis, admixtōque saccharo & cinnamomo.

Sic vbi præparata, mitigata, deterfāque bilis viæq;
 expeditæ fuerint, tum demum illa ex venis & visce-
 ribus purgatione commodè extrahetur.

℞. rhabarbari in aqua endiuiz vel graminis per
 noctem infusi \mathfrak{z} j β agarici trochiscati \mathfrak{z} β spicē nar-
 di \mathfrak{z} j in expressione dissolue diaprunis solutiui \mathfrak{z} β
 syrūpi rosar. laxatiui \mathfrak{z} j fiat potio, detur mane cum
 custodia. Huius electarij vicem suppleat, sed mi-
 nori dosi vt \mathfrak{z} ij vel iij. electarium efficacius de suc-
 co rosarum vel qui sequitur bolus.

℞. electar. diacathol. & diaprunis solut. an. \mathfrak{z} β
 rhabarbari puluerisati & aqua endiu. irrorati donec
 mollescat \mathfrak{z} β vel \mathfrak{z} j fiat bolus cum saccharo & de-
 tur eadem hora cum custodia. vel,

℞. massæ pilular. de agarico & aurearum an. ʒ ss
 diacrydij gr. iiii. cum aqua endiuiz fiant pilulæ vj
 vel vij deauratæ deuorandæ post primum somnum,
 leui cœna præcedente. Pilulæ quia diacrydiatæ &
 colocynthifatæ acriores sunt, ideoque purgandæ
 bili in calida natura, vel febricitante minus aptæ
 sunt.

Vomitoria vacationis exempla.

Vomitio, siquidem ad ipsam omnia con-
 gruunt, citanda est vel leuioribus potionibus
 si bilis tenuior minúsq; pituitæ mixta, aliàs acio-
 ribus, magisq; attenuantibus & detergentibus pi-
 tuitam.

Leuior sit ex succo ʒ ij rad. raphani vel ex ʒ iij
 eiusdem pulueris cum iusculo tenui vel ex aqua te-
 pida in qua olei communis ʒ ij dissolutæ sint.

Acrior & vehementior fiat ex hoc decocto quod
 recipit semin. raphani atriplicis & radic. azari an.
 ʒ ij agarici ʒ j. summitat. hyssopi & satureiæ an. m. j.
 In huius decocti ʒ viij vel x oxymelit. simplicis vel
 scillit. ʒ ij dissoluantur & hæc potio detur tepide.

Expurgata bile tanquã calidam intemperiem fo-
 uente: tum demum calida corporis yterique in-
 temperies alterantibus contrariis expugnanda est
 intus forisque propriis vt topicis & communibus:
 hæc sunt interna quidẽ electaria mollia duræque,
 iulepi, iuscula: Externa balnea & vnctiones, infes-
 sus, vnguenta, fots.

Exemplum electarij mollis.

℞. conferuæ rosar. cichorij & nenupharis an. ʒ ij
 pulueris electar. diamargarit. frigidi & triasantal.
 an.

an. 3 j semin. acetosæ, portul. & lactuc. ras. eboris margaritarum & coralli rubri an. 3 s cum syrupo de nenuphare cogantur omnia in mediam consistentiam. Capiat 3 ij vel iij mane superbibendo parum aquæ acetosæ lactucæ vel nenupharis. Ex eadem omnino materia si loco syrupi ponatur saccharum fiet conditum dictum:

℞. pulueris electar. diatriasantal. 3 s seminis acetosæ portulac. & lactuc. an. 3. j. rasuræ eboris margaritarum & corall. rub. an. 3 s pulueratis puluerabilibus misceantur omnia cum saccharo aquæ acetosæ, vel lactucæ vel rosarum soluto; fiatque electarium solidum tabellatum:

Ex eadem omnino materia, formula fiat remediij interni quod conditum vocatur, hoc solo discrimine, quod in hoc pro syrupo sacchari puluerisati conueniens modus adhibeatur mixtis etiam auri vel argenti 4. aut sex bracteolis. Sicuti electarium durum à molli differt: quod in hoc puluerum quarta pars mellis aut saccharo misceatur, id est tres 3 s vni, 3 ij 3 j adiungantur: in illo 3 j ad 3 j aggregetur.

His electariis ingratoribus fortasse, vtiliter substituatur aut lac asininum aut serum caprillum per cocturam bene repurgatum in cuius tb j per totam noctem foliorum cichorij m. j. sub dio maduerit in quo post colaturam sacchari rosati momentum dissoluatur. Sic succi cichorij destillatione per filtrum purgati & saccharati 3 iij vel vj prosint: vel denique iusculum incoctis lactucæ portulacæ & acetosæ foliis alteratum & per xx dies aut mensem continenter potatum in exitu lecti.

Exemplum balnei refrigerantis.

℞. rad. altheæ lapath. acuti cum suis foliis an. ℥ ij fol. 4. emollientium, cannarum vitium salicis cucumerariæ melonum, cucurbitæ sonchi rostri porcini, dentis leonis, cichorii, betæ, & mercurial. an. m. iij. siue fasciculum j florum trium communium & nenupharis an. p. ij. coquantur in aqua dulci pro balneo quod post colaturam factam ingrediatur mulier mento tenus, vacuo ventriculo mane & vespere tepidè & sine sudore, in eoque maneat per duas horas singulis vicibus & per triduum in vnoquoque mense æstiuo.

℞. vnguenti refrigerantis Gal. 3 vj applicetur subfrigidè toti spinæ hypochondriis & vteri regioni cum momento aceti albi post detersum balnei madorem in lecto, idque multum fricando. Quod si à balneis ægra mulier abhorreat, ex eadem materia fetus concinnetur iisdem horis, moxque à foru vteri, eidem idem vnguentum applicetur. Fotum quoque suppleat tum infessus aut semicupium, aut euaporatio etiam per sellam deiectionariam. His omnibus externis remediis, clyster vterinus ex earundem herbarum decoctis, vel succis vehementer proffit. Atque hæc sit curatio relictæ intemperiei calidæ vteri per contraria alterantia satis exposita: quorum magnitudo intemperiei ipsi spatio potius curationis longioris quam gradu æquiparanda est: cum enim contumacior sit intemperies insita non tam vehementibus: (ne vtero intemperiem priori contrariam .i. frigidam asciscant) quam diuturnis sæpiusque repetitis debilioribus remediis absolueda est. Proinde cum vere medio inchoata hæc fuerit curatio, ea quidem in totam ætatem primamq;

au-

autumni partem proroganda est, reuocatis semel, vel bis, balneis & topicis præscriptis præmissâque purgatiuncula.

Adhuc intemperiei calidæ vteri sympathicæ & vniuersalis totique corpori communis methodus curatiua exposita est. Nunc eiusdem intemperiei sympathicæ & particularis, ex visceris alicuius sublimioris vt hepatis sympathia exponatur: hanc autem propria hepatis calidioris signa libro de arte parua Galeni proposita testantur.

Constat autem hæc eodem remediorum genere alterantium vacuantiumque. i. cholagogorum: cum vtriusque partis idem sit excrementum biliosum tum hepatis generantis mandantisque: tum recipientis vteri. Itaque ab vniuersali sympathiæ methodo differt, vsu solo & vsurpatione externorum alterantium; quod hæc non toti corpori vt balneû, sed hepatis tantum vterique regioni necesse sit adhiberi, vt litum, vnguentum &c.

Internorum enim tum quæ bilem vacuent: tum quæ alterando humorem vacuationi præparent, viasque aperiant: tum denique quæ propriam partis vtriusque vteri & hepatis intemperiem nudam à vacuatione relictam emendant, vsus idem omnino est. Hæc autem intemperiei species affectio verius est, quàm affectus, nisi postquam diutius inuauit & à diutina sympathia confirmata est.

Iam intemperies vteri idiopathica rara quidem insita: sæpiusque est aduentitia à causæ alicuius externæ calidæ exuperantia, vt infessus suffitus vnguenti &c. contracta. Generis eiusdem remediorum alterantium & vacuantium indicatio eadem est, ab eadem scilicet biliosi excrementi abundantia par-

tiſque intemperie calida: in uſu tantum diſcrimen eſt, & à parte indicatur ſiue de admouendis ſiue aſſumendis & immittendis ſermo ſit. Ac aſſumenda quidem alterantia vacuantiaque antea ſunt expoſita: ſemper enim particulari vacuationi, vniuerſalis primæ ſecundæque regionis excrementorum præmittenda eſt. Immittenda autem conſtant iniectionibus refrigerantibus & tergentibus mixtis cholagogis, ſiue etiam peſſariis, deinde refrigerantibus leuitérque coarctantibus laxiorem ab immodico calore matricem. Admouenda quoque topica eadem ſunt nempe refrigerantia & aſtringentia.

Simplices intemperies quia vix vnquam ſolitariae reperiuntur, ſimplici curatione non egent: ſed cognatis intemperiebus ſemper iunguntur, vt caliditas ſiccitati, frigiditas humiditati, præſertim vbi iam morboſæ euaserunt. Quare proximus curationis locus erit tumorum vteri præter naturam partim, vt qui vtriuſque generis morborum naturæ participes ſint ſimilarium & organicorum.

De Vteri tumoribus.

EXpoſita omnium intemperierum vteri metho-
do curatiua, proxime ſubiicienda eſt ea quæ ad
tumores dirigitur, quorum omni genere vterus e-
xerceri ſolet & quidem tam naturalium quam non-
naturalium. Vocantur autem illi naturales quicun-
que ex aliqua ſanguinis parte ab aliis ſecreta effuſa-
que excitantur, quorū ſunt principes quidē ſpecies
Phlegmone, Oedema, Scirrhus, Eryſipelas eorūmq;
differentiæ, vt phlegmone eryſipelatodes ſcirro-
des

des &c. Nonnaturales contrà dicuntur qui ex humore excrementitio exaggerantur vt inflatio, hydrops, herpes cancri &c.

Cæterum cum vteri partes quatuor distinguantur fundum, eiusque interius orificium, siue os matricis, ceruix siue collum, & pudendum, seu orificium colli: nunc morborum tumorumque fundi methodum aggredimur, mox de aliarum partium ægritudinibus acturi.

Phlegmone igitur vteri, quæ tamen ceruicem eius carnosam potius quam reliquum membranosum corpus exangue densumque infestare solet, à communibus fluxionum causis commouetur tum internis vt plethora siue vniuersali siue particulari (ab vtraque enim obstructis cotyledonibus non in cavitatem vteri sanguis illabitur: sed in eius substantiam totam diffunditur) tum externis quæcunque vel præ ingenti dolore præcipitem sanguinis cursum proritant, vt sunt ictus, casus, occurfus violentus, abortus: vel præ frigore, terrore, ira inchoatum sanguinis cursum cohibent, aut lochiorum etiam in puerperis: aura enim frigidior subiens sicuti & potatio gelida, acetabula astringit: sicuti & terror coacto ad cor calore, ira foras impellit sanguinem cum spiritu ab vtero reuocatum.

Communia vteri phlegmones & reliquarum partium signa diagnostica sunt, tumor, ardor, rubor, durities & renitentia, dolorque pulsans eius partis cui in vtero insidet, siue anteriori siue posteriori, siue laterali. Multo plura sunt aliarum partium symptomata, quæ suscitatur per sympathiam atque transmissionem vaporis, humorisve, vel per contagionem tantum & generis cognationem: alligatur

enim cum recto intestino & vesica per villos complures : cum osse sacro pube & ilibus , per tunicam à peritoneo ductam & per vincula laxa quidem (& moveri distendique uterus facilius possit) sed tamen valida à processuum lateribus orta per coxas & inguina ad os usque pubis delata. Hepati per venas spermaticas & hypogastricas, cordi per arterias, cerebro & nervoso generi per spinalem medullam, cui validis vinculis annectitur, perque nervos tum à sexta coniugatione tum à rachitide exortos: itaque ex anteriori parte inflammata non solum pubem & anum ventrem dolor ardorque excruciat, sed stranguria quoque vel dysuria urget oppressa ab inflammationis mole vesicæ cervicæ. Posteriori parte inflammata dolor idem ardorque lumbos graviter exercet & sacrum retentio ab eadem intestini oppressione. A laterali parte & ligamentis inflammatis maior inguinum dolor & coxarum, ægraque ambulatio, aut claudicatio etiam femoris vicini, ægram molestat.

Ab antica quoque inflammata vteri regione, phrenitis delirium cephalalgia intolerabilis usque ad radicem oculorum sinciput exercet delatis per iugulares venas & arterias eo desinentes vaporibus, à quibus panniculi cerebri per suturas rariores cum tenuium vasorum copia foras emicantes & pericranio annexas vehementius distenduntur & diuelluntur. Est quoque os ipsum maxime fistulosum, hinc à sincipite terè sudor oriri solet.

A postica parte dolor idem ardorque per spinalem medullam sine vlla tamen vaporum translatione, sed sola contagione & sympathia communicatur totique nervoso generi, ex qua ceruix brachia

chia manus digiti crura conuelluntur, diaphragma reuellit, cum difficili respiratione, stomachus singultit, dolet, vomitque præsertim à pastu. Sic affecto corde per arterias venasque vteri lipothymia, sudorque frigidus frontis & extremarum partium commouentur.

Prognostica signa.

Phlegmone vteri quanto maior tanto periculosior, ob acutâ magis grauemque ab ampla quàm ab exigua phlegmone febrem & symptomata funesta phrenitim, delirium, cephalalgiam, sitim, iactationem. Quod si phlegmone vterum prægnantis obsederit, certa mortis formula fœtæ fœtûique est: hic enim calore febre aut inedia necatur vel à tumore foras eliditur: Illa ab ardente febre, abortu grauibûsque symptomatis de quibus Hippocrat. aphor. 43. lib. v.

*Methodus curatiua Phlegmonarum
communis.*

Phlegmone morbus est ex immoderata maiorum minorumque venarum repletionem. Indicatio curatiua est euacuatio, eaque duplex: tum antecedentis causæ, quæ sanguis est fluens vel mox fluxurus: tum coniunctæ qui sanguis est vasa omnia implens & distendens. Prior illa reuulsione & deriuatione constat, vtrique obtinetur per phlebotomiam, sed illa in parte contraria magisque vicina secundum rectitudinem: hæc in venis tali siue malleoli fieri debet. Posterior aliàs manifesta est, vt per apertionem, per hæmorrhoidum fluxum, per hirudinum morsum, per scarifi-

cationem aut phœnigium : alias obscura est, & insensibilis quæ digestionem aut percussione constat: hæc quidem posteriori ordine celebranda est: ne facta iam fluxio præ calore aut dolore, noua fluxione augeatur, aut, ne percussa pleno corpore & turgentibus venis maioribus repellatur & in parte subsistat, gangrænam aut scirrhum excitatura.

Curatio Phlegmones vteri.

Primum instrumentum profligandæ vteri phlegmones diætâ est refrigerans inerasans & attenuans, vt fluxionis incitatrices causæ tenuitas caliditas & copia sanguinis subducantur. Itaque per æstatem ver & autumnii primam partem quiescat ægra in conclauis aquilonis ventis perflato, aut frigida irrigato, aut ramis foliisque frigidarum plantarum strato : per hyemem in eodem bene clauso: sed ignibus tamen luculentis submotis.

Vigilias prolixiores adhibeat, somnum fugiat, iram omnemque animi ægritudinem, spiritus & sanguinis perturbatricem declinet. Motus omnes femorum & tibiærum compescat, brachiorum agitationem frictionemque permittat. Cibi frigidi humidique parsimoniam colat, non tamen integram tridui inædiam, quam Aëtius Paulusque præcipiunt, voraciori nostro sæculo non ferendam. Vescatur ergo pane loto coctoque cum hydrelæo, lacte amygdalino & hordeato cum aqua & saccharo elixatis. Aut si ægram horum obsoniorum tædeat, insculis pullorum alteratis, foliis oxalidis buglossi endiuiz borrag. & omphacio, prunis

nis & pomis coctis iisque semel vel bis in die, neque enim temerè sanorum pascendi pristina consuetudo, ægrotantibus illis mutanda est Hippocrate autore de vict. acut.

Alterum instrumentum est chirurgicum, scilicet phlebotomia duplex, reuulsoria & deriuatoria: illa in cubiti dextri flexu præcisa basilica, vel mediana exerceatur, primo quoque die & hora qua accersitus medicus nascentem phlegmonem detexerit; ac constantibus quidem viribus, ætate satis adulta & obeso habitu copiosè & ad animi lipothymiam sanguis hauriatur, siquidem fluxio præceps sit & vehemens. Alias in vices distribuatur quibus vires idoneo alimento recreandæ sunt. Sin exigua phlegmone, virésque valde afflictæ sint, vt puta à dolore ingenti, abortu, & vacuatione aliqua insigni, tum ommissa phlebotomia, solis frictionibus & deligationibus brachiorum & cucurbitulis ad hypochondria apponendis confidendum est.

Altera phlebotomia deriuatoria vno aut altero die post reuulsoriam, repressumque iam fluxionis impetum iure celebretur in poplitis vel pedis interna vena, qua coercitus circa vterum venasque eiusdem minores sanguis adhuc liquidior, diuellatur.

Tertium instrumentum est pharmaceuticum multiplici differentia: quædam enim antecedenti causæ opponuntur: tum vacuantia, tum alterantia: illius speciei est clyster mollis ex lb. j. decocti emollientis & refrigerantis (ne maior liquoris copia vterum dolentem premat) qui phle-

botomiz præmittatur, vel mox substituatur, vt intestina facibus & sordibus exonerentur in venas mesenterij exhaustas rapiendis. Huc etiam spectat purgatio præsertim cholagoga leniorque citra nimiam vasorum apertionem ne fluxio augeatur: bilis autem è subtiliori sanguine à febre cumulatur quæ fluxionem adiuuet.

Alterantium species sunt iulepi & apozemata frigida siccaque à quibus sanguinis caliditas febrisque obtundatur, tenuitas incrassetur, eiusque motus & fluxio retardetur. Vtriusque speciei materia & forma exposita est capite de intemp. calida vteri. Commune antecedentis & coniunctæ causæ remedium primumque post phlebotomiam, purgationem & iulepos, est de genere repellentium, quæ frigido siccoque temperamento, crassa & terrena substantia, austero acerboque sapore prædita sint, quæ non solum refrigerando fluentem sanguinem reprimunt: sed astringendo quoque coarctando & comprimendo partis substantiam, sanguinem iam influxum ex parte inflammata expriment, & ex venis minimis in minores, & ex his in medias, tandemque maximas: atque adeo ex ipsis quoque obscuris partis poris remeare cogunt.

Ea vero eo usque usurpanda sunt, donec pars liuescere incipiat in externis inflammationibus, aut donec tumor ardor dolorque internarum crescere sentiatur. Cauendum enim singulariter est ne perfrigeratione sanguis in scirrhum concreascit in quem opportunissimus est vterus: ob substantiæ suæ crassitiem & densitatem fluxionis retentricem. Usurpanda insuper

per vel liquida vel media consistentia, quia solida minus alte penetrant in partem distantem suâque grauitate & duritie dolorem intendunt. Admouentur autem foris imo ventri & regioni dolentis vteri: vel immittuntur per collum vteri, vesicæ aut intestini, his enim ductibus admissus liquor inflammata[m] vteri anticam, posticam, lateralem regionem proximè attingit vt situs & conformatio vteri apertè declarant.

Primum ergo vsurpabitur remedium sub forma liquidâ, exempli gratiâ fots ex oxycrato, ex aquæ & aceti ea proportione mixtis vt bibi possit. Hoc spongia excipiat[ur] & subfrigidè admoveatur. Aquæ stillatitiæ vt solani, plantag. rosar. & lactucæ maiorem vim obtinent quàm aqua simplex. Post fotum commodè parti inducetur medicamentum quod olei myrtini ζ ij aquæ rosat. & solani ζ j aceti rosati ζ β albumine oui vnus, & caphuræ ζ β diligenter inter se permixtis constet: Similis denique facultatis est mucilago seminum psyllij & cytoniorum ex aquis solani & plantag. extracta addita aceti parte octaua.

Tertiò admouebitur cataplasma: vt puta ex succis folior. semperuui solani plantagin. vmbilici vener. cum polline (i. tenuissima farina) hordei super ignem vel etiam sine igne mixtis.

Licebit etiam pulueris santali albi & rubri, sumach balaustiorum corticis granatorum aliquid inspergere. Cataplasma hoc ex stupis vel lintecolis minori mole imponatur; ne parti graue sit

& molestum.

Vnguentum denique ex usu erit, vt quod comitissæ vocant, quoddam ex oleo cytonior. lentiscino, myrtino, cum prædictis pulueribus & cera alba fingitur. Hæ omnes remediorum non solum externorum, sed internorum etiam formulæ, sæpius commutandæ sunt, ne cum incaluerint, caliditatem partis vicissim foueant & ingeminent.

Ex iisdem aquis & succis iniectiones fiant tum in vterum, tum in vesicam, tum denique in intestinum, sed per vices, ne duplici oppressione dolor partis inualecat. Vterina autem iniectio sublatis cruribus & femoribus aliquantisper vt per quartarium horæ, ne effluat cohibenda est.

Pessaria denique ex magmate herbarum refrigerantium contusarum linteolis incluso digitali magnitudine, vel earundem iure cum farina hordei pisto, pultis instar, & linteolis excepto intromittantur. Hæc quidem est legitima phlegmones in suo principio curatio (per reuellentia phlebotomiam & purgationem, & repellentia) quæ tamen propter doloris vehementiam ab ardore & immodica tensione, sæpe interpellatur, vt ei leniendo omissis repellentibus imprimis studeatur, tum quia vires labefactat ægrotantis: tum quia fluxionem febrilemque & symptomata eius omnia vehementer exasperat; sicuti ipse à repellentibus vicissim exasperatur. Lenitur autem medicamentis tum anodynis, tum narcoticis. Illa quod moderata sint substantia, modicæque calida & sicca par-

tem

tem laxant, nonnihil materię coniunctę digerunt, cāmque mediocritate quadam temperant : sed reuellentibus semper subiungenda sunt.

Anodynorum exemplum vsitatissimum est cataplasma ex mica panis in aqua calente macerati & expressi, tandēque cum lacte caprillo potius quam bubulo additis ouorum duorum vitellis in pultem percocta. Simile est ex folior. maluę, violarię manipulis aliquot, elixatis, contusis, mixtisque cum farina hordei & mueilag. radic. altheę extracta ex decocto florum chamęmeli, meliloti; oleo denique chamęmelino, & violaceo, vt fiat cataplasma.

Sic pessaria fiant ex oleo violato chamęmel. & vitellis ouorum crudorum mixtis & gossipio exceptis.

Contumaciorem dolorem narcoticis domare practici solent, vt cataplasmate ex foliis papaueris albi hyoscyami, mandragorę sub cineribus coctis, contusis cum vnguento rosaceo vel populeo : aut tempore hyemis cum axungia porci non salita &c.

Proximus est in curatione ordinaria post repercutientia digerentium vsus in augmento nempe, non tamen simplex vt in declinatione, sed admixtis repercutientibus quantitate quidem maiori in augmento : sed minori in statu. Tamen si enim eadem sit phlegmones toto suo decursu essentia: ab eius tamen causis per temporum vicissitudinem variantibus, varia medicamentorum genera indicantur. Supereft sane in augmento

vis magna fluxionis quæ quidem cohibita fuit in principio morbi, reuulsionis & repercussionis ope, sed non prorsus repressa: quia factæ iam fluxionis portio parti adhæsit frigore repercutientium durior crassiorque. Ab illa repercussio: ab hac resolutio indicatur in augmento.

Distinguuntur autem phlegmonarum tempora symptomatis earundem: ut augmentum ex maiori tumore, dolore, ardore, rubore, duritie & febre.

Digerentium medicamentorum genus vnum est, sed duplici differentia. Quædam enim leuiora, arctica dicta: alia fortiora quæ priuatim diaphoretica vocantur. Illa, sunt mediæ naturæ magis vicina, calore ab humiditate temperato ad primum tantum ordinem. Hinc dolorem leniunt, cutem eiusque poros rarefaciendo eosque tenuitate sua penetrando & humorem in hærentem liquando, ex quo vapor fiat semper expirans, donec locus detumuerit. Atque hæc quidem fere satis sunt in phlegmonis in quibus materia morbifica superficiali magis vicina est, eaque calida humida & tenuis, cumque locus mollis & rarus est. Sic Galen. libro tertio de Arte parua à phlegmones curatione remouet vsum acriorum resoluentium: ne calore & dolore fluxionem augeant.

Quæ secundo ordine aut supra calida sunt, utilia sunt, cum in alto corpore humor residet: cumque idem humor crassus frigidus & glutinosus est: quando denique dura est & densa partis substantia & distantior sedes. Videndum enim non quale est, sed

sed quale futurum sit dum ad partem peruenerit remedium.

Vtramque diaphoreticorum materiam permiscendam esse in discutienda vteri phlegmone, suadent situs eius remotior & substantiæ crassities atque densitas: tum sanguinis menstrui lentor & crassities, ex quo phlegmone accendi ea in parte solet.

Ad procurandam igitur repercussionem validiorem cum modicâ digestionem ipso morbi augmento poterunt exempli gratia ea quæ mox subiiciuntur usurpari.

℞. fol. plantag. absinthij maluz violar. summitat. myrti & rubi an. m. j. rosar. rubr. flor. chamæmeli meliloti an. p. j. balaustior. & cortic. malorum granatorum an. ʒ ij coquantur in oxycrato: residua contundatur & cribretur, eique adde farinæ hordei & lini, butyri recentis & axungię porci sine sale an. ʒ ij olei rosati, chamæmel. an. ʒ iij fiat cataplasma applicetur super stupas cannabinas bene pexas: vel contusa commixtâque eadem materia intra saccellos excipiat. Ex hoc ergo decocto pars primum foueatur, mox à fotu patefactis poris cataplasmate tegatur, cauendo tamen ne pars nimis oneretur & indolescat.

℞. olei rosati myrtini & chamæmelini an. ʒ ij mucilag. seminis cyton. & psyllij extractæ ex aqua plantag. quartar. vnum. rosar. rub. baccarum myrti, & santalorum omnium an. ʒ ij axungię porci insulsæ & butyri recent. an. quartarium β ceræ nouæ q. s. fiat vnguentum.

Simile erit vnguentum resumptiuum & de althea cui inspergatur puluis rosarum, santalorum

omnium, gallarum calycum glandium & cort. mali granati ad partes æquales puluerum & vnguentorum vt pariter discutientia & repellentia eue-
dant.

Emplastrorum & ceratorum forma durior grauiorque sit quam vt pars dolens ægraque ea perfe-
rat.

Cum status adest tumorque, ardor, dolor, febris & symptomatum eius tota syndrome plurimum videntur: tum digerentibus pluribus pauca repercutientia miscenda sunt: ne fluxionem tametsi iam suppressam redintegrari calore & dolore vehemen-
tissimo contingat.

℞. micæ panis frumentacei ℥. j. infunde per ho-
ram in aqua feruenti & exprime, eique adde mellis
ros. quartar. j. fiat cataplasma, vel

℞. fol. malvæ plantag. calamenth. absinth. an.
m. j. florum rosarum chamæmel. & aneth. an.
p. j. coquantur cum vino, contundantur & eri-
brentur, cribraturæ adde farinæ lini & scœnu-
gr. & fursuris subtilissimi an. ʒ. ij olei rosati
q. s.

In declinatione sola digerentia abdicatis repel-
lentibus omnibus conueniunt, non tamen valde a-
cria ob metum fluxionis: sicuti si proximo cata-
plasmati addantur folia artemisiæ pulegij matrica-
riæ. Simile quoque erit vnguentum ex emplastro
diachylone, ireato dissoluto cum oleo chamæmel.
vel liliaceo.

Postquam denique tumor prorsus subsedit ac ni-
hil quod exhalet reliquum esse videtur: tum pars i-
psa confirmanda est, quæ longiori decubitu fluxio-
nis vsuque digerentium valde elanguit, ne postea rheu-
rheu-

rheumatismo sæpius vexari eam contingat.

Fotus parabitur, ex decocto folior. equiseti tap-
psi barbati, summitat. oleæ, rubi, myrti & bacca-
rum eius, balaustiorum, nucum cupressi gallarum
rosar. & aluminis rochæ, in vino tortuuo.

De abscessu uteri.

Phlegmone uteri quæ ob materiæ copiam leni-
torem aut crassitiem, vel denique sedem di-
stantiorem neque prohiberi, neque digeri potuit,
in novam morbi speciem degenerat quam *ἄπισσα*
Græci vocant à verbo *ἀπίσαται*, quod partes si-
milares quæ antea contiguæ erant, recepta flu-
xione impletisque intermediis earum spatiis à se
inuicem separentur: hinc Abscessum Latini vocant
ab abscedendo, vel recedendo. Quanquam aliud
etiam est abscessuum genus, nō ex fluxione sangui-
nea: sed congestione ortum habens, idque ipsum
varium admodum est pro multiplici excremento-
rum contentorum corporumque solidorum natu-
ra.

In tres tamen species secari tantum solet, Athe-
roma, Steatoma & Meliceridem. Est autem ab-
scessus phlegmonosus, alias crudior, alias maturat-
us; In illo omnia phlegmones symptomata graui-
ter inualescunt, tumor fit eminētior duriórque; con-
cepto vapore multo ex sanguine efferuescente, vnde
tensio ardorque maior longanoniæ, aut vesicæ aut
pubis oppressio maior, urinæque & sæcum molestior
quam antea suppressio, indèque dolor acrior, magis
pungens & lancinans: febres denique ardentiores,

sed accessiones crebriores magisque inordinatæ & cum horrore, emicantibus scilicet ex abscessu ipso vaporibus acrioribus, in partes nerueas & membranas, vel calore ipso natiuo sese ad coctionem & maturationem materiæ colligente, aliasque partes affatim destituyente.

Tum igitur phlegmonosus abscessus supuratione curandus est quæ materiam ad facilem educationem comparet. Eius quidem sola natura causa efficiens est, sicuti solus sanguis idonea materia quæ vertatur in pus magis minusve sincerum pro substantiæ eius crassitie, vel tenuitate, calore vel frigore. Iungitur tamen à medicamentis tum calidis humidis & naturæ partium similibus: tum emplasticis, ut præclusis cutis spiraculis caloris substantia non qualitas crescat: partesque solidæ confirmentur, à quibus vitiosus sanguis concoquatur, earumque consuetudine exalbescat, tandemque fiat pus album læue & vniforme. Itaque à suppuratoriis arceantur: tum detergentia, tum validè calfacientia ficeantiæque nisi sint emplasticorum mistione retusa, vbi scilicet multa sunt sanguinis vitia, ut frigus & lentor, eodem tempore domanda.

Illius generis sunt leuiora suppurantia, aqua tepida simplex, hydrelæum, oleum, butyrum, adipēs domesticorum animalium præsertim recentes, ut & medullæ, verbi gratia gallinæ, porci, anseris, cerui, vituli, veruecis.

Paulo efficaciora sunt, rad. althææ, liliorum, folia quatuor emollientium herbarum, caricæ, semen
lini

lini eiusque mucilagines & althææ, extractæ ex decocto florum chamæmeli meliloti, folia quoque oxalidis & tussilag. sub cineribus cocta & cum adipibus prædictis mixta.

Efficacissima sunt, in lenta contumaci minúsque suppurabili materia vt phlegmonarum istarum vel inueteratarum, pix, terebinthina, galbanum, ladanum, styrax pinguis. Ex his omnibus differentiis fots cataplasinata & vnguenta concinnantur, qualia etiam asseruantur in pharmacopoliis vt basilicum vtrumque diachylum, ireatum & de mucilaginibus.

Fots ergo paretur tepidus : vel ex aqua simplici, vel ex hydrelæo vel ex decocto plantarum prædictarum, tantisper continuandus, donec pars erubescat & extumescat, non subsideat, aut expallescat.

Vel etiam ex pane calente ex furno, cataplasmata conficiantur, vel ex farina tritici, lini, hordei, quæ purissima sit & ab omni fursure purgata tergente & resolvente, cocta, cum aqua & oleo, vel cum mucilagine radic. althææ, aut seminis lini extracta ex decocto florum chamæmeli vel caricarum pari quantitate, vel ex materia prædictarum plantarum cocta, tusa, cribratâque cui farinæ prædictæ adipēs suis, gallinæ, medullæ veruecis vel vituli addantur. vt

℞. farinæ tritici & mucilaginis lini vt dictum est extractæ an. ℥. j. misce ad ignem. Item.

℞. rad. althææ & liliorum an. ℥. ss fol. quatuor remollitorum an. m. j. florum chamæmeli meliloti an. p. j. seminis lini 3j caricarum paria quatuor

cepam numero j. coquantur , contundantur & cribrentur : cribraturæ adde farinæ hordei purissimæ ℥ iiij axungia anseris & gallinæ an. quartar. s. medullæ cruris veruecini vel vitulini & butyri recentis an. ℥ j misce fiat cataplasma & applicetur.

Iam vero suppuratio abscessus facta, ex omnium symptomatum mitigatione dignoscitur: (Stupor enim solus & indolentia citra tumoris depressionem febrisque extinctionem & duritiei mollitionem, gangrænam, partemque syderatam & emortuam indicat) donec eadem omnia recrudescant ut acriores dolores febrésque vehementiores, dum pus acre partem exedens, eruptionis viam sibi parat: quod pus ex fundo quidem & lateribus uteri: alias in eius interiorem sinum influit, unde sincerum effluere per pudendum solet, alias in abdominis capacitatem inter peritonæum & intestina penetrat, in unumque ventrem ad inguina distendit opprimique: sic ex orificij externi aperto abscessu, pus per cervicem eiusdem eructatur: sicuti aliquando ex antica parte per vesicam: ex postica per intestinum profunditur.

Est autem ex ventre detrahendum secus inguinum locis, ubi illa terminantur. Dividi enim, ut puto, & cicatrice claudi, peritonæos membrana potest, sicuti ex paracentesi hydropicorum & chirurgia enterocæles constat, in quibus sine ullo periculo sanescit.

Quod si suppuratio facta, ob crassitiem carnosæ uteri substantiæ, aut ob puris crassitiem
lento-

lentoremque nequaquam sponte sua rumpatur, illa ne serpat longius & cuniculos agat, partis substantiam longè latèque depascendo, maturè foras euocanda est, non ferro tamen aut igne: ne obuia vesica violetur; sed medicamentis, non causticis quidem, aut cathæreticis propter metum iniuriæ quæ eidem vesicæ inferri posset, sed epispasticis validèque attrahentibus, calidis siccisque ordine secundo completo & tenuis substantiæ, quæ conditum intus penitùsque in altiore vteri substantiam abstrusum pus, in eiusdem superficiem transferant. Ideoque eorum forma solida conuenientior est, vt cataplasmatum quàm liquida: illa enim subditam saniem aliòsque quosuis humores foris è regione opposita ad sese aduocant.

Licet tamen etiam pus ipsum quod paucum sit & superficialium in aliis quidem partibus medicamentis vehementer resoluentibus & siccantibus per cutis spiracula exugere: nam in altioribus partibus hæc quoque consumendi puris ratio inanis est, vt & in vtero. Cataplasma epispasticum tale exempli gratiâ esto.

℞. caricarum in aqua vitæ coctatum & fermenti veteris an. ℥. ss. rad. iridis cucumeris aggreg. crudarum & brionia an. ʒ. ij. seminis sinapi ʒ. j. fimi columbini & caprilli torrefacti an. ʒ. ij. contendantur omnia simul & fiat cataplasma. Emplastri hæc erit formula.

℞. Picis aridæ & ceræ nouæ an. ℥. ss. axungia porci ʒ. quatuor, sulphur. viui ʒ. iij. rad. pyrethri & hermodactylorum an. ʒ. ij. fiat emplastrum. Huic similia in officinis prostant emplastr. de baccis lauri

croceum & diuinum.

Exemplum emplastri pus absorbentis & exurgentis tale erit.

℞. olei veteris ℥ vj ceræ albæ ℥ iiij liquefactis ambobus adde terebinthinæ Venetæ ℥ iij permixtis & refrigeratis omnibus, insperge salis nitri, cineris ficulnei an. ℥ j fiat emplastrum. Huic similia è sale oleo veteri terebinthina lithargyro comparantur, quibus mixtis, acrium quorundam, vt æruginis, calcis, vitriolorum, stercorum caprilli & columbini pulueres adiiciuntur. Præstiterit tamen epispasticos & attrahentes liquores siue decocta per metrenchyten in vteri sinum anteriorem infundere: vt in eum pus deducatur, quàm foris cataplasma aut emplastrum simul imponere; ne pus in abdominis capacitatem rapiatur.

De vlcere vteri.

Abscessui aperto siue natura, siue arte, & pure expurgato succedit Vlcus sordidum saniosumque. A quo medicamentum modice tergens siccansque indicatur. Detergenda enim sordes est, saniesque absumenda quæ duo sunt gignendę carnis qua repletur vlcus impedimenta.

Sordes autem tum ex partis vlcerae corruptela, vt ex alimenti crudioris reliquiis concrescit.

Sanies quæ tenuis & humidum excrementum est, (à quo virus vel ichor crassitie & lentore differt) vel aliunde allabatur vel stata naturæ lege ex alimentis in tertia coctione colligitur.

Vin-

Vincit autem sæpe alterutra sanies fordēſve vnde maioris, modò terſionis modò exſiccationis indicatio hauritur. Atque hæc quidem ſimplicis vlceris curatio ad purgandi ſiccandique rationem tota referenda eſt, tantisper dum vlcus rubens nec nimis ſiccum aut humidum appareat. Ab hac igitur removenda ſunt, tum acria, quæ ſordibus cauum vlceris implent; humectantia à quibus laxata pars elanguescit & fluxionibus patet; falſa denique quæ tergendo vellicant partem eique impingunt ſordes.

At ſi vlcus ipſum pluribus affectibus implicitum eſt, tum multis aliis medicamentū tergens temperari poſſit, vt omnibus caſibus opituletur, vt ſi quid in vlcere durius, malactica: ſi quid rheumatis, aſtringentia: ſi quid cruditatis, ſuppurantia: ſi quid caliditatis moleſtæ, refrigerantia: ſi quid denique putredinis adſit, acria vtiliter permisceantur. Iſta vero medicamenta externis vlceribus media forma vt vnguenti, aliquando etiam ſolida, vt emplaſtri: vel pulveris aptari poſſint. Internis autem & reconditis non niſi liquida per manifeſtos & cōtinuos meatus adhiberi vtiliter poſſunt. Sicuti in vlcere orificij interioris vteri, iniectio frequens conuenit per mettenchyten ex decocto hordei in quo diſſoluta ſit ſyr. de roſis ſiccis aut mellis roſ. colati pars ſexta quæ ne effluat proſpiciendum, ſublatis clunibus, & depreſſis humeris & obturato pudendo. Conuenit etiam peſſarium è linamento contorto obductoque mixtura olei roſati vitelli oui & pauca terebinthina. Quod ſi per veſicæ cervicem pus cum vrina ſimul erumpat, tum vrinæ purulentæ acrimonia: ne cervicem & vrethram vellicet & exulceret, lenienda eſt potatione matutina lactis aſinini vel

caprilli etiam, in quo tamen ad deterfionem facchari ros. vel rubri \mathfrak{z} j dissolui possit, vel certè emulsione 4. seminum frigidorum maiorum cum syr. viol. mixta. Tum etiam iniectiones similes partim in vesicam partim in vterum instillandæ erunt, vnde vtriusque partis vlcera abluantur.

Si per intestinum, clysteres tergentes submittantur ex decocto betæ, agrimon. plantag. hordei, furfuris, rosarum, in quo vitelli ouorum cum melle, aut saccharo ros. dissoluantur.

Profuerit quoque plurimum detergendo cuilibet matricis vlceri bolus sequens matutinus per sex vel octo dies repetitus.

\mathcal{L} . terebinthinæ venet. decies lotæ cum aqua artemisiæ \mathfrak{z} iij aloes non lotæ \mathfrak{z} ß concorporentur fiântque boli ex cochleari cum syrupo violato & nebula deuorâdi. Quod si vlceris vterini difficilior tardiôrque ob situm & vsum partis deterfio videatur, tum potioni vulnerariæ, id est, tergenti siccantique & astringenti per plures dies horis tribus ante prandium ægra muliercula assuefacienda est.

Exemplum potionis vulneraria hoc esto.

\mathcal{L} . rad. bistortæ cort. ligni guaiaci & rad. aristol. ret. vel gentianæ an. \mathfrak{z} j fol. agrimon. nepetæ absinthij plantag. verbenæ consol. minor. faniculæ, buglæ an. m. j. fiat decoctio in paribus vini albi & aquæ portionibus, eîque inter coquendum adde astacorum flauiatilium plena luna captorum & in clibano post detractum panem creinatorum \mathfrak{z} iij postremo colentur & capiat colati iuris \mathfrak{z} iij.

Si denique sanies exuperet, sero repurgetur caprillo in quo sacchari vel mellis octuplum dissolutum

tum sit. Sin sordes vincat, melicrato abstergeatur vel cœnomelite: sicuti putredo oxycrato oxymelite, vrina, aqua marina, lixiuto. Interiora quoq; inguinum vlcera pariter repurgentur.

Iam vero vlcus vbi purum, id est à pure, sorde & sanie aliisque partis vlceratæ affectibus, caui vlceris repletionem prohibentibus vt rheumatismo, phlegmone, dolore, intemperie, callo vacuum deprehensum fuerit, tum demum regeneranda caro est vlceris cauitatem impletura. Quod quidem naturæ partium vlceratarum opus est, sanguine tali & tanto fruentium, vt inde carnem deperditæ substantiæ similem proferant. Naturæ autem subseruiunt instrumenta duo, diætæ & pharmacia. Instituenda enim est iusta vitæ lex, ex cibis euchymis modice calidis siccisque & eupeptis vt ex aue nemorali montana campestris: carne suilla, veruecina, vitulina, hædina, & ex vino modico non ita tamen veteri & acri. Reliqua curatio medicamentis sarcoticis perfici debet, quæ mediæ sunt substantiæ atque infra secundum gradum calida siccæque, modicè tergentia sordem, blandèque siccantia saniem: sicque iustam naturæ materiam subministrantia.

Medicamenta verè sarcotica simplicia pauca sunt vt farinæ, scœnugræci, lupinorum, orobi, fabarum, hordei, pix, terebinthina, aloë, myrrha, sarcocolla, mel, radix peucedani. Multo plura componi possunt ex verè tergentibus siccantibusque, cum astringentibus & lenientibus mixtis: his enim asperitas tergentium lenitur & acrimonia hebetatur.

Iniectionum sarcoticarum pro vtero (neque enim vnguentis & emplastris in occultis altisque vlceribus commodè vti licet) hæc erunt exempla.

℞. vini rubri ℥j mellis ros.col. q̄rt.j. misce & fiat iniection. Vel ex sero lactis caprilli & melle mixtis: vel ex aloes myrrhæ sanguinis draconis an. ʒ ij in decocto hordei dissolutis. Similis & hæc est.

℞. lactis caprilli ʒ iiij olei rosati ʒ ij tuthiæ præparatæ ʒ β aloes lotæ ʒ ij concorporentur in mortario plumbeo diu agitata: atque ex huius mixturæ portione cum tripla decocti hordei, fiat iniection. vel,

℞. rad. irid. florent. & aristol. rot. & bistort. an. ʒj fol. agrimon. absinth. melissæ plantag. an. m. j. hordei integri & ros. rubr. an. p. j. coquantur & in colat. ℥j dissolue mellis ros. colati vel syr. de ros. siccis ʒ ij vel denique cum decocto hordei dissolue vnguenti aurei vel tetrapharmaci ʒ ij.

Denique vbi impletum carne vlcus fuerit: tum demum cicatrice pro vera cute, aut certè callo tenui cutique simili operiatur. Et quidem ipsa quoque cicatrix naturæ opus est: sed iuuatur tamen medicamentis epuloticis insigniter resiccantibus coagentibus & indurantibus restitutæ carnis superficiem, citra morsum quidem vllum & acrimoniam: sed cum frigore modico crassitie substantiæ & astrictione, vt absumpto humore carnem contrahant, constringant, densentque. Huius generis sunt metallica omnia vsta lotaque: vt pompholix siue tuthia, cadmia seu cerusa, plumbum, antimonium, æs & æris squama & vitrioli genera, tum plantæ quædam & plantarum partes vt radix bistortæ & tormentillæ, tapfus barbatus, plantago lysimachia, summitates oleæ sumach & myrti, huiusque baccæ, sanguis dracon. terra armena & sigillata. Illa autem vsurpantur vel formâ pulueris qui vlceri repleto insper-

inspergatur, vel lotionē, vt per aquam aluminosam & similia: vel vnguento vt cum cera alba & oleo myrtino, vel omphacino concorporentur: vel formā liquida, mixto puluere cum aquis conuenientibus, vt plantag. portulac. aut similibus decoctis vt instillentur in partium occultarum matricis vlcera.

℞. rad. bistortæ & symphyti maior. an. q̄rt. ꝑ alumini rochæ ʒ j. fol. symphyt. maior. & minor. (prunellam vocant) plantag. centinodiæ tapsi barbati summitat. myrti, oleastri & summach an. m. j. balaustiorum mali corij nucum cupressi gallarum viridium an. ʒ j coquantur in aqua ferrata vel vino rubro & tortiuo. Colatura iniiciatur vel sola vel dissoluta cum pulueris conuenientis, vt metallicorum lotorum vstorūque parte sexta. Hæc denique iniectionis materia tum in vterum per collum eius, tum in vesicam & intestinum infundatur, si illac pus effluxisse visum sit.

Deinceps de aliis tumoribus erysipelate, scirrhus, œdemate, hydrope & aliis inflationibus dicendum.

De erysipelate uteri.

Erysipelas tumor est vtriusque cutis, tum externæ, tum internæ viscerum, id est membranarū illa inuoluentium, biliosa fluxione constans, id est, calidissimæ & siccissimæ partis massæ sanguinariæ.

Aliàs verum est, & legitimum, aliàs contra: illius signa communia sunt, calor exurens partem affectam, dolor pungens, & acuum ictibus similis, color rubeus & fugax, qui ex pressa parte facile fugit refugitque, sine extuberantia, amplum, & superfi-

ciarum, sine palpitatione, duritie & renitentia, sed comitante febre vehementi, cuiusque symptomatis violentissimis, ut cephalalgia intolerabili, deliratione, peruigilio, lingue nigritie, siti implacabili, & corporis iactatione.

Propria autem vteri erysipelatosi signa sunt, calor dolorque funinis, ilium, inguinum, pubis, & perinæ, alui supressio, & dysuria, &c.

Aliàs non verum est & legitimum erysipelas, sed ex alio humore cum bile confuso conflatum, unde erysipelas phlegmonodes, cedematodes, & scirrholdes, dicitur pro specie humoris cum bile confusi.

Huius signa sunt tumor magis insignis cuti carniq̃ue communis, febris, cuiusque symptomata omnia leuiora.

Curationis scopus duplex est, refrigeratio, & euacuatio, utrique causæ communis, antecedenti & coniunctæ. Instrumenta tria, diætæ, pharmacia & chirurgia. Prima illa frigidior humidiorque quàm in phlegmone indicatur quanto bilis sanguine ardentior est. Pharmacia autem causæ antecedentis duplex est: alterans vna, id est refrigerans & humectans, altera vacuans: illa iulepis constet, & syrupis acidis, ut acetoso simplici, oxysacchar. simpl. de granatis acidis, de ribes, de succo mali limonij, aut citrij, mixtis cum dupla portione aquarum refrigerantium, ut acetosæ, cichorij, nenupharis, lactucæ, mixtioneque quodam aromate, cum saccharo rosato ad saporis & odoris gratiam, ut,

℞. aquarum prædictarum lb̄ j syrup. de acetositate citri, de ribes, & de granatis acidis, an. ʒ ij fantali citrini ʒ j sacch. rosat. q̃rt. j. fiant iulepi tres qui tamen iterari poterunt.

Apo-

Apozema ex decocto refrigeratiū plantarū mixtisq; eiusmodi syrupis simili facultate cōcīnabitur.

Vacuans pharmacia cholagoga sit cāque clemens & leniens, contraindicante tum bile, tum febre, acriora purgantia eiusdem generis vt diacrydium & diacrydiata, vt elect. de succo rosarum.

Talis est potio ex infusione ʒj vel ij rhabarb. cui spicæ momentū addatur in aqua endiuīæ per duodecim horas addita eius expressioni, syrupi violati ex pluribus infusionibus, vel rosacei laxatiui, vel de cichorio compositi ʒj.

Talis sit bolus ex cassiæ, & tamarindorum pulpæ an. ʒβ.

Tale denique decoctum rhasis ex ʒij tamarindorum, prunis dulcibus xx & florum violæ p.j.

Altera purgationis species phlebotomia est, partim reuulsoria è cubito, partim deriuatoria è poplite, vel malleolo. Illa quidem omīssa cap. 3. 14. method. à Paulo adhibita : ille verum erysipelas curabat cuius est materia valde exigua, hic erysipelas phlegmonodes. Potest tamen & in vero utilis esse phlebotomia, si non tam vacuationis, quam refrigerationis gratia celebretur ; vtraque tamen tam phlebotomia, quam purgatio repugnare videtur aphorismo 35. lib. 6. Erysipelas foris intro conuerti malum est, intus vero foras bonum, & vt causa, & vt signum, liberat enim viscera causa morbifica, ostenditque naturæ victoriam. Huius enim aphorismi sententia est, quòd materiæ decubitus, ab ignobili parte in nobiliorem, in malis habendus sit, nobilior autem pars est, tum superior inferiori, tum interior exteriori; atqui neutra vacuatio causam coniunctam intro reuocat, sed ante-

cedentem tantum diripit forasque excludit, quare aphorismus intelligendus est de humoribus à parte affecta intro conuersis ibidemque resistentibus.

Causæ coniunctæ refrigeratio prior sit, digestio siue resolutio posterior: illa constet fotu partis erysipelatosæ ex aqua frigida, vel oxycrato, ex succis herbarum refrigerantium vt lactuc. vmbilic. ueneris solan. semperuiui & similium: constet etiam cataplasmatibus ex iisdem succis mixta hordei farina.

Sunt autem topica hæc tanto crebrius iteranda, quanto pars erysipelatosæ celerius exsiccat & calefacit linteola infimo ventri apposita. Sunt etiam eiusmodi succi per metrenchyten in uterum altissimè infundendi, sicuti per clysteres, decocta refrigerantium herbarum admixtis oleis frigidioribus vt de nenuphare.

Non est autem metuenda viscerum ex causæ coniunctæ recursum inflammatio, tum præ paucitate materiæ, tum præ debili percussione, topicorum frigidorum humorum sine attritione terrene substantiæ. Refrigerationis terminus est ardoris in parte temperatio colorisque mutatio ad naturalem, aut saltem ad liuoris initium, tuncque resolutioni locus est, per cataplasmata è farina hordei: quod si liuor aut nigrities accesserit tum scarificatione præmissa, locus scarificatus abluatur vel aqua calida, vel si forte materia crassior sit & magis lenta, aqua marina, aut salsa, aut muria.

Non veri erysipelatis curandi iidem sunt scopi, eadem remedium genera, discrimen tantum est in efficacia & gradu, nam refrigeratio leuior esse debet causæ antecedentis, vacuatio vtraque copiosior, alteratio quoque loci leuior,

uior, sed resolutio sit efficacior.

De œdemate.

OEdema communi significatione omnis tumor est tam calidus, quam frigidus: propria frigidus tantum, isque aut verus & legitimus, aut contra. Ille constat fluxione naturalis pituitæ, estque mollis, digito cedens, eiusque vestigium aliquantum retinens, concolor & albicans, calore exiguo, & dolore prope nullo.

In utero cognoscitur ex grauitate partis ad pubem, & inguina, faciliq; cutis eleuatione. Verus hic sæpissime resolutione curatur, rarissime suppuratione, aliquando induratione in scirrhum.

Non verus & illegitimus, aut per mixtionem fit alterius humoris cū pituita, vnde fit phlegmonodes, erysipelatodes, scirrhodes; vel fit per degenerationem propriae substantiæ, vnde fit tumor aquosus aut ventosus similis scilicet hydropi, asciti & tympaniti.

Hæ œdematis veri, & non veri species sunt morbi, propriaque egent curatione. At symptoma est periculorum affectuum, vt tabis vel plithiseos, hydropis, artuum tumor laxius circumscriptione carens.

Oedematis veri curandi scopus duplex est, alteratio, vacuatioque, tum materiæ antecedentis, tum coniunctæ. Alterationis species indicatur ab antecedente causa, crasso lentoque & crudo humore, calesfactio nimirum, attenuatio, & deterfusio, cuius absoluendæ duo sunt instrumenta, diæta, & pharmacîa.

Illâ constet acre calido siccoque, siue natura, siue

arte, vino rubello, tenuisque, & pauco, parumque lymphato; pane bene fermentato, salsoque, & albo: carnibus recentibus affatis caryophyllo, vel fœniculo, vel salvia transfixis, vitatis volucris aquaticis, carnibus porcinis, bubulis, & piscibus, nisi fortasse saxatilibus iisque affatis, aut in vino elixatis. Fructibus siccis, ut nucleis pineis, passulis purgatis, remotis recetibus omnibus fructibus & frigidis ut pomis, prunis, pyris, oleribus, iusculis, leguminibus, caseis, & lacticiniis.

Alterum instrumentum alterationis est pharmacia per iulepos ex syrupis incidentibus, & tergentibus, & similibus aquis concinnatos. Tales sunt syrupi de stœchade, de artemisia, oxymel simplex, & compositum, mel anthosatum. Tales aquæ sunt, betonicæ, hyssopi, melissæ, samplici, salviæ, & fœniculi: qui iulepi tantò in plures dies prorogandi ut 5.6.8. quanto humor contumacior est coctionique ineptior.

Est tamen impuro intestino, aut ventriculo, minoratiua potio iulepis, & apozematis aperientibus præponenda. Purgatio causæ antecedentis prius coctæ, deterisæ, & attenuatæ instituatur, vel liquida, vel potulenta, vel ex infusione $\frac{3}{4}$ β fol. fennæ, & agarici trochiscati, $\frac{3}{4}$ j in aqua betonicæ vel melissæ, ut in expressionis $\frac{3}{4}$ iij diluatur sacchari $\frac{3}{4}$ β cinnamomi $\frac{3}{4}$ β . Sic electaria ut diaphœnicon. elect. de citro, diacarthamum & benedicta ad $\frac{3}{4}$ β vel $\frac{3}{4}$ vj ad summum, earundem aquarum $\frac{3}{4}$ iij dissolui possunt addito cinnamomo aut saccharo ut supra. Pilulæ quoque cociæ, & sine quibus & de agarico ad $\frac{3}{4}$ j vel $\frac{3}{4}$ iij singulæ utiliter vsurpantur.

Phlebotomia rarò nec nisi in plethora pituitosa
eaque

taque parcior conuenit.

Causæ autem coniunctæ vacuatio constet, mixta ficatione, & resolutione, cum modica astrictione in principio; nam in augmento maior resolutio, in statu & declinatione maxima & sincera sine astrictione conuenit. Topici in principio materia, est apud Gal. 2. ad Glauconem cap. 3. & 14. methodi cap. 2. posca, vel oxycratum, ex aqua & aceto; ita temperatis ut bibi possint: In augmento eadem posca, sed aucta aceti mixtione, additæque pauco alumine. In statu, & declinatione, pro oxycrato liquum ex cinere vitis, fici, vel ilicis, adhibetur. Porro liquores illos admoueri iubet Galen. ibidem per spongiam, quæ noua sit aut certè aqua falsa, & nitrosa deterfa, atque supra partem calidè strictæq; appressa per deligationem expressiuam dictam in artubus quæ per fascias ab imis eorum partibus incipiat sensimque ad altiores producat parum remittendo, laxandæque.

Hæc quidem est veri œdematis curatio in artubus, sed in præcordiorum partibus ut liene, hepate, utero oxycrati usum abdicandum esse suadet Gal. cap. 5. lib. 14. methodi medendi. quibus substituit fotum, oleum illitum, absynthium decoctum, sic Aetius curat œdema uteri, mollientibus & digerentibus internis externisque.

Eius autem œdematis quod symptomata est grauioris morbi, ut phthiæcos, aquæ intercutis, necessaria curatio non est, nisi ægro permolestum sit, aut primum affectum augeat, tum enim remitti poterit fricatione loci tumentis ut ait Galen. cum oxyrhodino quod humorum affluxum reprimit, vel cum eodem & sale mixto, reprimit enim & di-

gerit quod impactum est, & oleo cum sale quod dilatat & vacuat.

Oedema impurum, mixtumque cum alio humore ut phlegmonodes, erysipelatodes, scirrholes, mixtis indicationibus curandum est, siue alterandi, siue vacuandi: phlegmonodes quidem phlebotomia, & purgatione, partim phlegmagoga, partim cholagoga, & percussione digestionéque magis valida. Erysipelatodes pariori phlebotomia quam phlegmonodes, sicuti & percussione inualidiori & purgatione ex phlegmagogis & cholagogis mixta.

De scirrho.

Scirrhus tumor est, frigidus, durus, & indolens: sique duplex est, verus unus & legitimus, constatque ex melancholia naturali, & alimentaria, à sanguine secreta forasque expulsa in habitum: sed hic raro exactus & exquisitus occurrit. Alter est spurius & illegitimus, de quo postea.

Causæ eiusdem humoris melancholici procreatrices, sunt aut externæ ut victus cacochymus à Gal. descriptus lib. 3. de locis affectis cap. de melancholia. Aut internæ, suntque hæ duplices, vel enim intemperies hepatis frigida siccaque sanguinem melancholicum ex cibo etiam euchymo multiplicat, & lienis infirmitas præ intemperie aut obstructione vel humorem non attrahentis, aut certè non expellentis, eundem humorem in venis maioribus, & visceribus cumulat.

Veri scirrhi notæ sunt, tumor valde durus, & tantum resistens, hebes sensus, color fuscus, quod ab exiguo initio sensim in insignem tumorem crescit, idque

idque sæpius in musculorum finibus, aut mediis etiam musculis, aliquando etiam in visceribus, hepate, liene, & frequentissimè in vtero, tum ob proprietatem substantiæ eius densioris, tum ob suppressionem mēstrui, crassique sanguinis ex obstructione cotyledonum: cuius vteri scirrhus præter durtiem & indolentiam partis, designatur etiam ex eo quod grauitas in imo ventre, pube, & sede molesta sit, incessus difficilis, & totum corpus pigrum.

Veri scirrhi curandi duplex scopus est, alteratio, & vacuatio, illa à melancholia naturali frigida siccaque & crassa, indicatur calefaciens, humectans, attenuans & tergens, quæ duobus expeditur instrumentis diætæ, & pharmacia. Illa constat ex aere verno aut simili, pane triticeo, bene fermentato, coctoque & modice falso, ex carnibus recentibus, vt hœdorum, veruecum, vitulorum, gallinæorum omnium vel assatis, vel elixatis, idque cum foliis buglossi, borraginis, pimpinellæ, lupulorū, melissæ, ex vino tenui & oligophoro siue albo, siue rubello, vitellis ouorum, fructibus siccis, vt passularum, nucleorum pineorum.

Pharmaceutica alteratio purgationi præponatur, vt per iulepos elaboratos, è syrupis violato, de succo buglossi, de fumaria, & de poinis; cum aquis stillatitiis, buglossi, borraginis, fumarix, melissæ.

Simili facultate apozema concinnabitur ex decocto radicis buglossi, polypodij, fol. vtriusq; buglossi, ceterach, pimpinella, melissæ summitatum fumarix, lupulorum florum tamarisci viol. borrag. in cuius decocti ℥j diluatur panis sacch. qrt. j satali citrini vel cinnamomi ꝑ iij clarificentur pro tribus

dosibus matutinis: hæc tamen alteratio tantò pluribus diebus producenda est, quantò humor contumacior.

Causæ antecedentis sic præparatæ, alteratæ, coctæque vacuatio per purgationem subiungēda est, per medicamenta melanagoga, constabit, tum simplicibus vt radicibus polypodij, epithymo, myrobalanis indis, & cassiæ medulla (hæc leuissima sunt) ex foliis & foliculis fennæ quæ mediocris est, ex radicibus veratri nigri & lapide cyaneo & armeno. Idem est compositorum melanagogorum, quoad vires discrimen: leuissimum est, elect. diacatholicon, mediocre diasennæ solutium, vehementissimum confectio hamech, & pilulæ de lapide lazuli.

Porro ex illis simplicibus vel infusis, vel decoctis, sicuti ex compositis dissolutis liquore conuenienti potiones catharticæ exhibētur potius quam pilulæ quæ exsiccant magis.

Altera vacuatio eiusdem causæ antecedentis phlebotomia est, utilis dum præcisa cubiti vena sanguis crassus, & nigricans manare cernitur; aliàs inutilis. Rursus eadem phlebotomia quoties plethora est cacochyma coctioni præmittenda est, vt sanguis totus sit sequacior; est autem phlebotomia, in scirrho vteri non solum reuulsoria ex cubito, sed deriuatoria etiam ex poplite & malleolo celebranda.

Causæ coniunctæ indicatio duplex est, emolli-
tio digestioque per topica calido humidoque temperata, calidiora enim crassam lentamque materiam, in duritiem lapideam & incurabilem cogunt, humidiora nihil resoluunt, sed potius prutredinem, cancrumque, accersunt. Cæterum emolli-
dige-

digestioque pro varietate temporum scirrhi variat: initio enim mollitio, in statu & fine resolutio, vincere debet, insigniter, in augmento parum.

Malactica olea sunt chamæmelinum, lirinum, irinum, cherinum, & sambucinum.

Omnes quoque adipēs, & medullæ, tum recentes, tum insulsæ, domesticorum animalium. nam vetustæ, falsæ, & animalium agrestium, ut pardorum, leonum, sunt acriores, & siccantiores. Gummi quoque, & resinæ, malactica sunt præsertim humentiora, & recentiora. Malactica sunt ut bdellium, opoponax, galbanum, terebinthina, pix. Ergo scirrhum in principio fouet Gal. oleo cui cortex radicis althæe incoxerit: eidem cataplasma mox apponit, & corticibus radicis althææ, vel maluæ foliis, tum crudis, tum præsertim coctis, & cum seu hircino, aut adipe anserino, gallinaceo, accuratè permixtis.

Sed in vtero curabitur topicis liquidis, & mediis utpote magis penetrantibus, tum foris appositis eiusdem regioni, tum initio admissis per clysterem, in intestinum, vel in vterum ipsum infusum.

Fœtus ergo, incessus, semicupium constabunt decocto radicum liliorum, althææ, ebulli, foliorum 4. emollientium, maluæ, parietariæ, violariæ, branchæ vrsinæ, feminibus lini, scœnugræci, caricis, & floribus chamæmeli, meliloti, sambuci, à quibus continuo illinientur olea prædicta, vel vnguenta, ex prædictis oleis, adipibus, & medullis, cum pauca cera noua cōfecta. Post emolliationem humor magis digerendus, ut in augmento & statu, quàm emolliendus; itaque decoctis miscebuntur herbæ calidiores, ut arthemisia, matricaria, nepita, melissa.

Olea quoque calidiora ad litum vsurpabuntur, vt irinum, lirinum, ricininum. In vnguentis gummi aceto, dissoluta admiscebuntur. Postremo in declinatione vbi iam depressus tumor valde fuerit, ceratis, vel emplastris munietur vt de meliloto diachylo magno, ireato &c. hæc est igitur veri scirrhi curatio.

Alter scirrhus est non verus, sed spurius & illegitimus, isque duplex, aut enim ex mixtione alterius humoris, cum melancholia naturali constat, vt sanguinis, bilis, pituitæ, vnde scirrhus plegmonodes, erysipelatodes, & œdematodes dicitur. Aut ex induratione cuiuslibet tumoris, & humoris, per refrigerationem immoderatam in principio, aut per resolutionem vehementiorem, sic pori in articulis arthriticorum increscunt, ex humoribus violentius digestis, sic calculi in renibus, asso in iis crasso & glutinoso succo.

Est & alia tumorum species valde durorum, siue aquosi sint, siue etiam flatuosi, idque ob tensionem, & repletionem immodicam; sed hæc durities à scirrhusa aliena est, quæ concretionem tantum, & siccitatem sequitur. Scirrhus spurius si exactus est, id est omnino sensus & doloris expers incurabilis est, sicuti & magnus, sic marcor ex febre hectica incurabilis est.

Non exactus difficile curabilis est, quòd humor crassus, lentusque sit, præsertim à digestionem, & resolutionem immodicam, & partibus induratis contumaciter impactus. Huiusce scirrhi vnica est curatiua indicatio, vacuatio nempe causæ coniunctæ (nullus enim antecedentis fluxuræ metus est, vt quæ præcedenti curatione compressa sit.) Vacuatio hæc susci-

fufcipietur per emollitionem & refolutionem cōiunctam; neque enim ficcus lentūſque humor digeri, niſi prius attenuatus, terſūſque, neque rurfus attenuari, niſi præmolitus poſſit.

Vtraque hæc facultas, à mediocri caliditate, & humiditate oritur, illa enim calidior, indura reſoluendo, hæc aut nihil efficit, aut corrumpit putrefaciendo.

Vtraque vis molliendi digerendique, pro temporum varietate, tumorūque, corporum & partium mutatur. Nam emollitio maior in principio, & augmento, ſicuti in corporibus durioribus, tumoribūſq; requiritur. Digestio in ſtatu & declinatione, vbi præmolitus tumor eſt, vehementior cōuenit. Vtraque denique facultas ſæpius permiscenda eſt, rarius ſeorſim uſurpanda & in articulis tantum: quare malaſtica topica ab initio concinnabuntur ex materia expoſita in principio, ſed in ſtatu & declinatione decoctis vinum album addetur & herbæ calidiores iam nominatæ: Sic vnguentis addentur gummi diſſoluta aceto quod validiſſimè diſſoluit craſſos, lentōſque humores.

Sic Galenus cuiuſdam puerum à ſcirrho femoris præ eryſipelate indurato percurauit lib. 4 methodi cap. 4. Aliàs aceri vapor, articulis artuum ſcirrho obſeſſis opitulatur, qui à lapide molari vel pyrite in ipſo extincto in ſcirrhofos tendones & ligamēta attollitur. Sed vaporis huius rarior ſit uſus, vt ex interuallo duorum dierum, eiſque malaſtica protinus ſubiungantur.

Poſtremo in declinatione, vbi non ſolum emollitus ſed depreſſus etiam tumor valde fuerit, emplaſtris idoneis. i. malaſticis & digerentibus vt dia-

chylone ireato, & diachylone magno, reliquæ scorsim dissipentur.

Altera species scyrrhi spurij, ex alterius humoris vt sanguinis bilisque cum melancholia naturali mixtione constat: hæcque sæpius exquisita non est, nosceturque cum duritie & renitentia, tum loci caliditate, dolore graui, vel acuto, & pulsatione; hæc vero longiorem phlebotomiam, & purgationem mixtam ex melanagogis & cholagogis indicat in principio, item topica repellentia magis, & refrigerantia vt fotum ex decocto foliorum plantaginis, solani, tapsi barbati, maluæ, violariæ, rosarum & chamæmeli: cataplasmata etiam vel ex magmate herbarum illarum confecta, addita hordei farina, & oleo rosato, vel ex farina tantum & oleo. In statu autem & declinatione digerentia magis conueniunt, quàm in simplici, vt si decocto prædicto ad fotum, calidiores herbæ vt artemisiæ, matricariæ, nepitæ, fabinæ addantur: ex quo etiam decocto iniectiones in vterum fiât, sic in scirrho erysipelatode parciior quidem phlebotomia initio, sed topica applicanda magis refrigerantia & humectantia, ex eadem hordei aut lentium aut fabarum farina cocta cum succo plantaginis, solani, semperuini, & oleo violato, vnde cataplasma formetur. Iniectiones quoque ex sero lactis dissolutis mucilaginibus seminis psyllij & oleo violato commodissime fiant.

De cancro.

Adhuc veri scirrhi ex melancholia naturali & alimentaria, & spurij, per mixtionem aut indurationem, methodus curatiua exposita est: nunc
alius

alius ortus ex melancholiâ excrementitia sed naturali curandus est. Hic humor crassus & turbidus est, fæcis vinariæ instar in doliis, & amurcæ in vasis oleariis: ex crasso magisque terreno cibo, in hepate vnâ cum reliquo sanguine genitus, à quo lienis vi secernitur vt inde propriû capeſſat alimentum: reliquias autem in stomachum appetentiæ citandæ causæ refundit, ex quo si exuberet, vomitione aliquando excluditur, vel per splenicum etiam & mesentericum ramum in venas hæmorrhoidas internas deponitur; aliàs si à debili liene non secernatur, aut icterum nigrum excitat aut eiicitur è venis maioribus in habitum vnde elephantiasis, interdum in partis alicuius vel venas, vnde varices, vel substantiam vnde tumor emergit *cancer* dictus, à similitudine tum coloris, tum figuræ, tum naturæ.

Cancroſa enim pars vt canceri corpus liueſcere ſolet & circumſtantibus venis nigro ſanguine turgentibus ambitur, vt cancer piſciculus pedibus vndiquaque è toto corpore prodeuntibus, partibus quoque obſeſſis contumaciter inheret, non ſecus ac piſciculus hic ab occupato loco non niſi ægerrimè auellitur.

Eſt autem cancer duplex, vlceraſus vnus, non vlceraſus alter. Ille vlcus cancroſum, hic tumor cancroſus vel apoſtoma cancroſum vocatur.

Vlceraſur autem, efferueſcente in loco obſeſſo, humore vel præ mora & putredine quòd parti penitus ſit impactus, vel vſu topicorum calidiorum, vel etiam interna vſtione, per febrem aut acriorem victum.

Tumoris cancroſi ſigna ſunt, durities, renitentia, rotunditas, quę qualitas, color fuſcus, calor, quàm in phlegmone minor, dolor, ab initio grauis & torpidus tandèmque pungens humore magis incalcſcente & aeri, iamque ad vlcerationem properante. Initio valde exiguus eſt tumor, inſtar eicis, aut fabę, ſed celeriter accreſcens, atque hæc omnia ſigna cancrum in vtero, ad pubem, inguina, pudendum, comitari ſolent.

Vlcerati cancri ſigna ſunt, labra dura, tumida, inuerſa, albicantia, rubentia, liuentia, ſanies ſeroſa, olida, nigricans, vel flauelcens.

Rurſus cancer aut occultus eſt, in penitiori aliqua parte corporis, vt vtero, hepate, liene, naribus, palato, faucibus: Aliàs euident in qualibet parte externa, ſæpiſſimè tamen circa faciem, vt in genis, labris, naribus, & manimis; quamquam occultus etiã vocatur, qui non eſt vlceratus, etiamſi partem externam & conſpicuam inuaſerit.

Incipiens & exiguus cancer verè quidem curatur aliquando ſcopis duobus, præſeruatiõis, & curationis, illa ad cauſæ antecedentis ablationem, hæc ad cauſæ coniunctę vacuationem refertur. Aufertur cauſa antecedens tum per phlebotomiam in cubito, primum ad reuulſionẽ: tum in poplite vel mallole ad deriuationem, eruptionemque menſium ſi fortalſe ſuppreſſi ſunt, in ſceminis, ſicuti hæmorrhoidum conſuetarum in viris: tum per purgationem melanagogam & mediocrem, nam à vehementibus exaſperatur ille humor, neque illis etiam cedit: tum denique per dietam ex accidenti frigidam, humidamque & euchyram, cacochy-
miæ melancholicæ aduerſariam, qualis in ſcirrhis
expo-

exposita est, quæ melâcholia quod celeriter prohiberi non possit, ne cumuletur, purgationis crebri-
tate subducenda est.

Causæ coniunctæ curatio vacuatione duplici cō-
stat, repulsione & digestionē; illa quidem vsurpatur
in principio vbi imperfecta adhuc est purgatio ca-
cochymia venarum ad eam regeŕendam ne affluat,
partemque roborandam ne suscipiat illam fluentē.
At vbi exquisita iam est purgatio in statu scilicet
& declinatione, vtraque miscenda. Debet autem
vtraque mediocris esse, non vehemens aut im-
becilla ne hæc vincatur ab humoris impacti crassiti-
e, illa humorem magis impingat & incrasset, vel
repulsa vel dissoluta tenuiori portione. Materia v-
triusque paulo post exponetur: minuti quoque illi
canceri in loco libero, & superficiali vbi apprehē-
di possint, curari possunt excisione tumoris, & radi-
cum eius omnium, deinde sanguinis expressione;
moxque suppressione per vſtionem candentis ferri
reliquias absumentis & hæmorrhagiam immode-
ratam prohibentis.

Qui grandior est, & confirmatus cancer neque
pharmacia, neque chirurgia curabilis est quocumq;
in loco hæreat, nam repellentia & digerentia topi-
ca si imbecilla sunt respuit, si vehementia ab iisdē
magis incrassatur, si acria efferatur ab iis & exulce-
ratur; Chirurgicam sui excisionem cum suis radici-
bus non fert ob metum profusioris hæmorrhagiæ
ex grandioribus venis arteriisque quæ neque deli-
gatione, ne ad vicinas partes principes sanguis re-
fluat, neque vſtione supprimi possit, ne calor ignis
in easdē transcurrat per continuitatē vasorū & ob
viciniam; quæ deniq; reciduum cancrū prohibere

non possit cicatrice inducta ob noui humoris impressionem.

Est igitur palliandus cancer grandior, iab incremento & acrimonia prohibendus, idque tum per dietam prædictā, & purgationes ante memoratas, tum per topica ex repellentibus digerentibusque, & refrigerantibus composita. Huc spectat Hippocratis apho. 36. sectionis sextæ, caneros occultos nō esse curandos, curatos enim citius perire, non curatos lōgius tempus perdurare. Vbi Gal. occultos vocat, tum eos qui in penitioribus partibus delitescunt, tū eos qui exulcerati non sunt etiam si in externa parte hæreant. Porro topica illa constāt metallicis vstis, lotisque, vt cadmia, tuthia, antimonio, plumbo, cerusa lota, canceris fluuiatilibus vstis lotisque, ex quibus cum oleo rosato, myrtino, omphacino, & cera alba fiant vnguenta.

Quòd si dolor nimis vrgeat, tum leniendus est balneo, foru, infessu, aut ex lacte, aut ex aqua simplici, aut ex decocto emollientium, & refrigerantium herbarum. Iniectiones quoque ex eadem materia fiant in vterum, quibus mucilago seminis psyllij addatur, & oleum rosatum, vnguenta magis refrigerantia, lenientiaque, apponantur ex oleo rosato, nenupharis, succo solani, plantaginis, aceto rosaceo paucò & cera alba. Cataplasmata eodem scopo concinnantur, ex farina hordei mixta cum succo solani sine igni admixtoque oui albumine, vel mucilagine psyllij: Singulare est ranæ viridis oleum.

Iam vero cancer vlceratus in loco libero, liberè curari potest integra amputatione eius & radicum, cui subiungatur sanguinis è vasis expressio, moxq;
vstio

vstio ad absumentas reliquias & hæmorrhagiam cohibendam.

Aliàs curatur vstione vi medicamenti caustici vt sublimati, muniendo interim locum vicinum vnguento de bolo, & dolorem mitigando post effectum tridui. At in loco non libero tutius palliabitur, dolore interim, si quando sæuiat mitigato lenientibus, & refrigerantibus mixtis, tum admotis, tum iniectis vt lacte asinino, vel solo, vel mixta aqua arnoglossi, plantaginis, portulacæ, vel earundē herbarū succis. Oleū vitellorū oui crescente dolore aptissimū. Imminens hæmorrhagia ex erosio venis maioribus (vlcere iam profundo) præcauebitur admixtis illis metallicis vstis lotisq; bolo armena, & terra sigillata. Singulare est vnguentum sequens.

℞. plūbi vsti lotiq; tuthiæ præparat. & thuris an. ʒ ss puluerentur seorsim & subtiliter, tū ℞. ol. ros. & ceræ albæ an. ʒ j & pistillo plūbeo in mortario plūbeo agitata incorporētur, deinde addita succi solani ʒ j omnia diu versanda, ita vt effuso tandem omni liquore vnguentum retineatur.

De inflatione vteri.

Est quidam vteri tumor, inflatio dictus. Flatus autem est spiritus seu vapor crassus & turbidus, quo vterus impletur & distenditur. Oritur ab imbecilli calore nativo, & humorib. cibisq; pituitosis. Ille enim materiam quantitate & qualitate alioqui moderatam diminutē coquit attenuat & dissoluit: hæc vegetū etiā calorē vincit. Colligitur flatus in cavitatib. manifestis & occultis. Ille vel sunt maiores vt in vētriculo intestinis cerebro scroto venis, vel minores vt in spaciis inter partes similes, sub cute & membranis muscutorum, viscerum & ossium.

In maioribus multipliciter mouentur, ex quo ipsorum motu variae admodum sonorum species eduntur, ut in cerebro sternutationes, in corde & musculis palpitantes, in ventriculo ructus, in intestinis murmur, strepitus, sedis crepitus, sonori, vel obscuri, in vluva & vesica efflationes, in nervis tremores.

Flatus vteri tum substantiam, tum cavitatem priuatim obsident. Communia eorum signa diagnostica sunt imi ventris & pectinis tumor dolorque; pungens, & distendens aliquando ad praecordia usque; stomachum & umbilicum praepressione viscerum ad ilia & inguina exporrectus: sed propria in cavitate vteri flatuum signa sunt sonitus tympano similis pulsante digito: strepitus, tum cum flectitur aut conuoluitur corpus, humore cui mixtus flatus est in alterutrum vteri latus afflatim transfluente, efflationes vteri sonorae, vel obscurae (propterea orificium internum magis minusve patet.) Flauum in vtero colligendorum externa fere causa est aura frigidior, in patulam vluuam vterumque incautis nec benedictis puerperis, aut menstruatibus mulieribus, aut denique balneatis clam subrepens subiensque. Alias interna est vel idiopathica, ut obstructio à mensibus & lochiis retentis occursu refrigerantis causae: ut aeris aut morboris & tristitiae: vel etiam grumefactis; aut sympathica ex cruditate ex qua flatus: vel ex flatuoso cibo & sanguine.

Prognosticum est quod sterilitas ab eiusmodi inflatione imminet astrictis acetabulis & cornibus, quo fit ut neque semine muliebri ad coeceptum allabatur, nec sanguis menstruus ad conceptus nutritionem.

Curatiua indicatio communissima omnium tumorum est: vacuatio scilicet flatuosa alienaque materiae.

teriaz. Peculiaris est resolutio digestioque. Cate-
rum resolutioni & peculiari vacuationi præpo-
nenda est vniuersalis per clysterem tergentem &
phlegmagogū, & per purgationē ex infuso rhei &
agarici trochiscati, cū elect. indo maior. dissoluto,
aut electar. sennæ cum diacarthamo. Sunt autē me-
dicamenta resoluentiā calida siccaque parū, vsq; ad
secundum gradum & tenuissimę substantiæ vt calo-
re suo cutem rarefactam tenuitate sua penetrent,
crassūque vaporem incidant & attenuent, vt spō-
te sua exhalare possit, aut certē trahentium vi ma-
iori facilius tandem dissipari.

Forma medicamentorum liquida vel media sit;
quippe penetrationi vtraq; aptior est, multo magis
quā solida nisi forte in declinatione vaporū humo-
rūmq; exiguis reliquiis dissoluendis hæc cōparētur.

Ergo ex topicorum externorum genere fotus
paretur ex foliis artemis. nepit. pulegij, matricar. o-
rig. calāmint. meliss. ex baccis lauri & iuniperi ex se-
mine cumini ex florib. denique chamæmeli meli-
loti in aqua decoquēdis, addita vini quarta parte,
& quod ex filtris, vel spleniis, aut vesicis etiam ma-
iorū animalium regioni vteri inducatur tepide ante
pastus & per horam vnā singulis vicibus vicissim
mutando. Fotus etiam siccus, conuenientissimus e-
rit per sacculos fursute macro, milio, sale, cumino
frixis repletos. Ex eadem fotus materia fiant infes-
sus & semicupia & clysteres vterini additis oleo ru-
taceo & anethino. Mox autem à fotu vel infessu li-
tus vel embrochatio fiat ex oleo cui ruta aut cali-
dum aliquod semen vt cumini carui incoxerit, ex
quo etiam addita cera & prædictorum seminum
pulvere, vnguenta comparentur.

Sic ex residentia confusa cribratâque addendo farinam liliaceam, aut similium seminum pulueres cum oleo rutaceo cataplasma fiat. Tâdem vero cucurbitulæ umbilico affixæ magnæ & cum multa flâma flatus validissimè foras protrahût in declinatione: sicuti dropaces & sinapismi. Vbi autem dolor ex nimia têsione acerbior fuerit, plura anodyna & relaxantia paucioribus digerentibus misceantur: ne ab iis calidioribus plures vapores tensiôque maior suscitentur.

Lochia suppressa post apertionem venarum poplitis aut malleoli in utroque pede, & purgationem phlegmagogam, euocanda sunt tandem per clysteres & iniectiones prædictas, à quibus acetabula expellantur flatûsque digerantur.

Eadem erit grumorum cohibitorum ex uteroeductio per clysteres & iniectiones, si insuper duriores digito obstetricum leniter in sinum pudoris inserto detriti & dissoluti fuerint. Ventriculi denique intemperies & cruditas si inde flatuum vteri congeries est, abroganda prius erit per purgationem redundantis pituitæ siue phlebotomia & per alterationem intemperiei contrariam. i. calfactionem siccationemque cum leui adstrictione: tum per assumenda ut vinum absinthinum elect. aromat. rosat. & diagalang. per condituras zingiberis, cortic. citri, rad. enulæ & eryngij, florum anthos & saluiæ: per opiatas theriacam & mithridatium; denique per imponenda, ut emplastrum mastichinum.

De hydropo vteri.

VT flatuosus, sic aquosus quidam tumor vterû obsidet, hydrops vteri vulgò dictus, alibi à chirurgur-

rurgis apostema aquosum. Est autem serum tenue & aquosa humiditas, cuius instar aliorum humorum. i. sanguinis in hepate ortus est. Est autem vel moderatum, vel immoderatum. Illud è potulentorum ciborumque humidiorum reliquiis prouenit, cuius magna pars vi renum tractrice, à sanguine secreta & in vesicam transmissa vrinarum fit materia, reliqua portio sanguine mixta permanet ad eiusdem deductionem per minores venas in habitum corporis.

Immoderatum autem vel ex victu frigidiori humidiorque aceruat ut ex mora in locis pluuiosis & palustribus, ut ex olerum frigidorum usu eorumque iusculis, ut ex piscium, fructuum horarum, lactis & caseorum, largiori aquæ frigidae & intempestiua potatione, desidia, somnolentia. Tum ab hepatis frigida humidaque intemperie, vel simplici, vel tumori alicui implicita, frigido humidoque, flatuoso, œdematoso, scirrhuso, eaque vel idiopathica vel sympathica potius per consensum aliarum partium nutritioni seruientium, ventriculi, lienis, mesenterij, intestinorum, renum & vesicæ, quorum intemperiei ob viciniam venarumque communitatem hepar facile tandem fit particeps. Quod si utraq; causa concurrat, & intemperiei, & diætæ prauæ, tunc ingens aquarum copia cumulat.

Porro exuberantis feri pars magna, post vrinarum etiam secretionem, sanguinem in vena cava diluit unde fit praua nutritio, inde *χρῆμα* virginum, fœdus corporis color, & virium omnium dissolutio nativo calore prope extincto, pars ex eadē cava vena eiusque ramis per occultos & insensiles meatus in partium sinus exundare solet, ut in ventriculos

cerebri(vnde epilepsia, apoplexia, conuulsio, paralysis, vertigo) in thoracis capacitatē vnde dyspnœa suppurationi similis, in abdominis vnde hydrops, ascites, indēq; pedū, tibiārū, & articularū œdematosi tumores, in pericardium vnde palpitatio, dyspnœa, lipothymia, & aliquādo mors repentina, in vterum denique vnde stupor sensuum, torpor motuum, & totius corporis inertia, sterilitas quoque & menses suppressio. Cæterū serosa illa illuuiēs in vterum aliquando non confluit, nec aliunde excipitur, sed in eo colligitur. ob frigidam humidamque eiusdem intemperiem, vel natiuam, vel potius aduentitiam, ab aere frigido, post menses, partum, abortum violentum, balnea, stuphas, ab incautis mulierculis in hiantem vuluam admissæ, proprium corrumpēte alimentum, vel certe ex pluribus hydatidibus(i. vesiculis aqua plenis ruptisque à quibus in hepate oriri hydropem Hippocrates testatur.) Accruatur denique serosa colluuiēs in vteri sinu conuiuente eius ostiolo interiori non quidem ob tensionem & repletionem immodicam collectionis initio: sed potius vel ob conceptum, vel attractionem à tumore aliquo. Aliàs eius destillatione pudendum muliebri perpetuo madere solet.

Huiusce tumoris signa sunt diagnostica imi ventris, tumor laxus, amplus, flatuosus & agitato corpore murmurans ob mixtos flatus, ambulatio difficilis pressis grauāte feri mole neruis femorum, difficultas spirandi impulsis sursum intestinis, & ventriculo, atque diaphragmate, valdè oppresso, deiectiones valde foetidæ ob humiditatem intestinalium, dolor ventrem, lumbos, ventriculum, ilia, inguina,

guina hypochondria fatigans, vt de inflatione proditum est, suppressio mensium ob acetabulorum angustiam præ vehementi refrigeratione vteri: aliàs enim menses suo tempore tametsi prauipaucique & breuiori spatio, priusque expurgata colluie, erupisse aliquando Fernètio aliisque visi sunt, Cõceptus denique impeditur, extincto semine virili, neque intro admissio ob oris interni cõnientiam. Quod si præcesserit conceptus, aquis tamen immersus continuo interit.

Curatio.

Curationis scopus duplex est, primus aquarumeductio, alter relictæ intemperiei alteratio. Eductio autè duplex est, prior causæ antecedentis seriq; cum sanguine per venas sparsi, posterior coniunctæ, serique in vtero conditi. Illa inchoatur per accidens à diætâ calida siccâque, & attenuante, qualis descripta est in œdemate, & inflatione, quæ serinouum prouentum prohibeat.

Absoluitur à pharmacia 4. reuulsionum speciebus: prima est clyster attenuans, tergens, & hydragogus qualis est,

℞. rad. irid. cyclamin. & arist. rotund. an. ʒij
fol. betæ mercur. artemis. puleg. sabin. matric. an. m.
j. seminis cumin. ʒβ flor. chamæmeli & centaur.
min. an. p. j. decoquantur & in colatur. lb. j. dissolue
succu mercuriaris & vrinæ pueri impuberis an. ʒ
ij ferment. veteris & bened. laxat. an. ʒj olei rutacei & anethini an. q̄rt. β fiat clyster iniciatur pri
die purgationis ieiuno ventriculo & reiteretur
bis aut ter in hebdomade toto curationis spatio.

Secunda reuulsionis species est hydragoga purgatio, cuius clementior materia est, cortex radicis ebuli, item semen & folia, succus radic. iridis hortensis, rad. ebuli, brassicę marinę & peti. i. nicotianę & radix mechoacam &c. Vehementissima sunt colocynthis, elaterium, succus cucumeris agrestis, & radicis cyclamini, folia thymelę, chamaelę, laureolę, tithymali & cataputię grana. Similia sunt electaria diagrydiata & colocynthifata, quale est de succo rosarum, diacartham. indum maius & benedicta.

*Exemplum hydragoga purgationis
lenioris.*

℞. rad. mechoacam subtiliter pulueratę, vel seminis ebuli contusi ꝓ ij cinnamomi ꝓ j infunde per noctem in vini albi clari & tenuis ꝓ ij & die sequenti mane expressum potetur.

Exemplum media.

℞. succi rad. irid. purpureę ꝓ j detur cum decocto leniente hordei mundati, prunorum dulc. passul. violarum.

Exemplum validissima.

℞. rhabarb. puluerat. ꝓ j ꝓ agaric. trochiscat. ꝓ j infundatur in vino albo claro & tenui, vel in aqua peti per noctē, & in expressione dissolue elect. diacartham. ꝓ ꝓ cinnamomi gr. vj sacchar. ꝓ ij.

Tertia reuulsionis species est mictiō incitanda augēdāque medicamentis diureticis calidis siccisq; tertio gradu, & tenuissimę substantię, hæc enim sangu-

guinem liquant, tenuántque, & ab eo serum fecerunt quale est sequens.

℞ rad. apij, petros. scenic. rubię maior. azari, cort. median. rad. capparum & tamarisci an. ℥ij fol. agrimon. capillar. omnium, organ. calamiut. brassic. marin. berulæ, sisimbrij siue cressonis an. m. j. cicerum rub. flor. genist. tamarisci & anthos an. p. j. seminis apij petro. scenic. ebuli & peti an. ℥ij coquantur in oxymelite tenui & in colaturæ ℥b j β dissol. syrup. de s. rad. oxymelitis diurectici & syrup. bizant. an. ℥ij panis sacchar. qrt. j. pulu. elect. Iustini vel λιδος-τεϊκας ℥ij fiat apoz. pro 4. dosib. matutinis.

Finito apozemate reiteretur potio laxatiua præscripta. Similis sit diurectica facultas pulu. rad. ononidis cū pauco cinnamomo liquiritia & saccharo.

Quarta reuulsionis species est sudor tum hydroctis medicamentis, quale est decoctum Guaiacini rad. chinę, & falsę parillę, tum stuphis & balneis naturalibus commotus.

Reuulsiones sequitur vacuatio causę coniunctæ per topica interna externæque calfacientia, & resoluentia, cuiusmodi sunt saccelli fursure macro, sale, milio, & cumino frixis repleti & calidè appositii: talis fatus est ex decocto rad. aristol. rotūdæ, ebuli, cucumeris agrestis, ciclaminis, fol. puleg. organ. calamenthi, sabinæ, artemis. matric. seminum cumini fileris montani & flor. genistæ in equalib. portionibus aquę & vini albi additi post finitam coctionem: applicetur cū vesica suilla vel spleniis vel filtris ter aut quater in die & per horam vnā singulis vicibus. Ex eadē materia cōmodissime infessus pareretur vel semicupiū. Mox à fōtu infessūve li. fiat vel embrochatio ex oleo rut. multū fricādo, vel vnguentū

ex eodem oleo addendo cinerem buccinarum, purpurearum coclearum. Emplastrum simile est à Guidone descriptum ex seminis sinapi & vrticæ, sulphuris viui, spumæ maris aristoloch. bdellij ammoniaci olei rutacei & ceræ sufficienti quantitate.

Iniectiones comparantur è simili fœtus materia siue decocto quæ menses moueant aperiendo tergendoque, & aquas educant quibus reiectis mox pessus subdatur ex myrrhæ, aloes, gummi ammoniaci, rad. iridis folior. brassicæ, mucernæ & colocynthid. puluere cum melle incorporato. Quod si topicorum acrimonia pruritum & ardorem pudendo & ceruici vteri inusserit, ille quidem deliniatur portione lactis asinini vel caprilli, locique perfusione ex eodem lacte, admisto succo plantaginis vel mucilagine seminis cytoniorum & psyllij extracta cū aqua rosarum, linteolis etiam eodem liquore & albumine oui insuccatis & pudendo admotis. Denique post exhaustas vteri aquas pristina temperies & robur vtero restituatur, eiusque mollities & laxitas substantiæ comprimatur topicis modice calidis siccisque, & constringentibus tum externis vt emplastro pro matrice, aut de mastiche, vnguento ex oleo nardino, absinthino, myrtino, muscatelino cum puluere rad. bistortæ iridis florentiæ mastiches ladani nucis moschatæ boli armenæ & balaustiorum cum cera alba : tum internis vt fusticibus ex eiusdem materiæ puluere in trochiscos cum terebinthina coacto : quorum vapor mane & vespere ex ollula per insudibulum ferreum aut baxeum altissimè per vuluam in vterum infera-

inferatur, peflo denique per opiatam ex eodem pulvere cum melle.

Quod fi ab hepatis aut alterius visceris intemperati sympathia noxa hæc vtero accesserit, illa quoque intemperies simul profliganda est, remediis scilicet calidis siccisque & modice astringentibus tum sumendis mane, vt opiatis, qualis est theriaca mithridatium &c. & tabellis vt aromatici rosati diagalangæ, & similia, in cedemate & inflatione vteri expositorum: tum ad mouendis vt emplastris idoneis & vnguentis.

De calculo vteri.

Post curatos vteri morbos similes, vt est pars substantiâ spermaticâ & membrancâ, organici eiusdem affectus, vt pars est quoque instrumētaria, curari cœperunt.

Primum quidem ij qui ad figuram spectant, vnde tumores præter naturam, deinde morbi in cauitate, ex quibus inflatio & hydrops. Soli supersunt calculi & grumi molâque à quibus cauitas vteri repleri solet, cum eodem fecunditatis, & mensium incommodo.

Est autem calculi materia frequentissima humor crassus viscidus limosus: magis infrequens arenulæ limo coactæ & conglutinatæ: sicuti & terrena vrine portio adusta concretâque, vt in matulæ fundo, sic in vesica.

Euidentes causæ sunt intemperans & intemperata dixta, ex alimentis crassi, lentique succi, vt carnibus porcine bubulis & ferarum vetustiorum, piscium grandiorum, cetaceorum, radic. napi, rapi, leguminum, lactis, casei, aquarum limosarum, vino-

rum crassiorum. Huc spectant exercitatio à cibo importuna, desidia, somnolentia, mórque à pastu balnea. Causa efficiens calor est, siue vehemens & valde acris, siue mitis & remissus, vterque sane humorem crassum lentumque, tenui portione insensibiliter dissoluta in lapideam duritiem cogit, ille quidem affatim, hic sensim; ille quoque terream vrinæ portionem in vesica adurit, & in renibus exusto crassiori sanguine arenulas colligit, hinc vtrique sexui molestus calculus est, (quamvis mas calidior, scæmina frigidior sit) omnique ætati, vt pueritiæ, iuuentuti, & senectuti.

Locus est cuiuslibet visceris partisve etiam externæ cavitas, vt articulorum, sinuum cerebri, brôchiorum in pulmonibus, intestinorum, mesenterij, lienis, hepatis, vtriusque vesicæ & reni: rarissimus in vtero locus est, ob mensium fluxum, viarumque laxitatem, situmque decliuem in iuuenibus (sed in iunioribus conglobatus est arctissime vterus instar pyri) & in senescentibus quibus defecerunt menses, aut ob obstructionem cotyledonum, idque vel è proprij alimenti reliquiis, vel ex viscerum sese exonerantium sympathia. Causa sine qua non oris est interioris oclusio, perpetua quidem nisi coitus, mensium, & partus tempore.

Calculi signa sunt dolor grauis in pectine, & imo ventre, oppresso ore interiori, suppressio mensium, & sterilitas, obturato eodem ore ab impacto calculo minori, vel obiecto grandiori, indéque sanguinis emissionem, & seminis virilis admissionem interclusa.

Curatio.

Curatur vteri repletio à calculo, calculi ipsius amo-

amotione: non quidem per medicamēta diuretica, tercio gradu calida siccaque & tenuissimę substantiæ, ob auritiem & distantiam nimiam, neque per incisionem ceruicis vteri, ne vesica ipsa & intestinum scalpro violentur: sed extractione & propulsione per os interius prius relaxatum. Sic enim calculus haud multò egrus quàm fœtus multo grandior proditurus est: illa autem relaxatio constet medicamentis humectantibus caloris & frigoris mediocritate tēperatis, sed humore aqueo & acreo magis minúsve confertis; Eiusmodi sunt inter mitiora radices altheę, liliorum, folia eorundem, violar. parietar. acanthij, pruna dulcia, flor. chamæmel. & meliloti: paulò calidiora sunt lini & fœnugræci semina, carica, oleum lirinum, chamæmelinū, amygdalinum dulce, iasmininum: adipēs denique & medullæ recentes & sine sale domesticorum animalium, quia hæc humidiora sunt, quàm agrestia, ex hac materia cocta clysteres, fœtus, infusus, cataplasmata, vnguentā & cerata conficiantur.

℞. rad. alth. & liliorum an. q̄rt. j. fol. 4. emollientium an. m. j. prunorum dulc. & caricarū pingu. an. par. vj. feminis lini vel fœnugræc. q̄rt. j. flor. chamæmeli, meliloti, malu. an. p. j. coquantur omnia in iure pingui omazorum veruccinorum. In colaturæ lb j (vt minor quantitas diutius moretur) dissolue butyri recentis & axūgiæ recentis suillæ vel gallinacæ an. q̄rt. β, olei liliorum ℥ iij fiat clyster, iniiciatur semel in die, ieiuno ventriculo.

Possit tamen etiam vtiliter cassiæ bolus post clysterem exhiberi, eique plebotomia substitui ad fluxionis declinandum periculum in partem relaxandam & ex cōpressione atque extractione doliturā.

Ex eodem decocto clysteris, forus & infusus siue semicupia, aucta eius quantitate, fructuosè vsurpètur bis aut ter, per singulos dies, & hora vna per singulas vices.

Ex magmate eiusdem decocti tuso cretòque per cribrum setaceum adiunctis prædictis adipibus & oleis, & farinis lini vel scenugræci cataplasma fiat mox à fotu vel infusu, calfactæ & rarefactę parti super stupas bene pexas imponendum. Embrochationes, litusque ex prædictis oleis, cataplasmatibus loco conuenient, indèque vnguenta eiusmodi.

℞. mucilag. seminis lini extractæ ex decocto caricarum ℥ iij olei lirini chamæmel. & amygdal. dulcis an. ℥ ij butyri recentis, axungię recentis gallinæ vel anseris & cœsypī an. ℥ j farinæ lini ℥ β ceræ nouæ parum, fiat vnguentum.

Similia prostant in pharmacopoliis, Resumptiuū & de alth. & emplastrum filij Zachariæ.

Vsurpatis per biduum, vel potius triduum istis remediis relaxantibus: tum dehiscēte satis osculo interno vuluæ calculi amotio per extractionem internam, & propulsionem externam tentanda est.

Extrahent autem & à fundo ad cervicem deducant calculum longiores duo sinistræ manus digiti obstetricum, vel chirurgorum per anum altissimè in intestinum demissi: eundem eodem tēpore propellet dextra manus superiorem ventrem fundumque vteri ab vmbilico valide comprimendo, & calculum ad os interius cogendo: muliere interim decumbente supina & diuaticatis crūribus, intestino denique prius eloto vt dictum est.

De

*De repletionē vteri à grūmo sanguinis,
aliòve humore.*

VT puerperis lac in mammis, sic lochia siue sanguis in vtero grumescere solet. Est autem *θρόμβωσις* grumefactio vtriusque communis affectio, tum lactis, quoties in mammis duritiem caseosam subit: tum sanguinis qui è cotyledonibus in vteri cavitatem infusus, neque ex eadem maturè effusus, vel ob indecentem puerperæ decubitus femorumque arctiorem accubitus, aut interioris oris tumorem aliquem, in eadem similiter coit, & in exigua frustra condensatur, qui grumi vocantur, idque ob refrigerationem propriique caloris dissolutionem ob quam nigricare: sed etiam putrescere, ac tandem corrumpi solet cum funestissimis symptomatis, vt coloris sceditate, pulsu paruo, frequenti, & obscuro, anxietate, animi defectione, & morte frequenti, ob caloris natiui perniciem à venenata corruptelæ aura per communes arterias in cor delata.

Eadem sanguinis refrigeratio per habitum carnisque meatus obscuros, à contusa & collisa vena respersi accidere solet, vnde pars ipsa liuescit & nigricat, vocaturque eiusmodi affectio liuor, sugillatio, & in genis priuatim *καρπούριον*.

Eadem sanguinis concretio & corruptela non in vteri solius sed in aliarum quoque partium euidenti cavitare accidit, vt ventriculi, intestinorum, renum, vesicæ, thoracis, narium quomodolibet, ex venis siue per *διαρροήν*, siue per *σπληνισμόν*, siue per *αγγειόμωσιν*, siue per *πέξιν* exciderit.

furfum,mutata fede ad viscera,vel incitante libidine: vel cogente ficcitate ad humiditatis captanda subsidia, cum vterus fcilicet immodicè exaruit præ immodico labore & calore, vel ex inedia,vel ex menfium & lochiorum redundantia, vel ex menftrui fuppreffi, veluti alimenti idonei penuria, vel ex feminis virilis inopia, vel denique ex contractione conuulfiua venarum & ligamentorum poftquam humore vel vapore repleta nimis funt. Addunt extumefcere eundem vterum multo intus cõcepto flatu craffoque ex intima feminis & menftrui fanguinis putredine, vel ex aëre in hiantem vterum per eruptionem menfium & lochiorũ fubente, folutionem denique nafci ex violenta flatuum diftentione quam pungens & colico fimilis dolor imi ventris fequatur. Sed enim ab affectus huiufce vterini caufis,afcenfum eiuſdem,tumorẽ & folutionem continuitatis remouere iure mihi videor: cum enim tres corporis partium motus notari tantum poſſint, animalis,naturalis & fymptomaticus, à nullo certè iſtorum præcordia opprimi vt omnino non dilatètur,ab vtero poſſint. Naturali enim ad vmbilicum tantum non ad medium ventriculum,nedum ad diaphragma extendi poterit, ficuti deorfum ad ceruicis initium tantum & ad latera leuiter contorquetur, dum fcilicet gratis odoribus allicitur aut ingratis fugatur, aut dum femini virili per coitus incendium obuius obuoluitur, aut denique dum moleſtis vel iucundis rerum caſibus nuntiiſve percellitur, nam quæcumque ab eiufmodi motu naturali hyſterica fymptomata cieri ſolent, ea quidem non ad aſcenſum preſſumque præcordiorum: ſed ad humorum putrium vaporumq;

venenatorum agitationem & expirationem proximè sunt referenda; mota enim vehementer parte qualibet eiusque spiritibus, humores quoque vaporesque quicumque sopiti & inertes in ea delitescunt, grauitur commouentur. hinc vertiginis & epileptice accessiones à vehemente ira & timore, sicuti hysterice inuasionis suscitantur. Animalis autem motus vteri nullus est, cum animal non sit (vnum enim, fœminam nempe, è duobus actu existentibus constare paradoxon omnino est) cumque omnibus motus animalis & voluntarij instrumentis musculis & nervis careat: neque etiam desiderij sui compos per eiusmodi animale motum si fortasse à Platone concedatur fieri omnino possit. Simplicem enim & aqueam humiditatem non mutata sede sua, è vicina vesica & intestini parte aliqua celeriter & quietus captaret; alimentalem autem sicuti sanguineam aut chylosam etiam hepatis & ventriculo proximè aduolutus deriuare nullam posset præ densitate & crassitie externæ suæ tunicæ nullis meatibus manifestis peruia, solisque venarum à caua ortarum propaginibus intus hiantibus conspersæ. Multo verò minus septi commercio, quod natura siccum aridum & membranosum est, societate & adhæsiōe irrigetur: nulla denique coitus voluptate aut generationis cupiditate incitari motus hic animalis vteri possit, cū seminis excretio sicuti stercoris vrine & molesti cuiuslibet excrementi sit omnino naturalis brutorumq; citra voluptatis cogitationē prolisque cupiditatē cōmunis. Motus denique symptomaticus vel cōuulsiuus vterum attollit deprimite, aut in latera adducit: sed omnino leuiter neque lōgius à sua sede vt diaphragma laceffat

laxeſcat, dum ſcilicet ſuppreſſo menſtruo impletis
 venis valida quidem eius, ſed tamen laxa vincula
 viciffim implentur & contrahuntur, vterumque ſe-
 cum verſus ſuam originem vel æqualiter, ſi omnia,
 vel inæqualiter ſi quædam conuellantur, reuellunt,
 qui motus violenti, vteri peruerſiones, merito vo-
 centur: nequaquam tamen hyſtericorum ſympto-
 matū authores ſtatuantur, cū illa à cōmuni origine
 & cauſa menſtrui ſcilicet retenti corruptione & ex-
 piratione ſuſcitētur. Vteri quoque tumor valde in-
 gens amplus & turgidus reſpirationem quidem
 crebriorem minorēque per ſe effecerit (oppreſſo
 diaphragmate) eandem tamen omnino per ſe non
 ſuſtulerit, aut hyſterica ſymptomata vt apnœam, a-
 phoniam, ἀφροζία, torporem, conuulſionem ſine
 venenata expiratione non attulerit, ſicuti neque ſa-
 tietas & ingluuiſ immodica aut imprægnatio aut
 hydrops. Solutio denique continuitatis nullum al-
 liud tædium niſi fortasſe doloris pungentis & co-
 lico ſimilis commouere poteſt. Ergo cum neque a-
 ſcenſus vteri neque tumor eius ullus hyſtericorum
 ſymptomatum author ſit, ad intemperiem vteri ſo-
 lam vterinum affectum referri & hyſterica ſympto-
 mata neceſſe eſt, quæ paſſio quædam diuturna, ſed
 paroxyſmis acutiſſima eſt. Ergo affectus vteri vnde
 ſuffocatio ægrotantis mulierculæ, intemperies eſt
 frigida humidæque à veneno ſimili frigido, humi-
 dōque ex corrupto ſemine & menſtruo orta. Ita-
 que viduis potiſſimum ob intermiſſam purgatio-
 nem & venerem ſymptomata hyſterica inſenſa
 ſunt, à quibus antea aliena omnino erāt, dum probe
 purgarentur, parerent, viriſque miſcerentur. hinc
 hyſterica fœmina titillatis digito obſtetricis genio

talibus magnam vim crassi seminis reiecit & accessione confestim liberata est; sic monialibus quoque ex voto castis innuptis benèque habitis & otiosis puellis eadem corrupti potissimum seminis molestia creberrima esse solet. Cæterum corrupti mēstrui seminisque materia non manifesta tantū qualitate frigida humidāque, sed occulta quoque antipathia veneni præsentissimi instar mulieribus est noxia. Non enim nouum aut inauditum est venena intestina in nostris corporibus succrescere, à quibus vt ab externis & assumptis funestissima symptomata & inopinatæ mortes nobis consciscantur, similisque mortuorum corporum affectiones excitentur, vt liuor, nigrities, varij colores, mollities & laxitas, vnico tantum discrimine, quod externorum pestis in hominem eusarchum & temperatē lautēque & frugaliter victitantem sæpius grassari videatur. Colliguntur autem minutatim, sensimque intus inualescunt venena sine graui tamen ægrotātis & euidenti ostensione, donec aut cumolata vberius, aut corrupta deterius, aut longius sparsa, aut mota sint vehementius ab irritata tandem partis in qua desident facultate expultrice. Materia igitur hæc in plures vapores resoluitur agitata in vtero humorum corruptorum sentina. Hinc repentina mors quam in sinu diutius antea gestauerant ægras velut ex insidiis rapit. Sic rabies à morfu canis rabidi non quidem illico sed pluribus postea diebus vel mensibus hominem inuadit, dum scilicet iusta mole satisque vehementi perniciē creuit, quæ cerebri temperiem calore & siccitate subuertat. Sed enim ex duplici illa materiæ venenatæ specie, seminis corrupti maior est quam mēstrui perniciēs.

Cum

Cum enim mutatio omnis in contrarium fiat, sitq; semen sanguine magis coctum perfectum & elaboratum, deteriore veneni conditionem hoc ipsum subire quam illum necesse est: hoc verò perspicuum est tum ex illis fœminis non viduis quæ suppressa purgatione menstruali hysteriis aliquando symptomatis sed multo leuioribus lacerantur, quàm pleræque viduæ, quibus procedente etiam purgatione, vehementissima maximèque funesta insultare solèt ut apnœa, aphonia, syncope, conuulsio, stupor torporque, illis præsertim quibus est à luxu, otioque & longiori continentia copiosius semen congestum.

Virile autem semē minus est quam muliebre ad putredinem & corruptelam venenatam proclive, cū sit illud quidem calidum siccūque magis & sincerum, hoc contra frigidius humidiusque, frigidūque veneno magis affine & ut dicunt proportionatum, & præterea in obsceno sordidūque vtero resideat. Neque tamen hysteriis similium symptomatum molestiam viri plane effugiant dum venenis consuetudinem diutius intermittunt ut cephalalgia, stupor, inertia, fastidium, cruditas, metus & mœstitia. Neque vero dubitandum est quin tantula veneni uterini portio tantum possit aduersus principes totius corporis partes. Quid enim? An non exiguum valde venenum pungentis phalangij per angustissimum foramen partibus principibus cōfestim imprimitur? Nōne ex infixo scorpionis aculeo quidā vel tabificus vapor, vel deleterium virus sine foramine conspicuo totum corpus celeriter peruat? Quid? An non solius qualitatis sine vlla substantia diffusio vicina corpora perme-

uere aliquando videtur? Sic piscatoris manum per continuum tridentem torpedo marina eneruat. Sic electrum paleas. Sic magnes ferrum ferreasque acus complures quasi nexu quodam inter se deuinctas tacta vna ordinatim omnes ad sese pertrahit: Rectè igitur vterinum affectum ad intemperiem frigidam humidamque vteri retulimus, qua vterus primum, deinde reliquum corpus perfrigeretur. Huius quoque intemperiei continentem causam verè statuimus materiam venenatam frigidam humidamque ex corrupto semine & mēstruo aut alio quolibet humore, præsertim pituitoso, cuius expiratione tetra, venenata & deleteria, partiū principum omnes functiones labefactentur, vitæque ipsa aliquando eripiat, dum in cerebrum per nervos & spinalis medullæ tunicas, in hepar per venas, in cor per arterias, in totum corpus per latentia spiracula quoquo versum efflante vtero per accessiones spargitur. Inde symptomatum hystericorum numerosa & violenta soboles tum cerebri, vt stupor sensuum, torpor in motu, mentis inertia, veternus, dolor grauans, deliratio melancholica aut furiosa, vertigo, epilepsia, conuulsio siue vniuersalis siue particularis. crurum & brachiorum, eaque omnia à crassis, frigidisque vaporibus cerebri substantiam meninges nervosque impetētib, tum cordis, thoracis & diaphragmatis vt apncea, asphyxia, aphonia, lipothymia & syncope, calore scilicet nativo aut vaporum frigidorum crassorumque copia oppresso, aut venenata qualitate extincto, tunc enim i expirationis & pulsationis vsus nullus est: tum ventriculi vt nausea, vomitus rarus, fastidium, ructus, irrēpentibus ex vtero malignis vaporibus: tum intestino-

testinorū vnde murmura rugitus borborygmi præ flatuū tumultu. Inde etiam imi ventris, lumborum, pubis inguinum ilium dolor pūgens & colico similis, ex flatuosa distensione ligamentorum & membranarum peritonæi, quibus ad vicinas partes annectitur vterus.

Quod si per mensium aut lochiorum eruptionem nimiam purgationem & inediam extumescere vterum aliquando contingat: hunc quidem tumorem ab aëre simplici hiantem sinum mulieris subeunte non à vapore venenato excitari certum est, atque inde diaphragmate leuiter compresso minorem & crebriorem spirationem sine grauioribus symptomatis oriri. Similis est quoque ab odoribus suauibus olfactis dispncea, septique oppressio, vtero scilicet ad eos odores inclinante vnde impelluntur ventriculus & intestina, nisi fortasse vterus & sopita vteri camarina his vteri motibus concitetur. Porro hystericorum symptomatum varietas non solum ex varia viscerum vtero condolentium natura, sed pro dissimili etiam causæ efficiētis, id est venenatæ materiæ specie, quantitate & qualitate emergere solet; nam venenum ex semine multo magis quam è menstruo corrupto pestiferum esse iam docuimus. Idem si copiosum valdeque frigidum & humidum sit totum corpus tam vehementer perfrigerat obfesso corde vt veram mortis imaginem exprimat, cerebro inexpugnabilem veterum, thoraci apnceam, cordi & arteriis asphyxiam, lipothymiam aut syncopen inducat, si vel crassum vel acre sit conuulsionem, sin biliosum delirationem, furorem, loquacitatem temerariam, si atrabilarium metum & mæstitiam, risum & la-

chrymas fuscitet. Ex hac igitur hysteri-
corum symptomatum varietate vterini affectus species tres
obseruabat Galenus libro sexto de locis affectis,
vnam cum hystericae foeminae sine sensu motuque,
respiratione & pulsatione euidenti tanquam mor-
tuae iacent: alteram cum, sensu motuque & iudicio
constante, lipothymia tamen & dyspnoea laborant:
tertiam cum eadem foeminae cruribus & brachiis
praeter reliqua symptomata conuelluntur. Sed de
prima specie, an a morte distet dubium non est.
Vegeto sane calori nativo, per quem vita est & si-
ne quo vita nullo modo possit esse, conseruando,
purgando alendo temperandoque respiratio pul-
satioque euident est omnino necessaria: sed cun-
dem tamen debilitatum vehementer maximaeque
perfrigeratum vterinae labis aspersione fouere tan-
tis per tuerique transpiratio sola potest, dum excus-
sa ex utero venenata materia omninoque eius ex-
piratione compressa restituatur calor & respiratio;
Non igitur nullo, vt in respiratione: sed obscurissi-
mo & languidissimo pulsu motuque cordis qui
transpiratio dicitur, hystericae foeminae possunt vi-
uere.

Similis est serpentum in suis latebris sine sensu
motuque, respiratione & pulsatione conspicua per
totam hyemem vita, qui tamen blando veris tepo-
re excitari & veluti reuiuiscere videntur. Sunt au-
tem serpentes acri quidem magis calore quam ho-
mines, sed minus copioso, & frigore magis infesto,
sicuti homines etiam magis quam bruta ob cutis
mollitiem & laxitatem maiorem: proinde incer-
tum fallaxque est in foeminis hystericis mortis ar-
gumentum sumptum ex eo quod neque nitidum
spe-

speculum ipsarum ori admotum inquinetur, neque carptæ lanæ floccus naribus obiectus moueatur; neque denique cyathus quolibet liquore plenus & stomachi regioni impositus agitetur; tria enim hæc respirationem solam abesse non transpirationem denuntiant. Differendum itaque scæminarum hystericarum in tertium ab accessione diem funus, sapientum literis traditur: hoc enim triduoano spatio, aut scætere grauitur, aut excitari ab accessione incipiunt.

De signis diagnosticis.

VTerini affectus signa diagnostica sunt vel propria vel distinctiua. Illa rursus triplicia, imminētis, vigētis & declinantis accessiōis. Prima illa sunt torpor mentis, stupor sensuum, crurum debilitas, standique impotentia, faciei pallor, ventriculi oppressio & dispncea, vētris inflatio, facilisque in eum decubitus, quæ omnia incipientem ab vtero euaporationem sequuntur. Secunda (hoc est vigētis) sopor, apncea, aphonia, deliratio, furor, conuulsio brachiorum & femorum aucta vaporū multitudine, maximèque exacerbata continente causa, risus denique vel lachrymæ vel vtraq; vicissim pro natura atrabilarij sanguinis vel menstrui. Tertij ordinis sunt virium recreatio, oculorū apertio, sensus motusque & iudicij redintegratio, corde & cerebro crassis & venenatis vaporibus desinentibus liberato, intestinorum murmur & rugitus, saniei ferrosæ mucosæ aut seminalis profluuium aut spontaneum aut titillatione digitorum obstetricis illectū: hæc enim sanies accessiōis cōtinens causa fuerat: vteri denique ad suā sedē reditus & detumefactio.

Signa distinctiua sunt bipertita, quædam causas spectant. Sic vitiatum semen insinuant hysterica symptomata omnia grauiora vt vniuersi corporis vehemens & repentina perfrigeratio, apnœa atonia aphonía lipothymia, veternus, cōuulsio, si præsertim mulier vidua & ætate prædita sit lautèque & otiose victitans & iuniorum virorum colloquiis familiaritatèque fruens, fluentibus interim mensibus. Eadem est ratio innuptarum iuencularum siue monialium siue aliarum.

Contra menstruum suppressum leuiora sequuntur symptomata vt stomachi dolor & oppressio (adducto sursum à venis repletis & contractis vtero) cephalalgia grauans, dispnœa tantum, si præsertim mulier sit ætate florens luxúque & otio abundans mensibus suppressis.

Alia sunt signa ex quibus affectus hic à similibus morbis distinguitur, vt à syncope, ex pulsu minore, nullo sudore frigido, pallore faciei minore odoratorum noxa: à catalepsi ex eo quòd rigor nullus adest, oculi clausi sunt: ab apoplexia quia stertor nullus: ab epilepsia quia concussio nulla, spuma circa os nulla; pallor vultus nullus aut minimus apparet, quin potius rubet in præfocatis.

De signis prognosticis.

Signa prognostica sunt quod fœminæ viduæ moniales & innuptæ puellæ affectui uterino sunt obnoxia, sicuti seniores cessantibus mensibus multo magis quam iuniores; Quod à corruptela seminis multo magis quam menstrui perniciosa & vehemens sit accessio; quod longa & violenta accessio penè funesta sit, breuior leuiorque tuta; quod
acces-

accessionis longitudo cum vehemētia symptomatum & spuma circa os mortis sint indicia, cōtraria omnia sanitatis : quòd mulieres fecundæ raro sint hystericae absumpto semine in conceptum menstruūque in alitionem foetus; Quòd suffocatio à pituita putri, in sexagenariis & in iunioribus intemperanter victitantibus frequens est : Quod hyeme & autumnò sit frequentior languente magis venere, coarctato vapore à densitate habitus & pituita succrescente : Quod denique homines à seminis corruptela minus infestentur.

Curatio.

Therapia siue medicatio affectus vterini est duplex, præseruatua & curatiua : hæc vrgentem submouet accessionem, illa futuram prohibet. Futuræ accessionis causa duplex est, vna sanguinis menstrui aut alterius humoris, altera seminis retentio quam corruptela subsequi solet. Vtraque à motis suis causis antecedentibus præcauetur, sicuti menstrui retentio sublata plethora & vacuata cacochymia. Minuenda autem est illa plethora tum vacationibus occultis vt per vitum tenuem parcūmque & frugalem, frigidum siccūmque, vel humidum & minimè crassum & alimentosum, exercitationes vehementes, vigilias graues, curas, & negotia ardua, tum manifestis vt phlebotomia in cubito & malleolo, quā antecedit leuior purgatio & clyster emolliens. Phlebotomię quantitas ex plethoræ & virium modo æstimanda est, tempus eiusdem ex periodo instante & consueta menstruæ purgationis, vt triduū

aut quatrīduū ante illā; vt duplici stimulo naturæ & artis cōmotus sāguis liberius profluat. At post phlebotomiā & purgationē sanguinis alterationi & attenuationi apertioniq; & relaxationi vasorū hystericorū studeatur, vt sic facilius transfluat sanguis. Alterantia & aperientia sunt balneum, fons, litus & iulepi attenuantes in ingressu balnei; ipso denique fluxus tempore sanguis foras inuitetur (si segnis & tardus sit) frictionibus multis durisque, deligationibus arctioribus femorum crurūque, cucurbitulis ad inguina apponendis, lotionibus tibiarum femorūque calfacientibus; matutinis & vespertinis, multis deambulationibus, pessariis denique acribus valdeque tergentibus. Sed de iis omnibus copiosius in fluxu mensium curando posita, nunc genera remediorum indicasse satis sit.

Cacochymia quæ sanguinis menstrui eruptionem cohibet, crassa lentæque pituitosa vel melancholica vel certè mixta, purgatione dematur phlegmagoga & melanagoga. Purgationi præponenda est cacochymię coctio & præparatio attenuans & detergens caliditati moderatę & siccitati iuncta per diætā, tum pharmaciam vt iulepos & apozemata.

Coctionem rursus præcedat primæ regionis vacuatio per clysterem attenuantē tergentem & phlegmagogum similēque minorationē, cui pariter subiungenda est phlebotomia siquidem plethorica sit cacochymia, vt reliquię illius facilius coquātur; alias phlebotomia è malleolo tantum rectius post purgationem differatur. Absoluta purgatione relicta cacochymię portio sumendis & admouendis

remediis percoquatur viæque vteri liberentur. Ex horum genere sunt balneum, infusus, vel semicupium & fons in triduum producenda ex decocto calidorum siccorumque & tergentium atque attenuantium simplicium horis matutinis & vespertinis sine sudore tamen vllò, à quibus embrochationes oleorum calidorum, vteri regioni adhibeantur deinde gossipium imponatur; in introitu quoque balnei electaria calida, confectiones aut iuscula similia exhibeantur.

Expleto balneo atque instante iam periodo mēsum consueta, lotiones calidæ tibiarum femorumque deligationes & fricationes vehementes, cucurbitulæ magnæ & cum multa flamma ad inguina appositæ, iniectiones in vterum ē simili decocto balnearum dissoluta hiera aut benedicta aut trochiscis de myrrha; suffitus aromatum pessaria acia adhibeantur non intermissis interim topicis prædictis donec sāguis copiose satis prorumpere videatur. Hæc cacochymix menses remorātis multo prolixa magis & ardua quam plethoræ therapia est, ideoque pluribus ante periodum diebus vt quindecim inchoanda & maturanda est. Quod si sine corruptela seminis aut mēstrui hysterica symptomata sœuire aliquando contingat ex quolibet humore vtpota pituitoso putrescente(perseuerante etiam coitu & mēstruo)omnia præter phlebotomiam cacochymix notata remedia aptanda sunt.

De præseruatione.

PRæseruatio suffocationis vterinæ à retentione & corruptela spermatis versatur in duplici scopo; vacuationis sanguinis & refrigerationis

eiusdem, idque in viduis tantū, monialibus & virginibus innuptis; maritalis enim singulare remedium est coitus.

Dixit itaque frigida siccāque, tenuis & parca cumulando sanguini ex quo feminis redundantia est aduersetur; aëre fruatur frigido, vescatur cibus frigidis minimūque alimentosis, vt pane hordeaceo, aquæ potione, piscibus, oleribus eorūque iussulis, acetariis, fructibus vernis; laboribus interim sese dedat, studiis grauib; piisq; cogitationibus. Carnes, vinum, lac, caseum &c. fugiat lectōsq; molliores, quin potius super folia plantarum frigidarum vt salicis nenupharis aut super paleam recumbat.

Chirurgia quoque redundātem feminis materiā (id est sanguinem) exhauriat per phlebotomiam superiorem venarum maiorum cubiti dextri, & inferiorem ad malleolum.

Postremo pharmacia eandem sanguinis redundantiam circumcidat vacuationibus vel manifestis, vt purgationibus crebris, clysteribus lachrymicis & balneis naturalibus, aut artificialibus etiam sudores mouentibus: vel occultis per quęcumque remedia vehementer desiccantia & resoluentia, vt sunt electaria mithridatium & theriaca vetus, diacyminum, semina viticis, nasturtij, menthæ, rutæ, cumini, cardamomi maioris coriandri præparati, oxalidis & portulacæ fixorum, quæ omnia vel in puluere assumantur vel electario & tabellis saccharo aqua melissæ dissoluto. Externa sunt vt frictions & deambulationes citatiores. Extinguitur denique feminis ardor regione lumborum vnguentis frigidis sæpe obducta

obducta quale est populeum, refrigerans Galen: talis denique lamina plumbi est noctu diuque gestata, sic enim segnior & torpidior renum vis tractrix vasa deferentia vicina minori copia sanguinis onerat. Quod si seminalis materiæ portio antea in vterum infusa eiiciatur, ea detrahatur post expedita præseruationis præsidia per clysteres, iniectiones & pessaria acria tergentia & phlegmagoga.

Curatio accessionis hysterica.

Curatio constat causæ continentis duplicis vaporosæ scilicet & corruptæ materiæ vacuatione. Vaporosa autem tum reuellitur deorsum cum vtero ipso (vt sublimiora viscera infestare desinat) frictionibus validis ex linteis duris aut ex aceto & sale mixtis, deligationibus actioribus & dolorificis pedum crurum & femorum, cucurbitulis magnis & cum magna flâma mediis femoribus, deinde inguinibus, hypogastrio denique affigendis, plâtarum fotu ex vino calente aut aqua vitæ aut oleo laurino, de spica, & simili. Fotu etiâ pudendi ex decocto calente cum spongia vel staminum glomis duobus in oleo feruefactis & vicissim apposis, vulsione pilorum pudendi, titillatione ceruicis intimæ & vnctione odorata; Titillatio enim lenisque frictio calfacit modicè laxatque partem & voluptate afficit (sicuti per pruritus scalptus) indeq; vapores venenatos putremq; materiâ effundit vterus. Odoribus quoq; suauib. (quorû à tēperie sūma & perfecta coctione origo est, sicuti à cruditate scetor) recreatur vterus non animali quidem sensu & quali-

tatis odorabilis apprehensione quæ propria nariâ est aut meatuû inammosorû : sed naturali substâtię odoratæ perceptione, qua pars multo spiritu & calore ad propriam functionem egens iucundius reficitur tanquam familiari spiritus insiti alimento vt vëtricus cor & cerebrû; ideóq; vterus ad illos quâ potest proximè extensus accedit sicuti fœtidus declinaturus, seipsum quâ lōgissimè potest subducit. Neque vero de fœtidis odoribus metuendum est ori admouendis ne eorum mixtione venenati vapores inquinari augeri & crassescere possint, vnde accessiones grauiores & contumaciores euadant; illorum enim fūga cōtractus cōpressusque vterus tū circūiecta viscera oppressione sua liberat, tū venenatos vapores deorsum exprimit & dissipat, Illorū etiā attenuādi resoluēdi & consumēdi vapores eximia via est sicuti & acrium quorumlibet vt aceti incoctis foliis pulegij, rutæ, calamēthi origani baccis lauri & iuniperi seminibus cumini sileris montani. Grati autem sunt odores vt storacis, ladani benioini, calami aromatici, polij, schenanth, zibeti, ambregrisæ & moschi, & ex cōpositis galliæ aliptæ moschata. Vsus autem talis esto, zibetum quidem solū allini ceruici intimæ potest & paucos gossipio excipi atque intronitti, reliqua vel puluere cotoni insperso, vel oleo laurino muschatellino & simili excepta, vnguenti specie vsurpentur. vt

℞. galliæ vel aliptę moschatę ʒ ij moschi optimi
 ʒ ss dissolue cum oleo muscatellino, fiat vnguetum.

Fœtida sunt castoreû, assa fœtida, sagapenû, ammoniacû, gagates eiusque oleû, petroleum, oleû sulphuris, plumæ auiû præsertim perdicû cōbusta, pili humani vsti, vetus coriû, vngulæ cornua, cādele, papyrus

pyrus incensa, quorum omnium vapores ore clauso & naribus aliquantisper retineantur donec eorum odio veluti fugiens seseque occultans matrix in suā sedem sese receperit flatibus etiam expressis; talis est etiam vetus matula vrinaria, talis guttula olei gagatini linguæ instillata.

Exemplum compositi fœtidi odoramenti.

℞. castorei & assæ fœtidæ an. ʒ ij sulphuris ʒ j olei gagatis vel petrolei quantum sufficit, fiat vnguentum applicandum naribus intus vel ex nodulo ex paucis gossipio & linteolo. Item acetum acerrimū in quo acria decocta sint vt pulegium &c. à quibus attenuetur vapor crassusque digeratur.

Repellitur vaporosa materia fœtidis ad os & nares appositis vt dictū est, & præterea sternutatione & vomitione; vtraq; enim hæc intentis & appressis abdominis musculis vterū in sedem suā validissimè compellit, ex eoque compresso vapores expellit deorsum. Mouetur illa acri & vellicante puluere in nares insufflato vt piperis pyrethri, seminis staphisagriæ sinapi zinziberis &c. aut naribus adacta palea aut penna acuta & pungente. Vomitus excitatur faucibus inserto altius digito vbi initium œsophagi est, vel potione tepida pinguique & acri laxato irritatōque stomacho vt ex libra vna decoctionis seminis atriplicis nasturtij raphani, in qua dissolutæ sint oxymelitis simplicis vel scillitici ʒ ij resoluitur vaporosa materia acrib. tū sumēdis vt theriaca & mithridatio cū aqua artemisiæ vel granis piperis nigri quindecim cōtusis cū aqua absynthij; tū admouendis vt cucurbitulis imo ventri, oleis digerētibus vt rutaceo, laurino, costino, emplastro deniq. ceroneo. At corrupta humoralis & seminalis materia vacuat clysterib. iniectionib. & pessariis acrib. digerētib. &

phlegmagogis, quibus etiam phlebotomia adiungi potest ab initio accessionis si à menstruo suppresso orta fuerit, non si à feminali materia, ne vapores venenatos in venas deducat, aut vterū & viscera à veneno impēsius refrigerata maiore in modū refrigeret, aut debilitata deniq; cōturbatis vaporibus vehementius debilitet. Purgatio quoq; phlebotomiæ adiūgi vtiliter possit vbi diuturnus paroxysmus fuit vtrū biduanus triduanus. Postremo post euacuationes prædictas imo ventri magnæ cucurbitulæ dropax & sinapismus infigantur ad digerendas reliquias tum vaporis tum humoris cotyledones obstruētis. Tandē finito paroxysmo vterus bene purgatus confirmetur tū in seſſibus & balneis calfacientibus, tum vero emplastro, pro matrice appposito calfaciente scilicet astringente & odoris suauitate recreante; fuit enim per accessionem refrigeratus extensus & dilatatus violentius, vterus.

Curatio extraordinaria.

CÆterum grauiora symptomata in ipso paroxysmo leniantur, vt veternus quidem vulsione pilorum in temporibus, frictione & deligatione brachiorum propriūque nominis altiori inclamatione, sternutatione vomitione & instillatione duarū vel triū guttularum olei alchymistici, saluiz aut caryophyllorū in aures; cōuulsiones vero brachiorū crurūq; retētiōe eorūdē & acerrima totius spinæ & præsertim occipitis vnctiōe vt vapores crassī diffilētur. Prospicietur dispncæ accliuī situ corporis hystericæ mulieris solutis ligamētis omnibus & laxatis vestibis vt liberius spiret, præcordiorū cōpressionē manibus & fasciis facta vt thorax & diaphragma

phragma ab oppressione liberetur. Recreantur deniq; à syncope epithematis cardiacis electariis cōfectione alkermes, de hyacintho, aqua cinnamomi & similibus.

De furore uteri.

NOmen à vehemēti symptomate ratiocinationis læsæ & à parte primariò affecta tractū est, quod ex vitio uteri per sympathiam eius cum cerebro mens turbata sit & ratiocinatio deprauata. Huius intemperiei uteri calidæ causa proxima est sanguinis & seminis circa uterum copia, æstúsque: Remotæ complures, quæcumq; vtrumq; cumulare vberius possunt, internæ externæque; illæ sunt natura calida humidâque, ætas florens: hæ verò aer temperatus, diætæ calida humidâque flatuosa lauta, otiosa, curarū grauium expertæ & negotiorum arduorū, secuta, rerūque venerearum lectio num & auditionum studiosa; intempestiuus coitus aut omnino nullus; ille vasa dilatat seminaria, vique eorum tractrice aucta semen affatim & multum colligit; hic sensim congerit; atque his causis multiplicatus ad uterum sanguis semenque in testibus exuberans tum inflamatur, uterūque vicissim inflammat & cerebrum mentēque; venereis concutit deliramentis ob vapores seminales venereis idolis onustos, in cerebrum expiratos, à quibus imaginatrix facultas pulsata naturalem excitat ad vacuationē necessariam excrementi seminalis affluentis, fitque hæc vacuatio per motus cōsuetos & partes huic muneri dicatas: Sic quibus intestinum aut vesica per somnum stercore aut vrina opprimitur, de stercoratione & mictione somniare solent.

De signis.

Signa vterini affectus duplicia sunt, diagnostica, propria & distinctiua. Illa sunt procax & insatiabile coitus desiderium, atque eiusdem tum per obscena verba, tum per motus gestusque inuerecundos expressio, temeraria garrulitas, vociferatio tumultuosa, insana tandem inania, pudendi ob seminis pruritū assidua fricatio. Distinguitur à præfocatione vteri causis signisque, neq; enim per hūc affectū vlla suæ sedis mutatione aut venenati vaporis expiratione, sublimioribus visceribus negotiū facessit, sed loco suo constanter cōfidens intemperie suā per seminales vapores iisdē omnibus sed cerebro maxime impartitur. deīde præfocatae mulieres torpēt stupent obmutescūt veterinosę fiunt conuellūtur animoque linqūtur: at per vteri furorē garrulæ, lasciuæ iracundæ & rixosæ sunt, tumultuantur exiliunt, vociferantur bacchantium more, denique in viros obuios explendæ libidinis causa inuolant (est enim in præfocatione vapor frigidus in furore calidus semine ardente quidem sed non corrupto) tandēque oblitterata ratione vitā spontanea nece finire solēt vel gladio vel laqueo vel præcipitatione & submersione sepissimè. Distinguitur à priapismo & pruritu vteri, in quib. duob. coitus quoq; desiderium cruciat sed sine ardore. Distinguitur denique ab intēperie calida simplici vel phlegmonosa eiusdē vteri in qua deliratio quidē est: sed extra veneris cogitationē & seminalis vaporis affluentiam.

Prognostica signa sunt quòd viduas & virgines natura calida humidaque & florenti ætate quę præsertim indulgentius & licentiosius educantur hic affectus sepe inuadat, Quòd nisi succurratur mature, vigiliis

Giliis, inedia, erumnis tandē contabescant, nisi prius ad interitū ruant voluntarium & violentum.

Curatio.

Curationis vnicus scopus est, refrigeratio vteri & seminis. Refrigerationis instrumentū primū est diætā frigida siccaque, & oligotropha, de qua in præseruatione suffocationis. Alterū instrumentum chirurgia est quę per phlebotomiā tum corpustotū refrigerat exclusis cum sanguine vaporibus calidis, tum vterū ipsum priuatim dum proximā gignendi sperinatis materiā exhaurit, (sanguinē scilicet.) Exerceda igitur illa est primū in cubito dextro, deinde in malleolo pedis, vt plethorā tū communē toti corpori tū vtero peculiarem leuare possit. Phlebotomiā modus infra plethoræ & viriū præsentium rationem tēperetur futuræ infirmitatis metu ob vigilas inediā & ferinos motus. Chirurgica quoq; remedia sunt frictio valida, deligatio arcta crurū & femorum, & cucurbitulæ inguinibus affigendæ, quib. omnibus à cerebri obsidione vapores reuocentur. Tertium eiusdem refrigerationis instrumentum est pharmacia vacuās alteransq;. Illa clysterē mollē aut minoratiuū bolum ex pulpa cassiæ & tamarindorū phlebotomiæ præponit, deinde humores acres & biliosos coquit coctosq; excludit à quibus acrius magisq; pruriginosum semen euadit; sic naturali cœconomia sinistra vasa seminaria ex emulgentibus sinistris, dextra ex caua vena exprōpta sunt. Sic ergo remota causa antecedēte, cōiuncta cōfestim deriuetur ex vtero per iniectiones clysteres & pessaria ex acris digerētibus & refrigerātibus mixta, à quibus facultas expultrix vteri irritetur & vapores consumātur sine caloris incremento: ab his enim simile quid

faliuæ elicitur & affectio sedatur. Postremo ardor partis & seminis relictæ extinguendus est topicis tum internis, vt iniectionibus vel oxycrati vel succorum solani; plantaginis, vmbilici veneris, semperuiui, lenticulæ palustris, & clysteribus ex similibus herbarum decoctis, tum deniq; pessariis ex earundem herbarum contusis foliis & linteolo exceptis: tum externis vt fotibus, infessibus ex eodem refrigerantium plantarum decocto, vt vnguentis rosaceo, santalino, populeo & refrigerante Galeni cum pauco aceto frigide impositis, vt cataplasmate denique cum farina hordei subacta ex succis prædictis sine igni & cum pauca mucilagine seminis psillij.

Curatio extraordinaria.

CAput per totam morbi historiam contra vaporum calidiorum impressionem accuratè muniendum est repellentibus remediis & reuoluentibus. Illius generis ad frontem & nares vsus est quale oxirodinū est ex olei rosacei vnciis duabus vel tribus, aceti rosacei 3 ss, albumine oui vnus laboriosè inter se commixtis; Quibus vnguenti populeonis 3 iij, caphuræ 3 ss si addantur multo efficacius euadat. applicetur autem frigide & sæpe fronti & temporibus, aut syncipiti etiam rasis capillis de sublimi affundatur & pauco cotone supertegatur.

Simile est frontale ex puluere crassiori florum rosarum & nenupharis, seminum lactucæ papaueris albi, hyoscyami albi, santali albi & rubri, addito pauco semine rutæ tela canabina excepto & aqua rosacea leuiter irrigato sæpiusque mutato.

Odo-

Odoramenta naribus adinuenda constant puluere eodem nodulo excepto & in rosaceam infuso mixtaq; opij portione, si somnus quærat, aliàs sola rosacea pauca caphura addita ex cotone ad nares admota satis sit. Olea frigida vt papaueris nenupharis rosarum in aures commode instillantur. Reuellentia sunt frictiones deligationes & cucurbitulæ tum cruribus & femoribus adhibitæ, tum brachiis etiam & scapulis vt liberando cerebro magis profint quo sunt propiores. Neque denique minor est fumendorum vsus siue potionum narcoticarum (si ferina dementia est aut peruigilium) alias refrigerantium tantum & astringentium ex syrupo de granatis acidis de nenuphare de limonibus cum aquis rosarum acetosæ nenupharis &c. addito pauco puluere electarij diamargariti frigidi.

De morbis uteri in situ mutato.

Percuratis organicorum uteri morborum speciebus duabus magnitudinis & repletionis, iam tertia eiusdem morborum generis species quæ ex situ mutato est curetur. Est autem naturalis uteri situs viscerum omnium abiectissimus in hypogastrio imòque ventre (hinc *ὑστέρα* dicta matrix est) in antro coxarum inter vesicam & rectum intestinum medius, osse sacro pubis & ischij obuallatus. Inde toti corpori omnique ex parte connectitur suprà quidem cordi & hepati per venarum & arteriarum propagines, apophysi peritonæi munitas quo validius grauem vterum sustineant sine ruptionis periculo, spinali medullæ & cerebro per nervos sensitiuos motiuosque. Infra, intestino & vesicæ, idq; multo magis secundum collum quàm

totum eiusdem corpus, per fibras complures à peritoneo ductas, ossi pubis ilium & sacro per tunicā quoque à peritoneo illic multo spissiore densiorēque, & per vincula duplicia laxa quidem sed valida admodum; ex quibus duo ab osse pubis enata de quibus pendere vterus videtur, alia duo maxime conspicua ipsique vtero propria, à cuius processibus orta super os pubis ad inguina & coxas deferuntur.

Vterus quandiu sanus & incolumis est suisque ligamentis & appendicibus membraneis obfirmatus, in loco descripto & naturali constanter persistit, tametsi naturali motu extendi aliquando contrahique, cum sit membraneus, persæpe videatur, idque boni cuiusdam auiditate aut mali odio (instar ventriculi cordisque.) At idem vterus ex vinculo-
rum suorum & appendicum iniuria loco suo mouetur vel ascendens sursum ad ventriculum hepar lienem diaphragma, vel descendens deorsum ad vesicam intestinum propriamque ceruicem suam aut extra eandem, vel denique declinat ad coxas & latera ad regionem anticam vesicæ & posticam intestini recti. Hinc ex mutati situs differentiis tribus, totidem morborum vteri species emerferunt, ascensus, descensus, vel prolapsio etiam aut præcipitatio, atque peruersio siue declinatio, auersio, obliquitas.

De ascensu vteri.

Ascensus igitur vteri aliquando à naturali motu eius est gratum odorem aliquem naribus vel ore perceptum consecretantis, aut ingratum pudendo appositum vel aduersum denique molestumque humoris alicuius quem sinu suo complexus sit,
fugi-

fugitantis. Aliàs ex conuulsuo motu superiorum ligamentorum & appendicum eius præ repletionè à suppressio menstruo ex vasis propinquis per diapedesin exudante, aut præ crassi lentique humoris infarctu. Illa autem, ligamenta sunt vteri propria à processibus eiusdem orta & super os pubis ad inguina excurrentia, & præterea apophyses peritonæi venarum hysteriarum fines roboris causa muniētes & obsepientes, ab vtrisque enim repletis coarctatis atque adeo versus originem suam conuulsis reuulsus violentiùs vterus, loco suo naturali cedere cogitur. Cæterum earundem particularum conuulsionem ab inanitione repellit tum ipsa vteri constitutio ex membrana valde carnea & multiplicibus sanguinis canalibus & curipis perfusa; situsque visceribus naturalibus finitimus humorum affluentia semper restagnantibus, tum ipsa therapia per digerentia & attrahentia topica. Quod si per immodicam mensium aut lochiorum eruptionem ascendere vterus aliquando videatur, motus ille certè aut ab aëre in hiātem per fluxum matricem subcunte; aut à concepto intus præ refrigeratione flatu, aut certè à grumis putrefactis excitato, incitatur.

De signis diagnosticis.

Ascensus signa diagnostica sunt communia, quæcumque ex oppressione stomachi & diaphragmatis obtingunt symptomata, vt dolor stomachi, nausea, vomitio, ructus, lipothymia stomachica, dyspnœa, inquietudo.

Distinctiua signa à suffocatione vera vteri sunt, quòd grauiora absint cordis & cerebri symptomata, ob venenati vaporis penuriam, syncope, apnœa, asphyxia, aphonia, conuulsio, deli-

ratio, veternus, torpor, stuporque & mentis inertia.

Causarū quoque signa distinctiua sunt, quòd ascensum naturalē leuiora & breuiora ex oppressione tantum sequuntur symptomata, suaque sponte dissipantur, sublatis odoribus: sed conuulsiuum motum comitatur grauissimus dolor regionis in abdomine, ad quam particulę conuelluntur: alias æqualiter, alias inæqualiter.

Curatio.

Ascensus curandi duplex indicatio est: vna conuulsarum particularum relaxatio: altera vteri in suam sedem reuocatio & cōfirmatio. Prior illa constat vacuatione replentis & coarctantis materiae, siue sanguinis, siue mucosæ pituitę. Vacuatur sanguis tum sectione primū maiorum venarum cubiti dextri, si plethora toti corpori sit grauis: tum subinde minorum ramorū saphenæ in pedibus: atq; sic inanito sanguine immodico vasa & ligamēta relaxantur. Postremo topica emollientia leuiterq; digerentia, admouenda & immittenda sunt, ad discutiedas reliquias; vt sunt fots, infessiones, vnctiones iniectiones & clysteres. Vacuatio quoque cacoehymiae pituitosæ absoluenda est purgatione phlegmagoga, pituitæ probè antea cocta; & per tanto plures dies iulepis & apozematis calidis siccisque attenuantibus & detergentibus præparatæ; quanto copiosior & contumacior illa fuerit. Huic quoque vacuationi topica prædicta ex acri attenuante & tergente materia adhibeantur.

Quod attinet ad alterā indicationem restituēdi in naturalē locum vteri: Ea quidē explebitur reuulsionum differentiis omnibus ad inferiorē corporis regionē: vt frictionibus, deligationibus, crurū femorumque

rúmque, cucurbitulis primū ad inguina, deinde ad hypogastrium cum magna flamma affixis. Item per gratos odores & suffitus pudendo foris subditos vel intus in ceruicem inditos. Contra per ingratos ore & naribus inspirandos: vel in stomachum admittendos, vt per pilulas ex castoreo assa fœtida & rutæ semine cum pauca aqua vitæ concinnatas (& hoc præstantissimum est) sed ante repositionem vteri, vësica & intestinum suis excrementis liberanda sunt, vt recursuro vtero locus liber sit: neque ab illis plenis retrudatur. Sed de tota hac therapia lege caput de Suffocatione vteri.

Continetur denique in suo loco vterus primū decenti corporis decubitu decliuīque capite & thorace surrecto, coxis depressis, femoribus diductis & cruribus valde extensis, vt extensis abdominis musculis vterus comprimatur loco suo alias spatiofo, patulōque, vëtre interim à diaphragmate ad vmbilicum arctius vincto. Admoueatur deinde hypogastrio emplastrum de galbano, in cuius extremo versus pubem, vel in medio super vmbilicum, moschi vel ciuetæ gr. ij aut iij affixa sint. Frictiones extremorum inferiorum adhibeantur, sicuti grata pudendo, ingrata odoramenta ori & naribus admoueantur. Et quilibet vehementior corporis motus vterum concutiens prohibeatur vt sternutatio, vomitio, tussis, cursus, saltus, clamor, choreæ, durities ventris, prolixitas somni, cibique frigidi & humidi fugiantur, calidi sicci que apponantur & vinum bibatur rubrum aqua ferrata vel cisternæ dilutum.

De descensu Vteri.

Descensus vteri duæ sunt primariæ differentiæ

seu species; Vna est leuior : cum collum eiusdem in
 ceruicem pudendi propius longiusve elabatur. Al-
 tera grauior: cum non solum vteri collum, sed cor-
 poris etiam vterini pars aut totum corpus extra
 ceruicem & pudendum foras procidit & promi-
 net. Ille Descensus simpliciter. Hic Prolapsio, Proci-
 dentia & Præcipitatio, vocetur. Porro vteri collum
 hoc loco appelletur infima pars eius ore angustis-
 simo & rictui canis pusilli per simili: quod partibus
 vicinis. ossi sacro, coxarum & pubis vesicæ & inte-
 stino pluribus peritonæi fibris & ligamentis, quam
 reliquum vteri corpus annectitur. Quibus laxatis
 magis minúsve, ipsum quoque in supremam me-
 diam aut infimam ceruicis partem excidere contin-
 git, vnde rubēs cum suo foramine oculis obseruari
 obstetricis & digito tractari possit. Hinc prociden-
 tia vteri in tres differētiās secari solet: Vna est quā-
 do non totum corpus vteri ; sed pars eius quædam,
 vt tertia vel media quartave cum foramine pro-
 prio caninóque foris extat, oui anserini ferè ma-
 gnitudine: Altera dum totum corpus vteri foris est
 conspicuum & tractabile instar oui struthiocha-
 mæli, cum eodem foramine suo ad femora suprema
 media & infima genuaque ipsa : Tertia quando to-
 tum vteri corpus sine foramine ; at à fundo suo ita
 euersum apparet, vt virilem penem præ se ferat, e-
 iusque interna facies externa fiat.

Descensus leuioris causa proxima est laxitas vin-
 culorum & appendicum inferiorum infimæ partis
 vteri (collum eiusdem vocant) Antecedentes, para-
 lysis & extensio. Ex quibus illa, aliàs à causa interna
 oritur vt ab aquosæ & serosæ pituitæ perfusione.
 Quanquam ab externis quoque interna illa succre-
 scit:

scit: nec solum à natura & ætate frigida humidâque: sed ab aere quoque simili, morâque in illo diuturnâ, & reliquo victu, otioso, somnolento, intemperanti, crebrisque addicto balneis, vnde affectio hæc, non solum seniores, sed iuniores etiam licentiosè educatas inuadit. Alias à causa externa oritur paralytis, vt à vehementi perfrigeratione, siue idiopathica, dum aer gelidus hiantem vterum per mensium vel lochiorum fluxum subit: Vel sympathica, scilicet ob sympathiam generis vt ex scissione diuturna super marior aliûmve lapidem nimis rigentem, & ex longiori mora nudorû pedû in aqua gelida, magnâque animi consternatione, mœrore, aut timore: calore scilicet ad cor compulso & coacto nerueâque partes destitente. Extensio autem fit à quolibet motu corporis aut musculos abdominis validius intendentis & comprimantis, vt cursu, saltu, choræis, vociferationibus, tussi, sternutatione, vomitione, tenesmo, extensione totius corporis & brachiorum: gestatione grandioris fœtus, vel gemini, arduoque partu & in eo longiori spiritus retentione, & coitu à partu recenti nimis effræno, aut post partum grauioris oneris gestatio sublatiôque.

Procidentia: causæ sunt extensio quidem maxima vel sæpius ruptio vinculorum & appendicum vteri, à motibus violentissimis, vt à præcipiti casu fœminarum super coxas, ab ictu graui & contusione hypogastrii, à laborioso nimis & difficili partu, vterô simul cum fœtu excusso, à temeraria secundarum cotyledonibus nimium adhærentium, aut fœtus etiam mortui detractione facta à chirurgis, vel obstetricibus imperitis.

De Signis.

EX signis diagnosticis, alia sunt utriusque descensus speciei communia, alia leuioris propria, ut etiam grauioris. Illa sunt dolor calorve partium illarum quibus annexus uterus est (siquidem ab extensione vel ruptione non à paralyfi fiat) ut lumborum, ilium, coxarum, pectinis, pudendi, ani: indeque alui excrementorum vrinæque suppressio ob vesicæ & intestini oppressionem, ab incubante uteri corpore. Propria descensus leuioris sunt tumor oui asferini instar, aut minor intra ceruicem instar glandis virilis cum rictu canino, vnde congressus virilis tædium: hinc quoque fit ut ægrâ stante, grauitas ad pubem, eâdem sedente vel recumbente supina ad intestinum, eâdem denique prona, ad vesicam sentiatur. Grauioris descensus siue procidentia signa sunt propria, tumor extra pudendum cum rictu canino conspicuus (in duabus primis differentiis) moléque maiori vel minori ut oui struthiochamæli, pro relaxationis & ruptionis discrimine, colore rubro instar carnis: & sine foramine, in tertia differentia ab euerfione fundi. Hæmorrhagia in omnibus copiosa, dolorque varius partium connexarum, cum à ruptione aut violenta extensione est.

Prognostica.

Mulieres aggreditur aut natura, aut ætate, aut ratione victus humidiores, ut ærumnis etiâ morbóve languidas, & extenuatas: cum sit eiusdem debilitatis & humiditatis cum reliquo corpore uteris particeps. Procidentia recens facilius dirigitur quam vetusta, aut tumida, aut callosa. In procidentia

tia ex relaxatione in iunioribus & ætate florentibus, vterus facile reponitur suoque loco continetur. At in effœtis & senioribus obfirmari non potest aquoso scilicet redundante excremento, præ caloris labascentis infirmitate vterique vincula & appendices emolliente. At à ruptione in quavis ætate & naturâ incurabilis est, tantùmque suo loco cohiberi potest immisso penitus in sinum pessario ouiformi.

Curatio.

DEscensus leuior vteri curatur gemino scopo, scilicet repositionis & conseruationis. Prioris illius duæ sunt indicationes, repulsio à parte inferiore ventris, id est à pudendo & cervice eius, & retractio ad superiorem, hoc est hypogastrium.

Primum ergo repositio tentanda est corpore ægrotantis resupinato & accliuo, id est capite & humeris depressioribus, clunibus altioribus, femoribus diductis & cruribus ad nates reductis, intestino etiam & vesica, à suis excrementis vacuis, vt collum vteri per ampliata[m] cervicem pondere proprio & impulsu digitorum obstetricis vel chirurgi, atque pessariis immissis, in locum suum facilius reducatur. Eodem tempore eadem repositio acceleranda est validissimo cucurbitæ maioris & cum multa flamma hypogastrio affigendæ tractu. Vtraque insuper iuari potest; retractio quidem gratorum odorum ad nares: repulsio verò foetidorum ad vuluam appositione.

Repositioni, confirmatio protinus subiungenda est, per astringentia intus forisque vsurpanda, vt laxiores appendices & vincula coarctentur: vel sola,

si laxitas ab extensione fluxit, vel adiectis calfacientibus, si quidem laxitatis à paralyfi origo est, id est frigore aut destillatione serosa. Atque in hac quoque specie à destillatione repositioni præponenda est purgatio phlegmagoga & deiectionaria & vomitoria: sicuti phlebotomia plethoræ adhibenda. Astringentium tantum, sunt exempli gratiâ electaria, vel mollia vel dura. Illorum materia est ex confervis rad. symphyti, acori vulgaris rosarum, caruis cytoniorum nucum iuglandium an. ad 3 j quibus addatur pulveris mastichis rasuræ eboris cornu ceruini, boli armenæ & terræ sigillat. gummi arabic. an 3 ss. cum syr. myrtino vel de granat. acidis. His adai potest conferua cort. citri, zinziberis & enulæ can. p. roris marini florum saluæ & stœchados ut euadat opiata astringens simul & calfaciens. Electaria dura ex eodem puluere addita nuce mosch. maci cinnamomo excepto saccharo aqua melissæ dissoluto comparentur. Dosis sit maturina utriusque generis vel speciei electariorum ad 3 iij cum cochlearibus duobus vini austeri superbibendis. Hæc vero sunt topica admouenda ut fetus litusque vnguenta & emplastra hypogastrio, & immittenda, ut iniectiones per pudendum & clysteres in intestinum. Consistent autem decocto astringente & exsiccante, ut laxata vincula in naturalem contrahantur figuram & magnitudinem. Exemplo est hoc quod

℞. rad. symphyti maior. & acori vulgar. an. lb ss
 foliorum symphyti caudæ equinæ tapfi barbati, sanguinalis, bursæ pastoris, summitatum lentisci oleastri sumach rusci an. m. j. cort. malorum granatorum nucum cupressi balaustiorum gallarum viridum,

dium, rosarum rubearum an. p. j. coquantur in aqua ferrata & vino tortiuo post finitam coctionem addito. Huic decocto misceantur calida vt folia saluę absinth. verbenę primulę veris, polij montani summitates lauri, hederę lauendulę & roris marini, flores stęechados vtriusq; si adsit paralyseos suspicio, mox à fotu vnguentum comitissę vel emplastrum contra rupturam aut simile hypogastrio imponatur. Aut in suspicione paralyseos emplastrum de mastiche, vel pro matrice. Sicuti eidem balnea naturalia vt sulphurea & bituminosa valde prosint. Pessaria denique in totam ceruicem pudendi inferantur ex lana prædictorum puluere farcta & linteolo obducta, cuius longitudo xij extremorū digitorum & crassitudo pudendi atque ceruicis magnitudini respondeat. Atque hæc quidem de remediorum genere forma & vsu. Ea autem in xv. vel xx. dies sunt producenda, eodem semper mulieris decubitu in latus alterutrum, vt & femorum altero alteri incumbente & cruribus extensis: vt compressa ceruice & pudendo non relabatur collum matricis.

De procidentia Vteri.

Descensus grauioris, id est procidentię siue præcipationis vteri: iidem sunt scopi, scilicet vt reponatur vterus, & suo loco contineatur. Illius remedia sunt complura ad apparatus corporis pertinentia, vt phlebotomia ratione plethorę, & purgatio cochymię siue pituitosę materię, & vomitorium corporis decubitus ante expositus, vt pudendum eiúsque ceruix restituendo vtero quam amplissimè pateat, intestini & vesicę inanitio, ne

intrusus inter vtramque partem vterus tumore & compressione foras retrudatur. Tum vteri pudendique lenitio & lubricatio per malactica vt oleum amygdal. dulcium, lirinum, cheyrinum, iasmininū butyrum vel decoctum quatuor emollientium, feminis lini florum chamæmeli & meliloti. Tandem emollitus vterus, absterfóque prius madore oleoso, blanda manu chirurgi vel obstetricis impellentis reponetur, aut agitatione coxarum sublatarum, aut mulieris de scala per pedes suspensione.

Confirmatur vterus in sua sede constrictis & contractis vinculis eius laxioribus & appendicibus per remedia interna externaque modo exposita: Ex quibus pessaria etiam fiant ex lana linteolo inuoluta & acaciæ hypocystidos aut aluminis dissolutorum liquore, insuccata: quorum extremitati fœtor aliquis addatur: sicuti naribus odorata continenter admoueantur.

Similis est lanæ hapsus ex vino tortiuo calente pudendo appositus, forúsque pectinis ex posca per spongiam, deligatio brachiorum arctissima: appositio maiorum cucurbitar. & cum multa flamma sub mammis in ilibus lumbis, suffitus fœtidus per cannam aut tubulum (vitatis naribus) clam submissus. Conuenit denique supino decubitu mulieris laborantis, cruribus productis sibique inuicem innitentibus.

Quod si repositus vterus sæpius relabatur, aut præ humiditate redundante, aut ruptione vinculorum, tum cohibendus est in suo loco, pessariis in eius sinum conditis ex subere, aut buxo bene politis: aut argento, auróve, intus cauis, ceræque alba obductis. Itē perisomate Hippocratico cū subligaculo.

Hæc

Hæc quidem recentis procidentia ex relaxatione curatio in quadraginta dies proroganda est: mutatis vnoquoque triduo eiusdem generis remediis. Interim vero mulier alatur cibis euehymis calidisque: & quiete utatur animi & corporis, rarisque & facilibus ventris subductionibus per clysteres vel per bolum ex cassia, si natura isti muneri desit: ne laxatis vicinis partibus vterus relabatur. Possit tamē interim luxurians vteri humiditas, lotionē lixiuij in quo nitrum aut saxe vini vsta, dissoluta sit, asperso subinde plumbi puluere absorberi.

Vetusta autem tumidaque procidentia ē refrigeratione aerisque externi commercio, reponenda est, discusso prius frigore flatibusque dissipatis per topica calida siccaque & digerentia, vt litum ex oleo laurino nardino costino muscatellino, de spica post fotum ex lanâ decocto simili imbuta, vt foliorum origani, calamēthi, pulegij, artēmisie, matricariæ, sabinæ, florum chamæmeli in tribus partibus aquæ & vnâ vini. Postremo gangrænosus vterus præcidatur, sine quo mulier incolumis diutius viuat.

De peruersione Vteri.

Peruersio siue Auerſio, Declinatio, Inclination & Obliquitas, tertius est moti ē sua sede vteri organicus morbus, isque multiplēx, dextrorsum, sinisterorsum & ad latera, vt ad ilia & ad inguina, anteriororsum & retrorsum, vt ad vesicam & intestinum idque inæqualiter. Tametsi ad vtranque partem æqualiter aliquando fiat.

Peruersionis vteri autores sunt duo morbi vinculorum & appendicum ipsius, antea propositi, con-

uulsio scilicet & paralyfis. Illa à repletionem est è sanguine, vel menstruo in vasis & cotyledonibus obstructis suppressio: vel inuitato & deducto vi aliqua externa iisdem vinculis illata, vt per præcipitem casum in coxas: grauem hypogastrii contusionem ictumque & violentam extensionem, vt per arduum partum, grauiditatem molestatam, & maioris alicuius oneris sublationem gestationemque. Hæc à fluxione aquosæ pituitæ, aut immoderata perfri-
geratione prouenit.

Signa diagnostica.

EX signis diagnosticis: alia respiciunt causas paralyseos & conuulsionis: alia sunt specierum peruersionis propria. Illa sunt quod in conuulsione ad eam vterus regionem accedit ex qua orta sunt, quæ tenduntur vincula & appendices: idque cum dolore & tumore si ad alteram tantum: vel sine tumore si ad vtramque partem æqualiter trahatur. In paralyfi autem vterus ad sanam partem contorquetur sine dolore sed cum tumore, otiantibus scilicet antagonistis vtpote resolutis, & trahentibus ad se vterum sanis vinculis.

Propria sunt peruersionis conuulsivæ signa, illius quidem quæ fit ad ile, dolor tumorque partis eius. Eadem sunt eius quæ fit ad inguen, sed dolor aliquando ferox vt mentem quoque commoueat: tumorque tantus, vt indiscussus suppuret atque rum-
patur, subsequente vlcere diuturno & fistuloso apud Hippocratem 48. aphor. sect. 5. Concurrit denique vicini femoris stupor torporque, refrigeratio & ambulandi standique impotentia. Æqualem verò vtriusque inguinis conuulsionem, vtriusque cruris torpor,

torpor, difficilis motus, aut nullus cum acerbissimo dolore consequitur.

Peruersionem ad pubem comitatur hypogastrii distensio dolorque & aliquando vrinx suppressio: sicuti quæ ad intestinum est, impatibilis dolor ossis sacri, aluique tarditas.

Signa prognostica.

Signa prognostica sunt, quod ex qualibet peruersione sterilitas contrahitur, quod mensium effluxum per sinum vteri, & seminis virilis in eundem influxum siue admissionem prohibeat os vterinum simul cum reliquo vteri corpore auersum, quod pleræque prægnantes dolore cõxæ afficiantur, affectis vt dictum est ligamentis, quo dolore post editum etiam foetum permanente, claudicatio oritur puerperæ ex Gal. 6. de locis affect. Quod peruersionem vteri ad coxam suppuratio aliquândo excipiat, vlcusque diuturnum & fistulosum, quodque longioribus penicillis egeat; Quod denique in peruersione vteri ad pubem & ad intestinum obstetrix os vteri obseruare digito potest, non tamen in ascensu ob digiti breuitatem cum sit ceruix pudendi xij. fere digitos longa.

Curatio.

Communis omnium peruersionis specierum curatio duabus constat principibus indicationibus. Vna spectat morbos antecedentes, cõuulsionem scilicet & paralytin. Altera peruersionum propria est. Illa igitur duplex est, relaxatio cõuulsionis & constrictio paralyseos vinculorum & appendicum. Soluitur autem cõuulsio vacuatione materie

replentis vincula & appendices, id est sanguinis siue ex suppressione mensium congesti: siue præ dolore à causa externa illecti: idque per phlebotomiam primum quidem reuulsoriam ex cubito dextro, moxque deriuatoriam ex pede, atque vtranque *καὶ ἱκνῶ*, quam conuulsa regio indicarit: sic enim instans fluxio ad vterum & vincula eius inhibebitur factaque inanietur & menses expeditis viis profluent: sed præmittenda intestinorum vacuatio per clysterem mollem, aut impuri ventriculi per minorium bolum, vel potiunculam.

Paralyfis emendatur purgatione valida caco-chymiae pituitosæ accuratè coctæ & præparatæ per iulepos & apozemata calida siccæque & tergentia in sex, septem, vel viij dies producenda, ne pergat vincula & appendices non intermisso decubitu suo enervare & relaxare. Phlebotomiæ autem in paralyfi nisi plethora fortasse pura impurave sit, nullus omnino usus est, nullaque commoditas.

Atque sic reuulsa vacuatæque cōuulsionis & paralyseos antecedente causa, tum demum coniuncta vtriusque sensum & sine sensu dissipanda est topicis laxantibus & modicè digerentibus in cōuulsione. At in paralyfi multò vehementioribus magisque resoluentibus & astringentibus. Mitiora erunt exempli gratiâ: partis conuulsæ, fofus ex hapso seu flocco lanæ œnelzo imbutæ, aut ex vesicis porcinis eadem mixtura plenis. Litus & embrochatio ex oleo irino cheirino lirino chamæmelino cum lana succida superimposita. Iniectiones iisdem consent oleis sicuti clysteres & ex decocto communi. Vehementiora erunt balnea, fofus, infusus, iniectiones & clysteres ex decocto acri calidarum plantarum vtriusque radicis

radicis aristolochiæ rotundæ, helenij, gentianæ, foliorum origani, calaminthæ, pulegij, artemisiæ, nepethæ, tanaeti, fabinæ, florum chamæmeli, centaureij minoris.

Litus & embrochatio ex oleo costino laurino muscatellino rutaceo nardino de spica, de terebinthina, petroleo, & oleo de lateribus.

Tandem verò dropaces sinapismi phœnigmi & balnea naturalia, nitrosa, sulphureosa, aluminosa, à quibus omnibus perfusionis reliquiæ validissimè euocari & resolui possant. Intus quoque paralyfi imprimis conferent acriores antidoti, vt mithridatium theriaca vetus, & quæ ex sequenti puluere portiones cōficiuntur cum vino, vt seminum anisi, cumini dauci sileris montani enulæ campanæ.

Quod si phlegmone aut abscessus ex copiosa nimis & nequaquam digesta satis fluxione vincula conuellat: huius quoque curatiua methodus in aliis vteri tumoribus antea exposita est.

Iam vero conuulsione & paralyfi prius curatis, scopus alter isque duplex superest. Vnus restituendi in suum locum vteri. Alter eiusdem in eodem conseruandi confirmandique. Restituitur peruersio quæ ad alterutrum inguen vel ile est, obstetricis digito oleo lini vel simili peruncto & in orificium internū si fieri possit, penitus inserto, aut si breuior digitus est, summisso leuiter cū eodē digito specillo chirurgico: à quo in sanā aduersāmque conuulsioni partem impellatur: vel in ægram partem si sit paralyfis. Adiuuatur quoque hæc restitutio, si foris eminēs vteri tumor, manu obstetricis leuiter cōprimatur: si denique cucurbitula magna, cum multa flāma sanæ parti in conuulsione nimirū, aut ægræ, in

De Signis.

EX signis diagnosticis, alia sunt utrique descensus speciei communia, alia leuioris propria, ut etiam grauioris. Illa sunt dolor calorve partium illarum quibus annexus vterus est (siquidem ab extensione vel ruptione non à paralyfi fiat) ut lumborum, ilium, coxarum, pectinis, pudendi, ani: indeque alui excrementorum vrinæque suppressio ob vesicæ & intestini oppressionem, ab incubante vteri corpore. Propria descensus leuioris sunt tumor oui anserini instar, aut minor intra ceruicem instar glandis virilis cum rictu canino, vnde congressus virilis tædium: hinc quoque fit ut ægrâ stante, grauitas ad pubem, eâdem sedente vel recumbente supina ad intestinum, eâdem denique prona, ad vesicam sentiatur. Grauioris descensus siue procidentia signa sunt propria, tumor extra pudendum cum rictu canino conspicuus (in duabus primis differentiis) moléque maiori vel minori ut oui struthiochamæli, pro relaxationis & ruptionis discrimine, colore rubro instar carnis: & sine foramine, in tertia differentia ab euerfione fundi. Hæmorrhagia in omnibus copiosa, dolorque varius partium connexarum, cum à ruptione aut violenta extensione est.

Prognostica.

MVlieres aggreditur aut natura, aut ætate, aut ratione victus humidiores, ut ærumnis etiâ morbóve languidas, & extenuatas: cum sit eiusdem debilitatis & humiditatis cum reliquo corpore vterus particeps. Procidentia recens facilius dirigitur quam vetusta, aut tumida, aut callosa. In procidentia

tia ex relaxatione in iunioribus & ætate florentibus, vterus facile reponitur suoque loco continetur. At in effœtis & senioribus obfirmari non potest aquoso scilicet redundante excremento, præ caloris labascentis infirmitate vterique vincula & appendices emolliente. At à ruptione in quavis ætate & naturâ incurabilis est, tantumque suo loco cohiberi potest immisso penitus in sinum pessario ouiformi.

Curatio.

DEscensus leuior vteri curatur gemino scopo, scilicet repositionis & conseruationis. Prioris illius duæ sunt indicationes, repulsio à parte inferiore ventris, id est à pudendo & ceruice eius, & retractio ad superiorem, hoc est hypogastrium.

Primum ergo repositio tentanda est corpore ægrotantis resupinato & accliui, id est capite & humeris depressioribus, clunibus altioribus, femoribus diductis & cruribus ad nates reductis, intestino etiam & vesica, à suis excrementis vacuis, vt collum vteri per ampliata ceruicem pondere proprio & impulsu digitorum obstetricis vel chirurgi, atque pessariis immixtis, in locum suum facilius reducatur. Eodem tempore eadem repositio acceleranda est validissimo cucurbitæ maioris & cum multa flamma hypogastrio affigendæ tractu. Vtraque insuper iuuari potest; retractio quidem gratorum odororum ad nares: repulsio verò fœtidorum ad vuluam appositione.

Repositioni, confirmatio protinus subiungenda est, per astringentia intus forisque vsurpanda, vt laxiores appendices & vincula coarctentur: vel sola,

si laxitas ab extensione fluxit, vel adiectis calfacientibus, si quidem laxitatis à paralyfi origo est, id est frigore aut destillatione serosa. Atque in hac quoque specie à destillatione repositioni præponenda est purgatio phlegmagoga & deiectoria & vomitoria: sicuti phlebotomia plethoræ adhibenda. Astringentium tantum, sunt exempli gratiâ electaria, vel mollia vel dura. Illorum materia est ex conferuis rad. symphyti, acori vulgaris rosarum, caruis cytoniorum nucum iuglandium an. ad 3 j quibus addatur pulueris mastichis rasuræ eboris cornu ceruini, boli armenæ & terræ sigillat. gummi arabic. an. 3 ss. cum syr. myrtino vel de granat. acidis. His addi potest conferua cort. citri, zinziberis & enulæ can. p. roris marini florum saluæ & stœchados ut euadat opiata astringens simul & calfaciens. Electaria dura ex eodem puluere addita nuce mosch. maci cinnamomo excepto saccharo aqua melissæ dissoluto comparentur. Dosis sit matutina vtriusque generis vel speciei electariorum ad 3 iij cum cochlearibus duobus vini austeri superbibendis. Hæc vero sunt topica admouenda ut fetus litusque vnguenta & emplastra hypogastrio, & immitenda, ut iniectiones per pudendum & clysteres in intestinum. Consistent autem decocto astringente & exsiccante, ut laxata vincula in naturalem contrahantur figuram & magnitudinem. Exemplo est hoc quod

℞. rad. symphyti maior. & acori vulgar. an. ℥ ss
foliorum symphyti caudæ equinæ tapsi barbati, sanguinalis, bursæ pastoris, summitatum lentisci oleastri sumach rusci an. m. j. cort. malorum granatorum nucum cupressi balaustiorum gallarum viridum,

dium, rosarum rubearum an. p. j. coquantur in aqua ferrata & vino tortiuo post finitam coctionem addito. Huic decocto misceantur calida vt folia saluę absinth. verbene primulae veris, polij montani summitates lauri, hederę lauendulae & roris marini, flores stœchados vtriusq; si adsit paralyseos suspicio, mox à fotu vnguentum comitissae vel emplastrum contra rupturam aut simile hypogastrio imponatur. Aut in suspicione paralyseos emplastrum de mastiche, vel pro matrice. Sicuti eidem balnea naturalia vt sulphurea & bituminosa valde prosint. Pessaria denique in totam ceruicem pudendi inferantur ex lana praedictorum puluere sacra & linteolo obducta, cuius longitudo xij extremorum digitorum & crassitudo pudendi atque ceruicis magnitudini respondeat. Atque hæc quidem de remediorum genere forma & vsu. Ea autem in xv. vel xx. dies sunt producenda, eodem semper mulieris decubitu in latus alterutrum, vt & femorum altero alteri incumbente & cruribus extensis: vt compressa ceruice & pudendo non relabatur collum matricis.

De procidentia Vteri.

Descensus grauioris, id est procidentiae siue praecipitationis vteri: iidem sunt scopi, scilicet vt reponatur vterus, & suo loco contineatur. Illius remedia sunt complura ad apparatus corporis pertinentia, vt phlebotomia ratione plethorae, & purgatio cochymiae siue pituitosae materiae, & vomitorium corporis decubitus ante expositus, vt pudendum eiusque ceruix restituendo vtero quam amplissimè pateat, intestini & vesicae inanitio, ne

intrusus inter vtramque partem vterus tumore & compressione foras retrudatur. Tum vteri pudendique lenitio & lubricatio per malactica vt oleum amygdal. dulcium, lirinum, cheyrinum, iasmininū butyrum vel decoctum quatuor emollientium, feminis lini florum chamæmeli & meliloti. Tandem emollitus vterus, absterfóque prius madore oleoso, blanda manu chirurgi vel obstetricis impellentis reponetur, aut agitatione coxarum sublatarum, aut mulieris de scala per pedes suspensione.

Confirmatur vterus in sua sede constrictis & contractis vinculis eius laxioribus & appendicibus per remedia interna externaque modo exposita: Ex quibus pessaria etiam fiant ex lana linteolo inuoluta & acaciæ hypocystidos aut aluminis dissolutorum liquore, insuccata: quorum extremitati fœtor aliquis addatur: sicuti naribus odorata continenter admoveantur.

Similis est lanæ hapsus ex vino tortiuo calente pudendo appositus, forúsque pectinis ex posca per spongiam, deligatio brachiorum arctissima: appositio maiorum cucurbitar. & cum multa flamma sub mammis in ilibus lumbis, suffitas fœtidus per cannam aut tubulum (vitatis naribus) clam submissus. Conuenit denique supino decubitu mulieris laborantis, cruribus productis sibi que inuicem innitentibus.

Quod si repositus vterus sæpius relabatur, aut præ humiditate redundante, aut ruptione vinculorum, tum cohibendus est in suo loco, pessariis in eius sinum conditis ex subere, aut buxo bene politis: aut argento, auróve, intus cauis, ceræque alba obductis. Itē per isomate Hippocratico cū subligaculo.

Hæc

Hæc quidem recentis procidentia ex relaxatione curatio in quadraginta dies proroganda est: mutatis vnoquoque triduo eiusdem generis remediis. Interim vero mulier alatur cibis euechymis calidisque: & quiete utatur animi & corporis, rarisque & facilibus ventris subductionibus per clysteres vel per bolum ex cassia, si natura isti muneri desit: ne laxatis vicinis partibus vterus relabatur. Possit tamē interim luxurians vteri humiditas, lotionē lixiuij in quo nitrum aut sæx vini vsta, dissoluta sit, asperso subinde plumbi puluere absorberi.

Vetusta autem tumidaque procidentia è refrigeratione aerisque externi commercio, reponenda est, discusso prius frigore flatibusque dissipatis per topica calida siccaque & digerentia, vt litum ex oleo laurino nardino costino muscatellino, de spica post fotum ex lanâ decocto simili imbuta, vt foliorum origani, calamēthi, pulegij, artēmisia, matricaria, sabinæ, florum chamæmeli in tribus partibus aquæ & vna vini. Postremo gangrænosus vterus præcidatur, sine quo mulier incolumis diutius viuat.

De peruersione Vteri.

Peruersio siue Auerſio, Declinatio, Inclination & Obliquitas, tertius est moti è sua sede vteri organicus morbus, isque multiplex, dextrorsum, sinisterorsum & ad latera, vt ad ilia & ad inguina, anteriorsum & retrorsum, vt ad vesicam & intestinum idque inæqualiter. Tametsi ad vtranque partem æqualiter aliquando fiat.

Peruersionis vteri autores sunt duo morbi vinculorum & appendicum ipsius, antea propositi, con-

uulsio scilicet & paralyfis, Illa à repletione est è sanguine, vel menstruo in vasis & cotyledonibus obstructis suppresso: vel inuitato & deducto vi aliqua externa iisdem vinculis illata, vt per præcipitem casum in coxas: grauem hypogastrij contusionem ictumque & violentam extensionem, vt per arduum partum, grauiditatem molestatam, & maioris alicuius oneris sublationem gestationemque. Hæc à fluxione aquosæ pituitæ, aut immoderata perfri-
geratione prouenit.

Signa diagnostica.

EX signis diagnosticis: alia respiciunt causas paralyseos & conuulsionis: alia sunt specierum peruerſionis propria. Illa sunt quod in conuulsione ad eam vterus regionem accedit ex qua orta sunt, quæ tenduntur vincula & appendices: idque cum dolore & tumore si ad alteram tantum: vel sine tumore si ad vtramque partem æqualiter trahatur. In paralyſi autem vterus ad sanam partem contorquetur sine dolore sed cum tumore, otiantibus scilicet antagonistis utpote resolutis, & trahentibus ad se vterum sanis vinculis.

Propria sunt peruerſionis conuulsivæ signa, illius quidem quæ fit ad ile, dolor tumorque partis eius. Eadem sunt eius quæ fit ad inguen, sed dolor aliquando ferox vt mentem quoque commoueat: tumorque tantus, vt indiscussus suppuret atque rum-
patur, subsequente vlcere diuturno & fistuloso apud Hippocratem 48. aphor. sect. 5. Concurrit denique vicini femoris stupor torporque, refrigeratio & ambulandi standique impotentia. Æqualem verò vtriusque inguinis conuulsionem, vtriusque cruris torpor,

torpor, difficilis motus, aut nullus cum acerbissimo dolore consequitur.

Peruersionem ad pubem comitatur hypogastrii distensio dolorque & aliquando vrinæ suppressio: sicuti quæ ad intestinum est, impatibilis dolor ossis sacri, aluique tarditas.

Signa prognostica.

Signa prognostica sunt, quod ex qualibet per-
uersione sterilitas contrahitur, quod mensium
effluxum per sinum vteri, & seminis virilis in eun-
dem influxum siue admissionem prohibeat os vte-
rinum simul cum reliquo vteri corpore auersum,
quod pleræque prægnantes dolore còxæ affician-
tur, affectis vt dictum est ligamentis, quo dolore
post editum etiam fœtum permanente, claudicatio
oritur puerperæ ex Gal. 6. de locis affect. Quod per-
uersionem vteri ad coxam suppuratio aliquândo ex-
cipiat, vlçusque diuturnum & fistulosum, quodque
longioribus penicillis egeat; Quod denique in
peruersione vteri ad pubem & ad intestinum ob-
stetrix os vteri obseruare digito potest, non tamen
in ascensu ob digiti breuitatem cum sit ceruix pu-
dendi xij. fere digitos longa.

Curatio.

Communis omnium peruersionis specierum
curatio duabus constat principibus indicatio-
nibus. Vna spectat mórbos antecedentes, còuulsio-
nem scilicet & paralyfin. Altera peruersionum pro-
pria est. Illa igitur duplex est, relaxatio conuulsionis
& constrictio paralyseos vinculorum & appendi-
cum. Soluitur autem conuulsio vacuatione materiæ

radicis aristolochiæ rotundæ, helenij, gentianæ, foliorum origani, calaminthæ, pulegij, artemisiæ, nepethæ, tanacetij, sabinae, florum chamæmeli, centaureij minoris.

Litus & embrochatio ex oleo costino laurino muscatellino rutaceo nardino de spica, de terebinthina, petroleo, & oleo de lateribus.

Tandem verò dropaces sinapismi phœnigmi & balnea naturalia, nitrosa, sulphurea, aluminosa, à quibus omnibus perfusionis reliquiæ validissimè euocari & resolui possunt. Intus quoque paralyti in primis conferent aciores antidoti, vt mithridatium theriaca vetus, & quæ ex sequenti puluere portiones cōficiuntur cum vino, vt seminum anisi, cumini dauci fileris montani enulæ campanæ.

Quod si phlegmone aut abscessus ex copiosa nimis & nequaquam digesta satis fluxione vincula conuellat: huius quoque curatiua methodus in alijs vteri tumoribus antea exposita est.

Iam vero conuulsione & paralyti prius curatis, scopus alter isque duplex superest. Vnus restituendi in suum locum vteri. Alter eiusdem in eodem conseruandi confirmandique. Restituitur peruersio quæ ad alterutrum inguen vel ile est, obstetricis digito oleo lini vel simili peruncto & in orificium internū si fieri possit, penitus inserto, aut si breuior digitus est, summisso leuiter cū eodē digito specillo chirurgico: à quo in sanā aduersāmque conuulsioni partem impellatur: vel in ægram partem si sit paralytis. Adiuuatur quoque hæc restitutio, si foris eminēs vteri tumor, manu obstetricis leuiter cōprimatur: si denique cucurbitula magna, cum multa flāma sanæ parti in conuulsione nimirū, aut ægræ, in

paralyſi applicetur. Sit autem interim dum reponitur vterus, reſupinatum ægrotâtiſ corpus capite & thorace aceliui, femoribus decuſſatiſ & pedibus ad nates reflexiſ, inteſtinum quoque & veſica à ſuiſ excrementiſ exonerata ſint.

Appendiceſ denique & vincula ipſa conuulſa iniectionibuſ oleoſiſ clyſteribuſ fotibuſ & malaëtiſciſ prædiſtiſ ſæpiſſimè reiteratiſ relaxanda: ſicut eadem reſoluta & laxata nimis topicis calidiſ ſicciſque & aſtringentibuſ coerceri debent.

Confirmatur loco ſuo naturali vteruſ tum perpetuo ægræ decubitu in latuſ reſoluto aduerſum: tum cucurbitularum prædictarum frequenti appoſitione: tum friccionibuſ & ligaturis puluinis que in eandem aduerſam partem cogentibuſ, tum denique menſeſ prouocantibuſ: vel pulueribuſ vt ſeminum aniſi, dauci, carui, ſileriſ montani, nigellæ romanæ, rad. gentianæ, ariſtol. rotundæ, enulæ campanæ cum hydromelite propinandiſ: vel trochiſciſ de myrrha cum vino albo claro & tenui diſſoluendiſ, vel iulepiſ ex ſyrupo de quinque radicibuſ de artemiſia cum aquis meliſſæ hyſſopi artemiſiæ ſceniculi: vel denique ex antidotiſ calidioribuſ, vt theriaca & mithridatio veteriſ: fluxuſ enim menſium reliquias conuulſiuz obſtructioniſ demolitur vteruſq; ab inclinatione noua tuetur.

Peruerſio colli vterini ad inteſtinum rectuſ conuulſi, poſt eiſdem inteſtini & veſicæ excrementorum vacuationem, vinculorum & appendicum vteri relaxationem, per topica oleoſa & malaëtica modo dicta, reſtituenda erit obſtetriciſ digito altiſſimè in anum demiſſo à quo repellatur ſuſſum ſicuti à ſuppoſito, olido, ingrató que.

Con-

Conseruabitur in suo loco beneficio supposito-
rij 4. digitos longi quod ex galbano & cera mix-
tis constet : vel ex lana castorei succo aceto disso-
luti imbuta & linteolo obducta subditæque : tum
fotu pudendi per spongiam ex vino odorato & suf-
fitu grato quo vterus ad locum suum alliciat
qualis est ziuenta ceruici intimæ illita. At in paraly-
si topica illa omnia per quamcunque peruer-
sionis speciem calida siccaque & astringentia sunt ad-
ministranda.

Peruersio denique eiusdem colli vterini ad pu-
bem conuulsi post eandem vinculorum & appen-
dicum emollitionem, per topica modo exposita
vel astringentia calida siccaque in paraly-
si, dirigitur digito obstetricis : vel si breui-
ores sint, specillo chirurgico quod digitis clam & leuiter in ipsum
collum immittatur, à quo deorsum deprimatur, &
insuper à manu hypogastrium comprimente. Tum
demum ibidem continebitur pessario & odorato
altissimè intromisso & ligatura hypogastrij cum
puluino. Hæc quidem est singularis & propria per-
uer-
sionum cuiusque speciei therapia, remediis to-
pici-
s, reposi-
tionis & confirma-
tionis gratiâ, con-
stans, & quæ ad multos dies vt xx, aut xxx, aut xxxx,
continuari debet, donec probè obfirmatis appen-
dicibus & vinculis quæ affecta fuerât conuulsione,
aut paraly-
si aut exten-
sione violenta, vterus à reci-
diua declinatione tutus sit.

De morbis colli vterini.

EX quatuor vteri diuersis magisque compositis
partibus fundo, ore interno, ceruice & puden-
do; Primæ illius morbos omnes similes, dissimila-

res & communes, necnon curationem prosequuti
sumus. Iam secundæ partis morbi curandi quoque
instant. Illa vero est collum vteri, alias internum v-
teri orificium meatus scilicet sinui muliebri & cer-
uici pudendi vtrinque continuus & perbrevis in-
star pollicis vnus & ore duplici constans: vno ver-
sus ceruicem pudendi vergente, quod glandi virili
& rictui catuli recens nati persimile est: altero ver-
sus vteri sinum & cauitatem directo & perangusto
in virginibus, sterilibus & effœtis, in quibus specil-
li chirurgici aut acus acumen vix admittat, n. aximè
verò in prægnantibus per primos conceptus dies
donec membranz scilicet fœtuni sustinentes editæ
sint ad arcendum genituræ effluxum, auræque fri-
gidioris influxum; paucis tamen post conceptum
diebus libidinis & coitus incēdio referatur, semē-
que transmittit virile, vnde superfoetatio, sicuti ra-
ro tamen quibusdam mulieribus grauidis menses
emittit. Est igitur externi oris vsus, seminis men-
sisque emissio, interni verò in mulieribus non præ-
gnantibus neque virginibus seminis virilis cum
muliebri commixti in capacitatem vteri admissio:
mulieres enim non prægnantes, suum duplici via
semen excernunt; partim per cornua vteri in eius
ipsius cauitatem, partim per vasorum spermatico-
rum riuulos in medium vteri collum apertos: præ-
gnantes autem & virgines per vnum vteri collum,
non etiam per cornua eius vtrumque, menstruum
nempe sanguinem & semen exigunt, alioqui enim
effuso in vterum moraque corrupto, per totū gra-
uiditatis tempus semine, sæuissima suffocationis
symptomata excitarentur. Meatus hic siue collum
vteri, siue os eiusdem interius, morbis obsidetur
tum

tum vtero toti communibus, vt qui in situs mutati speciebus versantur (sequitur enim pars totius motum) tum propriis à quibus vsus eiusdem, aut a-
boletur, aut deprauatur: cuiusmodi sunt dilatatio, constrictio siue clausio, mollities & durities: nam à constrictione & angustia & obturatione, mensum effusio & cuiuslibet rei molestæ, receptioque seminis virilis intercipitur: sicuti à lubricitate & dilatatione retentio seminis, conceptus & embryonis interpellatur.

De Laxitate & mollitie Vteri.

Mollities seu Laxitas siue Lubricitas colli vterini semen virile non cohibet, donec ab vtero intro prolektetur & recõdatur, sed ipsum mox à coitu exceptum diffluere sinit. Hinc conceptus præpeditur.

Origo laxitatis ab humida intemperie est, siue idiopathica, siue per sympathiam totius corporis, vel visceris alicuius frigidioris & humidioris: vt ventriculi, cerebri, hepatis, aut lienis, affluentibus excrementis serosis, siue ea intemperies insita, siue ex improbabili victu ascita sit. Hæc autem intemperies communis & sympathica curabitur diata calida siccaque & euchyma, vt ex pane biscocto & anisato, carnibus assatis, fructibus siccis, & vini generosi potatione, intermisto etiam epulis sale condimentario (sacerdotali dicto) ex z iij. salis communis z ij. canellæ exquisitissimæ, seminis anisi, fœniculi, sileris montani, foliorum siccorum hyssopi origani pulegij & piperis an. z β .

Curabitur eadem intemperies sympathica purgatione pituitæ accuratè coctæ per Iulepos & apozemata calida siccaque attenuantia & tergentia, de quibus sæpe antea: Deinde per hydroticas portiones decocti Guaiacini, aut falsæ parillæ, & diureticas. Tum denique per topica sumenda immitenda & admouenda: quorum omnium plures species capite de Procidencia vteri expositæ fuerunt.

Ex iisdem etiam suffitus humidus, astringentibus & calfacientibus constans concinnetur, vt radicum bistortæ, foliis plantaginis, caudæ equinæ, tapperi barbati, absinthij, saluæ, pulegij, matricariæ abrotani, nucibus cupressi balauistiis, gallis, calicibus glandium, calamo aromatico, schoenantho baccis lauri & iuniperi coctis scilicet omnibus in aqua ferrata & vino tortiuo, vt decoctionis feruentis vapor per sellam deiectoriam & tubulum oblongum bis aut ter in die in mediam ceruicem demissum admittatur; moxque pessaria decenti magnitudine ex lana linteo molli inuoluta, quæ prius vino decoctionis aluminis & nucis muscatæ imbuta sit: vel aspersa puluere acaciæ hypocistidos, balaustiorum, nucum cupressi, gallarum, radicum bistortæ, caryophyllorum & nucis muscatæ.

Ex prædicta suffitus quoque materia fiat focus hypogastrij & iniectio per pudendum. Denique applicetur emplastrum de mastiche, vel contra rupturam. Postremo antidoti calidiores horis matutinis adhibeantur vt theriaca mithridatium.

Quod

Quod si intemperies idiopathica sit, post particularis cacochymia, si qua adsit, vacuationem, vterique per clysteres, & iniectiones tergentes, & phlegmagogas ablutionem, similique facultate immissa pessaria, tum deum deleatur præscriptis topicis calidis siccisque tam adinouendis quàm immittendis.

De angustia colli uterini.

Coarctatio siue angustia colli uterini morbus est organicus in amplitudine diminuta, meatus interni, externus enim fere liber est & patens: sicuti in eadem abolita prorsusque intercepta obstructio obturatioque versatur.

Angustia proxima causa est morbus ferè alius antecedens, interdum quidem similis ut intemperies valde sicca vel frigida. Illa porro aut nativa est, aut aduentitia, atque hæc ex longa effluxione humoris cuiuslibet acrioris ut menstrui biliosi, pituitæ putris & salsæ: vel certè per accidens oritur ex menstruorum priuatione; præ ætatis morbiue prægressi granditate, frigida verò ex diutina super frigidiorum lapidem scissione mora que nimia contrahitur.

Vt ergo siccitas, sic frigiditas contrahit membraneam huius meatus substantiam utrique alterationi maxime opportunam & densitati, unde duntaxat comes accedit. Aliàs eiusdem angustia colli uterini causa est morbus aliquis communis, ut tumor isque vel scirrhus

vel phlegmonosus obduratus, meatum eundem foris coarctans & astringens, sicuti nonnunquam cicatrix intus, callusque foris. Illa quidem ex progressa ulceratione natâ ab acri & excrementitia fluxione, vel à partu abortuue nimis arduo & ærumnoso; hic verò ex multiplici nimisque violento concubitu, & enormis mentulæ vibratione, frequentique contusione.

Commune causarum omnium symptoma est sterilitas ob seminis virilis parcius tardiusve, & postquam refrigeratum est admissi penuriam.

Est tamen eadem astrictio secundum naturam tum in virginibus & vetulis effœtis: tum in iunioribus, gravidis à conceptu ad partum usque, nisi in raris quibusdam in quibus leuiter, primis præsertim mensibus dehiscens semen virile suscipit, unde superfœtatio.

Signa diagnostica.

A Strictio naturalis ut in virginibus, effœtis mulieribus & gravidis, noscitur ex tumore laxo mollique & indolente. Nonnaturalis ex communi symptomate, duritie, asperitate, & dolore vel magno vel paruo & ex relatu mulierculæ laborantis.

Signa prognostica.

Omnis astrictio cum duritie siue in gravidis siue non gravidis fœminis contra naturam est, & curationis indigens, de qua Hippocrates
aphor.

aphor. 54. libri 5. Quibus os vteri durum est, iis arctetur est necesse: nam in grauidis abortum sæpe prouocat: ob impeditam vteri dilatationem iustumque foetus incrementum, qui etiam ex angustioribus locis excedere immaturè cogitur. Sæpe etiam vtrique & foetui & foetæ mortem consciscit, ex difficili nimis partu abortuue præ exitus angustia. In non grauidis mensium effluxum seminisque virilis admissionem prohibet.

Naturalis autem est sine duritiæ, vt in grauidis aliisque, tum iunioribus, tum senioribus menstruo carentibus. Exploranda est vtraque astrictiōis species digito obstetricis in ceruicem pudendi altissimè intromisso.

Cura.

Curatio multiplex causarum varietati opponatur. Quæ sine duritiæ est & secundum naturam, naturæ permittatur. Quæ cum duritiæ est à tumore aliquo scirrhuso aut phlegmonoso: curetur vt antea expositum est de aliis tumoribus vteri, tam in grauidis quam non grauidis foeminis. Quæ à callo & cicatrice est, curetur topicis emollientibus primùm: deinde acrioribus & digerentibus, de quibus antea capite de obliquitate seu peruersione vteri.

De obturatione colli vterini.

Obturatio siue oclusio & integra colli vterini conniuentia, tripartita est, Vna à natura, & secundum naturam est, eaque duplex; tum

in virginibus & effœtis mulieribus; tum in gravidis à conceptu ad partum vsque: Altera à natura etiã est, sed contra naturam tamen, vitiosaque conformatione, quæ etiã in ceruice pudendi frequens est. Tertia verò provenit, vel ab obstructione tuberculi carnosì, vel cicatrice ex ulcere prægresso, aut à pituitæ muco, vel sanguinis gramo intus obhærente, vel denique ab attritione omenti pinguioris.

Signa diagnostica.

Signa diagnostica communia obturationis contra naturam sunt durities & asperitas partis, priuatio mensium, & feminis virilis mox à coitu effusio, dolor imi ventris, lumborum, inguinum, ex perfusione ligamentorum matricis, à redundante menstruo. Aliàs ex palindrome mensium partes superiores condolescunt, vt pulmo vnde hæmoptoe, vel pectus vnde eius ipsius & mammarum ampliatio lacte turgentium; tandem etiã emergunt duri & cancerosi tumores.

Signa prognostica.

Naturalis obturatio & secundum naturam, tam ea quæ virginitatem, quàm quæ senectutem & conceptum comitatur, naturæ commitenda est: facilius enim naturali coitus partusue remedio, quàm medico hæc obturatio liberatur. Quæ à vitiosa conformatione est, vix curabilis sit, nisi à magna vi flatuum distendentium ex medicamentis cibisque flatuosis suscitandorum ex

Hipp.

Hipp.confilio. Quæ à grumosi sanguinis vel pituitæ mucosæ obhæsiōe est obstructio, expeditur illa quidem primùm purgatione vniuersali satis valida: deinde particulari vteri euacuatione per topica tergentia & attenuantia, tum admouenda, tum immittenda, de quibus lege cap. de vteri Pueruersione. Quæ ab omenti pinguedine & crassitie opprimente est, de qua Hipp.aphorif. 46. sect. 5. Quæ præter naturam crassæ non concipiunt (ait) his vteri os ab omento comprimitur, nec concipiunt priusquam extenuentur, id est ad mediocritatem habitus reducantur: illa inquam curabitur diætâ parca & ærumnosa calidâque & sicca, vacuationibus frequentibus per phlebotomiam, purgationes deiectiones, vomitorias, vrinas & sudores, vt ex decocto Guaiacino. Distinguentæ tamen sunt natura pingues quæ ferè fecundæ sunt, ab iis quæ victu obesantur. Quæ à cicatrice, callo, verruca, tuberculis meatui interno, vel præteritis, vel appressis obstructio nata est, hæc quidem expedienda est, primùm quidem emolli-tione ad multos dies continuanda, deinde resolutione per topica acria & attenuantia, vt sunt iniectiones fortiusque ex decocto rad. serpentariæ, enulæ campanæ, brionæ cucumeris agrestis, foliorum ebuli, mercurialis, artemisiæ sabina. Item cataplasmata ex eadem materia tusa cretâque & diligenter subacta cum farina fabarum oleo rutaceo & amygdalarum amararum: denique pessaria ex iisdem radicibus & ciclamine sub cinere coctis, atque cum melle mercuriato, hiera diacolocynthidos, semine cumini & ficibus simul contusis & linteolo inclusis.

De hiatu vteri.

Contra vero hiatus colli vterini ab imbecillitate totius vteri est qui nequit fibras suas membraneas contrahere & meatum illum interiorem constringere: hinc Paralytis & lassitudo vteri ab aliis nuncupatur vt Actio cap. 75. sermone 4.

Causa est vel intemperies frigida humidaque, vt à stillicidio diutino, & lento sanguinis fluxu, vel etiam à præcipiti longoque mensium diu antea retentorum (rarius enim nec nisi in vehementioribus motibus mensium superpurgationes fiunt) vel denique aliorum humorum quorumlibet effluuium, vt fit in fluore muliebri: Causa etiam esse potest violenta, ab abortu partu laborioso, aut frequenti nimis.

Signa diagnostica.

Signa diagnostica omnibus causis communia sunt, apertio colli vterini appposito obstetricis digito manifesta, seminis virilis non attracti neque retenti mox à concubitu effusio: vires omnes corporis sensim labascentes, febris lenta & horrida putrescentibus quibusdam vteri excrementis, dolor hypogastrii, lumborum, ilium & inguinum, ligamentis vteri omnibus fibrisque destituentis humoris, sero perfusis: mensium redundantiz proprium signum est fluxus diuturnus inordinatus & indefinens sanguinis liquidi & aquosi, fastidium veneris, & seminis virilis neglecti

gleæti diffusio, aut ad biduum vel triduum sola retentio.

Curatio.

CVratur viribus infirmis, dicta analeptica in-
taurante parumque astringente: deinde pur-
gationibus frequentibus & leuioribus tum vo-
mitoriis, tum deiectionibus, ne ab efficacioribus
vires nutantes labefactentur fluxu proritato. Po-
stremo pars ipsa roborabitur topicis admouen-
dis, immittendis & assumendis, de quibus omnibus
partim antea capite de Præcipatione vteri, par-
tim postea in singulorum affectuum capitibus
propriis agendum erit.

De morbis cernicis pudendi.

Tertia vteri pars ceruix vel collum pudendi
est, meatus scilicet siue canalis tum immit-
tendo semini virili, tum emittendo fœtui & men-
struo dicatus: ideoque efficta pars caua rotunda &
oblonga è colli vterini ore externo ad os vsque
pudendi externum exprorecta (quæ longitudo ferè
est duodecim digitorum) vt esset virilis mentulæ
semen in collum vteri cui braturæ, à quo mox ab v-
tero ipso raperetur, introque ad conceptum conde-
retur, capax receptaculum.

Substantia eius est musculosa quidem dura con-
stansque, nempe ex carne, membranis, nervisque
condita vt à ruptionis periculo ex grandiori fœ-
tu & enormi mentula tutior esset. Itaque in puel-
lis mollior cum sit, in annos tamen durior tan-
demque cartilaginea in vetulis euadit; in quibus
Herophylus summitati asperæ arteriæ eam vero

comparauit; atque inde vetularum corruptio, partioque difficilior est quam juniorum.

Neque tamen ea durities ex sola collisione & attritu est genitalium per venereos congressus, sicuti scortis etiā iunioribus accidit, sed ex naturali quoque temperamenti in siccius mutatione partium præsertim ex sanguinum membranarum & neruearum suapte natura siccarum. Eadem quoque substantia conniuente meatu rugosa & aspera est palati canini instar, sed eodem dehiscente læuis & æqualis: tum vt laxari ad emissionem fetus tum coangustari ad amplexandum penem possit.

Compluribus morbis afficitur pudendi ceruix, tū similaribus & intemperiebus: tum communibus vt vlceribus, fistulis, rhagadibus, verrucis, condylomatibus, hæmorrhoidibus, & tumoribus præter naturam; tum organicis vt læuitate asperitate, laxitate, angustia, obturatione, &c.

*De læuitate & lubricitate cervicis
pudendi.*

Cervicis pudendi lubricitas intemperiei humidæ sæpe soboles, quæ raro quidem natua & idiopathica est, sæpius aduentitia, ex sympathia aut totius corporis aut vteri priuatim contracta, cuius affluentibus excrementis madescere & irrigari solet. Hæc vero conceptui officit vel minuat coitus voluptate, quam inæqualitas ex confricatione genitalium auget; tum seminis virilis præcipiti effluxione, vt quatuor, vel quinque à coitu horis.

Itaque refrænanda ista humiditatis luxuries est pri-

primum quidē in vniuerso corpore si ex eius sympathia prouenit, institutā diætā calida siccaque, tum vacuationibus idoneis, vt phlebotomia si plethora subfit; alias purgationibus phlegmagogis, & post illas potionibus hydroticis, vt decocti Guaiaceni, & balneorum naturalium, sulphureorum, chalcanthosorum, bituminosorum, aluminosorum. Quod si ex vteri sympathia ortum habeat, eius quidem illuies primum eluenda est per tergentia & phlegmagoga topica, vt clysteres, iniectiones, pessaria. Postremo intemperies partis humida coercenda est topicis calidis siccisque, sed astringentibus, de quibus omnibus lege caput de prociencia vteri.

Eadem læuitas à cicatrice relicta fere incurabilis est, ab ulcere ægrè curabilis ob excrementorum affluentiam, idque per topica tergentia & siccantia primum, tandēque per epulotica remedia, id est cicatricem inducentia. Vlcus autem coitus voluptatem muliebrem turbat, semenque exceptum præ dolore ex confricatione præcipitat.

De asperitate.

Siccitas nimia asperitasque à vehementi intemperie sicca oritur: alias idiopathica, vt à labore, æstu, inedia, coitu frequēti, suffitibus, & ex morbo aliquo calido siccoque vt erysipelate, cancro, ulcere: alias sympathica ex totius corporis vteriue solius consensu ab excrementis eius biliosis acribus & salsis iniusta.

Illa autem fecunditati officia vel ob feminis muliebris & sanguinis penuriam, corpore vteroue

impensius attenuato, vel ob eiusdem eiectionem tardio rem, retuso ob duritiem loci titillationis veneræ sensu, vel certe ob seminis virilis contumacem nimis ad rugas adhæ sionem, quâ fit ut ab utero quamlibet arido, antequam refrigescat, celeriter satis attrahi nequeat.

Curationis scopus vnus est, humectatio, eaque vel toti corpori, utero & ceruici communis quâdo fit per sympathiam, vel propria utero & ceruici pu dendi. Humectationi alias calfactio, alias refrigeratio, pro causæ efficientis natura, iungatur. Itaque siccitas communis & natiua curetur primùm quidem diætâ frigida, humidaque, lactis diutina potatione, balneis refrigerantibus, humectantibus, & vnctionibus. In hac autem intemperiei & habitus squalidi specie vacuationum rarior aut nullus vsus est, nisi fortasse lenientium clysterum & minoratiuarum potionum, ut medullæ cassiæ &c. At quæ aduentitia est & communis ex morbo acuto vel diuturno, ea quidem diætâ calida humidaque & topicis omnibus pariter alterantibus persanetur.

Sed quæ ex sympathia vteri est, acria, falsa, putridæ fundentis excrementa, curatur vacuatione peculiari, per clysteres tergentes, iniectiones & pessaria: deinde per propria topica solis malacticis constantia, quibus scilicet idiopathica siccitas solis obliteratur, de quibus antea sæpe in affectibus colli vteri.

De angustia ceruicis pudendi.

Ceruicis pudendi angustia quædam naturalis est, nempe symphysis, & coalescentia laterum ceruicis, quæ primo impetu diuulsa & dilacerata sanguini-

sanguinem reddit quo tincta coniugibus substernebantur linteamina, quæ seruata ad desponsationē vsque virginitatis testimonia erant olim probatissima. Sin minus corruptio mulieris vel frigidity mariti significabatur. Lege 22. Deut. caput. Aliàs angustia eiusdē partis non est naturalis, neq; ita facile separabilis à pene virili, quem non admittit.

Officit autem hæc angustia conceptui prohibita mentulæ virilis in eam ipsam admissione, & seminis in collum vterinū immessione, aut certe foetus, si forte conceptus sit, exclusione, certo mulieris exitio post diros cruciatus, & inanes partus labores. Huius angustię causa est vitiosa conformatio, quæ fere incurabilis est, nisi forte à diuturna emolliitione dilatari aliquantulum possit. Constet autem emolliitio topicis malaëticis lenientib. & relaxantib. vt in fessibus, fotibus, clysteribus, iniectionib. præpinguibus ex decocto radicis althææ, liliorum, ebulli, foliorum 4. emollientium, seminibus lini, scænu-græci, ficuum, floribus chamæmeli, meliloti, litibus embrochationibus ex oleo liliorum, amygdalarum dulcium, lini, iasminini, & vnguento ex iisdem oleis addendo butyrum recens, cæsi pum adipēs infusos porci, gallinæ, anatis, anseris. Similia sunt resumptiuum & de althæa, pessariis ex iisdem vnguentis lana exceptis & linteolo inuolutis; vel ex emplastris diachylonis aut filij Zachariæ linteolo inuolutis oleoque lini imbutis ne adhærescant.

Atque sic relaxata prius ceruix iucundè mox dilatetur leni blandoque coitu, aut intrusis sensim pessariis ab initio quidem minoribus tandèmq; maioribus & iusta magnitudine solidæque substantia, vt ex fistula plumbea intus caua, aut ex

radice gentianæ, aut simili.

Eadem angustia à cicatrice quandocunque emerfit curanda, ut ante expositum est, primum quidem emollitione, deinde deterfione & resolutione, postremo dilatatione.

De amplitudine vel hiatu colli pudendi.

Contra ceruicis eiusdem capacitas immodicè aliquando hiat, & ampliatur, estque ægrotudo hæc sterilitatis author tum sublata quæ ex genitalium collisione per coitum oritur voluptate, tum deturbato foras ante attractionem vteri semine virili, quod arcte satis ceruix non amplexatur.

Est autem ægrotudo hæc alias insita & à vitiosa conformatione, alias adscititia, idque tum ex sympathia vteri eiusque stillicidio, & mensium redundantia aut fluore albo: ab iis enim excretionum vteri symptomaticarum differentiis. madescere ceruix pudendi, laxarique effasè solet, tum per idiopathiam ex violenta distensione enormis mentulæ vel difficilis arduique partus vel grandioris vel mortui, vel quomodolibet præposterè prodeuntis fœtus. Hiatus ille si naturalis sit, tum sane incorruptam virginitatem testari sanguis primo congressu profusus & substratis linteaminibus exceptus, non possit: tamen si Deuteronomij 22. cap. puellæ desponsatæ parentes cruentata à primo coitu linteamina in virginitatis indelibatæ fidem asseruare, publicèque ostentare iuebantur contra suspectas maritorum calumnias. Quæ consuetudo apud Hispanos inoleuit. sed ille Deuterono-

ronomij locus non ad violentam, seu auctam part-
tis figuram spectat: sed ad naturalem, cuius symphy-
sis distrahi sine cruore nequeat.

Curatio.

CVratur quæ sympathica est, affectuum vteri
præuia amotione ante exposita. cap. de hiatu
colli vterini, deinde constrictione & compressio-
ne partis per topica astringentia calida siccaque, a-
romatibus & odoramentis condita; his enim suavi-
ter uterus fruitur, cuiusmodi sunt fodus, infessus, li-
tus, vnguenta, iniectiones, pessaria & suffitus liqui-
di, aridique, de quibus paulo ante copiosè satis cap.
de Procidencia vteri.

Horum topicorum solus vsus sit in idiopathi-
ca illa amplitudine quæcunque eius origo fue-
rit, siue à natura, siue à labore, siue à disten-
sione violenta in partu. Iisdem denique reme-
diis puellarum corruptionem & stuprum fuca-
re atque adeo virginitatem eimentiri licet, vt
pro virgine procacissimum, & obscœnissimum
sæpe scortum pluribus scortatoribus vicissim ven-
datur.

De cervicis pudendi clausura vel obturatione.

Obsidetur pudēdi cervix tumoribus præter na-
turā; phlegmone, erysipelate, schirrho, cæcro,
gāgrēna & abscessu, non infrequentius quidē quàm
reliquū vteri corpus, quia eius substantia carnosā, &
musculosa est: sed vlcereb. multo infrequētius; obsi-
detur inquā tū ob sympathiā vicini vteri, totiūsq;
corporis quorū defluentib. excremētis sæpe acrib.
putribus, & saniosis continenter perfunditur; Tum

per idiopathiam, vel ex abscessu aperto, ex difficili **II** partu, ex violento impurove concubitu. Cæterum quia horum morborum methodum curatiuam ante expediuimus, cum de vteri morbis ageremus, propterea ad nouam quandam eiusdem ceruicis ægritudinem nostra iam properet enarratio. Ea verò græcis *φίμωσις* est, latinis præclusio, obturatio, aliis capistratio. *φίμος* enim propriè significat nexum summum sacculorum vel perarum oris, cum totus eius ambitus collectus circumducto vinculo obuincitur. Nempe *φίμωσις* est communis omnium naturalium meatuum quos natura diduci adducique oportet, clausio, vt narium, labiorum, oculorum, ani, præputij, vteri.

Contraria est affectio *ἄφίμωσις*, cum claudi iidem ineatus nequeunt.

De causis.

PHimoseos causæ plures sunt à Paulo proditæ; nā cap. 71. lib. 3. ostiolum ceruicis obturari docet phlegmone illic indurata & cicatrice ex prægresso vlcere. Eodem authore cap. 73. li. 6. idem ipsum ceruicis foramen intercipit & intercludit vel commissura sola & coalitus, vel membrana obtensa, vel caro superflua, idque aliàs circa alas, siue labia pudendi, aliàs iuxta ostiolū, aliàs denique circa mediū eius dē foraminis spatiū. Illo vitio laborantes mulieres græcis *ἄρπυραι*, latinis imperforatæ vocantur, quibus scilicet partes genitales vel morbo vel natura concretæ sunt.

Signa diagnostica.

PHimosi solo sensu noscitur tum tactu tum visu, non solum ea quæ foris est, sed etiā interna, immissa scil. dioptra: Noscitur & mariti querelis de priua-

priuatione coitus & voluptatis veneræ. Rarior enim puellarum curatio suscipitur, si modò fissura pudendi libera sit, nisi à suppressi menstrui mole in pubem incumbente grauius consistantur. Causæ distinguuntur tum ex origine, sic membrana est à natura, caro & cicatrix ab vlcere præuio; tum ex colore albicante vel rubro; tum denique ex substantia duriori vel molliori.

Signa prognostica.

PHimosi omnis fecunditatem turbat, tum impedita mensium purgatione, vnâque coitu & conceptu, partu denique nimis arduo & funesto. Sæpius enim caro membranâque totum ceruicis aut osculum obstruit; aliquando tamen vtraque angustiore quodam patet foramine vt parum seminis in sinum vteri admitti concipique, sicuti ex eodem, menstrui aliquid emitti possit, non tamen fœtus quamuis pusillus excludi. Curatio pro loci discrimine variat, tanto enim facilior est carnis & membranæ excisio, quanto manibus oculisque curantis chirurgi magis obuia est.

Curatio.

PHimosi osculi ceruicis à cicatrice vel phlegmone scirrhuso curatur vnico relaxationis scopo, vnâque emollitionis indicatione per incessus fotusque ex hydrelæo, & fœnugræci decocto, per cataplasmata similia & pessulos ex cæsypo resina & terebinthina interpositis interdum vtroque inueterascente vitio, id est cicatrice & phlegmone magis occallescente; attenuantibus & digerentibus acrium aromaticum suffitibus. Phimosi labiorum vel

alarum pudendi ex sola commissura & coalitu naturali, curatur diuisione per specillum, aut scalprum tanta, dum naturalem magnitudinem fissuræ vel rimæ pudendi æquauerit: mōxque linamentis carptis vulnus farciatur, diligenter obligandis ne rursus coalescant; deinde eadem linimenta per aliquot dies suppurantibus, tandēque epuloticis obducantur. Mulier autem ægra decumbat supina femoribus diductis, & cruribus ad nates reflexis tempore chirurgiæ, à quo eodem decubitu pergat cum puluinari inter femora, donec cicatrix confirmata sit. Membrana in ceruicis ostiolo impacta volsella protrahatur, inflectatur, penitusque tota circuncidatur, mōxque linamentum tortum vulneri inferatur. Eadem membranæ est in sinu ceruicis per dioptram exploratæ & volsella apprehensæ excisio. At caro in sinu ipso ceruicis confidens prius quidem dioptra admissa exploranda est, mōxque stilo in eam dimisso media dissecanda est, eiusque labia per volsellam arrepta tota amputanda sunt. Postremo finita chirurgia mulier in pedes erigatur diductis cruribus donec effusa omni corruptela rursus recumbat supina, donec vulnus suppurarit & cicatricem duxerit.

Interim ne coalescant labra crebra dilatatione dehiscant, vel per immissum digitum vel radicem gentianæ crassam & oblongam, vel per canalem plumbeum, stanneum, argenteum cauum, politum densis foraminibus peruium, quibus tota sanies foras decurrat. Hæc vero sæpius abstergenda est iniectionibus ex hydromelite, aut ex decocto foliorum agrimonij &c. Has autem membranas pudendi ceruicem dirimentes plerique asserunt tanquam septum

ptum quoddam naturale membranofum virginittis claustrum & propugnaculum, quod in vetustioribus virginibus duritiem à marito insuperabilem allequatur, de quo tamen magna iudiciorum varietate inter anatomicos certatur.

Vetus quidem opinio fuit illam pudendi ceruicem medio quasi ductu suo & post vrinę meatum transuersa quadam membrana dirimi, multis tum venulis, tum arteriolis conspersa, quę primo viri congressu dilacerata sanguinem profundant. Itaque cruentatio ea virginittis ad nuptiarum diem seruatque certum argumentum apud Hebręos olim habitum est vt ex 22. cap. Deuteronomij appareat: sicuti hodie quoque apud Hispanos quibus de more antiquo & Arabico solemne est, cruentata linteola quę coeuntibus coniugibus substrata fuerunt postridie nuptiarum publice ostentare cum eiusmodi acclamatione: *Vergen lostenemos*. *Africani* autem postridie nuptiarum tantum conuiuia celebrant nuptialia, seseque maritatos esse putant postquam virginittis testimonium ex cruentatione lintheaminum adfuerit, quo deficiente mulierculas omni probro & dedecore meretricatus onustas ad parentes suos ablegant. Fuit enim semper gens ea Africana valde zelotypa, & virginittis suarū puellarum studiosa; ideoque illis Arabes alas vel labia pudendi virgunculis adhuc consuere solebant, intacta vrēthra, quas mariti coituri arbitrio suo dissuērent.

Neque solum apud vulgus sed apud doctissimos quoque tum philosophos tum medicos ista hymenis opinio inualuit. Nam Auicennas lib. 3. fen. 27. cap. 10. puellarum violationem valde violētam esse

tradit, quibus aut cervix pudendi angusta, aut genitale virile grandius, aut virginales panniculi (ita vocat hymenes) valde densæ texturæ sunt. Singulares deniq; ævo nostro anatomici Fallopius & Columbus huius opinionis fautores sunt de hymene: ita enim vocatur priuatim membrana in pudendo hymen, vnde hymeneus dictus Deus nuptiarum præses & violandis puellis propitius ne dolore pereant. Sic meminx priuatim in capite, sic tunica circa viscera & musculos membrana vocatur. Contra complures alij & recentiores propriis suis experimentis opinionem istam conuellunt, quod sibi multarum virginum cadauera dissecantibus nullam huiusmodi membranulam in cervicis sinu inuenire contigerit. Quin potius naturalem quandam esse eius laterum symphysim & coalitû qui primo coitus impetu diuellatur, idque promptius ægriusve pro varia virginis ætate & genitalium conformatione. Vt enim iunioribus ante mensium eruptionem difficilius ob angustiam & prouectioribus ob duritiem & ficitatem, sic maturis facilius minori-que dolore & cruore pariori distrahitur.

Est igitur omnis illa de membrana naturali cervicem pudendi intersepiente (hymene dicta) assertio negatioque valde dubia, solâque probabili cōiectura constans, nisi Africanis virginibus ob regionis æstum & squalorem, membranulam istam densiorem, crassiolem, magisque concretam quam nostris Europæis ob mollitiem & aëris huliginem obtingere affirmemus. Sic nymphas illis prociore quondam & tentiginem ascripsimus, in nostris nusquam compertas.

¶ Sed tamen in fluctuantium opinionum varietate statui

statui posset verum virginittis indicium dolor
 cruórque primo coitu effusus.

*Derhagadibus cervicis & alarum
 pudendi.*

R Hagades sunt communes affectiones partium
 carnearum multis fibris nerueis & membra-
 neis contextarum, vt labiorum, digitorum in ma-
 nibus & pedibus, papillarum in mammis, præputij,
 ani, cervicis & alarum pudendi muliebris, Græcis
παράδες Latinis rimæ & fissuræ, Plinio fissa vocan-
 tur, Gallis *crenaffes & fentes*. Sunt autem rhagades
 solutæ vnitatis species, nempe vel vulnuscula, vel
 vlcuscula angusta & oblonga, quibus partes illæ fi-
 brosæ secundum longitudinem proscinduntur.

Causæ aliàs internæ sunt, vt humoris acris, falsi,
 nitrosi & erodentis è vicino vtero affluentia, vel
 condylomatis inflammatio cutē distendentis vio-
 lentius rumpentisque: aliàs externæ vt siccantes im-
 pensus tum frigidæ tum calidæ, vt æstium cælum
 & borealis flatus. Siccitas enim immodica nerueas
 fibras humido suo exhaustas affatim contrahit ve-
 hementer diuellitque chordarum citharæ instar, si-
 cut & laboriosus nimis partus, ob fœtus caput nimis
 vastum & prægrande.

Signa.

D iagnostica signa rhagadum cervicis pudendi
 sunt dolor ex qualibet fricatione vt per cot-
 tum: noscuntur etiam visu tactûve solo illæ quæ ex-
 timæ & circa ostiolum cervicis sunt affixæ. Altio-
 res etiam per dioptram & tactu indicis. Rhaga-
 des conceptum impediunt reiecto mox à coitu

propter dolorem semine virili , aut muliebri etiam suppresso.

Curatio.

R Hagades recentes & à causa externa impensius siccante calida, frigidave ortæ curantur duabus indicationibus, vna agglutinationis quæ à solutione; altera emolitionis quæ à duritie & siccitate indicatur. Tertia tamen iungi potest, refrigerationis vel calfactionis desumptæ à caliditate aut frigidityte siccantis causæ; vt sint in vniuersum medicamenta topica emollientia, agglutinantia, simulque calfacientia vel refrigerantia.

Talis est fodus ex decocto seminis lini aut similibus in aqua & vino cum spongiola: tale vnguentum ex olei seminis lini vel amygdalarum dulcium \mathfrak{z} ij vitello oui vnius, lithargyri \mathfrak{z} ij & pauca cera citrina. Simile quoque est & hoc,

\mathcal{R} . mucilagin. seminis lini extractæ ex decocto sol. maluæ, butyri recentis & nucum cupressi an. \mathfrak{z} ss cum cera fiat vnguentum. Talis denique litus est ex oleo de vitellis ouorum.

Hæc quidem osculi ceruicis rimarum curatio est, intimis autem abditisque in sinu altiori succurrunt iniectiones, infessus, & pessuli eadem emolliendi & agglutinandi facultate præstantes, quorum materia in hunc modum vsurpabitur.

\mathcal{R} . rad. althææ & ebuli an. \mathfrak{ss} sol. 4. emollientium, conisæ maior. vincæ peruinæ, plantagin. symphyti, sanguinalis summitat. oleastri an. m. j. seminis lini, balaustior. & nucum cupressi an. qrt. j. flor. rosar. & chamæm. an. p. j. fiat omnium decoctio & hoc decocto fiat infessus fodus & iniectio.

Sic

Sic ex vnguentis præscriptis exceptis lana inuoluta linteolis fiant pessuli.

Rhagades recentes à partu non statim in primis diebus curentur, tam in ostiolo quam in sinu ceruicis, ne lochiorum vacuationem remorètur; sed post septem dies, quo tempore ex affluente vteri illuuiæ iam degenerant in vlcerum sordidorum naturam; quorum remedia non lenientia tantum & agglutinantia, sed tergentia etiam sint, vt si myrrha, aloes, terebinthina, mel rosatum colatum præscriptis vnguentis addantur, & sic folia agrimonij vel betæ, absinthij decocto permisceantur. Huiusmodi topica ex vlu quoque sunt aduersus rhagades ab acri fluxione editas; sed hoc tantum discrimine quod hæ præseruatione & reuulsione egeant per phlebotomiam, purgationem clementem phlegmagogâ, aut cholagogam: & per dietam refrigerantem & humectantem; ne perenni fluxione rhagades alantur, augeantur. Huius generis hæc sunt.

℞. mellis rosat. colat. & olei rosat. an. ʒ i lithargyri ʒ iiij myrrhæ vel aloes ʒ ij ceræ albæ parum, fiat vngueptum.

℞. olei amygdalar. dule. & olei de papauere an. ʒ j vnguenti albi rhafis camphorati ʒ j β aloes, myrrhæ & thuris an. ʒ j terræ sigillat. ʒ ij cort. thuris & aluminis an. ʒ j β albumen oui vnus, fiat vnguentum.

Ad inueteratas rhagadas callosasque non admittit Aetius ferrum aut ignem, id est chirurgiam & medicamenta acria, ne inflammationem aut conuulsionem accersant; sed ad callum exterendū tergentia modicè & digerentia adhibet, vt iridem illyricam vel potius papyrus vstam cum terebinthina.

De condylomate.

Condyloma est affectio rugarum ani, & osculi ceruicis pudendi, nempe excrementia, eminentia, tumor; aliàs sine inflammatione mollis & indolens; aliàs cum inflammatione durus dolensque. Ita verò dictus ab articuli similitudine quem Græci κόνδυλον vocant, cuius in modum prominet, extuberrat & attollitur, maximè quidem fluentibus menses vel lochiis. Origo fere est è rhagadibus prægressis. Causa humor est tum phlegmaticus in neglectis rhagadibus collectus, concreescensque; tum atrabilarius sanguis ab iisdem rhagadibus dolentibus allectus.

Dignoscitur tum tactu chirurgi, visuque circa osculum ceruicis pudendi, in quo durum vel molle, dolens vel indolens, liuidum instar granorum racemi vel mori, vel albicans eminet: tum tactu mulieris & difficili coitu, vnde semen virile præ dolore foras exprimitur; sicque fœcunditas violatur.

Curatio per pharmaciam multo tutior & iucundior, tametsi longior, quam per chirurgiam, id est sectionem, vstionem & ligationem. Partes enim extremæ acerrimum habent sensum neque offendantur sine periculo grauissimi doloris, conuulsionis, fluxionis, phlegmones, & gangrænæ. Indicium est è pollice pedis subita mors apud Hippocrat. 1. epid. Habet etiam sedes & pudendum è vicino osse sacro ductos nervos prætenues, & rectos, indèque acius sentientes.

Curatio.

Curatur itaque quod minus durum est ab Aëlio, topico mixto partim malactico, partim valide siccante, vt vnguento ex butyro, tuthia vsta & alu-

& alumine vsto, & cera citrina. Paulo durioribus condylomatis opponenda sunt attenuantia magis & digerentia vt ex iride & terebinthina, vel ex papyro vsta cum eadem terebinthina. Durissimis vero cathartica tandem à quibusdam opponuntur, qualis est puluis mercurij appositus cum vnguento albo; aut puluis constans sabinæ siccatæ & pulueratæ ʒj hermodactylorum & myrtillorum vstorum an. ʒ iij chalcitidis & aluminis an. ʒ ij.

Cæterum in acriorum topicorum vsu cautiones sunt adhibendæ tum vt acrimonia obtundatur sensusque partis hebetetur, & dolor admixto opio: tum vt fluxio anteuertatur phlebotomiâ in cubito & in malleolo, purgatione clementi peccantis eacochymix, & diætâ frigida, atque astringenti; tum denique sublimiores partes vt ad inguina, ilia, & lumbos defensiuis vocatis, ex bolo sanguine draconis, ture, mastiche cum albuminibus ouorum muniantur.

Quod si ampliore sint basi, volsellâ apprehensa amputentur scalpro vel affatim vel sensim pluribusque diebus sanguine interim fluente vt pars exoneretur. Huius etiam impetus sistatur asperso puluere boli, gallarum, aluminis, balaustiorû; tandemque vnguento apostolorum tergeatur & ad cicatricem ducatur cum vnguento de plumbo. Si denique longius sit & gracilius condyloma seta equina intercipiatur, tantisper dum subducto omni alimento tabefactum sua sponte decidat.

De thymo.

THymus, tuberculum est carnosum instar verruculæ eminens, tenue prope cutem, latius ad superficiem, in summo perasperum, oblongum

subrubrum; ita dictum à similitudine thymi cretensis florem purpurascentem in cacumine suo gerentis. Id ipsum fabæ Ægyptiæ fere magnitudine est; aliquando tamen minus, hocque propriè thymus vel thymum, vel thymium vocatur: aliquando maius, hocque ficus vel *συκωσις* dicitur ut Martiali,

Dicemus ficus quas scimus in arbore nasci

Dicemus ficos Cæciliæ tuos.

Dicitur etiam marisca eidem Martiali,

Caduntur tumida medico ridente marisca.

Dux sunt thymorum vtriusque speciei principes differentiæ. Alij inflammatione assiduâque caliditate carent; suntque magis carnosî, molliores, indolentes, candidi, aut subrubri. Alij cum inflammatione & phlogosi duriores, maiores, asperiores, rubri, vel liuidi & cum dolore punctorio qui præsertim exacerbari solet cum manibus aut vestibus tractatur, aut medicamentis irritatur & præcipue à coitu & deambulatione finditur cruentatur, sanguinemque fundit, tuncque moro maturo vere respondet. Nascitur vnus vel plures in pedibus, talis, palmis, femoribus mediis, facie & quibuscunque partibus duram attritionem perpeffis. Sed molestissimi sunt, qui obscœna inuadunt tum virilia ut colem glandem, præputium; tum muliebria ut alas pudendi aut osculum ceruicis pudendi vel ductum eiusdem.

Causa est quælibet harum partium violenta attritio, & epidermidis erasio ob quam sensim parcèque exudans sanguis, vel pituitosus vel atrabilarius concrefcit iuxta superficiem veræ cutis in carneam substantiam mollem duramve, candidam vel rubrâ, vel liuidam, dolentem vel indolentem.

De signis.

NOscitur vel tactu solo visūve, vel si in ductu & sinu colli latet, per dioptram iminissam. Mites curantur tutò & medicamentis & excisione sine hæmorrhagiæ timore. Maligni autem neutro modo curantur, nam ab acribus & cathæreticis exasperantur & cancrofi fiunt; à chirurgia effrænīs hæmorrhagia prorumpit. Quare aut cum tota carne subiecta resecandi sunt (quod in vtero nō licet) aut cura dicta palliativa tractandi, per refrigerantia simul & validè siccantia remedia, anteuertendis leniendisque cancris consueta.

Curatio.

THymorum mitium recentiumque curatio cōstabit remediis strenuè siccantibus & astringentibus, vt apud Aëtium puluere cucurbitæ siccatae vstæque, & solearum vetustarū pariter vstarum, qui aspergatur sæpe thymis prius vino elotis: vt apud eundem pro propria vxore ex fumo stipitis organi sine flamma in thymum directo. Iidem mites duriores & vetustiores volsella apprehensi scalpro resecantur (intacta cute) moxque à resectione puluis anaxmōs aspergatur ex galla trita, alumine scissili cum pari thuris pondere (vitatis humidis omāibus quibus thymi renāscuntur) tandemque ex stomate ferri, rosarum flore luteo, gallis & citrinis siccis. Hic enim puluis mirificè cōtrahit, siccatur, & ad cicatricem perducit.

Iidem denique mitiores, in sinu vteri pariter resecari possunt, sanguisque cohiberi imposito cum digito vel spatula puluere præscripto: tum

cere videatur, éstque similis moro maturo non solum magnitudine & colore, sed & asperitate granorum.

De signis.

Signa diagnostica & distinctiua sunt omnia illa quæ modò exposita fuerunt. Prognostica sunt, quòd pensiles rarò solitariae, sæpius plures simul apparent, & subito disparent; desinente alimento ex pituitæ quacunque vacuatione: rarissimè inflāmantur & suppurant.

Curatio.

VTraque hæc verrucarum species curatur fere per chirurgiam, vt ligatione, excisione, v-
fione & erosione. Pensiles enim ad cutem inciduntur tutò, & sine hæmorrhagia; nullam enim radiculam altiore in frāque veram cutem relinquūt ex qua repullulant. Eædem interceptæ vel pilo equino vel filo canabino retorto ceratòque, vel filo serico, cerato pariter, aquæque alchimistica imbuto, per singulos dies arctius astricto, atrophia tandem contabescunt, suæque sponte decidunt. Sessiles affatim sensimque excinduntur per volsellam apprehensæ, sanguinem interim si copiosior fluat, anæmis medicamentis supprimendo.

Clauus, cornu, callus sunt cutis excrescentiæ sessilibus verrucis haud valdè absimiles. Est enim clauus exiguum tuberculum album, rotundum, radice alta vsque ad perioftion ex quo emergit, prædura, solidæque parte summa clauorum capiti simile in digitis plantisque pedum frequēs, dolensque & ambulantis semper molestum.

Callus non ex humore sed ex cute summa est per laborem indurata, in manibus pedibûsque sine vlla radice interna & sine dolore. Idem si duriores euadant & oblongiores, vnguium aut cornium fragmentis similes, cornua dicuntur: non ea quidem vera, quales sunt oblongæ quædam eminentiæ animantium corniculis similes, quæ è temporibus mediâque fronte sæpe erumpunt, suntque veræ exostoses.

Clavi recentiores molliorésque cathæreticis appositis absumentur, capite resciso vt puluere sabinae siccatæ vstæque, vt sapone nigro, misto pauco sale vsto, vel alumine, tithymali lacte, puluere mercurij, vt denique trochiscis Fernelij ex calce viua cum melle mixta, & trochiscis asphodelorum cap. 15. l. 6. meth.

Duriores mitiorésque melius adurantur aqua forti, oleo vitrioli, aqua capitelli, aut cauterio etiam actuali per cannam aut tubulum argenteum immisso, partibus interim vicinis vnguento de bolo, aut simili munitis, arcendæ fluxionis causa quam dolor ex vstione, calorque excitaret. De cathæreticorum istorum & causticorum materia vide Hollarium cap. 5. lib. 3. de materia chirurgica, & Galenum lib. 5. de facultatibus.

Calli non excisione sola superficialia (non enim vstionem aut erosionem postulant) sed emollitione multa etiam digeruntur, vt cochlea cum sua testa contrita & admota per paucos dies.

De affectibus pudendi muliebris.

PVdendum muliebre, (alias pudoris sinus, & vulua) propriè rima est in quam definit exter-
num

num ceruicis orificium, quæque labris cutaneis, pilosis(*αλεπουδαατα*, id est alas Græci vocant) munita, nymphisq; ornata est. Est autem nymphea epiphysis & substantia quædam ex carnosâ & cutacea mixta, in medio rimæ supra alarum pudendi commissuram, vbi meatus est vrinarij finis, quem ambit tegitque, estque ceruicis pudendi orificio, vt vna pharyngi, tanquam propugnaculum quoddam appositum vt illam à frigore, puluere, aliisque externis iniuriis tueatur. Illa autem in quibusdam mulieribus, rarissime quidem Europæis, sed in Africanis, & præsertim Ægyptiis ob caliditatem regionis frequentissime, in tantam magnitudinem excrescit, vt extra vterum prominens scæminis deformitatem pudorémque, viris certe tædium & molestiam afferat, & concubitum impediât. Solet enim non solum virili congressu sed vestimentorum etiam contactu arrigi & ad venerem irritari, quam Ægyptij olim virgunculis suis aut iam iam nubilibus hoc quidem modo rescebant, vt ait Aëtius; Virgini in sella parum inuersa confidenti retro assidens robustus minister & poplites eius manibus amplexus femora diducebat: totumque corpus & brachia continebat. Interim astans chirurgus hanc sinistra manu & volsella apprehensam distentamque, dextra per nouaculam excidebat, non totam quidem sed superfluam tantum eius particulam. Aliàs enim effrenis hæmorrhagia vterique relicta perfrigeratio sequeretur: tuncque post resectionem pars abstergenda cum spongia vino vel frigida imbuta expressaque; moxque puluere anæmo vt manna thuris aspergebatur, spongiâque poscâ imbuta su-

perligabatur , cohibendæ hæmorrhagiæ causa, donec post septimum diem resoluta spongia cicatrix duceretur epulotico pulvere vt cadmiæ cineris , ossium palmularum , florum rosarum & similia.

De Cleitoride.

CLeitoris naturalis pars est carnea , orificio externo pudendi adunata exquisitissimi sensus & voluptatis venereæ incitatrix per coitum aut quamlibet fricationem. Ea autem contra naturam in quibusdam mulieribus præsertim Africanis in tantam magnitudinem euadit vt extra vterum promineat instar caudæ (*σέπκροτις* appellatur) omninoque pudendum muliebri repleat. Hæc autem à Paulo curatur & Aëtio. Alia contra naturam clitoridis nomine particula quædam pudendi muliebris à Fallopio primùm describitur , quæ peni virili vsquequaque respondeat, figura, substantia, vsu, situque. Constare enim scribit ex duplici neruo intus spongioso, acrique & crasso, sanguine referto. Oriri ab vtraque ossis pubis parte, haberéque in principio suo vtroque musculum manifestum quidem, sed paruum pro magnitudine partis, vnde magis flaccida sit quam viris mentula, vasa multa per dorsum eius currentia sicuti in virili pene, videri, desinere denique in extremum quoddam glandis simile, pelle quadam veluti præputio contextum; quæ pellis gemina illa nervosa corpora coniungat. Crescere autem aliquando in tantam magnitudinem, vt mulieres hac parte præditæ cum mulieribus aliis coeant, vnde Tribades & fricatrices dictæ sint. Hincque for-

fortasse nata opinio est metamorphoseos virginū in viros ipso nuptiarum tēpore, quo æstuans libido latitantes antea partes istas produxerit. Sed hæc descriptio est hermaphro diti non simplicis fœminæ, cuius tamen illa excedens clitoris propria est. Hanc vocat Auicennas virgam vel caudā lib. 3. fen. 23. Albucasis tentiginē li. 2. c. 71. græci clitoridem, vnde verbū obscenū κλειτοριζειν ductū est: Columb. sedē veneris. Impedit autem coitum virilē, itemq; æstate producitur, hyeme contrahitur. Curatio eadem est & chirurgia quæ de nymphea exposita est.

De pruritu pudendi muliebris.

Pruritus symptoma est nempe doloris pungentis species scalptum, vel fricationem excitātis. Causa excrementum vel biliosum vel pituitosum, nitrosum, falsum putreue cuti, carniue subiectę affixum immotūmq; . Non enim ita tenue & mobile est vt quod febres accessiones vel lassitudines vlcerosas cōmittit: neque rursus ita crassum vt in psora lepræque surfores squammasque scalptu emittens. Itaq; pruritus ad psoram, huius ad leprā proximus gradus est; estq; aliquādo totius habitus symptoma ex sympathia viscerū tū vētriculi crudioris tū hepatis calidioris aut obstructi lienis; alias partis vnus vel ex eadem sympathia, vel ex idopathia vt ceruicis pudendi, eiusque præsertim osculi externi, cuius rugis facile pruriginosus humor adhærescit crassus lentusq; siue is ex vteri propriis excrementis putrescentibus siue è totius corporis cōmunibus effluat.

Signa diagnostica.

Signa diagnostica sunt sensilia vt puta tactilia, tū mulieris relatus, tum assiduus & inuerecundus

puerendi scalpitis, quo per calorem à leui motu commotum pruriginosus humor attenuatus detrususque ex relaxata ab eodem motu & calore cute expiret. Quanquam dolor momentaneus scalpitis sæpe sequitur ab humoris non discussi reliquiis, sed agitati & exacerbati, ob extritam epidemidem cutemque detectam, & ab aere commoriam.

Prognostica signa.

Affectus hic vetulis, viduisque etiam iunioribus molestissimus & creberrimus esse solet: illis ex pituita falsa & nitrosa: his ex biliosis ichoribus: Tum etiam quod vlcerosus tandem euadat, vel ab erosione humoris diutius hærentis, vel à scalpitu immodico.

Curatio.

Si sympathiæ totius corporis, vel visceris alicuius & vitiosi sanguinis ex natura, & ætate mulieris, victus ratione prægesta, aere, regione, & similibus causis externis, certa adsit coniectura, tunc therapie primum instrumentum circa diætam refrigerantem & humectantem exercebitur, siue pituitosa falsaque siue biliosa sit cacochymia. Alterum instrumentum spectat ad pharmaciam vt euacuetur primum antecedens causa, tum per sectionem basilicæ cubiti dextri vel sinistri, & ad viscus *δύσκρατον* directi: tum per purgationem cacochymie sanguini mixtæ postquam alterantibus frigidis humidis, & tergentibus iulepis aut apozematis subacta fuerit. Cuius si particeps habitus fuerit ab ea liberabitur vsurpatis balneis tepidis emollientibus & tergen-

tergentibus cum leui sudore, & in ipsis balneis frictionibus ex farina hordei fabarum cicerum rubeorum, amygdalarum amaranthinarum, facculis cannabinis concepta, vnguentis denique eiusdem facultatis, post balneum sudoremque deterfum, vt enulato sine mercurio.

At in idiopathia, solius pudendi habenda ratio est, cuius curatio rursus duplex est, aliàs legitima quæ pruritus causas effectrices primum summo-uet: aliàs extraordinaria, & symptomatis molestioris, id est edacioris pruritus sedatiua: per topica narcotica, quale est semen papaueris cum aceto tritum.

Quale vnguentum nutritum cum succis, & album Rhasis mixto opio: In legitima curatione indicationes plures sunt miscendæ: refrigerationis nempe ob acrimoniam excrementi, & ardorem partis, tum emollitionis & relaxationis pororum cutis: tum denique deterfionis digestionis & attenuationis ob excrementi contumaciam, vt per expeditos & laxatos poros præmolitus & attenuatus humor, promptius exhalet. Ad hoc confert vnguentum, quod ℞. olei rosati & nenuphar. an. ℥ ij. succi apij fumar. & cichor. vel scabios. an. ℥ j bulliant simul ad consumptionem succorum, tum adde aloes aluminis, & salis ammoniac. an. ℥ ij butyri recentis vel axungię porci sine sale ℥ j ceræ nouæ parum, fiat vnguentum.

Tale est istud Galeni.

℞. terebinthinæ ℥ iiij axung. porci ℥ j sulphuris viui & argenti viui extincti cum eadem terebinthina an. ℥ ss misce.

Tale & hoc.

℞. axung. porci insulsæ, & butyri recentis an. q̄rt. β. saponis nigri ℥j. feminis staphidis agriæ, tartari & aluminis vstorum, sulphuris viui an. ℥ij. olei rosac. ℥iij. ceræ parum, fiat vnguentum.

Tale denique est vnguentum enulatum sine mercurio & ægyptiacum aceto dissolutum.

Porro hæc omnia remedia ostiolo externo ceruicis affricentur digito mulieris, vel imponantur cum pessulis ex lana & linteo inuolvente, vel ex linamentis tortis & imbutis.

Eadem quoque pars quotidie lauetur linteolis aqua tepida simplici madentibus vel decoctione agrimonij, scabiosæ, peti, fumariz, cichorij, rosarum & hordei vel furfuris.

De hæmorrhoidibus.

Hæmorrhoids vniuersim significat quamlibet venam ampliorem capaciore multique sanguinis prodigam: sed proprie venarum extrema desinentium in anum & in locos muliebres. Idem nomen transfertur etiam ad significandum earundem partium affectum, vt inflammationem sine fluxu & cum dolore: aliàs ad symptoma, vt sanguinis effluuium & cruciantem dolorem.

Venarum quidem vteri omnium duplex origo est, vna ab hypogastrica, quæ ad interiorem tum vteri tum ceruicis regionem ramulos diffundit: altera à spermatica ducta in totum vteri corpus excurrit.

currit. Illius oscula cotyledones vel acetabula nuncupantur, per quos foetus cum matrice, per symphysim copulatur: vtriusque sane tum hypogastricæ tum spermaticæ à vena caua ortus est, atque adeo per extremos hypogastricæ ramos in cervicem pudendi, & osculum eius dispersos, prægnantium & virginum menses expurgantur; non per sublimiores vterini colli ductus aut cotyledones, cum prægnantibus illis & virginibus conniueat osculum istud, sintque cotyledones ob secundarum adhesionem obturati.

Cæterum hæmorrhoidum vteri & ani quamvis diuersa origo sit, eadem tamen differentia sunt, & symptomata; Illæ quidem principes & communes duæ. Aliæ enim cæcæ dicuntur tum interiores quæ videri non possunt, sed latent siue intra intestinum, vt quæ à splenico ramo derivatæ sunt, siue intra cervicem pudendi vt iam dictum est: tum quæ conniuent foris etiam extuberantes sanguinem tamen non fundentes. Aliæ apertæ, tum quæ foris sunt conspicuæ siue in ano siue in pudendo siue in cervicis extrema ora: tum quæ sanguinem certis circuitibus eructant tametsi obscuræ sint, & intus conditæ.

Symptomata autem sunt, quòd cæcarum crucians dolor sit, ardor flagrans, & distensio diuellens, tandèmq; phlegmone comes accedit. Apertarum contra, tolerabilior dolor est.

Particulares hæmorrhoidum vteri differentię sunt ex situ, quòd aliæ obsideant externum cervicis pudendi osculum, aliæ cervicem eiusdem, aliæ

pudendum ipsum.

Signa diagnostica.

Signa diagnostica sunt fluxus sanguinis crassi & sœculenti cum dolore graui, regionis obsessæ, sedis, inguinum, pubis: tuberculum ceruicis, cruentum, subrubrum, per dioptram deprehensum, quodque hic fluxus ordine careat certaque periodo, qua moueri menses solent, quodque dolorem inferat indeque coitum prohibeat.

Prognostica signa sunt.

Quod viduas, melancholicas, effœetas & puerperas sæpe exerceant, cum scilicet hysterica venæ vel astrictione, ob intemperiem frigidam, vel ob inopiam sanguinis redundantis, vel obstructione cotyledonum conuiuent.

Quod apertæ si moderatæ sint plerisque morbos quos & plethora & cacochymia excitat, tum prohibent tum curant etiam: immoderatæ cachexiam hydropem aliósque à caloris inopia morbos accersant.

Curatio.

Fluxio sanguinis imprimis arcenda in curatione cæcarum est, tum omni genere reuulsionum ad partes superas: siue euidenter sanguinem euacuando vt per phlebotomiani in cubito dextro, siue eundem intro reuocando, vnde affecta pars obscurè saltem alleuetur: vt per frictiones & deligationes quæ dolorem faciant in brachiis, & cucurbitulis applicatis ad vtrumque hypochondrium

drium mammas & dorsum, tum denique interceptione, & refrigeratione venæ causæ per topica frigida siccaque & astringentia lumbis apponenda, Tale est vnguentum populeum, vnguentum rosaceum, ceratum santalinum aceto albo decies lota. Tale cataplasma ex bolo, sanguine draconis, thure, oleo rosato, & albumine oui, ex stupis cannabinis appositum.

Tale ex farina hordeacea, melle & aceto concinnatum: Tale quoque est vnguentum ex oleo myrtino, lentiscino, melinum, cum iisdem pulueribus & cera alba.

Atque dum hac arte fluxionis impetus comprimitur, ne ab eodem perseverante inuitetur, dolori leniendo accurate studendum est omni anodynorum genere, tum eorum quæ vere paregorica sunt, calore temperata, paucâque substantiæ tenuitate, qualis est fœtus ex hydrelæo tepido, per gossipium, lanam, aut spongiam, aut ex decocto 4. remollitiuarum, seminis lini caricarum, florum chamæmeli meliloti ex hydrelæo.

Talia sunt oleum lini amygdalarum dulcium, liliorum, diutius in mortario plumbeo versata cum pistillo plumbeo, vt linimenti crassior formam induant vitello præsertim oui inter verberandum mixto cum exigua quadam refrigerandi facultate. Talia rursus sunt olea violaceum, rosaceum, nenupharinum pariter agitata, quæ tum lenitione, tum refrigeratione, vtramque doloris causam obtundant, tensionem & caliditatem, ex coarctatione, & multitudinis infarctu conceptam. Talia etiam sunt oleum papauerinum

& opium, superioribus illis & lenioribus vtiliter miscenda cruciante immisericorditer dolore, nisi fortasse phlegmone partem iam inuaserit, cuius materia, à tam insigni frigore in condyloma occallescere posset; tunc enim vtilior tutiorque sit per infixum scalpellum hæmorrhoidum inanitio, vel facta sensim sanguinis impacti resolutio digestioque.

Iam vero apertæ hæmorrhoides si moderatè fluant effcētis præsertim, & puerperis sinantur, nisi in iunioribus, in quibus ad naturalem menstruæ excretionis viam commodius reuocentur.

Sin earundem exuperantia vires conuellat, illæ quidem commodissimè inhibeantur præmissis reuulsionum expositarum differentiis omnibus & interceptionum, moxque topicis impositis hiantes venas obliquantibus, constringentibus & agglutinantibus. Tales sunt fots ex decocto foliorum symphyti maioris, lysimachia vtriusque centinodie plantaginis, equiseti, summitatum rubi, sumach, oleastri, balaustiorum, nucum cupressi gallarum viridium in aqua fabrorum & vino tortiuo. Tale est vnguentum ex oleo myrtino lentiscino cytoniorum, bolo armena, sanguine draconis thure alumine albumine oui, & cera alba; Talis denique puluis malicorij gallarum, & aluminis.

Intus quoque proderunt conseruæ refrigerantes rosarum, nenupharis, carnis cytoniorum, sicuti etiam potio laxans astringendo, vel ex puluere rhei cum succo plantaginis, vel eiusdem infusi cum myrobalanorum citrearū cortice valida expressio,

ab

ab hac enim cacochymia biliosâque fluxionis materia derivatur.

De hernia inguinali.

RAmex siue hernia tumor est alias scroti virorum proprius: aliàs inguinis scëminarum & virorum communis. Hic peculiare nomen bubonocèles ab affectu & parte affecta sortitus est: βυβών enim græcis inguen est, nempe locus ad latera pubis vbi femur & coxendix coeunt, κήλη verò tumor omnis in quacunque parte fuerit. Ferè autem fit ab vnica causa intestini scilicet prolapsu. Ille multiplici nomenclatura designatur pro varietate causarum ex quibus inguen extumescit. Inde enim cæderoceles, epiploceles, enderopiploceles, hydroceles, sarcocèles, pneumatocèles, cirsoceles. Vtriusque generis species tres in scëminis notauit Aëtius bubonocelem hydrocelem & cirsocelem, è quibus bubonocèle frequentissima maxime circa dextrum pudendi sinum, ex illapso intestino vel epiploo vel vtroque, idque aut ob ruptionem peritonci aut relaxationem meatus per quem yteri ligamentum ad os coxæ deuoluitur, idque à violenta nimis distensione præ gestatione foetus grandioris vel gemini: vel à difficili arduoque partu & vehementiori inter pariendum ventris compressione: Inde igitur trium organicorum morborum consecutio est. Dilatio in meatu aucto, prolapsio intestini in sede mutata, & tumor in figura violata: & eadem omphalocèles origo esse solet in muliebribus puerperis.

Signa diagnostica & prognostica.

BVbonocèles signum diagnosticum tumor est

in inguine prominens durus & obmurmurans, præsertim cum mulieres crura dilatarunt aut supinæ decubuerunt, tunc enim aeris intestino concepti liberior motus est & intestini in ventrem regressus. Prognosticum signum est quod in vetulis & iuuenibus sæpe concipientibus & parturientibus desperata curatio est.

Curatio.

CVratur autem in aliis repositione intestini resupinata muliere sublatisque eius clunibus & peritonei laxioris constrictione ruptique agglutinatione per emplastrum cōtra rupturam inguini appositum & subligaculo retentum. Quod si hæc pharmaceutica curatio irrita sit chirurgica tentetur Actij autoritate peruulgata.

De hydrocele.

Hydrocele alias pudendi vtrasque alas: alias alteram tantum inuadit, estque tumor mollis debilis indolens, ex compressu, fluctuans & inflationis similis ab aquoso humore ibidem fere per fluxum collecto. Eadem eius & inflationis curatio est, tum per diætam calidam siccamque, purgationem hydragogam, & topica sudorifica: tum per topica discutientia ut sunt fofus, vel infusus ex decocto foliorum pulegij artemisæ rutæ sabinae in diluto lixiuio vel aqua & vino albo, item cataplasmata ex farina liliorum, orobi, lupinorum & ex semine cumini, sileris montani, baccarum lauri, iuniperi. Huius generis sunt balnea naturalia sulphurea, bituminosa, aluminosa, dropaces denique & phœnigmi. Quod si contumacior tumor victis
hiscē

hiscē remediis persistat, ad chirurgicam Aetij operationem deueniendum erit.

De cirfocele.

E Arundem pudendi alarum affectus est cirfocele, id est varicosus tumor, est enim ~~xiphois~~ varix venæ dilatatio ampliatioque supra naturalem suam magnitudinem à valida distensione tunicæ tenuioris mollior, isque quam arteriæ: ideoque hanc diffingi potius quam dilatari contingit. Porro tanta illa distensio à sanguine permulto vel crasso & flatulento oritur qui non cedit venæ: sed venam sibi cedere cogit: talis fere est melancholicus, aliquando etiam pituitosus aut temperatus etiam: sed redundans præsertim in cruribus ob eiusmodi grauitatem sanguinis, aliquando etiam in omni parte venosa pronaque & à fonte caloris longius diffusa vt temporibus, ventre, sub vmbilico palpebris, testiculis, scroto aliisque pudendi muliebris partibus, maxime per suppressionem mensium à morbo aut grauiditate.

Curatio.

C Vrari quidem in artubus & inhiberi varicis incrementum potest fotu astringente & ligatura comprimente. Sed in aliis pudendi curatio chirurgica tantum Aetio suadetur cute per longitudinem venæ incisa, auulsis discretisque à vena membranulis, extremo eiusdem superiori vincto, eadem denique transversim præcisa. vide Aetij præceptum tetrabiblij quarto & sermone quarto.

H *Epilogus.* Atenus causas idiopathicas sterilitatis mulie-

bris enarrauimus, morbosq; vteri prope omnes similes, organicos & cōmunes à quibuscumq; causis conceprix eius facultas lædi aut impediri possit percensendo, curauimus methodo qua potuimus breuissima, artificiosissima maximèque dogmatica. Super sunt sympathicæ eiusdem læsæ conceptionis vterique affectiones ex totius intemperati corporis muliebris viscerumq; singulorum sympathia contractæ. Ex quibus amborum generationis principiorum seminis menstruique nata vitia officere cōcūditati solent: Seminis autem muliebris vitiorum prope omnium paulo ante in virilium morborum therapeia, expedita est pathologia simiotica & therapeutica, quare in vnius menstrui delenda notandaque vitia nobis deinceps incumbendum restat.

IOAN-





IOANNIS HV-
CHERI BELLOVACI
CONSILIARII MEDICIQVE
REGII, ET MONSPELIENSIVM
Medicorum Cancellarij, de Sterilita-
te vtriusque sexus.

LIBER TERTIVS,
DE STERILITATE MULIE-
BRI SYMPATHICA.

*De fluxu mensium, conceptu, partuſque
ſymptomatis.*

PRIORE huiusce argumēti parte que de sterilitate muliebri fuit, omnes ſe re morbi vterini percurati ſunt; ſuiſq; cauſis & ſignis propriis appoſitis deſcripti. Reſtat nunc propriorum eiufdem vteri ſymptomatum therapeutica hiſtoria hac poſteriori parte exponenda. Sunt autē vteri, vt reliquarum corporis partiū, morbi omnes genere triplices; ſimilares, organici, & communes, a quibus tū naturales functiones vteri, quæcunque nutritioni eiufus ſubſerviunt, tum organice tres lēdi ſolent: men-

sium fluxus, cōceptus, partusq; (constat enim vterus substantia spermatica & organica figura) quarum vt reliquarū functionū, triplex noxa notatur; abolitio, diminutio, deprauatio; Mensium autē abolitio, suppressio dicitur. Quæ rarior aut parciore est earundē vacuatio, vocatur diminutio: tertia, deprauatio est: vt redundantia, stillicidium, decoloratio. Cōceptus etiam abolitio est, quando nullus fit: diminutio cū rarior: (vtraq; sterilitas vocatur) tertia noxa deprauatio est, quando mola, monstrū, aliudue inauspicatū & terrificū animalculum cōcipitur. Sic abolitio partus, est cum nullus fit (vt mortuo fœtu) matreq; lāguente: & cum post partū secundinæ cohibentur. diminutio, cū tardior est: deprauatio cum aut immaturus est: vt semestris, quadrimestris, trimēstris, & abortus vocatur: aut difficilior, vt cum longiorib. & maiorib. doloribus, grauiq; matris, matricis & fœtus ipsius offensione: aut deniq; cū præposterus est, nec capite primo: sed alia quauis corporis parte obuia ex vtero fœtus prouoluitur. Istorū vteri organicorū symptomatū therapiā deinceps prosequemur, præterminissis similaribus, nisi siquando ab his illa fluere videātur: vt nō possint scorim vtraq; persanari. Curationis autē exordium à menstrui fluxus læsionib. ducendū est: quod illæ nō solū indiuidui id est fœminæ salutis, sed fœcunditati & prolis procreationi cui vni sarcindæ cōfirmādæque opera nostra modo dicata est, maximè aduersentur & frequentissimè, plurimaque circa conceptum partum symptomata proferāt: Naturalem igitur menstrui vacationē ex suis causis signisq; primum exponam: vt symptomaticæ eiusdem differentias omnes apponam.

Mēstrua purgatio vacuatiove, naturalis est sanguinis fœminarū superflui vtillis crudiq; excretio. Natu-

ralē esse demōstrat, tū spōtaneus fluxus, tū ex eodē muliebris corporis salubritas: Menses, vel menstrua dicta est, à vulgatori circuitu triginta dierū, Tēpora à certis circuituū interuallis, aut fluxus spatiis: aliās Flores, quod non nisi præuia hac vacuatione, conceptus fiat arborū instar fructiferarum: Mala denique septimana à spatio cōsuetō durationis septē dierum quibus mēstruatē mulieres pleræque languere solent lassarique, vel præ vacuationis copia: vel præ vaporibus cōmoti sanguinis quoquouersum in totū corpus viscera & musculos dispersis: vnde lassitudo, cephalalgia, hebetudo, torpor, somnolentia, mētis ignauia, & fastidium &c. Porro humorē hunc, esse sanguinem ipse attestatur sensus: Quod superfluous sit, excretio indicat: quod denique vtilis sit apparet ex eo quod reliquo alimentario fœminarum sanguini congener est.

Huiusce excretionis menstruæ generales causæ quatuor sunt: materia, efficiens, forma, & finis. Materia est sanguis fœminarum superfluous, earumque nutritioni nō necessarius. Excrementū ergo est vtile tertiæ coctionis partium carnearum, vt semen spermaticarum, idque quantitatis tantum in mulieribus sanis & temperatis: similis nempe est reliquo fœminarū sanguini in venis cōdito: gignitur enim ex iisdem causis, ex iisdem alimentis, ab eadem facultate, & calore nativo hepatis, & in iisdem sedibus, vena caua scilicet, & aliis venis acervatur. Inde quoque formatur fœtus aliturque in vtero & extra eundem, lacte nempe, quod sanguini menstruo germanū est: ideóque fluente in grauidis menstruo sanguine debiliior nascitur fœtus aut abortit. Quod si suppresso intus sanguine illo puro, fœminarū valetudinē tētari contingat: hæc quidem valetudinis

iactura ex accidenti est, oppressio scilicet ab eius copia calore natiuo, & visceribus obstructis. Est tamē aliquando excrementū nō quātitatis tantū, sed qualitatis etiā cuiusdā manifestā; estq; alicuius cacochymie particeps: vt in fœminis intēperatis & intēperantib. idque vel ex cōsensu totius corporis propter victus prauitatē, aut visceris alicuius intēperati vt hepatis calidioris, ventriculi frigidi, vel cōtra: eadē ratio lienis est, vel per idiopathiā vteri ipsius intēperati, & cacochymia aliqua inquinati, quæ cū mēstruo alioquin puro elabi potest. Hæc autē qualitas viriosa & manifesta cacochymie respōdet pituitosæ biliosæ melancholicæ, itaq; ipso supresso grauidarū symptomata primis mēsis. molestissima obrepere solent: quibus tamen quæ sanæ sunt, carere vidētur, vt sunt fastidiū, pica, malacia, nausea, vomitio, cardialgia, lipothymia, &c. Pleraque etiā fœtui infesta sunt iā edito: vt scabies, pruritus, tinea, furūculi, & erysipelatosi affectus (quib. sanarū liberi rectē educati fere omnib. carēt) quāquā probabilius est ex ingluvie impuri lactis ea omnia oriri. Itaq; collecta plethora cacochymia in venis instar musti in dolis, effervescebat, purgatur excrementis suis in cutē eiectis: vnde etiā variolarū, exanthematū & ecchymatū origo multo verior est quā ex mēstrui maligni reliquiis: quæ post tot inedias, labores, febres, sudores, purgationes, diarrhœas, phlebotomias, post tot deniq; annos vtriginti, triginta, quadraginta aliquādo necessario exoriātur. Est ergo excrementū sanguis mēstruus modo quātitatis solius: modo vtriusq; & quātitatis & qualitatis, sed manifestæ. Occultā. n. & venenatā perniciē mēstrui nullā agnosco: nisi diutius extrauasati corruptique: tūque humor non est, nedū sanguis mēstruus, falsūque existimo Plinij &

Columellæ de venenatæ menstrui sanguinis labe commenta: nequē enim vsquam compertum mulieris menstruatæ accessu, acescere vinum in doliis, neque herbas, plantas, & segetes eiusdem contactu contabescere: neque ab eodem prægnantibus foeminiis abortum aliisque sterilitatem conciliari. Eboris quidem albedinem, & speculi nitorem menstruatæ foeminæ propinquo aspectu inquinari fate-mur, præ vaporum copia ex ore & oculis erumpentium fluente commotóque eius sanguine: sic eodem corrupto mulieribus ipsis strangulatum vteri, canibus rabiem, hominibus maniam & epilepsiam ingurgitato illo commoueri non negem. Reliqua veneni exēpla ab authoribus citata falsa quoque sunt (nisi fortasse de eo corrupto & quod extra vasa exciderit audiantur) sicuti & illud de foetu elephantico quod concipiatur fluēte menstruo. Neque enim elephantica proles nisi ex elephantico semine & sanguine prodit. Moses quidem in Leuitico cap. 15. ne quis cum menstruatâ muliere coeat, vetuit; sicuti puerperam ab aditu templi prohibet; aliarumque mulierum consortio, ante integram lochiorum purgationem. Primi illius præcepti sententia fuit fortasse quod suspectam seminis prolifici iacturam ex fluxu immodico haberet, Secundi etiam vt monerentur pura mente & corpore gratias Deo ab illis agendas esse. Quamquam verisimile est elephantiam ex huiusmodi virorum cum menstruatâ foeminâ concubitu sapientissimo legislatori suspectam fuisse in gente illa Ægyptiaca & Syriaca apud quam popularis ille morbus est, non solum ob cœli & regionis ardorem sed etiam propter falsamentorum vsum, præsertim apud homines in mon-

ubus degentes redundante Nilo terrasque campe-
stres obruente. Quare à Fernelio proposita men-
strui partitio in tres partes admittenda non est : vt
vna sit purissima, qua formatur alitúrque foetus:al-
tera media, quæ facessit in vbera, lactis causa : tertia
impurior, quæ in venis vtero vicinis seponatur, vnde
partus tempore, copioso fluxu exhaustur. Nā
si partitio hæc vera sit, prægnantes oporteret vlti-
mis mensibus (aucta maligni sanguinis menstrui
copia) deterius habere se quam primis tribus men-
sibus, omninoque accessse esset foecundas insalubrio-
res esse quam iteris. In illis enim mixtione san-
guinis purioris vel nata labes temperabitur.

Mēstruæ excretionis causa efficiēs calor est foemi-
narum remissior humidiorque, à quo sanguinis plu-
rimū cumulari, minimum resolui discuti que potest:
proinde nullis ouiparis animalibus hæc excretio ad-
est, vel lucibus quidem propter siccitatem, pisci-
bus propter frigiditatem : at viuiparis omnibus ad-
est tum brutorum tum hominum foeminis (cū
sit is sanguis menstruus formationi alitionisque fœ-
tuum necessarius) sed in plerisque brutis obscurior
est, vel quia illa sanguinis copia in excrementa cor-
porum vt pilos, ungulas, cornua, iugas, abire ab-
sumique soleat vel potius ob ipsarum sicciorē
temperiem, victum frugalem magis, siccūque &
ærumnosum, alias euidentior vt equis, vaccis, cani-
bus; euidentissima est in humanis foeminis, tum
ob temperiem earum humidiorē, tum ob adiu-
trices etiam causas humiditatis redundantes : vt
sunt edacitas, desidia, habitus magis densus glabér-
que & transpirationis incapax; neque huic foemina-
rum temperamento frigido humidoque refragatur
fan-

sanguinis copia; hic enim crudior est multo quam virilis, neque earum celerior accretio extra uterum; fecunditas & ratio cinatio maturior (hæc enim primigenij humoris humidioris & dilutioris soboles est, indeque vitæ breuioris index. hinc etiam in utero tardior est earum conformatio & motus: illa in quadragesimum diem, hic in quartum mensem incidit, à calore scilicet pusillo & humiditatis vi obruto: Nihilo magis refragatur, quod decem virilibus cadaveribus foeminarum unum interpositum vitionem omnium acceleret: adeps enim incendij suscitandi causa est: neque denique quod mulieres frigoris magis sint patientes quam viri: patientia enim hæc similitudinem potius temperamenti aeris indicat: vel habitus densitatem & crassitatem: siquidem acriori calore animalia ob cutis raritatem & tenuitatem habitus (ut sunt canes) frigus magis exhorrescunt. Hinc itaque foeminarum vox gracilis, capillitium promissum & tenue, habitus magis glaber, densus & lævis, totius corporis robur infirmius, ingenium magis mutabile & iracundum ob humiditatis affluentiam. Mulierum igitur temperies frigidior humidiorque iure statuatur in quolibet animalium genere saltem viviparorum.

Asservatur materia hæc in venis maioribus minoribusque: ex quibus omnibus copia oppressis tempore suo in uteri venas exturbatur: ex quibus etiam per *ἀναστροφήν* copia referatis excluditur (neque enim ab utero attrahitur, cum ab eo non alatur) Excipitur ergo in virginibus atque foetantibus mulieribus in venas arteriasque hypogastricas, & à cruralibus ad collum uteri internum reflexas. unde per medium hymen erumpit foras: mulieribus ve-

rò nō grauidis nuptisque in venas & arterias à spermaticis abductas, & in latera fundumque vteri infinitis desinentes ramulis, quarum oscula intus in capacitatem vteri hiantia cotyledones vel acetabula vocantur: ex quibus fœtus alimentum suum prolicit sensim & modicè: neque tamen ex iisdem effluere sanguis in capacitatem potest, quod adhæsione secundinarum & vasorum fœtum nutrientium obturata sint (nisi fortasse per vehementem abortum.) Hæc autem excretio menstrua solet fere esse certa eodémque recurrere tempore: vel ob naturæ benevalentis consuetudinem, vel ob constantes lunæ cursus. Putauit enim Aristoteles fœminā lunaticum animal esse, purgarique ferè decresciente luna ob frigidiorē aëris temperiem & humorum excrementitiorum maiorē prouentum ex priuatione luminis lunæ. Verius tamen est à simili temperie aëris fœminarum sanguinem multiplicari, indèque vario tempore purgari. Vt in iunioribus prima quadra, in adultis secunda, senioribus tertia quartaque, vnde versiculus est,

Luna vetus veteres, iuuenes noua luna repurgat. Ad formam referuntur tempus, quantitas, qualitas, & excretionis modus. Tempus rursus duplex est, generale & particulare: Illud ætas est, qua hæc purgatio incipit vel desinit. Vtrumque certè inordinatum & incertum ferè est, ob varietatem causarum efficientium & adiuuantium vt naturarum, victus, habitus & aëris: à quibus humorum muliebrium copia corporumque constitutio variari solet. Frequentissimum tamen est maximèque secundum naturam vt in decimumquartum annum incidat prima eruptio, cessante tunc vt plurimum

accres-

accretionem & quia viget magis calor, tuncque vbera extumescere & semine vasa turgere solent; ideoque nobiles & fecundæ esse incipiunt, nisi fortasse albi sint menses. Anticipat tamen hæc excretio aliquando nono, decimo, undecimo, & duodecimo anno, & ferè præter naturam, unde vitæ brevioris index est, neque hymenæus earum tunc celebrandus est: ne superueniente conceptu corporis puellaris incrementum roburque intercipiatur, neque grauiditatis partusque labores impune perferre possint foetu ipso præsertim languido, aut ne sint magis lascivæ matura ætate, ex Aristotele 7. politic. cap. 16. ideoque ante decimum octavum aut vigesimum annum nubere non debent. Cunctatur etiam hæc vacuatio aliquando ad vigesimum annum longioris vitæ prælagio, ob humoris primigenij viscositatem indeque accretionem tardior. Particulare tempus cuique purgationi, id est duratio, spatiūque fluxus statum non est & ordinatum ob earundem causarum varietatem & sanguinis copiam dissimilem. Multis enim ad duos trêsvē dies, paucis ad quintum vsque profluit. Aliis etiam ad vsque septimum: raro ad duodecimum: puerperis & quæ abortum fecerūt lochiorum purgatio longe diuturnior est: ut triginta dierum, si mas, quadraginta dierum, si fœmina edita est. Eiusdem excretionis quantitas in eadem fœmina mutari ætate solet. Augescit enim sensim ad ætatis vigorem: hinc æqualitatem quamdam retinet, deinde in senescentibus paulatim imminuitur, donec omnino desinat. Desinit autem ea excretio frequentissimè circa quinquagesimum ætatis annum, idque c al oris natiui infirmitatem. Rarior est cessatio

crassities in senioribus, mediocritas in adultis, tenuitas in biliosis, crassities in melancholicis, lentor in pituitosis, mediocritas in sanguineis vincit. Color in sana muliere probèque temperata & temperanti, sit floridus & vniufmodi similisque cruori recens iugulatæ hostiæ, id est egregij optimique pecoris immolati. Odor sanguinis boni nullus est, putridi olidus est. Excretio deniq; & menstrui exitus debet esse facilis leuisque, id est sine vlla debilitate mulieris aut dolore partium ad vterum atque nentium vt lumborum hypogastrii femorum atque vteri ipsius & insuper indolens, id est sine vellicatione & exulceratione pudendorum. Hæc enim ex acrimonia mixtæ bilis, aut falsæ pituitæ: ille ex repletione immodica venarum nascitur & eruptionis cunctatione propter earundem venarum obstructionem ex plethora vel ex cacochymia crassa lentaque natam.

Finalis causa excretionis menstruæ triplex est, (neque tamen sanguinem menstruum tanquam alterum generationis principium agnoscimus, vnicum enim est tam formale quam materiale, vtrinque scilicet sexus semen in vtero foecundo confusum.) Primus est conformandi embryonis fibræque spermaticas partium eius omnium vt viscerum & muscutorum spatiaque earundem inania obfarcendi replendique: Alter alendi seminis foetusque, tam intra quam extra vterum, (vocatur autem embryo foetus in vtero conceptus nondum propriis speciei suæ lineamentis exornatus.) Hic enim in procreatione hominis ordo est: vt septem primis à conceptu diebus semen in vtero lacti sit simile, quo tempore vteri facultas conceprix vegetatiua

guinis copia, ut illæ iam mediocriter hiantes semen retinere, & alere possint embryonem. neque enim sanguinis muliebris quantavis sit copia, si non ad uterum affluat, & ex eius venis in capacitatem effluat, conceptui prodesse potest. Itaque coitus tempus conceptui aptissimum idem erit finito fluxui proximum: ut post biduum, aut triduum, quo relictus in venis sanguis purior est, uterus siccior, & seminis avidior: & cotyledones modicè patentes hiantesque, nisi fortasse finito fluxu, celeriter claudantur: ut infauftis quibusdam foeminis utero sicciori; cum quibus congressus nondum finito fluxu, sed guttatim adhuc prolabente, maturandus est. Alterum coitus tempus conceptui quoque idoneum, est fluxus initium primusque dies: quo iam uterus madere leuiter, & exasperari, acetabulis modicè dehiscentibus possit, ut geniturae effluxus præ læuitate uteri, aut extinctionis præ humiditate immodica periculum absit, hic tamen conceptus insalubrior esse consuevit, utpote ex sanguine nondum purgato editus. At verò qui in intermedium tempus incidit coitus, ad conceptum minus est accommodatus, quàm ille qui occurrit sub initium aut finem menstrui fluxus, quippe tunc humidior uterus viris magis ingratus ac tædiosus est, & seminis negligens: quod etiam vligine sua suffocat mórque deorsum exturbat. Quod si ex huiusmodi concubitu conceptus forte aliquis succedat, infœlix fœtus, animoque & corpore inualidus, valetudinarius, morbisque relictæ cacochymiae congruentibus obnoxius censebitur.

Excretio igitur siue fluxus mensium, functio est uteri organica foeminarum saluti fœtuumque ge-

nerationi necessaria; cuius symptomata sunt abolitio & diminutio, quoties nullomodo aut rarius parciusque fit vtraque, suppressio dicitur, vnico causarum affectuúmque magnitudinis discrimine dissidens: tertium symptoma est deprauatio. Porro defectus mensium tres sunt differentiz: Vna enim secundum naturam est, à naturalibus internisque causis oriunda, sine detrimento foetus aut foetantis mulieris: vt natura, ætate, habitu foeminae: cuiusque accidentibus duobus grauiditate & lactatione. Huius signum est *supra* a nondum suppetente menstruo, nedum valetudinem muliebrem infestante. Iunior enim ætas vberiore quidem sanguinem præ valido calore suo natio coaceruare potest: sed totum nutritioni & accretioni corporis sui adhibet. Senior parciolem, præ inualido sensimque fatiscente calore suggerit, quippe natura calidior sanguinem cumulat dissipátque, frigidior non cumulat: Habitus natura macilentus alterutrius est particeps, vel caloris vel frigoris sicci: vnde minimum sanguinis colligit: præpinguis eundem in seipsum conuertit: grauiditas alitione auctioneque foetus eundem intus consumit, lactatio lacte conficiendo absurnit: quo foetus, vt alimento, foris ex mammis hausto fruatur. Liceat tamen fecunditatis causa vtrumque habitum, etiamsi omnis absit valetudinis iniuria, per contrariam dietam commutare: vt tenuem per analepticam, obesum per attenuantem. Eadem ratio naturarum est, calidiores refrigerandæ, frigidiores calefaciendæ ope & subsidio contrariæ dietæ.

Altera differentia defectus mensium est non naturalis, à procatacticis externisque profecta causis:

vt aëre squallido vel alioſo vel æſtuoſo, inedia, cibis frigidis, calidiſve, vacuatione qualibet copioſa: vt hæmorrhagia, eaue vel ſpontanea, vel artificioſa, purgatione, diarrhœa, ſudore, vigiliis, labore improbo, timore, & mœrore: Ab illis enim ſanguinis menſtrui & ſuperflui prouentus prohibetur, ſicuti ab his duobus animi ſymptomatis, fluens aut fluxurus cum calore natiuo ſpirituque intro ad cor repente reuocatur: aut ſi diutius perſeuerent, gigni idem prohibetur calore debilitato, adeo vt præ frigidityte venæ vterinæ etiam in ſeſe concidant, earumque acetabula conſiueant. Huius ſecundæ differentię *uſque* quoque comes eſt, non redundante menſtruo, qui valetudinem afficiat: eius tamen correctio per diætam cauſis iis, quæ ſanguinem minuunt, aduerſantem, ob ſœcunditatis vota inſtitui poteſt, vt caliditati aeris frigiditytas & contra: inediæ ſatietas, & contra: extenuationi ex qualibet vacuatione, reſectio: obſitati extenuatio: labori otium, & contra timori confidentia; mœrori hilaritas opponatur. ſic frigidiæ aquæ crudæque portioni calidior alia tenuiorque ex vino albo modice diluta, vt ait Aetius, ſic cibis calidis frigidi, craſſis attenuantes, ſiccis humidi & contra ſubſtituantur.

Tertia differentia contra naturam omnino eſt: propriæque ſuppreſſio menſium vocatur: quæ vt à morbis vteri tam idiopathicis quàm ſympathicis inducitur: ſic eadem viciffim grauiffimas ægritudines inducit, tum corpori vniuerſo, tum principibus eius partibus: aut ſeruientibus: quarum meminit libro de morbis mulierum Hippoc. Hinc enim phrenitis, angina, peripneumonia, phthiſis, pleuritis, hepatitis, nephritis, hydrops, cachexia, icterus, vteri-

que tumorum genus omne vlcerúmque, febres cōtinuæ, aut ardentes, aut lentæ. Hinc quoque earundem partium & totius corporis, non vteri tantum, numerosissima pullulant excrementa: è quibus frequentissima & euidentissima quædam tanquam huius suppressionis diagnostica signa Gal. 6. de locis affectis recenset, præclare enim Hippoc. aphor. 57. lib. 5. Menstruis abundantibus morbi eueniunt (refrigerato scilicet calore natiuo,) coctiones omnes intercidūt & debilitantur:) vnde hydrops, cachexia icterus & alij,) iisdem subsidentibus accidunt ab vtero morbi. Nec solùm in vtero vt tumores, abscessus, vlcera, ex menstruo ibi retento: sed in toto etiam corpore & visceribus ex sanguinis sursum facta palindrome: sed id ipsum non ante tres aut quatuor aut quinque aut sex menses contingere solet; quibus *σπυγμία* circa vterum collecta aut putrescit & corrumpitur, aut ad partes refluit vicinas vel distantes.

Signa.

Primum igitur signum suppressionis est lac in mammis non grauidarum mulierum, cuius ex menstruo tota est materia à glandulosis mammis assimilato: neque tamen ex vtero ad vbera sanguis hic transfertur: cum vasorum ab vtero ascendentium aliorúmque à mammis descendentium nulla sit inter se comunicatio, societas & contiguitas: sed à vena cava propriisque eius ductibus affertur. Ideoque virginibus adultis ex suppressione menstrui lac esse potest: sicuti & viris quibusdam puerisque ob vbertatem alimenti. quanquam horum lac sæpius serosum excrementum est, rudiùs assimilatum.

Secun-

Secundum signum est grauitas totius corporis & lassitudo tensiua, ex plethora ad vasa & vires.

Tertium, fastidium ciborum ex sanguinis copia suctum venarum stomachi aliarumque partiū prohibentis, ab hoc tamen pica & malacia abesse solent mulierum prægnantium: in quibus impurior menstruus in mammis & stomachum seponitur qui in venis reliqui sanguinis mixtione temperatur.

Quartum, horror inæqualis, id est perfrigeratio leuis cum horrore, qui motus est musculorum deprauatus à vaporis aeris frigidive in partes nerueas & sentientes impetu concitatus, qui è sanguine menstruo sine febre tollitur. Sic rigor mulieribus à vitæ pituitæ motu sine febre frequens est. Quintò tanquam totidem signa concurrunt, lumborum, colli, sincipitis, & radicis oculorum dolores: lumborum quidem ex venæ cauæ arteriæque maioris repletionem, distensione, & ardore ab accumulato sanguine: colli ex consensu spinalis medullæ ob accubitum & sympathiam vteri sanguine referti: sincipitis ob repletionem alui quem iugulares intro iuxta peluim in cerebrum ascendentes & ad ventriculos desinentes conficiunt, vel ob vaporum expirationem ab vtero, siue ob rectitudinem: cum inter vesicam & intestinum rectum situs sit vterus, vel ob naturæ consuetudinem per sanitatem vapores sursum mandatis quorum illic facilis digestio est: tum ob multarum suturarum laxitatem ossiumque tenuitatem: tum ob vasorum per easdem suturas foras cum membranulis egredientium commoditatem: atque ob eiusmodi sincipitis constitutionem suspectus in eo est quibusdam causticorum vsus: ne

vltio ad intimas meninges subrepat : quæ tamen facile vitabitur, si caustica diutius non hæreant, aut si ad futurarum latera admoueantur. Sexto suppressionem comitantur febres ardentes : vel primariæ, ex sanguinis in venis maioribus putredine : vel symptomaticæ, ex phlegmone vteri vel alterius visceris à refluyente menstruo inflammati.

Septimum signum est vteri peruersio & obliquitas cum clausione & duritie oris interioris: quæ à tumore alterius lateris vteri oritur. eadem clausio duritie caret in prægnantibus, nam vt habet aphorif. 54. lib. 5. Quibus os vteri durum est iis coarctetur est necesse, vnde fit vt non concipiant. Huc quoque spectat coxendicis dolor & claudicatio alterius femoris ob ligamenti vterini inflammati propinquitatem. Hinc etiam phlegmonem vteri sæpe excipit φύλαλλον, id est phlegmone erysipelatoſa inguinis alterius, panus dicta, ex sanguine vel sensim & per diapedesim è venis vteri exudante: vel affatim per anastomosim erumpente.

Octauum signum est, quod vrinæ nigricantes redduntur à copioso sero menstrui melancholici & crassioris: aut à sanguine etiam ipso melancholico. Idcirco tales vrinæ sæpe criticæ sunt in quartanis febribus, in lienis tumore, & hæmorrhoidibus suppressis: sæpe etiam nephritidis prænuntiæ. In febre acuta semper lethales sunt vtpote calore natiuo extincto: aut ardente & sanguinem adurente.

Vltimum signum est tum stranguria, tum ischuria ex vteri sympathia. Illa quidem provenit vel ex sero acri mordacique sanguinis in vtero calfacti; à quo vesicæ tunicæ sensim imbuuntur, & qui vrinæ permiscetur: vel ex solo vrinarum ardore, ob accubitum

cubitus vteri inflammatus à quo præ adstrictione vesicæ & tumoris mole immodica, ischuria quoque nascitur. Præter hæc signa communia Galenica, multi superueniunt suppressioni menstrui morbi, tam in vtero: quam in toto corpore, eiusque visceribus singulis: vt ante dictum est.

Suppressio mensium symptomatica, curatione eget per contraria remedia tum sanitatis tum fecunditatis causa. reliquæ duæ suppressionis mensium differentiæ, mutatione tantum egent, solius fecunditatis gratiâ per causarum menses remorantium ablationem, diætæque pristinæ in contrariam mutationem. Symptomaticæ huius suppressionis auctores sunt morbi tum idiopathici vteroque proprii, tum sympathici totique corpori muliebri vel visceribus quibusdam & vtero communes. Est autem idiopathiæ & sympathiæ discrimen curationi valde necessarium: ne si mensis ad vterum ruat affectu persistente, qui effluxum eius remoretur: tum acerbissimi dolores diuulsis vasorum vteri tunicis & parturientium similes commoueantur: sicuti corpore impuro neque à suis excrementis vacuo vterus frustra purgetur & foueatur. Discrimen vero hoc ex constitutione totius corporis eliciatur: quæ si naturæ respondeat sitque diætâ opipara & multi sanguinis ferax: idiopathiam subesse certum est, quæ effluuium cohibeat: Aliàs ex mutatione constitutionis in nonnaturalem, sympathiam adesse suspicandum est. Primum igitur idiopathiæ sedem: deinde speciem prudens medicus percontetur. Pudendum enim foris phimosi clauditur, pudendi verò ceruix, tumore, tuberculo carnosio & interueniente membrana intercipitur, ostium inter-

num callo, vlcere, tumore, & obliquitate, sicuti totum corpus vteri tumore vlcere cicatrice & intemperie nuda vel humoralis laborat. Idiopathiæ verò species sic deprehendetur phimosis quidem & obstruens cervicem pudendi affectus, tactu visuque per *διοντοπαι*, obliquitas oris interni sicuti constrictionis & durities, tactu obstetricis: tumores vteri tactu quoque & propriis doloribus agnoscuntur, sicuti & tumor abdominis à pinguedine: obstruatio à gravitate ini ventris, & vteri, & obstruentis humoris species à prægresso victu. Intemperies denique nuda ex leuitate partium vicinarum: humoralis contra ex gravitate modica percipitur. Porro quæ calida est nudaque, ex caliditate totius corporis, pulsu frequenti, oris ariditate, fissura labiorum, libidine proclui pubéque densa, frigida ex contrariis causis signisque præcipuè ex fastidio veneris tardaque per coitum seminis excretionem deprehenditur. Humoralis species, perinde vt obstruatio, internoscenda.

Iam verò si nulla sit idiopathia, sympathiam necesse est subesse & per intemperiem vel toti corpori communem, vel visceri alicui propriam: communis ex natura ætate & antecedenti diætâ observatur, necnon ex effluuij substantia, colore ac sensu. Flauescens enim mordax & tenue biliosam intemperiem insinuat. Contra albicans crassumque & viscosum vel serosum liquidumque pituitosam. Viscerum peculiare intemperies & affectus sanguinem vitiantes vnde suppressio, ex propriis pathognomonicis signis deprehenditur.

Pregnostica.

V Acuatio mensium moderata sanitatem tuetur
fœ-

fœminarum, castitatem & fœcunditatem: immoderata vtramque demolitur. Suppressa vacuatio muliebri habitū in virilē barbatumq; sæpe cōmutat. Suppressio mensium post sex mēses incurabilis est, quæ ex obliquitate vteri est: at ex aliis orta vitiis vteri, vt intemperiebus, obstructionibus, aut ex sympathia totius corporis curabilis fuit post quatuor annos apud Hippo. 6. epid. ad finem & post septem etiam annos lib. 4. Idiopathici morbi prima huiusce operis de muliebribus parte, omnes fere percurati sunt: vt tumores, tubercula, vlcera, cicatrices, obliquitates. Intēperies vteri solæ supersunt curanda, tū nudæ, tū humorales: & vtræque tū insitæ tum aduentitiæ: Illæ autem menstruo fluxui conceptuique pariter officiunt: siue vteri facultatem conceptricem lædendo: siue eandem impediendo: menstruumque aut consumendo sanguinem: aut ne effluat, cohibendo: frigida enim calorem seminis spirituumque generatorem extinguit, aut certe non fouet & excitat: semenque ipsum languidius attrahit: quod etiam attractum acetabulis non copulatur conuiuentibus ob vteri ex frigore spissitudinem venarumque angustiam: vnde menstrui sanguinis effluxus prohibetur: iustumque & idoneum semini alimentum subducitur, crassescente supra modum & lentescente (quisquis affluit) sanguine. Intemperies calida spiritum caloremque resoluit, & serosam seminis substantiam fluxus adiutricem consumit. Intemperies humida menstruum quidem transmittit, sed seminis calorem vligine sua extinguit: neque id ipsum præleuitate & lubricitate retinet: Sicca intemperies seminalem materiam veluti absorbet: ipsumque alimenti penuria & san-

guinis resiccatum reiiicit.

Curatio intemperierum uteri.

INtemperierū curationis primum instrumētum est diætā singulis contraria tantum si nudæ sint; aliàs etiam humoribus comitantibus, vt calidarum, frigida humida &c. ex cibo potuque vberiori & humidiori, qualia sunt iuscula recentium carniū vt agnorum, hædorum, porcellorum, pullorum, elixatarum cum foliis frigidis herbarum lactuæ endiuizæ, acetosæ, portul. cucurb. cucum. tales sunt fructus recentes, poma, pyraque, vinum album, tenue, non vetus multa aqua dilutum.

Alterum instrumentum curationis est pharmacīa medicamentis constans intemperiei contrariis siue assumendis, siue admouendis, siue immitendis. Admouentur balnea, insecus fofusque, litus & vnguenta: immittuntur suffitus, pessaria, clysteres: assumuntur iuscula; seruata remediorum vbiq̃ue contrarietatis lege. Ergo in calida intemperie, admouenda comparantur ex decoctis herbarum florumque refrigeratium vt lactuæ solani plantag. viol. cucumerariæ cucurbitariæ melonum, florum trium communium, & nenupharis: adhibentur autem mane & vesperi (vt alterantia omnia præcordiorum regioni) absoluta coctione prima, inanique ventriculo, ne chylus crudior descendat, & tepida ne euocato sudore humor contumaciter affixus hæreat parti, sitque longior in illis mora. Litus siue embrochatio fiet ex oleis frigidis violarum rosarum nenupharis addito aceri albi momento penetrationis causa. Ex iisdem oleis vnguenta concinnabuntur admixtis pulueribus

ribus refrigerantium vt fantali albi & rubri seminum lact. acetosæ portul. rosarum & florum nenupharis.

Suffitus parabitur ex decocti eiusdem feruentis vapore per siphunculum ligneum vt buxum, vel arundineum, aut ferreum etiam, paniculis obuolutum in pudendi ceruicem vsque ad os eius internum transmissio.

Pessaria ex gossipio, lana, vel linteolo concepth constent, digitali crassitie, longitudine sex digitorum, tereti forma, & inuoluta linteolis, quorum materia frigidarum herbarum succis imbuta sit vt lact. plantag. solani, vel vnguentis frigidis admixtis. Virginibus noduli aptiores sunt glandis magnitudine. Porro isti curationi nudæ intemperiei vteri præmittenda est purgatio vniuersalis, tametsi nulla corporis cacochymi sympathia metuatur: nequid sordium vi topicorum è vicinis visceribus ad vterum deducatur. Eadem est reliquarum intemperiei nudæ specierum methodus curatiua: eadem remedia, per contrariam dietam, & pharmaciam, idem remediorum vsus: vt mox palam fiet in humoralium curatione: nullius enim partis nedum vteri intemperies longo tempore persistunt nudæ, & citra humoris vitiosi prouentum, ex tertie coctionis reliquiis sensim collecti: vt in vteri cotyledonibus vasisque eiusdem spermaticis: à quo præterfluens sanguis impeditur, suppressique magis vel minus solet, pro obstructionis maioris minorisue conditione. Humoralis autem huius intemperiei curatio eadem est, excrementitij verò humoris biliosi, atrabiliarij, pituitosi, serosi,

faniosi, purulenti, crassi, viscosi, tenuis, flauis, viridis, albidis, rubei, nigri, verminosi, putris, foetidique, argumentum est ichor ab utero sensim diffluens: quænam autem ipsius, ac proinde & intemperiei humoralis sit species, ex substantia, colore, odore, pudendi dolore, vel indolentia statuendum erit. Præmittenda quoque erit intemperiei humoralis curationi purgatio vniuersalis, quæ cacochymix respondeat: ne qua eius portio è vicinis partibus calore tractuque topicorum ad vterum deducatur.

Exemplum cholagoga purgationis.

℞ pulu. hieræ ʒ ij pilul. aurearum & de agar. ana ʒ j diagrydij g. vj. cum succo mercur. fiat massa mollior: capiat ʒ iij in pilulis vij vel viij. horis duabus post mediam noctem.

℞. rhab. in aqua end. per noctem infusi ʒ j β spicz nardi ʒ j in expressione dissol. elect. diapruni solutui ʒ β syrupi de cichor. compositi ʒ j fiat potio, detur sub auroram.

Exemplum phlegmagoga purgationis.

℞. pul. hieræ & bened. laxatiue ana ʒ j gummi ammoniaci ʒ β trochiscor. alandal. g. vj. cum aqua artem. fiat massa, capiat ʒ j in sex vel septem pilulis post primum somnum.

℞. fol. fennæ mund. ʒ β agar. trochisc. ʒ j zinzib. ʒ β infunde in ʒ iij aquæ artemisæ per totam noctem. In colatura dissolue electuar. indi maioris vel diaphœn. vel de citro ʒ β fiat potio, quæ detur sub auroram.

Purgatio melanagoga ex pilul. de fumaris & de la-

de lapide cyanæo ana ad ʒ ß formentur pilul. vii. cum aqua hyssopi deauratæ. sic denique ex electar. diacarth. & confect. hamech ana ad ʒ ß fiat bolus. Purgationi isti vniuersali particularis vteri vacuatio mox subiungenda est per medicamenta alterantia tergentia & incidentia, magis quidem in pituitosa & melancholica, minus in biliosa cacochymia, eaque sumenda, admouenda, & immittenda, quacunque forma solida, media, liquidaque: sed omnium præstantissima forma liquida est: vt pote quæ magis penetret ad partem intimam & distantem. Sic ergo pituitosa curetur.

℞. rad. enulæ camp. iridis hort. brionæ, cucum. agrestis aristoloch. rotundæ gentian. ana ℥ ß fol. puleg. scordij thanaceti matricariæ absinthij, conizæ fabin. artemis. nepitæ ana m ij. flor. centaurij minor. chamæm. & anethi ana p. ij. decoquantur in aqua sufficienti addendo vini albi partem decimam pro balneo, quod ingrediatur mane & vespri longè à pastu: & moretur in eo quam diutissimè poterit, sine sudore, per tridui, aut quattridui spatium. Efficacior est facultas balneorum naturalium nitroforum bituminosorum chalcanthorum, &c. modo absit sudor; balnei tædium infusus fortisque suppleat; litus & embrochatio consistet infusis oleis odoratis & instillatis in regionem vteri vt laurino, costino, irino, spicato, anethino & muscatellino. Ex iisdem oleis addito ceræ triente & pulueris prædictorum aromatum quadrante fiant vnguenta; quorum vicem gerat emplastrum pro matrice: sic enim eorum facultates facilius penetraturæ sunt ad vterum. Ex immittendis sunt suffitus & pessaria, illi quidem fiunt

ex vapore eiusdem decocti quod ad balneum comparatur, vel aromatū in trochiscos redactorum: vel benioini, styracis calamitę, spicę, schœnanthos, calami aromat. idque cum terebinthina, vel vino generoso. Vapor autem iste in vterum transmittendus est per siphunculos prædictos: pessaria verò absinthij, aut artemisij, aut rutę, aut iridis, aut mercurialis succo saturata & linteolis inuoluta vicissim intromittenda sunt extra balneum: quod suffritus perpetui non sint, morenturque diutius in ceruice pudendi pessaria, à quibus vteri vicini sordes amoveantur, attenuando tergendo & veluti liquando: hæc tamen purgante etiam aliquo electario imbuta: vt hiera, benedicta, diaphanicone, efficacissimè excrementa vteri protrahunt. Ex assumendis exemplo sit hæc potio in exitu balnei sumenda.

℞. rad. enulę camp. valerianę, iridis hortensis, & rubię maioris ana ℥ ij. fol. marrubij albi, nepitę, artemis. matricarię, melissę, hyssopi sabinę ana m. j. cicerum rubeorum, florum anthos & borraginis ana p. j. coquantur in æqualibus partibus aquę & vini albi, In colat. ℥ ij. dissol. mellis albissimi quartar. j. cinnam. ʒ ij. fiat apozema clarificat. pro vj. dosibus. Similes potiones fiunt ex trochiscorum de myrrha ʒ j. cum vino albo vel aqua artemis. ex pulu. prasilij albi aut rad. dictamni albi aut cinnam. ʒ j. cum vini albi vel hippoc. ʒ iiij. mane sumenda, ex theriacę veteris ʒ j. vel ij. cum eodem vino. Nostro more sæpius ex ʒ j. vel ij. syrupi de hyssopo de artemis. aut de quinque radic. cum aqua meliss. aut artemis. aut scœniculi propinantur in egressu ex balneo. Huius quoque pulueris in
ciendis

ciendis mensibus & expediendis viis vteri vsus efficacissimus est.

℥.rad.arist.rotund.gentian. irid. & enulæ camp. ana ʒ ij. baccarum iuniperi, seminis nigellæ romanę scœnanthos myrrhæ electæ & castorei ana ʒ j. cinnam. & zinz. ana ʒ β gummi ammoniaci cum vino albo dissoluti quantum suff. fiat massa de cuius ʒ j. fingantur pill. iiij. vel v. dentur ad auroram superbibendo decocti cicerum rubr. folior. prassii & artemis. & hyssopi ʒ ij. vel iiij. hic pulvis incorporari potest cum conserua flor. anthos vel borrag. tegendi amaroris causa vt fiat opiata ad ʒ ij. vel iiij. deuoranda. Absoluta vacuatione particulari tum primum reuulsionibus, tutus locus futurus est (neque enim ad impeditas & obstructas adhuc venas vteri sanguis è vicinis partibus inuitandus est) per duras frictiones tibiæ, femorum, lumborum, arctas deligationes pedum femorumque, cucurbitulas inguinibus affigendas, & per sectionem saphenæ in poplite vel malleolo parçè, & sæpe repetendam, aduentante consuetæ emptionis mensium tempore; vt virginibus in noua luna, adultis in plena, senibus in deficiente mœxque defectura: atque hoc esto exemplum curationis reliquarum vteri intemperierum humoralium: obseruata semper contrarietatis remedium lege. Quod si morbi quidam idiopathici menstruum sanguinem suppressantes incurabiles sint: tum copia illius circuncidenda est, per diætæ tenuitatem, labores vehementiores, crebrasque purgationes & phlebotomias in flexu cubitorum. Ita enim valetudinis incommoda multorumque morborum pericula menstruo liberata scœmina.

effugiet: quos conuerso deorsum sanguinis motu incurret si vterus laxari & aperiri nequeat, vt ait Actius.

*De curatione morborum sympathicorum &
imprimis intemperierum.*

IAm vero si absit idiopathia, sympathiæ species accuratè obseruanda est, nam vt à communi totius corporis, sic à priuata viscerum intemperie sanguis vitari solet: vt aut desit superfluus: aut fluxui sit ineptus: Hoc dico præsertim de visceribus illis quæ hepatis αἱματώσει iuuant, quatenus vel sanguinis materiam præparant quod facit ventriculus, vel eandem suis excrementis liberant, quod faciunt cystis fellea, splen, renes, & vesica, quorum omnium errore excrementa propria sanguini remissentur. Cæterum viscerum singulorum affectus eorūque signa diagnostica à quibus menstrua excretio interturbari potest, totaque therapia, grandiori nostro opere de singularibus partium omnium morbis fufius docebitur. Nunc autem intemperies tum communes: tum habitus vitia excretionem menstruanā supprimētia perscrutamur. Fœmina igitur biliosa calida siccaque siue natura & ætate siue ex labore & eduliis acrioribus nullos aut paucos menses effundit: estque habitu virili hirsuto beneque compacto, artubus neruosis & robustis, pectore humerisque latioribus, mammis paruis & solidis lumbis & strictionibus clunibus, colore fusco. Curatur hæc intemperies aliarum humoraliū instar duplici indicatione, alterandæ scilicet intemperiei contrariæ: & vacuandæ cacochymix biliosæ

biliosæ sanguini permixtæ. Vacuatio rursus duplex est: sectio venæ sed modica, quæ temperet sanguinem & viscera educto vapore acri: tum purgatio quæ cacochymiam excernat prius coctam probeque subactam à medicamentis alterantibus: quibus præparatio primæ corporis regionis præmittenda est, intestinorum quidem per clysterem emollientem & refrigerantem: ventriculi & mesenterij per minoratium leneque medicamentum. deinde coctio cacochymix adiuuanda per triduum, iulepis vel apozematis frigidis & modice aperientibus: postremo concocta bilis valentiori purgatione cholagoga excernenda est. Sic igitur fouentis causæ intemperiem ablatio curatioque præcedit, tum demum succedit intemperici calidæ post vacationem relictæ curatio per alterantia frigida humidaque sumenda & adiuuenda. Hæc methodus curatiua est, cuius materiam & vsum leges prima huius operis parte. Intemperies pituitosa ob crassitiem lentoremque sanguinis, excretionem mensium intercipit, tum obstructis vterinis venis, tum cotyledonibus obducto mucō obturatis: qui ex nutritione vteri membranei frigidique redundat: Hæc vero intemperies pituitosa vel insita vel aduentitia est: vt à vi&u frigido humidoque, somnolentia, voracitate, otio, crebrisque balneis & copiosa aquæ frigidæ potione fructuumque & acetariorum ingurgitatione. Signa sunt habitus crassius, color albus siue plumbeus, venæ parvæ, pulsus exilis & rarus, pituitæ aquosæ assidua expuitio, & aliquando vomitio crassæ & mucilaginosæ: somnolentia, ignauia mentis, sensuum stupor,

omniumque motuum torpor & inertia. Hæc intemperies eadem methodo summouenda est: duplici sc. indicatione alterationis & vacuationis: tribusque instrumentis dicta pharmacia & chirurgia. Diæta igitur calida & sicca attenuans tergensque ei opponatur ex aere calido naturâ vel arte; eduliis acrioribus, vini veteris vel marina aqua diluti potione, laboribus multis tum corporis quales in foeminis sunt gestationes vehementiores, tum animi ut sunt curæ rei familiaris: Pharmacia alterans vacuansque comparetur, illa quidem calida siccaque tergens & attenuans ob intemperiem sanguinemque frigidum lentum & crassum, quem suo calore dissoluat. Hæc phlegmagoga sit cacochymiam pituitosam quæ concoqui & assimilari non potest euacuans tam per deiectiones quam vomitum.

Alterantis pharmaciæ materiam suggerent medicamenta acria, sumenda sub forma apozematum iuleporum puluerum & tabellarum, quorum omnium usus in plures dies ob humoris contumaciam ut sex vel septem producat: his autem præmittenda est purgatio vocata minoratiua, ne alterantium tenuitate primæ regionis cacochymia viscerum venarumque obstructiones ingeminatura in secundam tertiamque inuehatur, & facilius in habitum penetret: sed insuper huic purgatiunculæ, clyster molliens, & intestina abluens præmittendus erit. Phlebotomia quoque minoratiuæ potioni subiungenda est. idque in brachio dextro: quia cacochymia coniuncta est plethora. Modus eius agræ foeminæ viribus respondebit.

Vbi

Vbi autem causa antecedens, sanguisque venarum maiorum minorumque alterantibus remediis probè subactus videbitur: tum validiori purgatione phlegmagoga educetur, causaque deinceps coniuncta, id est caeochymia pituitosa vteri venulis & cotyledonibus impacta dissoluetur, abstergetur, digeretur, & extrahetur, idque per admouenda, qualia sunt balnea, eaque vel naturalia vt sunt nitrosa sulfurea, &c. vel artificiosa ex remediorum acrium, amarorum, detergentium decocto. talia etiam sunt linimenta, vnguenta: tum per immittenda vt suffitus clysteres vterinos & pessaria à quibus vterus ad expulsionem irriteretur & vacuatio pituitæ prouocetur, vt sunt acria amaraque: aut etiam vere purgantia: tum denique per assumenda vt theriacam. Tandem post oductam continentem causam abstersumque vteri venularum & cotyledonum omnem infarctum, reliquum est vt natura consuetudini pristinae assuescat motusque sanguinis ad vterum prouocetur per tibiæ femorum lumborum duriores frictiones & deligationes, cucurbitulas & phlebotomias in talo vel malleolo frequentes. De vtriusque intemperiei curatione & curationis materia vsuque consule primam huius operis partem.

De menstrui suppressione ob habitus crassioris vitium.

VT intemperies naturalis calidior frigidiorque totius corporis de qua antea: sic habitus crassus & gracilis menstruam purgationem prohibet. Est autem habitus crassus duplex. Vnus plethoricus, alter præpinguis: ille crassus est solidusque, non valde adiposus, colore faciei ex albo rubescente,

venis & arteriis mediocribus, calore miti, moribus tranquillis, & hilaribus, vrinis copiosis, & sudoribus profusioribus. Causa effectrix huius habitus est insita aut aduentitia: illa calida humidaque est temperies hepatis cordisque, id est totius corporis, etasque adolescens aut iuuenilis. externæ causæ sunt prope similes omnes: id est, temperatæ aut calidæ humidæque: vt aer vernus, ciborum euchymorum, præsertim vinorum vbertas: exercitationis, somni, & vigiliarum mediocritas: vitæque hilaritas: ab vtrisque causis internis externisque, sanguinis multitudo vasorumque plenitudo oritur, plethora dicta, eaque vel pura vt virorum, vel paulo impurior magisque pituitosa scæminarum. Hæc vero præsertim quæ ad vasa dicitur, venas diducit disrumpitque aliquando, vnde hæmorrhagiæ & phlegmones viscerum, easdemque obstruit & calorem suffocat, vnde putredo febresque ardentes, vt synochus putris, & vacuationem menstruam supprimit. Dignoscitur plethora communibus signis tum vtriusque sexus communibus, vt lassitudine tensua, & gravitate totius corporis, venarum & arteriarum immodica mole, & duritie, habitu crasso solidoque, tum scæminarum propriis vt intermissione excretionis menstruæ, (eiusque tempore præterito) dolore lumborum, hypogastrij, femorum, colli, sincipitis, & radicis oculorum: flatuosis vaporibus: vnde distensiones crebrique horrores, fastidium, vrinæ rubræ, & aliquando nigrantes: tumor mammarum. Duæ hinc indicationes occurrunt, vna est alteratio naturæ, altera vacuatio plethoræ. Alteratio autem fiat naturæ etiam salubris in frigidam siccâque idque per diætam tenuem laboriosam, per quam car-

nium

nium, vini saltē vinosi, ciborum euehymorū, & iusculorum vsus remoueatur: somni spatium consuetū contrahatur, laborque augeatur. Vacuatio phlebotomia constat: primum quidem in cubito dextro: vt promptē plethoram inaniat: idque ad duas vel tres libras affatim, vel potius partitē: ne lipothymia habitum venasque perfrigerando constringat: idque non semel tantum aut bis in anno vt vere & autumnō (quanquam his temporibus magis copiosē:) sed per singulos menses ex pede scilicet appropinquante consuetō mensium tempore. quod si forte scēminam lateat; lunæ quadra eligatur eius ætati & naturæ magis consentanea. Huic phlebotomiæ clyster mollis & detergens, sicut & leuior purgatio primæ regionis præmittenda ex cassiæ medulla: vel syrupo rosar. laxatiuo: vel catholicone post causæ antecedentis & vniuersalis plethoræ vacuationem: particularis quoque venarum vteri plenitudo vacuanda & dissoluenda est, primum quidem sectione venarum malleoli in vtroque pede: quæ sanguinem circa vterum hærentem deorsum deducat: viasque reliquo venarum maiorum sanguini aperiat: idque instante menstruæ fluxionis consuetæ tempore, tum per balnea laxantia vias, & impactum venis sanguinem fundentia; & veluti liquantia; vt sit magis liquidus, & ad fluxum pronus. Eadem facultate olea, linimenta, vnguenta, ventri imo sunt inducenda mox ab exitu ex balneo: eademque hora iuscula aperientia propinanda ex decocto summitatum scēniculi, petroselini, ceresolij, hyssopi cum cinnamoni ʒj & croci ʒj.

similes sunt iulepi ex syrupis de quinque radicibus oxymelite simplici, oxyfaccharo, & bizantino, cum aquis graminis acetosæ, cichorij, artemisæ. Balnei prædicti materia constat radicum althææ & liliorum ana lb. duabus, ex foliorum herbar. quatuor remollit. artem. nepithæ agrimon. ana m. iiij. ex seminis lini vel fœnugræci lib. j. ex flor. chamæmel. melilot. anethi & sambuci ana p. ij.

Alter habitus præpinguis crassus quoque, est carnosus & mollior, arteriis venisque minoribus, colore albescente, moribus ignavis, corpore inertis, animo hebeti, (crassos isto Cæsar non metuebat) Huius causa efficiens aut interna insitaque est; ut natura frigidior humidiorque, ætas integra. Externæ sunt, diæta indulgentior, desidiosa, somnolenta, curarum & negotiorum secunda, multis cibis præsertim humidioribus & liquidioribus constans. Est autem pinguedinis materia nihil aliud, quam aerea magisque oleosa sanguinis portio, ex venarum tunicis exudans excidensque in membranam, eamque præsertim quæ cuti subtensa est, cuius frigiditate congelatur, ideoque reliquorum humorum frigore congelatorum ritu liquatur & diffluit. Neque circa particulas calidiores ut iecur venas arterias cordisque mucronem coire solet. affunditur autem membranæ naturæ consilio ut eas humectet quod inediis & vehementibus caloribus motibusque celeriter exsiccentur. effectrix itaque causa calor est remissior, hinc pituitosæ & sanguineæ naturæ facile pinguescunt pinguedine naturali: non biliosæ neque melancholicæ.

acqui-

acquisititia autem facile in calidis humidisq; naturis colligitur sed maxime in subfrigidis. Hinc apud Hippocratem libro de aere aq. & locis Scythicę mulieres ob perpetuam in rhedis suis desidiam lactisque ingluuiem pinguiore & steriles erant: quarum famulę ob sedulitatem graciles & fœcundę virorumque appetentiores erant. Sic quoque venter ob viatici presentiam otiumque maxime pinguescit supra reliquas partes labore perpetuo exercitas.

Habitus obesus sterilitatem vtrique sexui inducit, ob seminis inopiam: mulieribus verò menstrui defectum ob frigidiorē humidiorēque temperiem, venarumque angustiam: vnde raras concipiunt, eosque admodum imbecilles fœtus: quinetiam obesitas breuitatem vitę vtrique sexui conciliat Hippo.aph. 44. lib. 2. cum sit natura obesorum frigidior, paucusque valde tum sanguis tum spiritus eiusdē, vnde imbecillis facultas est vitalis: venę etiam arterięque angustę: atque hinc facile obstruuntur & putredine ac febribus occupantur: (habitu præsertim ob frigiditatem densiori minusque perspirabili) Hoc autem de obesitate naturali statuendum est non de aduentitia. Nam si quis natura mediocris, victu subinde pleniori, otio, somnoque, obesior euadit: is non continuo quam gracilis citius moritur, quod venas & arterias latas habeat caloremque natium minime imbecillum & extinctioni obnoxium. Pariter si forte fœmina non ab ipso ortu pinguis, menstruada esse desinit, & sterilis redditur, non est credendum id fieri ob seminis aut sanguinis penuriam: sed ob vteri adstrictionem, à mole im-

flexu: sed per singulos menses ex malleolo pedum, exigua tamen parcaque repetatur instante mensium tempore: pharmacia alterans calfaciens & attenuans constet sumendis electariis, & pulueribus calidioribus, aut vino hippocratico qualis est the-riaca & mithridatium vetus & diatrium pipereum. De his remediis consule curationem intemperiei frigida humoralis vteri.

De habitu gracili.

HAbitus gracilis vel macilentus est contrarius vtrique habitus crassi speciei, tum plethorici tum præpinguis. Est enim gracilitas siue macies nihil aliud, quam paucitas humidæ corporum substantiæ: vt sanguinis, adipis, tenellæ & recentis carnis. Gracilitatis duæ sunt differentiæ. Vna naturalis & proprie dicta, eaque vel ab ætate senili, vel à natura sicciori, tum calida, vt biliosa, tum frigida, vt melancholica: Harum in eo positum est discrimen, quòd melancholici magis musculosi sint quam biliosi: quia scilicet illorum cutis quodammodo est adstrictior, & sanguis quo alitur habitus, crassior, sanguis autem biliosarum naturarum tenuior magisque dissipabilis: cutisque rarior & transpirabilis. Altera differentia acquisita est, quæ extenuatio propriè dicitur, ex aph. 7. lib. 2. eaque duplex: vna non naturalis tantum à causarum externarum exuperantia calidarum vel frigidarum vt cælo æstuoso aut algido, alimentis acrioribus vel arte vel natura & apparatu vt salis frixis piperatis sinapisatis, tristitia, mœrore, laboribus immodicis, doloribus, vigiliis, diuturnis studiis, attentioribus curisque grauioribus, quibuslibet denique vacationibus im-

moderatis: vt sudore vberiori, vomitione, assidua diarrhœa, vrinacopiosa phlebotomia hêmorrhagia spontanea, per diuersas sedes vt nares, hêmorrhoides pulmonem, ventriculû. Altera acquisititia extenuatio contra naturam est, & symptomatrica à morbis vel acutis, vt febrib. ardentibus: vel longioribus, vt hecticis. Gracilitas sensilis est visûque & tactu perceptibilis, ex vacuitate laxitate & mobilitate cutis. Prognostica signa multa sunt, tum quod gracilitas officit fœcunditati vtriusque sexus, cui communis est, dum seminis materiam, sicut mulieribus priuatim excretionem menstruam subducit: tum quod graciles ægrius reficiantur, quam obesi extenuentur. Humectatio enim tardior est quam exsiccatio; tum quod humida qualitas minus quam sicca efficax, tû quod humoris primigenij instauratio multò magis sit ardua, ob caloris insiti & facultatum attractricis coëctricisq; partiû spermaticarû debilitatem habitûsque præsertim in acquisititia densitatē, tum quod naturarum biliosarum & calidarum humor tenuis sit & dissipabilis, cutis rara & transpirabilis & secundarij humoris à calore occurrente incrassati tardior sit adhæsiō & appositio, tum quod gracilia corpora aeris iniuriis vt calori frigoriq; magis pateant. Contra obesa internis vt febribus & viscerum inflammationibus obnoxia sint ob exiguarum venarum obstructions, vnde etiam obessorum quam gracilium vitæ spatium contractius esse solet, tum denique quod gracilitas sæpius vniuersalis sit, aliquândo etiam vtero propria ex aphor. 44. & 62. lib. 5.

Correctionis omnium gracilitatis differentiarum ars pendet ex analeptica quæ inter hygienen & the-

& therapeuticen media est. quia alitione vacuatam corporum substantiam refarcit: corrigendo interim leuiora intemperiei & cacochymię vitia. In hac enim gracili constitutione, prima & maxime generalis indicatio sumpta ab alimenti penuria, est re-nutritio cuius præcipuum & singulare instrumentum est diætā, quæ ciborum plurium euchymorum & cupeptorum appositione deficientem & dissipatam quacunque à causa naturali nonnaturali & cōtra naturam corporum substantiam restituat. Alterum eiusdem operis priusque vsurpandum instrumentum est pharmacia quæ tum cacochymiam naturarum biliosarum & melancholicarum è prima corporis regione leniendo, vt per cassiam syrupum de rosīs pallidis electarium diacatholiconis, diaprun. simplex & ex secunda mediocriter trahendo, vt per sennam agaricum & rhabarbarum, prætermisiss omnibus diagrydiatis & colocyntifatis, siccitatem maciemque augmentibus euacuet, ne vitiosus ex eius mixtione sanguis nutritioni ineptus sit. Pharmacia deniq; siccitatē caliditatē frigiditatē naturalē temperet per admouenda: vt balnea fotsus litus vnguenta regioni hepatis cordisq; & totius spinæ mox ab exitu ex balneo applicanda. Item per assumenda vt edulia liquida aut mediæ consistentiæ. Diætę analeptica materia est aer siue natura siue arte temperatus (qui enim eiusmodi est vtrique temperiei frigida calidæque aduersatur). cibi alimentosi crassi lentique euchymi cupepti liquidiq; vel mediæ consistentiæ, vt promptē salubriter & constanter recreent & instaurent. Tales sunt bubulæ vitulorum veruecū porcellorum agnorum, gallinaceorum omnium, turdorum perdicum phasia-

norum pipionū carnes, eæque elixatæ potius quàm tostæ, tale vinum rubrum generosum & mediocris substantiæ. tales fructus thoracici vt amygdalæ dulces, auellanæ nuclei pinei dactyli, passulæ, caricæ & pistacia. Porro ex carnibus illis elixatis & contusis expressisque iuscula parantur vt vocant consummata; vel panatellæ amygdalata hordeata mixtis vbique ouorum vitellis. Indè quoque fit obsonij genus vocatum (*le blanc manger*) ex pulpa contusa caponū cum amygdalis dulcibus, orizæ farina, lacte & saccharo & moscho. Fiūt quoque panes martij ex eadē pulpa caponum vel perdicum cū amygdalis & saccharo contusa. Fiunt denique tartæ vulgo vocatæ ex iisdem carnibus contusis cum amygdalis dulcibus nucleis pineis in lacte infusis, farina orizæ & saccharo simul mixtis coctisque in furno. Commendantur quoque testudinum elixatarum carnes, earūque iuscula addito pauco vino albo, vitelli ouorum, lac vaccinum vel ouillum potius quam asininum & caprillum. Somni denique sint longiores, matutini, & nocturni, à pastu breues: frictiones fiant leues totius corporis, balnea denique instituantur tepida, docec refrigerant leuiter: quo sit paulo adstrictior cutis: ne alimentum exhalet. In exitu ex balneo vt & in introitu iusculum aliquod aut expressum carniū aut gelatiua etiam exhibeatur.

De mensium translatione ad alias partes.

CAusarum multiplicium suppressionis mensiū vltima est eorundem ab vtero ad alias partes translatio. sæpius quidem eo quod ipse vterus tumoribus præter naturam, obstructionibus, obliquitatibus,

tatibus, & intēperiebus humoralibus infestatur, unde fit vt mensiū effluxioni viæ venæq; vterinæ, & cotyledones nō pateāt neque explicentur. Alias tamē proprio naturæ motu auersio hæc fit, vtero etiā incolumi: neque menses fluxuros respuente: Fit autem ea mensium transmissio à natura in eas partes quibuscum vterus ipse consentit. Tunc enim accidit: vt vterinæ venæ in vicinas: hæc rursus in alias vicinas redundantem sanguinem vicissim eructent: donec per consecutionem quandam reliquæ venæ impleantur. Transmissus itaque hoc pacto sanguis aut in venis subsistit, in quibus præ obstructione & putredine febres ardentes maximèque acutas accendit. Quod si ex iisdem violenta distensione diuulsis in viscerum aliarumque partium substantiam eruperit: phlegmonas calamitosas aliòsque tumores excitat: vt phrenitides, peripneumonias, aut hydropes, sed si ex iisdem venis per anastomosin reclusis foras extra corpus excludatur, in modum periodicæ menstruæque excretionis erumpere solet. Consentit autem vterus cum omnibus corporis partibus, præsertim cum principibus aut quæ ipsis inserviunt, per numerosas venarum propagines à caua deductas, cui annectitur per venas spermaticas vterus. Hinc igitur per nares ex cerebro: per pulmonem expuitione: per ventriculum vomitione: per renes & vesicam mictione: per hæmorrhoidas è ramo splenico: vel è vena caua, per intestina ex repleto mesenterio: vel per dysenteriam cruentam in mutilatis cōsuetoque victu vtentibus: per pedum vlcera κακόνθη: per alueolum dentis euulsi; per vmbilicum periodica & menstrua excretionem, sanguis menstruus ab vtero reflexus aliquando prorū-

pit. Eiusmodi autem mensium transmissionem superiorem omnem Hippocrates apho. 25. lib. 5. improbat; inferiorem probat tantum: si niger sanguis effluat: idem tamen suppressionem mensium ab hæmorrhagia suppleri docet eodem libro: quare sententia prioris aphorismi ita accipienda est. Si nulla adsit plethoræ puræ vel impuræ aut suppressæ vacuationis menstruæ oppressio: tunc enim veluti naturalis est: & scæminarum incolumitatem tuetur, non naturalis tamen ea ratione habenda est quod non per viam conuenientem id est vterum fiat: neque scæcunditatem tueatur. Transmissionis huius indicatio curatiua duplex est., prior venarum vteri apertio, posterior sanguinis ad eundem reuulsio: apertionis instrumenta materiaque exposita fuerunt antea prima operis huius parte in tractatu de tumoribus. Pariter remedia quæ conferunt aduersus obstructions & intemperies humores proximis huius secundæ partis capitibus designata fuerunt. Reuulsionis quoque differentiæ sunt appositæ & vsus vt sectionis venarum in pedibus: frictionum violentarum, lumborum femorum & tibiæ, deligationum arctiorum ad pedes & ad femora digitis quatuor supra genu vtrunque: cucurbitularum magnarum iuxta inguina: vaporum suffituum & pessulorum in ceruicem pudendi inferendorum. His reuulsionum differentiis locus non est nisi apertis prius venis: ne vteri substantiam cohibitus sanguis obruat, sicuti nusquam repercussio parti per quam effluit adhibenda est: ne partem principem impetat incessatque.

De immoderatis mensibus.

Affectus hic priori & natura & effectis omnino contrarius est: prior enim, vacuationis menstrue naturalis & consuetæ retentio est, posterior hic immodica vacuationis eiusdem profusio, Item prior ille organicos maxime morbos in vtero suscitatur, plerumque etiam in aliis visceribus, ut sunt tumores obstructions ulcera & obliquitates: posterior verò totius corporis similes frigidos siccisque; spiritus enim & caloris cum sanguine priuatio frigus & siccitatem inducit: nisi forte ex cruditate ventriculi humiditas excrementitia luxuriet. Huc spectat Hippo. aph. 57. lib. 5. Menstruis abundantibus morbi eueniunt (scilicet in toto corpore) & subsidentibus ab vtero id est in vtero morbi. Porro hæc abundantia supra naturæ vitæque modum est: cum plus sanguinis per vterum excernitur: quam ex propria sceminæ nutritione redundet. quare definiatur mensium redundantia, non dierum numero, vel periodorum ordine: sed multitudine quæ naturæ vitæque ætatis, habitus, & consuetudinis modum exuperet cum viriū iactura. Differentiæ redūdantię duæ sunt, vna à causis externis internisque coniunctis, altera ab internis tam antecedentibus, quam coniunctis. Externæ autem sunt quæcumque corpus & sanguinem vehementius inflammant attenuant & ad fluxum commouent ita ut vaporum multitudine ferox & tumidus orificia venarum maiorum aperiat: minores aliquando disrumpat: eiusmodi sunt cibi acriores salsi piperati, motus vehementes sub cælo præsertim æstuoso, iracundia truculenta & indomita. Coniunctæ

causæ sunt, venarum morbi organici duo, anastomosis, à sanguine replente vel vellicante nimis, & diapedesis, ab intemperie frigida humida vt in hydropicis. Item communes tres diærescos species, vt vulnus, & ruptio, à partu difficil, abortu violento, tribus præsertim à conceptu mensibus, vel ex improvida obstetricis parientium tractatione, erosio denique ab acrioribus & erodentibus venarum tunicas humoribus. Antecedentes causæ sunt plethora & cacochymia cum sanguine mixta: siue biliosa sit, siue pituitosa, & serosa, siue melancholica.

De signis diagnosticis.

H Vius redundantia mensium, sicut & cuiuslibet hæmorrhagiæ, comes est ingens corporis viscerumque principum & eorum quæ illis inserviunt, perfrigeratio (ob caloris & spiritus vna cum sanguine effluxum) maxime vero partium illarum, quæ ad proprii muneris functionem caloris magno subsidio egent. Hinc ex ventriculi offensione cruditas, cibique fastidium oritur: ex hepatis vitio læsaque hæmatosi crudior & humidior sanguis partes præsertim frigidiores, & à corde distantiores sero multo flatuque perfundit, atque hinc cachexia scdusque scæminarum in vultu & pallidus color: habitus subtumidus & flatuosus: cedematosus pedum & tibiarum tumor: ex cerebri iniuria mentis ignavia, sensuum stupor, motuumque torpor, & totius corporis inertia, ob ineptam spiritus animalis substantiam: ex cordis denique offensione graui, mœror, tristitia, lipothymia, syncope, hydrops, mors denique certissima prouenit. Causæ externæ recentes, ex laborantium scæminarum aut assidentium ministro-

ministratorum iudiciis perspicuæ sunt. Internarum siue antecedentium omnium signa communia petuntur ex causis internis externisque: vt natura, ætate, habitu, victu prægresso, & consuetudine: Ita plethoræ ex natura calida humidaque ætate iuuenili habitu carnosovitaque indulgenti. Cacochymie biliosæ ex natura calida siccaque, ætate iuuenili habitu gracili, totoque victu calidiori indicium sumitur. Pituitosa ex habitu præpingui, frigidiori victu & desidiofo, maximè ex aquarum niuosarum & fractuum horæorum ingurgitatione internoscitur. Signa peculiaria ex substantia & colore excreti sanguinis depromuntur. Tèperati enim sanguinis mediocris substantia colorque floridus est, & cruori vitæ recēs mactatæ persimilis: biliosus pituitosus & melancholicus sanguis experimento duplici eiusdem substantiæ & coloris explorandus est: tum eius in arenam sub æstuoso cælo & ardente sole infusione & exsiccatione, tum eiusdem in linteolum sub vmbra siccandum effusione: qui enim in arena aut linteolo enicat color, flauus quidem biliosum, albidus pituitosum, nigricans melancholicum renuntiat. Signa denique cuiusque venarum affectus ex copia modoque fluxus ducenda sunt: nam per anastomofin copiosus est facilisque laudabilis sanguinis fluxus: per diapedesin fluxus est longus sed parcior & indolens; & quidem sanguinis tenuioris biliosi aut aquosi: per ruptionem copiosus, & cum dolore, & à violentis sæpius causis, vt casu, ictu, abortu, partuque, coitu effræni: aliquando etiam vi causarum internarum, vt à plethora: per diaurosin & erosionem parcus quidem & languidus: sed cum dolore fluxus est.

Signa prognostica.

OMnium redundantie menstrue specierum difficillima est fereque incurabilis ea quæ ex veteri idiopathia vteri provenit occallescentibus meatibus, tū etiam quæ ex diuturniori sympathia est: cū sit pars hæc suscipiendis aliarū partium excrementis ob decliuorem situm opportunissima. postremo infinitis prope morbis frigidis corpus vniuersum opprimit, tandemque cachexia pituitosa & hydrope perimit.

Curatio prima differentia.

HOc symptoma id est redundantia mensium, quacunque ex causa fiat, indicationibus duabus curatur: vna sanguinem fluentem, altera venarum morbos respicit. Vtraque est multiplex pro varia sanguinis venarum morbi que natura: vt mox patebit. In ea enim quæ fit ab externis causis calidioribus: sanguini quidē fluenti reuulsio deriuatioque: eidē calfacto refrigeratio, attenuato incrassatio opponēda est. Sic in venarū maiorū anastomosi & dilatione, orificiorum constrictio cōpressioque, in minorum ruptione agglutinatio procuranda est. Hæc autem sanguinis constitutio ab externis quidē causis nata est, indicat tamen remedia sola que eius indicatio curatiua habenda est: sicut externarum causarum constitutionis in sanguine ab illis relicte propria est demonstratio & diagnosi: Symptomata quoque leuiora summoto morbo eorum auctore ipsa protinus summouentur: & tanquam cum causa sua profligantur: at grauiora peculiari curatione atque adeo ante morbū summouenda sunt; vt quæ viribus sunt pestifera, primisq; morbis augēdis vel nouis excitandis idonea. Eiusmodi est hæmorrhagia, quæ ruptis

ptis vel apertis venis vires animamque cum sanguine profundit. Fluxionis igitur coercendę instrumenta suggerit vnica chirurgia eaq; duplicia, tũ reuulsoria fluentis vel mox fluxuri sanguinis: tum deriuatoria iam fluxi ad vterum, venasq; eius implentis. Ex reuulsoriis sũt phlebotomia, hæmorrhagia nariũ, deligationes, frictiones, cucurbitulę. Deriuatoriũ vnicum est, apertio nempe hæmorrhoidũ per hirudines affixas vel scalpellũ chirurgicũ infixũ. phlebotomia prima quidẽ est & efficacissima in alterutro cubito: vbi altera vteri pars grauior & sanguine magis oppressa sentitur: vt fiat reuulsio κατ' ἰξιν venę basilicę vel medię, pressio interim ramo qui à cephalica deducitur idque parce vt ab ζ j. ad ij. singulis vicibus: sensimque vt bis terue in vno die & angusto vulnere: ne insignis spiritus & caloris iactura vacuationẽ sanguinis sequatur. Eadẽ sanguinis vacuatio, si vires sint debiliores, vtiliter tentabitur sectã venã dictã saluatella, quę inter annularẽ & auricularem digitum excurrit. denique hæmorrhagia narium ad motis vel fetis vel iuncis aculeatis tutissime proritabitur: loco phlebotomię deligationes arctiores fiant vel digitorum in manibus vel brachiorum iuxta axillas & mammarum ipsarum: item frictiones durę & asperę brachiorum & axillarum, dolor enim calorque sanguinem retrahit, cucurbitula magna & cũ magna flamma sub mammis: & ad hepatis lienisque regionem: ad dorsum denique & lumbos etiam cum scarificatione admoueatur. Caliditatis & tenuitatis temperandę instrumenta duo sunt, diætã & pharmacia. vtraque ad refrigerationem & incrassationem vergens. Diætã igitur constet aere frigido in conclauis aquilonio

aut gelida resperſo, aut foliis ramisque frigidarum plantarum conſtrato; pane hordeaceo, miliaceo ſequalino, pultibus leguminum, vt orizę, hordei, fabę, eicerum, lentium coctis cum aqua ferrata: vel reſperſis ſucco aſtero mali granati, aurancij, limonij. Fructus quoque adſtringētes proſunt: vt meſpila, ſorba cydonia corna & berberis: potus ſit aque pluuię ferratę: Si tamen defectionis virium ob vacuationis redundantiam metus ſit, panatella triticea, vel ſemola quam vocant cocta cum pedibus vitulorum exhibeatur aſperſo puluere coralli vt ambrę citrinę. Conſummata quoque, iuſcula carniū coctarum cum plantagine portulaca acetofa ſymphyto, conuenient, Item gelatinę cum ſucco mali granati, aut omphacio præparatę: vino quoque rubro & aſtero prædicta aqua diluatur. Eodem tempore ſit ſomnus prolixior, durus decubitus, vita perturbationum omnium expers, mollis denique vt lubricus vĕter ſiue per ſe, ſiue per clyſtere, & balanos: ne valida ventris compreſſione, ſanguis ad vterum deprimatur.

Pharmacia quoque fluxum refrēnet refrigerando & incrassando per interna externaque remedia, illa ſunt iulepi apoſemata pulueres electaria pilulę. iulepi cōſtant ſyrupis de granatis acidis cydoniorum myrtino & de roſis ſiccis, de limonibus cum aquis roſarum plantag. acetof. addendo trochiſ. de bolo vel de terra ſigillata portiunculam.

Apoſemata concinnantur ex decoctis radicū biſtortę tormentillę folior. plātag. lact. portul. equiſetiſolani acetofę ſymph. papauer. albi, verbaſcialbi, ſūmitatū myrti balauſtiorū roſarū rubearū: quibus addatur momentū pulueris adſtringētis: cuiuſmodi eſt terrę ſigillatę vel boli armeni, ſang. draconis,

coralli rubri, cornu cerui, rasuræ eboris, lapidis hæmatitis, & magnetis, masticis, thuris, gummi arabici, & tragacanthæ, ambræ citrinæ, amyli, caricum, glandium, gallarum, nucum cupressi, testarum oui calcinatarum, acinorum granorum rubeorum, præoniæ, ossis vsti de pede veruecis, spongiæ infusæ in picem liquidam & vstæ in fictili. Hic puluis aliàs cum vino rubro austeroque, aliàs cum albumine aut vitello oui ad ʒj alias cum succo plantag. vel cum aqua pluuia ferrata per plures dies, vt sex vel octo rectè sumatur, donec repressus omnino sanguinis motus videbitur. Ex eodem puluere cum succo conuenienti fiant pillulæ cum masticis aut psyllij mucilagine, quarum ʒ vnus deuoretur bis quotidie, ex eodem denique puluere fiunt electaria solida tabulata cum saccharo aqua rosarum diluto. Fiunt denique electaria mollia si iungantur conseruis adstringentibus qualis est baccarum oxyacanthæ rosarum caruis cydoniorum myrobalanorum cum sirupo myrtino vel cydoniorum.

Altera indicatio est hiatus & apertionis cotyledonum adstrictio oclusioque: tum per assumenda modo exposita, tum per adimouenda & intromitenda. Illa sunt, fomenta per spongiam oxycrato non calido, nec frigido imbutam: aut decocto adstringenti: quale est foliorum plantagin. bursæ pastoris, equiseti, verbasci albi, symphyti, lysimachiz, oleastri, vrticæ mortuæ, summitatum myrti, oleastri, lentisci, vel succis earundem. talia linimenta sint ex oleo myrtino, létiscino, melino, cū pauca cera. Itē vnguenta ex iisdē & iuncto puluere adstringenti: cuiusmodi est vnguentum comitissæ, imponenda regioni lumborum, renum, inguinum & imi ven-

tris. talia denique sunt cataplasmata ex decocto adstringentiũ & magmate iunctis pulueribus & oleis adstringentibus: clysteres intromittuntur per vteri cervicem, ex eiusmodi platarum decoctis succisve, vt plantaginis, mixto puluere aliquo adstringenti qualis est spõgię in liquidã picem mersã & in olla vstã: pessaria quoq; ex lana & cotone succo eodem imbutis & puluere aspersis altissimẽ ad os vsque pendendi intromittenda sunt. Physica denique sunt corallus rubeus de collo suspensus: ambra citrina, & quod magis superstitiosum est, sacculus magnę rannę puluere repletus, & inter mammas ex collo demissus gestatũque. Atque hæc sit differentię primę redundantium mensium curatio.

Curatio secunda differentia.

Secunda differentia immoderatę menstruę purgationis pēdens ex causis internis, tũ antecedentib. tũ cõiunctis, curatur iisdem indicationũ duarũ generibus: reuulsione scil. fluentis sanguinis: & solutionis venarũ vnione. vtraq; autẽ indicatio pro varietate causarũ antecedentium, vt plethorę & cacochytrię: & coniunctarum, vt anastomoseos, rixeos diapedeseos & diauroseos variari solet. Quę enim à plethora & anastomosi est, reuulsione indiget, per opera chirurgica antea exposita: vt frictiones deligationes cucurbitulas scarificationes in parib. superioribus, & phlebotomiã: quę vel copiosior sit, vel parcior: si plethora spontaneo fluxu iã sit exhausta, vnio autem tum per diætã nõ solum tenuem, sed refrigerantem etiã, incrassantem & adstringentem procurabitur, nisi integrę yires integrã vnus diei inediã ferre possint, tum denique p̃r pharmaciã & medicamenta adstringentia: qualia in assumendis admouendis, & immittēdis exposita modo fuerũt.

Quæ à sanguine bilioso & diapedesi est mensuræ redundantia: duplici quoque curatur indicatione, reuulsionis & adstrictionis atque condensationis rariorum tunicarum. vtriusque eadem instrumenta sunt tria communia, diæta, pharmacia, chirurgia. Hæc tamen reuulsionis fluxus propria est per opera aut enumerata: ut deligationes, frictiones partium superiorum, & per phlebotomiam parciorem, quam in plethorâ: diæta quoque sit magis refrigerans & incrassans quam in anastomosi plethorica. Eadem ratio remediorum pharmaceuticorum, tum internorum, tum externorum habenda est: ut utraque refrigerent, incrassent, & magis adstringant, quanto sanguis biliosus temperato tenuior, & ad fluxum pronior est, quantoque raritas pororum omnium difficilius, quam sola laxitas orificiorum condensatur: deriuatio autem fiat per purgationem cholagogam clementiorem, mediisque ordinis, cui adstrictio quædam coniuncta sit: ut cacochymia biliosa, fluxionis comes, simul deriuetur ad ventrem, venarumque raritas condensetur: idque sine ulla emollitione, qualis est mannæ & cassiæ: & deterfione valida ut alpes, & hieræ, & acrimonia aperiente ut scammonij & colocyntidos: ne exacerbato & aucto venæ affectu fluxio ingeminetur. Eiusmodi cholagogæ fluxionis materia est ex tamarindis, myrobalanis citrinis rhabarbar. modice assato, cum syrupo de rosis siccis. Forma purgationis huiusmodi sit.

℞. Cortic. myrob. citrinar. oleo rosato confrictarum ʒ j. rhab. leuiter vstulati ʒ iij. spicæ nardi gr. iij. puluerata excipiantur conseruæ ros. ʒ j. vel ʒ ss. fiantque boli qui dentur mane. Vel.

℞. fol. plantag. & ros. rubr. ana p. j. tamarind.

electorum ʒvj. cort. myrob. citrin. vt dictum est
 confricatarum ʒj. coquantur, in colat. ʒiij. infun-
 de rhab. modice tosti & puluerisati ʒj. β spicæ nar-
 di g. iij. in forti express. dissolue syrupi de rosīs sic-
 cis ʒβ. fiat potio. Deriuatio hæc reuulsione per
 phlebotomiā debet esse posterior. Postrema est in
 hac curatione hepatis calidioris tēperatio, tū per in-
 terna prædicta tū per topica eiusdē facultatis id est
 refrigerantia, vt vnguentū ros. ceratū santalinum.
 Quoad redūdantiā quæ à cacochymia pituitosa sero-
 saque est & diapedesi, illa non aliter quā biliosa, cu-
 ratur tribus indicationibus, reuellendi fluxum, con-
 densandi raritatem venarum, & temperandi frigidi
 hepatis, à quo aquosus sanguis. Instrumentis quo-
 que tribus hæc medica opera exercētur diætā, phar-
 macia, & chirurgia. Ex his chirurgia prior sit & ex
 eius operibus phlebotomia, sed parcissima ne intē-
 peries frigida viscerum augeatur : sed purgatione
 phlegmagoga suppleatur à qua omnis quoque e-
 mollitio validaque deterfio & acrimonia absit. Ma-
 teria est agaricus trohiscatus, semen carthami, syru-
 pus ros. pallidarum. Forma talis.

℞. agar. trochis. ʒiij. elect. diacarth. ʒj. misce &
 fiant boli cum sacch. Vel ℞. fol. meliss. & cicer. rub.
 ana p. j. seminis carth. conusi ʒj. myrobal. cepul.
 confric. ʒβ coquantur, & in colat. ʒiij. infunde per
 noctem agar. troch. ʒjβ. & in expres. diss. syrupi ros.
 pallid. ʒβ fiat potio. Diætā quidem adstringens, in-
 crassansque sit : sed tamen calfaciens siccasque
 modicè : ne victu frigido hepatis intemperies
 frigida aucta cacochymiam serosam multiplicet,
 venarumque substantiæ robur effoeminet rela-
 xetque.

Pharma-

Pharmaceutica denique remedia calida siccaque sint, & nonnihil adstringentia; cuiusmodi sunt inter astringentia iulepi ex syrup. absinthij & syrupo confer. cort. citri & myrobal. cum aquis melissæ, betonicæ, absinthij, quibus momentum pulueris astringentis vt coralli, cornu ceruini lapidis hæmatitis & terræ sigillatæ vt ad ʒj. addi possit in tres doses. Similis erit opiata ex conditura cort. citri: vel mali aurancij myrobal. nucum inglandium, caruis cydoniorum, & summitatum absinthij pontici, cum puluere trochiscorum de charabe, vel terræ sigillatæ. Foris quoque similes fons vteri regioni impingentur, ex decocto absinthij abrotani melissæ plantag. tapsi barbati summitatum olcastri in aqua ferrata & vino rubro acerboque.

Similis l'us est ex oleo absinth. myrt. nardino, cum cera alba quibus iuncti pulueres adstringentes vnguentum efficient. Similis erit iniectio vini rubri incoctis prius foliis absinthij salu. lauri & rosæ rubris. Similia pessaria eodem vino perfusa, & puluere adstringentia, cersa. Suffitus denique ex mastiche cort. thuris, ladano, semin. coriandri præparati, santalo citrino, granis alkermes, & ligno aloes.

Tertia indicatio est hepatis corroboratio: & per topica adnota vt oleum nard. absinth. mastich. & quæ inde conficiuntur vnguenta, addita pubi. spicæ nardi, santali citrini, nucis moschatæ, maccis, iusta portione cum cera alba. Eodem denique tempore quarta indicatio, quæ est condensatio opposita τῇ διαπρῶνι explebitur, per topica admouenda, immittendaque, adstringentia quidē, sed calida siccaque: vt & raritati pororū & effectrici

eiufdem caufæ id eft intemperie i frigidæ humidæq;
finiul occurrant. Talis eft ex admouēdis fatus ex decocto fol. plantag. tapfi barbati, equifeti, abfinthij, abrotani, tanaceti, artemifæ, balauftiorum, rof. rubearum & ſtœchados vtriufq; in aqua ferrata & vini rubri aufterique parte tertia poſt coctionem additi: Tale eft linimentum ex oleo abſinth. maſt. lentif. myrt. & cera alba: quibus ſi iuſta pulueris adſtringentis prædicti doſis iungatur, fiet vnguentū, ſicuti eadē doſi aucta emplaſtrū &c. Talia ex immittendis peſſaria: ex lana vel cotone cum lincolis vetuſtis digitali magnitudine confutis, & puluere adſtringenti calidoque intus fartis, vinoque veteri craſſo & acerbo immerſis, quæ ſi altius ad os uſque vteri internum inferantur, ibidemque & diu & noctu contineātur efficaciffima fient. Tales denique erunt clyſteres vterini ex prædictorū ſimplicium decoctionis & vini rubri æquis portionibus: vel ex vino rubro acerboque ſolo mixta pulueris prædicti portione aliqua. Quæ à venarum ruptione eſt, menſium redundantia: vt quæ à cauſis externis eſt: vel contudentibus vt caſu ictuque graui & duro occurſu: vel diuellentibus vt abortu partūque difficili & coitu violento: vel diſſecantibus & vulnerantibus: vel ab internis vt à ſanguine multo craſſo flatuoſo melancholico, vnde etiam hæmorrhoides & varices: curatur duobus iſdem indicationum & remèdiorum generibus; tum reuellentium fluentem ſanguinem, cuiuſmodi ſunt omnia chirurgica ante expoſita, ſicuti diætetica & pharmaceutica eundem refrigerantia & increaſſantia: tum emplaſticorū & aſtringentiū topicorū. Emplaſtica autē ſunt, ſimplicia craſſa terrenaque, ſine inſigni calore aut frigore: quæ permixtione

tionē suā sanguinem inspissant: porosque offarciūt: tum siccātia serūmque sāguinis absorbētia: itaq; fluxui sistēdo & ruptioni vniēdā plurimū intus forisq; profūt: eius generis sūt mastiche thus eiusq; cortex, myrrha, aloe, sarcocolla, mumia, lithargyrus, coralliū, lapis hēmatites, bolus armenus, sāguis draconis, quorū omniū puluis, vel solus, vel cum vino acerbo aut aqua ferrata sumendus est: vel opiatīs prādictis iūgetur: vel in trochiscos & pillulas cum mucilagine tragacanthi, aut albumine oui coactus deuorabitur. Admouendorū autē adstringentiū materia ante exposita est, cui emplastica pauca permisceri poterūt; vt ex simplicibus, cynoglossū, arnoglossū, vlmī folia conisa vinca peruinca. Immittēda etiā: vt pessaria clysteres vterini, eadē materia adstringenti cōstent: quę ante exposita est, sed iuxta pauca emplastici pulueris portione. Digēta denique materiā sit glutinosā vt ex pedibus quadrupedum, intestinis, cerebro, partibusque omnibus albicantibus, non pinguibus, testudinibus, cochleis, anguillis & albuminib. ouorū.

De stillicidio vteri.

Alia est deprauatę per vterum excretionis species, quę stillicidium vocatur: cū sanguis ex vtero non quidem abundāter breuiterque, vt in naturali mensū effluxu; aut non naturali etiā & symptomatico, qualis per anastomosin aut p̄ḡiv incidit: sed parcē & guttatim, idq; continenter, vel ex brevioribus interuallis prodit, purus quidem floridusq; veluti ex prēcisa vena, non serosus & biliosus, veluti in diapedesi per quam pallidi albīve sanguinis inordinatus parcus & diuturnus fluxus contingit. Huius symptomaticis autorem est morbus venę, in solutione vnitatis, diaurosis, vel anaurosis, cuius morbi proxima

reuellit tantum fluentem : sed temperat etiam sanguinem calidiorē: huic mox subiungenda est purgatiuncula cholagoga mixtæ cum sanguine cacochymix biliosæ hæmorrhagiam vlcusque fouentis: eaque nonnihil adstringens, qualis paulo ante exposita est. Aduuatur deinde reuulsio per dietam tenuem quidem: sed incrassantem, & refrigerantem. postremo per pharmaciam eiusque remedia refrigerandi incrassandique facultate præpollentia, cuiusmodi sunt iulepi, apozemata, pulueres, trochisci, electaria mollia, duraque, de quibus antea. Altera indicatio est tēperandi hepatis calidioris: ne biliosæ cacochymix congerere pergat: idque per epithemata, linimenta & vnguēta prius in diapedesi designata. Tertia indicatio erosionis est duplex, prius enim causa vlceri coniuncta abstergenda est: humorque acris eluendus, quicumque vlceri inhæsit, deinde erosa venæ substantia instauranda est. Cæterum deterfio illa leuior sit, modicæque tergens in simplici erosione: ne ab acrimonia validiori vlcus crescat, & exasperetur: Huius deterfionis idonea erit materia serum caprillum, hydromel, decoctum agrimonij, cum paucō saccharo rosato, aut melle rosato, aut pauca aloë detrita. hinc crebri fiant clysteres yterini, sublatis clunibus, depressis humeris, excipiendi asseruandique diutius occluso pudendo: post deterfionem tridui vel bidui, iisdem clysteribus sarcoticorum pulueres misceantur ytaloes, thuris, mastichis, sarcocollæ, iridis, & aristolochix, tandemque adstringentium ante notatorum: Pessaria quoque iisdem pulueribus aspersæ succoque plantaginis vel simili perfusa plurimum profint: simile est vnguentū diachalciteos & diapōphotydos, foris

quoque imponantur emplastra de Ianna & de gratia Dei, & cataplasma ex ltercore porcino, cum rosarum puluere. atque hæc est simplicis erosione, curatio methodica. Cōpositæ autem eadem sunt indicationes: eadem remediorum genera, reuelliētū, refrigeratiū, & incrassatiū, causā antecedentē. hepatis calorem temperantiū: & erosionē vlcusque carne replentiū. Discrimen tantū est: quod validiori detersione saniei copiosioris & crassioris vlcus indigeat: tū quod symptomatis. i. doloris acerbitas sæpe curationis ordinē inuertat: suadeatq; sese imprimis esse cōpescendū, idq; per clysteres vterinos ex lacte admixto pauco plantag. succo: vel ex decocto foliorū maluz, sâbuci, seminis lini vel scœnugræci, admixta mucilagine seminis lini aut scœnugræci: Proderit etiā infusus fotusq; pudendi ex iisdem decoctis per veficas lanani, cottonem, spongiam, filtrum admotis.

De fluore vterino.

Fluor vterinus dictus est quod per vterum fiat: siue ab eo, siue aliunde eius materia prodeat, alias muliebris, quod mulieribus proprius non etiam viris communis sit, estque veluti reumatismus ploratus & destillatio diuturna vitiosi & excrementitij humoris pervterum facta. Est igitur fluor hic species quædam deprauatæ mensium excretionis & symptomata vteri in exeunte mutato: quod non sincerus sanguis vt menstruus, sed corruptus quidam humor, & à sanguinis natura alienus: neque certo ordine, stataq; periodo vt menses, sed vel cōtinenter, vel breuioribus interuallis, vt ante vel post mensiū periodos, vel inter easdem ex vtero profluit: Fluor ergo fecernitur à mensibus rubeis ordinatis salubri-

salubribus : à gonorrhœa, quòd magis hæc alba sit: & nonnihil voluptatis afferat: cùm breuiter corpus attenuet, tum à purulenta excretionē quæ magis quoque alba est crassaque & fœtida & dolorifica: cuius causa coitus ferri non potest, cùm fluor vterinus magis tenuis sit, liquidus, minusque albus & fœtidus, tum denique à materia seminali putrique ex locis viduarum libidinofarum redundante. Sunt autem huius floris vterini duo genera: vnus enim simplex est, vniusque humoris specie effluit, siue pituosi, siue biliosi, siue atrabilarij, & melancholici: alter humoris quidem excrementitij, cū pauco sanguine aliòve excremento mixti: fluores tamen albi omnes dicuntur, vel quod omnium frequentissimi sint, ob pituitosas mulierum naturas & vterorum, vel quia cæteris omnibus speciebus fluor albus mixtus sit.

De causis floris vterini.

Floris vterini effectrices causæ sunt intemperies tum peculiare vteri: tum communes totius corporis: vel singulorum viscerū: eæque vel insitæ, vel adscititæ, & ab externis causis contractæ. Frequens autem eius origo est ab vteri idiopathia frigidioris, & humidioris, vel naturâ, vel à causis externis: vt appulsu auræ frigidioris, mensium præsertim partusque tempore, hiantibus locellis, merfione in gelidam, lotionē in balneo frigido, sessione super saxum aut in marmore: frigida enim & neruea vteri substantia à similibus causis facile in intemperiem insalubrem præcipitatur, vel à crebro conceptu, abortu, partuque difficili, & violento concubitu: sic enim debilitatus vterus copiosa congerit è proprio alimento crudo

incoctoque excrementa, perpetuo pudendi madore manantia: frequentior tamen huius mali origo est ex sympathia, vel cōmuni totius corporis: idque ob intemperiem vel nativam, vel ex prauo & improbabili victu ductam vel certe viscerum singulorum principum, aut partium principibus seruientium propria: vt cerebri, ventriculi, hepatis, lienis. Collecta enim per vtramque sympathiam tum communem tum particularem cacochymia ad vterum, vt-pote infimum & venosum, & vacuationibus assuetum, vel proprio grauitatis suæ impetu: vel naturæ dirigentis motu, decurrit & deuoluitur: est igitur hoc symptoma, vel idiopathicum vteri intemperati: vel sympathicum, idque ex affectione tantum leuique fluentis humoris alteratione: vel affectu etiam secundo & deuteropathico, dum ex diuturna alluione, longa que affluentis & effluentis humoris perfusione, vterus non tantum intemperatus euadit, sed adeo etiam laxus humidusque, vel circa fundum & acetabula venarum, vel circa orificium eiusdem internum, vt sæpe ad pudendum & extra prouoluatur.

*Signa diagnostica Causarum &
fluoris Specierum.*

Eorum quæ intemperies communes calidas aut frigiditas indicant, quædā sunt signa simul & causæ: ætæ; vel internæ, vt natura & ætas, vel externæ vt tota; regressa diæta, quædam sunt signa tantum vt habitus, color, mores, functiones, excrementa, morbi que prægressi. Eisdem intemperies in singulis visceribus, eorū functiones naturales declarant, necnon ipsarum intemperierum causæ, Earūdem differentias, fluoris vterini differentiæ desumptæ ex colore, substan-

substantia, & exitu luculentius declarant: rubeus enim tenuisque neque concreescens intemperiem, vel totius corporis, vel solius hepatis frigidam humidamque: sicuti fluor serosus & liquidus vel mucosus eandem: sed intensiorem indicat: biliosus flauusque viridis & æruginosus intemperiei calidæ; sicuti nigricans melancholici aut atrabilarij acris & vlcerosi, index est: obscurus denique mixtionis variorum humorum testis est ex proprio colore internoscendorum, in linteolis co fluore imbutis; & in vmbra siccatis. exitus quoque calidæ cacochymix biliosæ vel atrabiliarix dolore molestus est, in reliquis indolens.

Sympathia & idiopathia distinctiua signa.

Sympathiâ communem declarant, tum fluor copiosus tenuisque; tum causæ internæ externæque communes: vt diætâ & consuetudo: particularem insinuant singulorum viscerum læsæ propriæ functiones, fluorque paulo minus copiosus; idiopathiam denique paucus fluor, isque mucosus potius quam aquosus indicat. Fluoris vterini omnis, diuturnioris præsertim, & redundantix mensium, sunt communia signa, quæcumque caloris natui penuriam & dissipationem consequuntur; vt functionum omnium languor: tum naturalium vt in ventriculo, vnde fastidium: in hepate, vnde cachexia, vultus pallidus & deformis, oculi tumidi, totusque habitus, tibix pedesque œdematosi; hydrops denique & mors: tum animalium vnde vigiliæ, somni turbulenti, stupor mentis, totius corporis inertia & grauitas, & aliquando conuulsio per inanitionem neruosi vteri ex apho. 56. lib. 5. tum

denique vitalium, vnde palpitatio cordis, vermicularis pulsus, & lipothymia frequens, tandemque marcor & mors.

Methodus Curatiua.

Fluoris idiopathici curatio duabus indicationibus absoluitur: vna quidem est vt materia coniuncta & humor excrementitius ab vtero detrahatur: altera vt intemperies ipsa corrigatur per alteratā cōtraria, & adstringatur laxior eiusdē substantia; potest tamen particulari isti vacuationi vniuersalis purgatio præmitti; ne cacochymia alicuius descensus topicorum calore ad vterum inuitetur. Fluoris sympathici curatio multo magis artificiosa est; pluribusque indicationibus absoluenta, tam causarum antecedentium quàm coniunctarum hata ratione. Antecedentiū enim in quacūque sympathia specie tam vniuersalis quàm particularis indicatio duplex est: vna reuulsio materiae humorisque cacochymi per vterū defluentis: altera efficiētis causę alteratio, hoc est intemperiei, quam fluens cacochymia fouebat. Sic causę coniunctę vteri condoleſcentis duplex quoque indicatio est: vna respicit cacochymiam quę vteri vasis & substantię, fluendo adhæsit; altera est vt oppugnetur vteri intemperies ex commercio contactuque diuturni defluxus contracta. Nam ex breui defluxu affectio tantum, alteratioque, non affectus nascitur: ideoque Galenus communibus toti corpori remediis intacto vtero percuratum à se hunc affectum fuisse lib. 6. de locis gloriatur: idque in vxore Boeti cuiusdam Romani libro de prænotione ex pulsibus ad Posthumum. In summa methodus curatiua in

in idiopathico fluore hoc fert, vt materia vitiosa primum ex vtero diripiatur, deinde vteri intemperies laxitasque corrigatur. Sed in eo qui fit per consensum, multiplicem indicationum seriem explere, multo difficilius est. Est enim causa antecedens materialis vacuatione reuulsione & deriuatione imprimis summouenda: ne suppressa intus illuuias obstructionibus, scirrhis, hydropes aliisque funestis morbis nobiliora viscera implicet. Deinde antecedens quoque illa intemperies siue communis, siue particularis, contrariis deleatur: Postremo vterus causæ coniunctæ obsidione, liberetur: tandemque excrementitiis suis sordibus perpurgatis, alterando adstringendoque corroboretur.

Signa prognostica.

Fluor vterinus fœminis molestissimus est: Primum quidē ob deformitatem, pallorē faciei, maciem totius corporis, & inertiam, tristitiam, pudendi, & femorum madorem fœtidum, tū ob sterilitatem, cū intemperatus valde vterus semen masculum neque appetat, neque attrahat, neque retineat: tum denique ob vlcera ceruicis vel pudendi ab acrimonia aut putredine excitata. Secundò quod difficilis sit huius floris curatio ob vteri naturam situmque decliuem, per compositionem ex innumeris venis & arteriis, & fluxionum consuetudinem: remediorum denique breuiorem in ipso moram præsertim immittendorum. Tertiò quod fluxor hic fœminis frequentius, quam virginibus infestus sit: quod illarum vterus ex multis grauiditatibus abortibus & partibus, atque ideo

coitibus infirmior factus sit, ideoque ad suorum congestionem, vel alienorum excrementorum receptionem aptior. Quartò quod fœminis gravidis sæpius, quam vacuis insensus sit, ob ventriculi illarum imbecillitatem; ex qua fastidium, pica, malacia, tribus præsertim primis imprægnationis mensibus; His autem per venas colli vterini fluor hic erumpit, nisi instante abortus periculo per finem eruperit. Denique hoc statuendum quòd fœminæ rusticæ minus quam urbanae aut nobiles huic flori sunt obnoxiae: quod minus excrementosæ sint, ob sedulitatem & frugalitatem.

Exercitatio præscripta methodi.

SIt ergo fluor biliosus, vel flauus, vel viridis, vel æruginosus ex sympathia totius corporis, quod vel ab ipso ortu, vel ætatis aut victus ratione calidius sit. Curatio instituetur primum per contrariâ dietam frigidam siccâque & nonnihil adstringentem: deinde facta reuulsione fluentis cacochymiae; tum chirurgica per sectionem venarum cubiti basilicæ præsertim vel medianæ, exiguam angustoque foramine: tum pharmaceutica: primum quidem per purgationem bilis sanguini mixtæ, eiusque motum irritantis. sit autem ea duplex: vna, clementior & lenitiua phlebotomiæ præponenda primæque regionis expediendæ gratia, altera validior: quæ cacochymiam biliosam prius coctam, ex hepate venisque maioribus detrahat: vtrique quidem purgationi iuncta debet esse quædam adstrictio, ut vasis coangustatis fluxionis imperus reprimatur.

Lenitiua purgatio poterit exempli gratia in hunc modum præscribi.

℞. medullę cassiæ & pulpę tamarind. elector. ana ʒ
vj. rhab. puluerati ʒ iiij. fiât boli cum saccharo. Vel

℞. rhab. & agar. troch. pulueratorum ana ʒ j.
mirobal. citrearum ʒß infundantur in aqua acetosę
vel plantag. In express. diss. elect. diacatholic. ʒß
syrupi ros. lax. recētis ʒ j. fiat potio, detur mane. Vel

℞. massę pilularum aggregat. minorū ʒ ij. rhab.
puluerati ʒ j. fiant pilulę vj. deuorandę post primū
somnia. Mox à phlebotomia cacochymię biliosę
coctio maturanda est iulepis aut electuar. duris
mollibusque in quatuor doses matutinas diuiden-
dis. vt

℞. syrupi acetosi simplicis oxyfacchari simplicis
& de limonibus vel de granatis acidis ana ʒ ij. a-
quarum plantag. portulacę acetosę ana ʒ iiij. pul-
uer. elect. triasantali ʒ iiij. fiat iulepus. Vel

℞. rad. cichorij acetosę & lapathi acuti ana ʒ ij.
fol. end. cichorij acetosę plant. hepaticę lact. ana
m. j. seminis melon. & cucurb. contusi ana ʒß hor-
dei mundati & trium florum communium ana p.
j. decoquantur & in col. lib. j. diss. sach. rosati ʒ ij.
santali rubri ʒ iiij. fiat apozema clarificatum. Vbi
bilis cocta satis videbitur : mox expurgetur chola-
gogis medicamentis parumque adstringentibus.
quale est istud

℞. rhab. electi ʒ ij. cort. myrobal. citrearum ʒ j.
infunde in ʒ iiij. aquę plantag. & in express. dissol.
elect. diapruni solutiui vel de succo rosarum, ʒ iiij.
syrupi de rosis siccis ʒß fiat potio. His peractis
vsurpari poterit alia ratio reuellendi causam ante-
cedentem, nempe ad habitum per sudores & insen-
sibilem transpirationem : & ad renes & vesicam
per vrinās. Insensibilis transpiratio vniuersalibus

frictionibus commouetur: sudores hidroticis portionibus, sed leuioribus in fluore bilioso, ne corpus & viscera ab acrioribus magis incendatur vt ex china, salsaperille, & ligni sassafras decocto, aut balneis tepidis simplicibus, vel alteratis vel compositis ex decocto herbarum refrigerantium & humectantium. Sic vrinæ diureticis quoque leuioribus sunt incitandæ: vt iulepis ex syrupo de duabus aut quinque radicibus, & oxymelite simplici cum sero caprillo depurato. Præmissis omnibus istis causæ antecedentis reuulsionum differentiis, deueniendum erit ad remedia totum corpus roborantia leuiterque constringentia venas, per quas ad vterum fit humorum fluxus; talis est puluis.

℞. ossium dactyl. & ossium cruris capi & perdicis vstorum ana ʒ j. ambra citrinæ coralli rubri & albi ana ʒ β tartari viui albi cum aqua rosar. diluti ʒ j β cornu ceruini vsti terræ sigillatæ rasuræ eboris & margaritarum an. ʒ ij. panis sacch. ʒ iiij. fiat puluis, capiat cochlearvnum mane superbibendo cochlearia duo vini rubri diluti aqua plantag.

Tales sunt tabellæ quæ hic subiiciuntur.

℞. gummi tragacanthi arabici, & amyli ana ʒ j. mastichis ʒ β terræ sigillatæ coralli rubri ana ʒ j. fiat puluis, excipiatur saccharo aqua ros. dissoluto, & formetur tabellæ pond. ʒ iiij. capiat vnâ singulis matutinis vt supra, Talis opiata hæc. ℞. conser. anti-que ros. ʒ iiij. carnis cydoniorū cōdit. ʒ j. boli armeni loti, terræ sigillatæ & coralli rubri ana ʒ j. cū syrupomyrtino vel melino fiat opiata. Vsurpari poterit & hoc.

℞. thuris albi, boli armenię & terræ sigillatæ ana ʒ β excipiantur oui albumine, fiat bolus. Proderit denique mirum in modum potio per quindecim
dies

dies 3 iij vini rubri in quo sæpius extincta fuerit chalybs, additaq; gummi arabici & tragacanthi 3 ss. Postrema causæ coniunctæ cura est inchoanda à fluxionis biliosæ reliquiis purgandis: indeque ad vteri corroborationem perducenda. purgatio deterfioque biliosæ materiæ mitior sit, ne augeatur intemperies calida, fiatque per clysteres, & pessaria. illi consent vel decocto hordei, vel aqua saccharata, vel sero caprillo, vel hydromelite: hæc ex foliis viridibus contusis & linteolo inclusis fumariz mercurial. agrimonij: vel earundem herbarum succis cotone vel lana exceptis, & linteolo inuolutis: roborantia topica admouenda sunt fatus scilicet & infessus ex decocto adstringenti: excipiendas quoque eiusdè decocti vapor per sellâ perforatam, & tubulum ferreum. In eundem finem iniiciuntur clysteres ex eodem adstringenti decocto frigido siccoque: vel ex vino rubro, admixtis paucis pulueribus adstringentibus. Similis est suffitus. hic

℞. ladani purissimi 3j ss gallarum, nucum cupressi, calicum glandium balaustiorum, terre sigillatæ, boli armeniz ana 3 ss acaciæ hypocistidis thuris & psidiz ana 3ij. caphuræ 3 ss picis naualis 3 ss. cum mucilagine seminis cydoniorum fiant trochisci.

Pessaria deniq; ex prædicto suffitus puluere asperso cotoni vel lanæ vel ex vino rubro & tortiuo vel succis adstringentium plâtarum inebriata profunt.

Secunda exercitatio.

Esto fluor albus ex pituitosa totius corporis cacochymia eaq; vel à naturâ vel victu frigidiore curatur

iisdem indicationum generibus duobus. Antecedens enim causa id est fluens fluxuráque pituita imprimis reuellenda vacuandáque est; tum per purgationem phlegmagogā (ab hac enim frigida intemperie corporis muliebris & pituitæ arcenda est phlebotomia) tum per sudores decocto gaiacino stuphie balneis, sulphureis, bituminosis, chalcanthosis nitrosisque, vel decoctis plantarum calidarum commouendos: tum per insensibilem transpirationem vsurpatis mollibus frictionibus & oleorum calidorum embrochationibus vt laurini costini de spica &c. aut similibus vnguentis vt agrippæ martiati aregon. Denique per vrinas ex syrupis, bizantino, de quinq; radicibus, oxymelitis diuretico & scyllitico, cum aquis apij sceniculi, vt iulepi fiât. Deinde intemperies vniuersalis frigida delenda est sensim, multóque tempore, & electariorum calidorú diutino vsu, vel humidorú vt theriacæ mithridatij triphæræ magnæ sine opio: vel solidorum, vt diagalangæ aromatici rosati & diatrium pipericum. Similes sint opiata ex conseruis florum rorism. saluæ anthos stœchados, corticis citri, zinziberis viridis, mirbal. cepularum: interea dum sic toti corpori cõsultur: vteri ex consensu laborantis curatio coniungenda est; oppugnando tum causam cõiunctam materiale: tum intēperiem & laxitatem acquisititiã, illa quidem pituitosa est illuuiēs liquidior cui deterfio validior opponenda est, per clysteres & pessaria. Illorum materia idonea sit hydromel incocto anisifemine & decoctum radicis iridis hortensis, cyclamini & aristolochiæ rotundæ folio, prassij absinthij artemisiæ tanaceti cicerú rubeorú flo. centaurij minoris addito pauco melle. Horú materia est mithrida-

thridatiū theriaca vetus, tryphera magna sine opio ad ʒ ss cotone aut lana excepta & linteolo inuoluta magnitudine digitali vt per totā noctē in cēruicem pudēdi altissimē intromittatur. Item mercuriatum mel, & terebinthina & folia contusa mercurialis & sambuci, item benedicta laxatiua, hiera & diaphœnicon. Purgatus sic suis excrementis vterus roborabitur topicis calidis siccisque & adstringentibus, siue admouendis, siue immittendis: ex his clysteres sunt efficacissimi, vt ex decocto foliorum saluæ, menthæ, artemisię, absinthij, pulegij, polij montani, summitatum myrti, lauri, lauendulæ, calami aromatici, spicę nardi, sātali citrini, balaustiorum, nucum cupressi, gallarum, nucis moscata, macis & ladani. Ex eadem materia puluerata & in trochiscos cū vino rubro redacta in suffitus gratissimos aptabitur, sicuti pessariis excepta vinóq; rubro irrorata vtilissime vsurpabitur. Inseesus quoq; fotusq; ex aquis aluminosis aut ex decocto herbarū calidarum lapidibus fluuiatilib. ardentibus iniectis tandiu ex vsu erūt quādiu vires ferre possint. Fotus talis est ʒ. sol. absint. menthæ. salu. lauri & cort. granat. ana m. j. schœnanthos & cort. thuris an. ʒ ss calycum glandiū & aluminis ana ʒ j coquātur in vino rubro. Linimenta denique ex oleo absinthino nard. mastichino myrtino cum cera alba & addito puluere adstringenti vnguenta vel emplastra euadent.

Tertia exercitatio.

Fluoris vterini sanguinolenti ex communi totius corporis sympathia & intemperie frigida humidaque, siue natiua, siue aduentitia, iis-

dem indicationum generibus duobus curatio dirigenda est. Curabitur enim primum quidem antecedens causa materialis reuulsione multiplici: tum per phlebotomiam valde exiguam angustoque foramine: augendæ intemperiei frigidæ metu ex copioso caloris & spirituum effluuii: tum per purgationem duplicem lenitiuam phlebotomiæ præponendam, liberandæque primæ regionis gratia, & eradicatiuam quæ cacochymiam aquosam è secunda regione, maioribusque venis attrahat: postquam congruentibus perque aliquot dies vt sex vel octo, iulepis & apozematis percocta fuerit, sicut antea in redundantia mensium per diapedesin expositum fuit: sed vtrique tamen purgatio adstrictionis cuiusdam sit particeps coangustandorum vasorum causa, ne per eadem laxiora fluitans cacochymia aquosa procluius ad vterum decurrat: curabitur etiam per insensilem transpirationem, aut sudores & vrinas post purgationem & phlebotomiam incitandas remediis in secunda exercitatione enumeratis. Incumbendum deinde in totius corporis corroboracionem & communis intemperiei frigidæ correctionem: per dietam calidiorem & medicamenta calida siccaque: denique eadem erit sanguinolenti floris albique curatio. Discrimen vnicum est circa remediorum tam purgantium quam alterantium gradum & efficaciam tanto quidem maiorem in fluore albo: quanto intemperies in hoc quam in illo sanguinolento vehementior frigidiorque est, & humor contumacior. Coniunctæ quoque causæ tam materialis quam efficientis id est intemperiei humidæ vteri eadem sunt indicationes in vtrique floris

fluoris specie : vt nimirum vsurpentur , primùm quidem tergentia siccantia que: deinde calfacientia & adstringentia remedia , quæ corroborantia vocantur.

Quarta exercitatio.

Fluoris atrabilarij methodus eadem curatiua præcipitanda est (ne vlcus & carcinoma insigni acrimonia sua excitet) tum per antecedentis causæ materialis reuulsionem, hoc est phlebotomiam & purgationem melanagogam primùm clementem, deinde validam. Cuius exemplum sit.

℞. elect. diacathol. ʒ j. cort. mirobal. indarum cōfricatarum vel sol. sennæ ʒ ij. hordei mundati florum violæ ana p. j. fol. ceterach m. j. seminis anisi & zinziberis ana ʒ β infundantur & coquantur secundum artem, In express. dissol. elect. diasennæ solutiui & confect. hamech. ana ʒ ij. cort. myrobal. indarum confricatarum ʒ iiij. fiat potio. detur mane cum custodia. Coctionis quoque materia sit syrupus de fumaria, de cichorio, de pomis, de epithymo, cum aquis cichorij, borrag. endiuiz fumariz, vt inde iulepi fiant in sex vel octo dies protrahendi. Dissipabitur etiam materia sudoribus exiguis quidem & ex decoctis vt chynæ, atque balneis lenioribus, de quibus in fluore bilioso, deinde intemperies communis alterantibus ibidem expositis obliteranda est. Vteri denique, tum relictæ à fluxu sordes : tum debilitas & intemperies ab eodem contracta fluxu subtiliter percurabitur.

Quinta exercitatio circa sympathizæ particularis differentias.

IAmvero si fluor vterinus ex singulari sympathia visceris alicuius principis, aut principi seruiantis partis, ortus sit, eadem methodus obseruanda est: vt antecedens causa è toto corpore primum sum- moueatur, mox coniuncta tam materialis quam efficiens peculiaribus remediis oppugnetur, vt cerebri frigidi & intemperati cacochymia imprimis per errhina, sternutatoria, apophlegmatismos, gargarismos, masticatoria, cauteria ceruici, phœnigmos vertici affigendos, extrahatur: deinde cerebri relicta intemperies frigida humidaque deleatur, vt lotionibus eius ex plantarum calidarum & cephalicarum decoctis in debili lixiuio cineris sarmentorum vitis & vino albo, indèque fotibus & embrochationibus, vel aquarum thermalium, vel odoramentis & suffitibus per poma odorata, per corollas carpis & collo innexas, ex ladano puluere salicis moscho ambra & ciueta concinnatas & per cucuphas paucotone & cephalico puluere fartas: aut per asper- sionem vespertinam & quotidianam pulueris cephalici super commissuras verticis: & per vnctionem colli ex oleis calidis vt laurino consti- no de spica de stœchade & de nuce muscata: postremo affectus vteri sympathicus iisdem va- cuantium & roborantium remediorum indica- tionibus abrogetur, quorum omnium in fluore albo habetur historia. Sic vbi intemperati ven- triculi cacochymia pituitosa vomendo purgan- doque subducta fuerit, mox intemperies frigida hu- midaque eiusdem tollenda est, variis remediorum assumendorum & admouendorum formulis. Illius generis sunt electaria, tum solida vt aromaticum rosatum

rosatum,diagalanga,tum mollia, vt mithridatium
theriaca vetus,& syrapi vt de absinthio de mentha
conseruation.citri,vinum quoque absinthites, tum
opiatæ ex conseruis florum rorism.& saluiz, sum-
mitatum absinthij pontici,cort.citri,zinzib.viridis
nucum iuglandium carnis cydoniorum & mirob.
cepularum,cum puluere aromatici rosati, rasuræ e-
boris sapphiri & hyacinthi fragmentorum cum sy-
rupo conseru. cort. citri. Puluis hic quoque singu-
laris est.

R. pulu. spōgiæ vstæ & aqua rosarum decies lotæ
ʒ ij. rasuræ eboris,cornu ceruini,cort. citri, masti-
chis,macis, nucis muscatæ, ana ʒj. spicæ nardi ʒ ʒ
panis sacchari ʒij. moschi optimi g.vj. (nisi scemi-
na sit hysterica) fiat puluis. capiat cochlear vnum
quotidie mane.

Inter admouenda sunt fots, ex plantarum cali-
darum decoctis per filtrum vel vesicam applican-
dis:vt absinthij,menthe,sambuci,betonicæ,melisi-
sæ,radicis cyperi,galangæ,cort.citri,spicæ nardi,ca-
lami aromatici, seminis coriandri, florum rorism.
& rosarum. Item embrochationes post fotum ex
oleis calidis & adstringentibus vt absinthino, nar-
dino,de mentha,mastichino meliño muscatellino:
ex quibus oleis mixto pulueris præscripti quadran-
te, fiat ynguentum cum cera alba, & ex triente ce-
ratum quale est Galeni pro stomacho vocatum. V-
tero consulendum est vt in sympathia cerebri: sic
denique in bilioso fluore ex sympathia hepatis ca-
lidioris,curanda est primum causa antecedens,& bi-
liosa caecochymia toti sanguini inspersa vniuersim
quoque è toto corpore reuellenda vacuandaque
est.deinde propria hepatis ipsius sentina priuatim

exhaustiunda est, aut per vrinas, aut per sudores leuiusculos: tandēq; eiusdem hepatis calidior intemperies delenda est tum assumendis, vt elect. triasfantali, tum apponendis de quibus in bilioso fluore. Postremo idiopathia vteri curanda est propria eius specie in singulis sympathiæ differentiis exposita. Hactenus menstruæ vacuationis symptomatum omnium therapeia exposita est: Conceptionis symptomata deinceps percuranda sunt: si modò eiusdem causæ prius expositæ fuerint.

De conceptione.

Est igitur conceptio propria actio vteri, procreatricem in suscepto semine virili otiosam facultatem ad actum propriumque conformandi scetus munus exsuscitans: hæc autem via cōceptrix ab idiosyncrasia vteri prodit, quam globosa cauaque eiusdem figura singulari ope adiuuat, dum semen ipsum intimo suo sinu auidè complectitur: & ad iustum concipiendi, formandi, augendi, tandemque pariendi tempus constanter asseruat. Illa vero conceptio septem dierū est: à quib. inchoatur formatio partium fœtus: hinc ab Hippocrate libro de carnib. & de genitura proditum est: si quod in vtero conceptum est, intra septem dies excidat: nullam præ se ferre partium delineationem, si vero post septem dies excidat, id ipsum in aquam immissum quandā euidentem partium delineationem exhibere, oculor. oris, pudendorum & principum viscerum. Aristoteles quoque lib. 7. de historia animalium cap. 3. quæ

quę intra septem dies primos in grauidis fœminis corruptiones fiunt: eas quidem, non abortus, sed effluxiones vocari autor est: non enim ante septimum diem fœtum & embryonem, sed semen solum in vtero contineri. Procreatio autem & coarticulatio fœminarum in vtero quadraginta duobus diebus absoluitur, masculorum in triginta, atque id vt plurimum, & tempore breuiori paulo, aut longiori. Procreationis, cui conceptio in primis opitulatur, subiectum locusque est totus vterus (hinc naturæ hortus agerque vocitatur) efficiens causa, formatrix facultas à patre semini conferta: materia circa quam fingendam facultas versatur, semen virile muliebri auctum & menstruo sanguine optima vteri constitutio, temperies & figura, adiutrix causa est. calor natiuus vnà cum spiritu à parentibus per coitum semini permixtus causa instrumentaria. Finis denique procreationis est speciei propagatio, naturæque ornamentum. In vtero igitur vt sit fœcundus, moderata temperies exigitur, omniumque excrementorum alienorum & menstruorum penuria, vt duobus, tribus, quatuor, aut pluribus à finito eorum fluxu diebus: figura quoque tum vtriufque seminis tum fœtus ad legitimum pariendi vsque tempus capax: natura denique veneris & coitus virilis auida. Cæterum cum cuiusvis operis principium soleat esse duplex, vnum agens, alterum patiens, siue materiale: in generatione tamen animalium vtriufque vicem gerit vnicum semen masculum muliebri permixtum, & in vtero auctum: ex eo enim partium spermaticarum

omnium prima rudimenta, viscerumque quasi filamenta quædam tenuissima, insidens semini ipsi formatrix facultas in primis exprimit, quæ deinceps carnea mole ex allecto mutatoque sanguine menstruo impleat, alat, augeat: & præscriptis à natura terminis tandem perficiat. Hoc tam diuino conformationis partiumque fœtus descriptionis munere facultas ipsa formatrix perfungitur, calore nativo, spiritumque à parentibus adscititio adminiculante, à quo semen totum perlustrante, variasque feminis portiones distrahente: diuersæ quoque partium substantiæ suscitatur, ut putà neruearum, membranarum, ossæarum, quæ à præsentī facultate informantur: sed enim ex seminibus duobus maris & fœminæ, masculum solum fœcundum est: utpote præcalidum & siccum, indeque album, crassum, lentum, bullosum, ex coctionis probitate & spirituum mixtorum vbertate. Atq; hæc maris temperies calida siccaque ex multis tum causis tum corporum & animorum affectionibus perspicua est: Primum enim mares è semine calidiori dextri testis maioris & densioris gignuntur. Hinc ligatio sinistri testis: & leuatio cruris dextri in coitu, prolem masculam maturat. Idem in dextro vteri sinu aluntur: utpote calidiori, ob viciniam & rectitudinem hepatis: vnde sit ut dextræ omnes partes sinistris sint calidiore & robustiores. Aluntur quoque sanguine puriori è vena caua infra emulgentem tracto. Huc spectat quod à coitu, fœminæ in dexterum latus decubitus prolem masculam iuuat, sicuti naturæ quoque sanguinæ vel biliosæ ætas ab adolescentia ad constantem. Deinde masculi fœtus velocior est in vtero formatio, ut in triginta diebus, motusque

que validior, celerior & frequentior, purgatio puer
peræ breuior, vt 30. dierum, cavitates omnes vaso-
rum, thoracis, & asperæ arteriæ ampliores. Hinc
pulsus maior, vox grauior, tardior extra vterum ac-
cretio, vitæque diuturnior, ob crassi lentique humo-
ris primigenij extensionem difficilem & dissipatio-
nem. Habitus nigrior, densior, porosior, grauior,
constatius iudicium, ferocitas magis implacabilis
vires tandem omnes robustiores. Postremo à cali-
dis causis omnibus, tum cibis, tum medicamentis
mascula soboles propagatur: Eiusmodi est diæta ca-
lida siccaque, quæ sit omnis ingluuiei, temulentia,
cruditatis, frigoris, inedia, metus, & tristitia ex-
pers. Item purgatio omnium corporis excremen-
torum per octo vel decem dies ante mensium eru-
ptionem, moxque à fine mensium, vteri corrobo-
ratio per sumenda, admouenda, & immittenda in
vterum remedia, quorum in profluuiio muliebri al-
bo meminimus. Contra verò temperiem scæmina-
rum frigidiorē & humidiorē esse earundem o-
rigo satiusq, & corporum animorumque accidentia
clarissimè demonstrant. Oriuntur enim illæ à frigi-
diori semine testiculi sinistri, minoris, magisq, flac-
cidi, quod è sanguine magis seroso & ab emulgente
sinistra hausto conficitur, alunturque in sinistro v-
teri sinu ob hepatis distantiam, frigidiori. Inde ac-
cidit, vt scæminarum semen sit tenuius, liquidius, a-
quosius, minusque album, vires earundem omnes
languidiore (robur enim calori & spiritui tribuitur)
capillitium densius, tenuius, productius, cum calo-
ris sit poros dilatare, pilos incrassare & aliquando
crispere; vasorum omnium, thoracis, & asperæ ar-
teriæ angustia maior, ynde minor pulsus, vox magis

exilis, remissioris caloris indicium, clunium amplitudo, ossiumque ischij & coxarum ad facilem tutāq; foetus gestationē, habitus obesior, laxior, læuior, magis grauis, magisq; glaber vt pote minus porosus, sanguis crudior & abūdantior, vt quē non dissoluat calore qui infirmus est, cōformatio in vtero tardior vt in 42. dieb. motusq; tardior, vt circa 90. diem, in viris autem circa 40. idem languidior & rarior est, quia tenuius semen ab infirmo præsertim calore serius cogitur & inspissatur: eduntur tamen eodē, quo mares, tempore, quia quantò tardius formantur, tanto citius formatæ iustum incrementum consequuntur, extra vterumq; citius crescunt, pubescunt, vigentq;, & sapiunt ob faciliorem tenuis & liquidi, quam lenti crassiq; seminis productionem, citius senescunt & moriuntur ob velociorē humoris primigenij dissipationem, genitalia deniq; intus cōdita sūt infirmo calore foras illa nō extrudēte, vt ait Galē. vel potius natura ipsa foetus securitati isto situ prospiciēte. Itaq; marē vocare cōsueuerūt qui in alieno corpore generat semine per erectū colē, quasi per siphonem in vterum instillando, fœminam quæ intra se: ideoq; genitalia eius interior situs decuit, ad excipiendum fouendūq; semen virile, & fundendū menstruum alimenti gratia. Est enim Aristoteli virile semen coagulo simile in casei concretionē: & menstruum lacti: proinde illud recte quoq; asserēbat Arist. vim habere accedendi ad omnia, id est informandi omnia mēbra animalis, non solum in genere, vt humanum humanas partes, equinū equinas: sed in specie etiam vt semen Socratis Calliæ filij partes gignat. Iā vero seminis virilis tēperies & energia non solum à causis internis, vt ætate & natura frigida

gida viscerumq; vitiis, & externis omnib. perfrigerantibus: sed à mixto etiam semine muliebri impuroq; menstruo tam valde debilitatur, vt muliebri simile euadat, maxime autem ab vtero. Vt enim grana tritici per pluuiosam tempestatem ab vliginosa terra in loliū & auenam sterilem degenerare solēt: sic semen virile ab vtero frigido humidoq; mutari in muliebri cōtingit: sicuti caliditate eiudē vteri frigidum semen incallescere solet. Hinc fœminę iuuenulæ ex seniorib. maritis mares concipiunt: sed ex senioribus fœminis iuuenes mariti mares non generant, nisi prius vterus arte recalfactus sit. Hinc quoq; eadē fœminæ ex iisdem maritis, sed diuerso tēpore, mares concipiunt & fœminas: illos quidem primo, secundo, tertio, aut quarto die à fine mensiū: has vero aut initio eorundē aut serius post fluxum. hæc tamen vteri vis semen virile mutatura insignis & vehemens intelligi debet: aliàs semini virili proprium motum relinquit integrum. Triplicem quidem liberorum cum parentibus similitudinem tradunt: vnā speciei, alteram sexus, tertiam formæ aliorūque tum animi tum corporis accidentium. Primam è specifica differentia facultatis formatricis oriri volunt, sicque hominem ab humano semine: equum ab equino, & immixtis diuersi generis animalium seminibus, fœtum matris speciē referre, vt ex ouis hirciq; cōgressu ouē: quod materia plurima à matre, vt semen & menstruū toto prægnationis tempore conferatur, quam formatrix facultas sequatur, cū futuri operis apparatus quendam contineat. Secundam dicunt ex seminis temperie emergere: ex qua calida siccaque mas, ex frigida humidāque fœmina educatur.

Tertiâ à differētia indiuiduali non specifica facultatis formatricis in membris paternis residua: quorū ideā semini in testib. inducit vehēte calore & spiritu natiuo. Formā autem hic pro delineatione & descriptione partiū vsurpamus. Nec vero liberorum cum matribus sexus aut formæ similitudo; seminis muliebris menstruiq. fecunditatem testantur: sed potius seminis virilis, in quo solo facultas generatrix insidet, intēperiem frigidā humidāq. prodit, & quidē vel per se crudioris, vt puta ætatis iunioris seniorisue, naturę valetudinariæ & diætæ intemperantis & intemperatæ vitio: vel à muliebri semine copioso mēstruoq. oppressi: vel denique à frigidi & vliginosi vteri cōmercio mutati: tunc enim & sceminā & matri similem profert, sicuti marē vsquequaq. patri similem cū in menstruo & semine muliebri caloris spiritusq. affluentia excellit: sin virile semen cum vtroq. paribus gradibus, illo quidem caloris, hoc frigoris certet: marem quidem sed matri magis similē suscitabit, quod à viro caloris energia maior, à fœmina materia copiosior, quā formatrix facultas sequitur, generationi fœtus cōferatur. Quod si diuersis partibus suis vtrumq. parentum exprimat fœtus, istam sane figuræ varietatē vna eademq. formatrix facultas seminis virilis, fœtui insculpsit (tamen si solas paternorum membrorum ideas ipsa complexa sit) vel quod ineptam materiam non potuit facultas motu satis valido fingere: vel quod non æque ab omnibus seminis portionibus ad fingendas partes fœtus pulsata est: dum quædam earum portionum vincunt: aliæ vincuntur. Quæ denique fœtui cum auis atavisque formæ & figuræ similitudo intercedit (cum neutrius victoria est,

masculi

maſculi aut muliebris ſeminis inenſtruique) ea quidem ex reliquiis caloris ſpiritusque eorum effingitur. Atque hæc quidem ſimilitudo formæ & tēperiei ad quartam generationis ſeriem retro pertinere putatur: in qua matrimonia prohibentur (eccleſiaſtico ritu) morbique hereditarij à medicis metuuntur. Quamobrem formæ indiuidualis ſimilitudo non temperiem principiorum generationis ſequitur, cum multæ ſceminæ patrib. multi mares matribus ſint ſimiles, nec tamen illę à calidis, hi à frigidis principiis naſcantur: ſed à formatricis facultatis robore ob copiam materiæ, niſi à præpollente imaginatrice facultate formatrix vincatur. Illa enim reliquias tum animales tum vitales tum naturales facultates tam imperioſe regit, vt motus, vociferationes, ambulationes dormientium cōmoueat, mœrorem, triftitiã, hilaritatē, rerumq; diu & ſerio cogitatarū imagines in fœtu ipſo exprimat; nō id tamē accidit in ipſo coitu: quo facultates animales oēs principes & imaginatrix ipſa quoq; lāguere ſolet: nec in cōceptu: qui quòd nondū animatus ſit, nil oīno effingat (cū ſit anima corporis viuentis animatiq; eſſentialis forma, omniūq; eius actionū cauſa primaria) ſed toto conformationis tēpore, quę imaginationis vi ſepe cōmutatur. hinc appetiti negatiq; cibi per picã & malaciã grauidarum, figura colorq; in fœtu ipſo exprimitur: hinc cuiuſq. rei quæ mulierem prægnantē vehementer terruit aut exacerbauit imago in fœtu cōſpicua remanet: cuius deformitatē mulieres ſolēt à parte nuda obuiaq. ad occultã & veſtib. teſtam admotam manu trãſſerre. Hic etiã ex matre alba æthiops fœtus, hinc excludūtur pulli, lepufculi, hinnuli, cæculiq. & ouiculæ Iacobi ſimili rerum colore matrib.

cōformationis tempore obiectarunt. Hinc denique multo maior in hominum quam reliquorum animalium genere formæ varietas est & dissimilitudo ob multiplicem humanæ imaginationis varietatē, & ingenij celeritatem. Tanta denique, tamque imperiosa imaginatricis facultatis violentia est, ut quācumq; rem & quamlibet obscœnam alienāq; cōstanter cōceperit, eius ipsius speciem fœtui fœtq; aliquandō insculpat, abortūq; etiam prouocet. Solet enim ex rei vehementer appetitæ priuatione, ingens animi ægritudo & molestia sanguinē tam valde cōmouere, ut eum ex vtero, vnāq; fœtum ipsum sēpe excutiat. Quid? quod fœtantē scēminam præsertim natura debilem & iracundam perimere haud raro visā est? Macrinam cuiusdam Torquati consulis Romani vxorem prægnantē, dum Ægyptij cuiusdam monoculi per vicum ante ædes suas prodeuntis (cuius videndi auidissima erat) aspectū sibi sua spōte interdixisset, ne absente marito, tum cōtra Volchos bellū gerenti, aut fores ædium suarū egrēdi, aut caput proferre ē fenestra cogeretur: extinctā repente fuisse narrat M. Aurelius: Itaque senatuscōsulto honestis scēminarum prægnantium desideriis tum cautum fuit, ne quid illis negare cuiquā lice-
ret. Inde etiam vulgi nostri opinionem ortam esse probabile est: hordeolum illi, quicumq; secus faxit, in oculo nasciturum, i. corporis turpem aliquā maculam foras erupturam. Cēterū vis hæc imaginatricis, tam eximia primo cōformationis tempore potissimum viget, molli adhuc semine, cogitationum simulachra facile & celeriter admittente. Hęc autem ab imaginatione inducta formæ similitudo non parentum est, aut maiorum, aut auorum, atauorum: sed peregrinorum rerūq; monstrorū

& belluinarum. Quod ad fœdas faciei aut cuiusvis partis fœtum maculas attinet: aut à turbata vehementius fœminę prægnantis imaginatione, quo tēpore formatrix negotiatur, cōmotóq. in hanc vel illā embryonis partē sanguine: vel partis peculiari in tēperie alimentū corrūpentis in fœtu, vel alieni cuiusdam humoris in eandem insultu, vel deniq. graui aliquo ictu aut casu aut cōpressu infligi incutique contingit. Sexus autem similitudo prouenit ex temperie feminis totius, nō cuiusdā in semine portionculæ, à genitalibus deriuatæ: nec enim à singulis parentum particulis, sed è genitalibus solis seminalis substātia decedit: solāq. facultas formatrix ad semē in testes cum spiritu & calore ab omnibus paternis membris accedit: cuius ratione semen quidem est manus indefinita, & facies, &c. Itaque non ex solis genitalibus, sed ex omnibus corporis animiq. accidentibus sexuū discrimen notari solet, vt capillitio, barba, voce, habitu, morib' & studiis. Cōstātque omnib. causis calidis internis externisq. mascula proles: sicuti contrariis fœmina. Natura enim calida vt sanguinea & biliosa mares: frigida humidāq. fœminas: adolescentia iuuentus & cōstans ætas mares. Sic diætā calida siccāq. & tēperans mares: eadē frigida humidāq. crapulosa, otiosa, somnolenta fœminas. Sic ventus Aquilonaris, & regio, & hyems, mares. q̃ viscerū calor tū vegetior sit: semēq. magis coctū & elaboratū. Cōtra regiones æstuosæ, austrini venti, ætas & autūnus, fœminas. Sic dexter vteri sinus calidior mares, sinister frigidior fœminas. Sic triduū primū à cessione mensiū mares (quòd ob recentē fluxum vterus sit calidior) reliquum spacium potius fœminas. Voluptas denique & licentia in coitu

maior mares; metus foeminas profert. Sexuum quoque in geminis ex eadem seminis temperie discretio est. Illi enim alias eodem, alias diuerso eduntur sexu: nam è similari coëctoque exquisitè & æqualiter semine toto, mares ambo: à crudiori minúsque elaborato foeminas: at verò ex dissimilari eiusdem portione magis coëcta, mares: ex portione crudiori & inualida foeminas proferri constat. Non enim prima secundaque aut tertia per coitum ei aculatione semen pariter laudatum emitti putat Hippocrates. Oportet autem semen id, à quo gemellorum ortus est, vno coitu totum, non pluribus effundi, eodémque die concipi, foëtumque tandem excludi: nam si pluribus coitibus conceptus, partusque diuerso tempore contingant, quamuis breuiore, vñ quinque, aut sex, aut octo dierum: hæc quidè superfœtatio crit, nō gemellorum partio, dum primis illis diebus vterus nondum valde conuiuens virile semen facilius suscipit. Geminis eiusdem sexus obuoluendis in vtero vnica secūdina satis est: alias cuiq; sua obtingit. Singuli quoque foëtus, quocunq; sint sexu, suos cum cotyledonib. nexus suaque vmbilicalia vasa venas & arterias sortiti sunt. Porro geminorum procreandorū causa duplex est, tum seminis copia plurib. gignendis foëtibus idonea, tū eiusdè in vtrumq; vteri latus dextrum sinistrumq; (sinum vteri vocāt) æqualis diuisio. Est sanè vteri vt vesicæ & stomachi vnica cavitatis, nullo diaphragmate aut mediastino, vel membraneo vel carneo intus dirēpta: sed vnica linea alba vt in scroto per mediā partem foris descripta. Itaq; foemina humana sæpius vnicum aut duos foëtus simul cōcipit, vicissimq; parit. Ideoque duas illi tantū mamas natura affixit: nō
solum

solum vt vna ob morbum feriente, altera cōmune lactationis officium expleat: sed vt duobus geminis lactis simul suppeditet alimentum. Plures tamen aliquando vt 3. 5. 7. & aliquando centum vno partu editi domesticis referuntur historiis: ob solā seminis vbertatē, siue cellularum vteri multitudinē, quę in multiparis animalib. vt suib. & canib. conspicua est, quibus mām arum fœtuūmq; numerus rēspōdere videtur: quibus iungenda est vteri amplitudo, fœtum, atque secundinarum exiguitas, maturāque vt septimestris partio. Deniq; de varietate sexuum sic habeto. naturæ supremæ & vniuersali eā quidem ad generationis vsum propositā esse: ideōque eius gratia, genitalia diuersa efficta, colem & vterum: vt ab illo semen, ab hoc cōceptui locus suppeditetur, fœtusq; cōformationi, allecto menstruo ad nutritionē auctiōnēque: at particularis vnicum masculum sexū cōsectatur: ex propria seminis virilis prolifici temperie: ex qua indiuidualis, & propria facultas formatrix existit. Sepe tamē ob seminis vitiū & intemperiem frigidā, siue propriam, siue ex mixto menstruo & semine muliebri acquisititiam, quasi errore quodam, naturę & formatricis indiuidualis, fœmina excitatur. vnde mōstrum & imperfectio vocitari quibusdam cœpit. Nec vero imbecillitatis maternæ & ægritudinis expressa in liberis vestigia muliebris seminis menstruiq; sanguinis fœcunditatem vllam insinuant: sunt enim corporum ista accidentia, nō ē facultatis formatricis vitiis: sed ex seminalis menstruæq. materię, ē quib. fœtus ipsi in vtero inchoantur, augentur, perficiuntur, intemperie orta. Hęc vero intemperies aliās est insita, totique corpori cōmunis, vel particularis: alias adscititia, lōgāq. causa-

rum externarum cōsuetudine confirmata: vel recēs
 & ob insitæ adhuc vigentis naturæ repugnantiam
 debilior: vt in febribus putridis: quæ idcirco à pa-
 rētib. in fœtus trāseunt rarissime. A reliquis intēpe-
 rierum tum cōmunium tum particulariū speciebus
 morbi oriuntur tam similes quā organici, hæredi-
 tarij vocati, quod istorum hēredes non minus quam
 bonorum liberi esse soleāt. Hinc biliosæ matres, ne-
 dū patres, iracūdos: melācholicę mœstos & timidos:
 atrabiliarę feroces & maniacos: pituitosa segnes &
 torpidos fœtus edūt: hinc gibbosę gibbosos, claudę
 claudos, mācā mācos, arthriticā arthricos, tabidā
 tabidos, calculosā calculosos pariūt fœtus: sæpe ta-
 men ab ægra parte aut corpore tam exigua seminis
 portio ad conceptū accedit, vt alterius parētis tem-
 perie cōmuni vel particulari robustaq; facultate fa-
 cile vīcatur, & corrigatur: quanquā est paternę mul-
 to facilior crebriorq; quā maternę intemperiei cor-
 rectio: quod à matre generādo, alendoq; fœtui mul-
 to plus in vtero materiæ seminalis & mēstruæ: deīn-
 de extra eundē totū alimētū ex lacte cōferatur. Ac-
 cedit eiussdē vteri sana cōstitutio, qua vitiosorū se-
 minū vitia vt frugū à feraci fertiliq; terra emendari
 solent. Itaq; corporis paterni vitia rarius quā mater-
 ni in fœtu respōdēt: sēpiusq; claudi, cēci, gibbosi, ar-
 thritici patres liberos tollūt saluberrimos, omniūq.
 istorū vitiorū expertes: matrū quoq. virtutes, nedū
 corporū vitia, fœtus multo plures, quā patrum æ-
 mulātur, fiūtq. pleriq. abstemij, temulēti, horū vel
 illorū ciborū diligentes, vel negligētes, ob similem
 matrū grauidarū cupediā, picā, malaciam, sicuti ab
 iisdem pleuriticis aut quaternarijs grauiditatis tem-
 pore, pleuritidi & quartanis febrib. obnoxij totam
 vitam

vitam traducunt. Eadem est autē morū, ingeniorum studiorumque à parentibus in posteritatē è principiorū tēperie transfusio. Itaq. præclaris maiorū virtutibus nepotes decorari, sicuti turpissimis facinoribus dedecorari solēt: nimirū utrūq. generationis principium semē & menstruū indelebilem parentū temperiei ideam in conceptum ipsum deponunt: vnde virtutum omnium vitiorumque primordia atque sanitatis & ægritudinis rudimenta fluere in prolem cum hæreditate solent.

Quæ autem sublimioris sunt facultatis supra temperiem, & vegetatricis animæ corpoream facultatem, quæq. intelligētia, iudicio, studioq. cōparantur artes & discipline, hereditarię nequaquā esse possūt.

Hactenus generationis animaliū (vt cuiuslibet actionis principia duo) satis accuratē demonstrata sūt, vnū effectiuū, alterū materiale. Illud semē est masculū fœminino auctum: illud enim ob caliditatem est fœcūdum: hoc ob frigiditatem sterile. Posterius sanguinem esse menstruū quo inanes partium simpliciū ex semine ductæ fibrę implētur, partesq. ipsæ in vtero alūtur, & tātisper augētur, dum grādiōr fœtus excludatur. Super sūt aliquot eiusdem argumenti enarrāda capita: an semē sit principiu duplex actiuū & passiuum: an à parentibus an à seminis potētia facultas formatrix excitetur: tum an ipsum semen actu sit vel potētia animatum: tum an eadem sit cœlestis vel elemētaris: tum deniq; quæ signa sint conceptus cōmunia, diagnostica, & sexuum signa distinctiua. Seminis masculi duplicem vim esse, actiui, passiuique principij, tum ex formæ id est effigiei, quæ facultatis formatricis propria est: tū ex accidentiū corporeorum fœtus cum parentib. similitudine,

quæ à materia est, clarissime antea disputatū est: nec tamē illud ipsum semen agere pati; circa idē & à seipso mutari: quin potius ab insidēte facultate formatrice in fœtuum partes conformari seminis substantiam totam putandū est. Facultatis autē illius origo nō in seminis ipsius potentia locanda est: cum ex solis testibus ipsum defluat, in quibus instar lactis in mammis, ex cōmuni partiū omniū alimento id est sanguine elaboratur; nam si ex partibus solis principibus effluuium statuatur, vnde quæso vnguim, barbæ, capillitij parentū similitudo in liberis extet? si à partibus spermaticis solis, vnde partiū organicarū formæ similitudo, quarū tamē propria est, exprimatur? si à solis organicis, vnde simplicium partium, vt cutis, pilorū, vnguim eadē similitudo? si denique ab vtrisque & organicis, & simplicibus; vnde singularū similitudo, cum ipsæ inter se cohæreant? quin etiā si manci patres, nō mancos liberos, claudi non claudos, & deauriculati non deauriculatos aliquādo generāt, cōformatio certē ipsa ad facultatē quandā formatricē semini insidentem referenda est, quæ à paternis mēbris omnibus in quibus residua erat, per coitus ardorem cum vapore emicās calorigue vitali & spiritui mixta ad testes in semen fœcundum illabitur, ex quo simillimum parentibus corpus, quibus præfuerat, sine singulari tamen partium seminali materia in vtero facultas ipsa cōformet: semē enim fœcundū, est materia gignēdarum partiū omniū cōmunis, quæ à facultate tanquā opifice in singularū decentē figurā & substantiā dirigitur: facultas autē ipsa aut ex omnibus vt dictum est partibus, aut è principibus potissimū ad semē accedit. Est vero animalium plantarumque semē poten-

tia

tiâ sola animatû: si enim in semine generatoris canis statuatur actu anima generandi canis, illa quidē nō erit actus primus, formâque essentialis & causa actionum omnīū primaria, cuiusmodi ab Aristotele definitur, corporis organici viventis, cum semen paternum primis saltē à coitu septē diebus nōdum corpus sit delineatū & instrumētis ad actiones formatum quibus carere anima nō potest: Ea autē potētia intelligenda est, non remotissima, mediave in qua actui principij nihil est, sed per alterationē & præparationē materię acquirēdum: sed propinquissima actui formali in quo effectiuū principium totum est: vt citra alterationē materię operetur: vbi materiā & locū idoneū inuenerit. Excitatur autē & educitur in actū propria agentis vi, qui calor & spiritus est vitalis à patre semini inditus, indeq; in embryonē & tādē in perfectum animal trāsmittēdus: per quem denique suę speciei fœtum in vtero pater generat. nec enim calorē seminis à patris calore differre, nisi numero, putādum est: cōceptus enim nondū animatus est, nec quidquā moliri & efficere possit. sic actus primus dicitur potētiâ ad secundum idest ad functiones propinquissimâ. sic anima seminis collata ad animas iâ formatorum animalīū dicitur potētiâ, cum illę iam operentur. Caro quidē in parte vulnerata succrescit, sed à carne partis viuētis nō à sanguine ipso genita: sic ex semine animal formatur actu animatū, cū ante formationē sola potētiâ: sic plātarū semina dum partes sunt viuētium viuunt, alūtur quoque & augētur: sed medio tempore quo in granariis asseruantur, tametsi figurata & organica sint: ex partibus suis similaribus: nequaquā tamen actus: sed potētiâ propinquissimâ viuūt, tātūma-

que egent loco & alimēto in terra idoneo, eiusq; calore, à quo illa excitetur. Sic ova volucrū viuētium partes sunt & simul viuūt, donec formatrix facultas à proprio agēte, id est calore infuso per incubatum gallinæ excitetur. Licet ergo vere affirmare semē nō actu sed potentiā propinquā animatum esse: eadēq; potentiā, viuere ali & augeri: omnesque functiones perfecti animalis & viuētis obire: nec eā tamē animam de potentia materiæ remotæ aut media excitari, cū sit à parentibus immissa. Verum enimvero de formatricis facultatis origine variis certatur opinionibus: Minime .n. Deus formationis author censendus quibusdā videtur, cū nec tam egregiū artificem vilissimorū animaleulorum, vt muscarum, vermium, serpentum: nec tā sapientē authorē monstrorū passim occurrentiū, deformitas deceat. Minime fortuna, cū enim perfectorum mixtorū siue plantarū siue animalium delineatio facultatis formatricis propria sit: omniumq; partium ad necessarias functiones congruæ magnitudinis, figuræ situsque & substantiæ descriptio, nemo nisi prorsus amens tā artificiosam molitiōē in fortunæ temeritatē referre poterit. Minime natura: quæ cum ex elementorū permittis inter se substantiis & qualitatibus primis constet: nihilq; ab eorū tēperie distet, lōge sane à tā eximia conformationis dignitate distat. Minime denique anima humana, quæ alieni potius ædificij inquilina est, & in corporibus hominū hospes & peregrina, quæque etiam non nisi ab alio prius artifice condita cælitus aduolat. Est igitur facultatis formatricis origo valde dubia: neque utrū vel cælestium vel elementariū generi tribuenda sit, certum satis raturq; indicium esse videtur. Est ta-

men

men quæstio hæc sapientum ponderibus hoc pacto exigenda. Etenim viuentiū corporum à non viuentibus discrimen vnum per animam est, illorumque differētia tres, plātarum, brutorum, hominumque: non ex animæ quidem essentia obscura nostrisque sensibus prorsus occulta, sed ex conspicuis eiusdem obuiisque operibus diuersis. [Prima est stirpium: quæ solis animæ vegetatricis viribus eduntur, aluntur, augentur: Altera brutorum, quibus motus sensusque ex sentiente anima communis est. Tertia est hominum, quorū ratiocinatio & intelligētia propria est. Cū igitur singulas istas viuentium corporū differentias, singula constituent animarum genera: plura quidem in eodem subiecto sibi vicissim succedere videntur, vt in bruto vegetans & sentiens: in homine tum priora illa duo, tum etiam intelligēs, quæ discreta tamen in eodē non sunt. Sic enim consulis speciebus idem esset corpus viuens & brutum & planta, idemque homo brutum & planta, pluresque omnino mortes obiret. Sunt ergo dominantis & excellentis animæ facultates vel partes habendæ quæ animarum nominibus vocitantur: singulorum autem animæ generū variz sunt functiones gestionesque, vt vegetatiuæ procreatio, nutritio, auctio, harūq; sociæ vel potius ministræ, attractio, retētio, coctio, & expulsio, vt sentiētis animæ sensus quinque, motusque communes & particulares: vt intelligentis dianœa, non illa quidem passiua, rerumque suscipiendis speciebus obnoxia: sed actiua: quæ cōceptas prius notiones discernit & diiudicat: hæc enim est intellectus ipsius propria actio omninoque triplex, Vna simplicium, vt canis, plantæ & cæt. quæ falsitate omni caret: Altera coniunctorum, vt cum ho-

mo dicitur animal rationale: in qua verum falsum-
que sæpe occurrit. Tertia est syllogismus, cum con-
iunctis alia quedam adduntur, vt inde aliquid aliud
cōcludatur. Intelligentem igitur animam, quod fun-
ctiōnes omnes suas sine vllō instrumentō corporeo
exerceat, incorpoream, immaterialem prorsusque
diuinam esse oportet: neque in semine paterno vl-
la potentiæ differentia desiderare aut à proprio agen-
te suscitari: sed confirmato iam suisque partibus o-
mnibus absoluto foetui cēlitus instillari. Est quidem
plantæ perfectus actus: vt illi nihil præter corporis
accidentia possit contingere: at animalium actus im-
perfectus est. Primum enim bruta plantæ more ve-
getatrice anima pollent & viuunt in vtero donec
perfectior anima sentiens successerit, vbi in foetum
delineatum versus est: sic homo ex planta fit ani-
mal: tandemq; homo, post intelligentis animæ, quæ
sola hominem informat, immigrationem. Est igi-
tur acerbum auditu credituque nefas, hominem à
sole & ab homine generari. Dicendum potius ab
homine tantum hominem inchoari, dum partes
singulæ corporis ex semine eius figurantur: sed à
Deo solo perfici, immissa cēlesti anima. Hinc homi-
nis est momentanea generatio: brutorum plantarū-
que lenta magis & tarda, dum essentielles eorum for-
mæ è potentia propinqua in actum à calore natiuo
parentum semini mixto excitātur. non est igitur a-
nima humana in corpore vt nauclerus in naui, vt
Stoici sentiunt, nec vt auriga super equum, vt Acade-
mici: sic enim oporteret animam esse corpus & in
certo loco à corpore vacuo, nec vllam corporis par-
tem esse animatā: aut certe à corpore corpus pene-
trari necesse erit: nec vt incorporea forma ad vnius
homi-

hominis hypostasin constituendā. Nā si duæ hypostasessunt anima & corpus, quādiu simul sunt, nō eget anima corporis physici formā: quæ enim penitus auulsa sunt, & à corporibus distracta, motoris officio non formæ funguntur. Est igitur in corpore veluti forma in materia: estque vna vtriusque hypostasis, nullo alio inter vtramque intercedente. Brutorum quidem animæ omnino in materiam demersæ sunt: & cum ea sic concretæ vt separari sine subiecti interitu nunquam possint. Hominum anima media est inter formas separatas & non penitus abstractas à corpore, nec tamē corpore sic affixa est, vt non sit separabilis & aliquando solitaria futura post interitum subiecti sui. Non est denique ea priuatim, aut in corde, aut in cerebro: sic enim oporteret reliquum corpus esse exanime: sed per vniuersum corpus diffusa est. Galenus libello quodam intelligentem animam, nil aliud quam quatuor qualitatū primarum temperiem, omninoque elementarem illam esse & caducam argumentatione triplici colligit: tum quod ab insigni qualibet intemperie tam insita quam aduentitia & morbifica facultates eius omnes functionesque deprauari, imminui, penitusque obliterari contingat: tum quod anima intelligens, si incorporea esset & immaterialis, extendi per totum corpus diffundique nullomodo posset: tum denique quod si incorporea eadem sit, non vni magis quam alteri parti corporis humani conueniat. Atqui irascibilis animæ facultas cordi, naturalis hepati, ratiocinatrix cerebro attribuitur. ratiocinatio sanè hæc futilis omninoque physica auctoritate indigna. Vt enim do-

E e

labræ, ferræque vitij fabricorum opera turbantur: sic cerebri intemperiei unionis & conformationis morbis intelligentis animæ alioquin & per se integræ functiones perturbantur. Deinde anima nisi tota in toto corpore statuatur, corporis pars una vitæ particeps: altera eiusdem expers erit: multo minus si corporea sit, & exigua, cum tanta corporis mole exæquari possit. Postremò quòd omnibus partibus corporis non æquè videatur congruere, variâsque facultates suas variis exercet instrumentis, id diuersa efficit partium temperies & figura diuersis animæ functionib. accommodata. Quamobrem animam humanam cælestem prorsus diuinamque esse, quodque proprias actiones suas intellectus sine corporis adminiculis exequatur, vere licet concludere. At vero vegetantis plantarum & sentientis animæ brutorum originem ex quatuor mundi elementis verisimiliter deducunt; ex quorum multiplici permixtione omnes tum materiæ secundæ tum formæ substantialis differentias prodire verbosa inductione disputant, tum figuræ corporum in eadem specie, tum brutorum animorum propensionis (non omittunt fructuum frugumque speciei eiusdem pro varietate soli, cælique & culturæ differentias prope infinitas) quorum varia discrimina variarum mundi regionum temperamentis respondeant; hinc illos homines proceros robustosque, hos paruos & debiles, illos calidos & humidos vel siccos, hos frigidos, humidos vel siccos, illorum vocem grauem, oculos caecos

sue

siue virides, horum vocem exilem, oculos nigros: illorum capillos flauos, cutem albam, horum capillos nigros, cutem nigricantem: illos calorem, hos frigus metuere: illos hilares, hos tristes: illos audaces & iracundos, hos timidos & mites: illos vrbano & comes, hos solitarios & rusticos, illos ebriosos, hos sobrios & abstemios: illos rapaces & prodigos, hos auaros & tenaces: illos milites, hos philosophos: illos armorum laborumque, hos disciplinarum studiosos. Extremarum autem mundi partium orientalium, meridionalium, septentrionalium & occidentalium populos, omnibus corporum, animorumque, vitiis & virtutibus fere inter se singulos consonare, mediterraneos autem omnium cuiusque extremæ mundi plagæ fere ex æquo participes esse, pronuntiant: diuersas enim huiusce sublunaris globi regiones, diuersis siderum viribus regi, vt Saturni & Veneris meridionales, Martis & Lunæ septentrionales, Iouis & Mercurij mediterraneos, Solis ex æquo omnes, quinetiam eandem corporum & animorum varietatem eiusdem prouinciæ incolis pro vario situ & temperie obtingere, hinc monticolas bellicosos, robustos, industrios, fures, frugales, & sobrios; maritimos versutos, cautos, fallaces: mediterraneos simplices & effœminatos: item sub ventis tranquillis, sedatos mores; sub violentis turbulentos. Postremo à legibus quoque, religionibus, consuetudinibus, victu & exercitatione, vt temperamentum, sic mores studiaque hominum permutari: vt vere quidem acuteque vegetantis &

sentientis animæ elementarem originem sibi demonstrare videantur. Demonstrationem quoque illam suam appositis quibusdam ratiunculis tuentur acriterque defendunt. Primum quidem eò quod si anima sentiens non ex ipsa subiecta materia, sed foris ad plantam, vel brutum accedat, illa sane non forma, sed accidens corporis erit. quidquid enim actu existenti accidit, id ipsum accidens vere vocatur: Deinde si foris, in subiectam materiam migrare utraque anima fingatur, tunc omnis generatio æquiuvoca, genitumque & gignens diuersæ speciei erunt, ut in muribus scilicet, ranis, cæterisque animalculis ex putredine procreatis euenit: quum alioqui animalium plantarumque generatio ut plurimum vniuoca sit, omninoque proles cum parente speciei eiusdem, in iis scilicet quæ ex semine generantur: sic ex equo equus, ex lactuca lactuca propagatur. Insuper si extrinsecus animæ illæ duæ assumantur, illas ipsas aliquando solitarias fuisse necesse erit; cum tamen physicorum corporum partes essentielles & integrantes sint; à quibus abiunctæ cogitari nullo modo possunt: sicuti nec materia à formis, sine quibus potentia mera est, ensque imperfectum prorsus. Quinetiam si formæ per se consistent: corporibus annumerandæ erunt, quorum proprius motus est, fietque vnum ex duobus actu existentibus, quum tamen quod actu iam est, fieri denuo nequeat: sed quod potentia sola est. Momentaneam denique plantarum & brutorum generationem, ut hominum esse oportet,

teret ; eget tamen alteratione multiplici subiectæ materiæ, ex qua excitetur. Enimvero eandem de elementari formarum inferiorum origine opinionem suam philosophorum quorundam refutatione stabiliunt.

Vere quidem ab Aristotele pronuntiatum esse fatentur principium motus cælum esse , eius nimirum conuersionem continuam & indefinentem : cuius vi totius mundi sublunaris virtus gubernetur: ab eo tamen generabilium omnium formas minime suppeditari sentimus , quòd in eo tantum communis generationis causa sit; cùm singularis generatio , vt actio quælibet, à propria & definita causa tantum edatur. Itaque nec à sole plantam sine planta, nec equum sine equo, nec hominem sine homine, sed omnes animatorum corporum species à speciei suæ viuientibus corporibus cum sole procreari , cuius viuifico calore ad generandum viuientia omnia excitentur. Sic è putrido cadaueris calore potentiâ proximâ sub eius forma latente solaribus radiis excitato, varia animalcula suscitari: vt apes è vitulo putrescente: ex equino stercore scrabrones: è pituita putri vermes. concurrunt enim ad generationem quamuis principia effectiua duo, commune & proprium, è quibus hoc ab illo ad agendum & generandum commouetur. Platonicum etiam formarum naturalium è mundi anima promptuarium facetè sane meritòque substantiant, dum quærunt an mundus plantarum, animalium, hominúmve generi sit annumerandus (nihil enim præterea in mundo conspici viuum) an

Ec 3

saxum, lapides, succi, metalla, elementa denique ipsa viuant? Eadem quippe partium & totius est ratio, vt si illis vita non concedatur, toti meritò detrahatur: ideoque plantarum viuentium partes & furculi & semina non viuunt tantum; sed si inserantur vel seminentur, ex seipsis plantas & arbores suæ speciei proferunt. an tam multiplices rerum genitarum formæ ab vno eodemque authore in secundam materiam infundi possint? an denique si formarum opifex datorque cælum fingatur, genitis corporibus inesse, & adesse possit? cum effectrices causæ omnes extra opus suum consistant. Porro si cælum anima formisque pluribus careat, quas elementaribus corporibus instillet, nec aut planta aut animal aut homo haberi possit, nihil omnino illi superesse potest, vt genita corpora formis exornet, nisi vt Deus quidam fingatur, à quo tamen infinito finitum mundum prorsus interesse necesse est.

Haëtenus ergo inferiores plantarum brutorumque formas esse elementares, totasque ex mixtione quatuor qualitatum primarum oriri multis rationibus & pluribus exemplis disputatum est. Cæterum facultates formarum istarum omnes diuiniori quadam supra temperiem forte constare vigereque ex earundem functionibus operibusque exiniis docemur, nempe diuinam quandam scientiam semini infusam, quæ facultates istas ex eo suscitet, & ad agendum suo tempore impellat. formatrix enim seminis ipsius substantiam formamque in primis mutat: deinde ex eadem

dem corporis partes omnes idonea functionibus suis figura, magnitudine, numero, sitûque, sapientissime effingit : easque certis periodis perficit auget. & ornat : sic dentes omnium ultimos promit, & genitalia vtrique sexui ad fecundisatem & generationem ineunte adolescentia auget, & foeminis mammas ad prolem lactandam.

Formatrici succedunt, altrix auetrixque. altrici adiunctæ sunt quatuor facultates aliæ tanquam administræ operis sui : quas eadem scientia non solum ad agendum ; sed sub ordine agendum impellit : sic attractrix nihil aliud, nisi quod substantia & qualitate alendo corpori simile sit, attrahit : expultrix nihil aliud quam quod dissimile, expellit : sic attractricis operibus expultrix, retentricis auetrix vicissim succedit, nec id per sanitatem solum, in assimilandis alimentis : sed per morbos etiam in vincendis pravis humoribus eadem scientiâ duce morborum suorum remedia, animalia quaritant.

Animales quoque facultates & sensificæ motiæque, ab eadem scientiâ sollicitantur. Hinc ægrotantes plerique imminente morte esitant bibuntque avidius, surgunt alacrius, multi loquuntur expeditè, claudi currunt celeriter, eadem diuina scientiâ ; naturales facultates moventur ad obsequendum animalibus : Sic veneris cogitatione coles distenditur, vterus descendit : semen eiicitur, ventriculus ingrata rei

aspectu nauseat & vomit, oculis periclitantibus manus obuersamus: & inscij conuiuemus & nictamus: appetitarum à gravidis fœminis aut exosarum rerum imagines fœtui imprimuntur: eadem diuina scientia naturalium functionum quæ vitales vulgo vocantur dux & magistra est: hæc enim pulsus differentias omnes, magnitudinis, morus, & ordinis pro caloris natiui temperatione variâ & fuliginis purgatione distinguit: hæc per somnum calorem intro reuocat, vt & per ingratos nuntios & initia accessionum febrilium: contra, per vigilias & lætos nuncios foras effundit calorem à corde: eundem denique per grauiora animi symptomata tam variè commouet & traducit, & cum eo humores partesque, vt qui gaudio exultat aut ira exardescit, vix ac ne vix quidem eodem loco consistat: contra qui æreore & timore obsessus est, à sua sede vix nunquam dimoueatur. Hæc denique functionum naturalium & facultatum doctrina partibus ingenita est: & post conformationem diuinitus insita: cuius ignari omnino sumus nedum partes ipsæ, nimirum cognitionis nostræ duces & authores sunt sensus soli: quorum idolis imaginatio nostra impellitur.

Est profecto plantarum brutorumque natura insitâ quadam & ingenita doctrinâ sine magistris librisque functionum omnium peritissima (hinc docta, indocta que iure censerî potest) quas facultatum suarum partiumque corporis adminiculis sine vlla earum notione exerceat, non secus ac horologia temporum momenta dimetiri & dispensare pro artificis arbitrio & artificio viden-

videntur.

Hæc autem naturæ doctrina ingenita , unde quæso nisi diuinitus hausta ? unde substantia naturæ , nisi cælitus delibata ? unde denique vtraque nisi à summo ente derivata ? nempe natura omnis inferior , influxu quodam diuino , incorporeo , ratione quidem vacuo : sed eximia tamen sapientia prædita : quam præclaris suis operibus suo tempore natura adhibeat.

Instinctus naturalis , insita illa naturæ doctrina vocitatur , elementis etiam primis mixtisque omnibus tam viuentibus quam non viuentibus communis : quo contraria similiaque internoscunt , illaque fugiunt , hæc prosequuntur , fines suos locumque agnoscunt , quem nunquam nisi forte explendæ vacuitatis gratiâ deserunt , qua expleta eundem confestim repetunt. Stirpes quoque eadem doctrina duce , alimentum familiare è terra proliciunt , alienum respuunt : animalia denique conspecto inimico protinus excandescunt : obuio amico exultant.

Quamobrem plantarum brutorumque animam diuinâ supra conditionem naturalem origine constare profiteamur , eamque à summo creatore substantiam suam doctrinamque & facultates omnes accipere contendimus , illamque vim diuinam tum naturam tum facultates eius omnes , naturales vocari : quod anima hæc , inferior temperamento , quod naturæ nomine designatur , calidôque innato adminiculante partium omnium functiones expediat,

quarum occultam doctrinam tacitamque memoriam partibus ipsis formatrix facultas inscruit, quodque functiones omnes sola temperamenti tanquam proximi instrumenti varietate variari contingat. Quod si animæ substantia ad elementarem corporum genitorum materiam & temperiem referatur: liceat sane metalla ob propriam suam temperiem animata affirmare: liceat homini plantam ex calidarum rerum cum frigidis congrua temperatione creare: liceat denique è categoria substantiarum regnoque plantarum brutorumque formas in accidentium insulas relegare, cum temperies ipsa è quatuor primis qualitatibus mixtis conflata qualitas quoque sit. Itaque Galenus tametsi aliquando naturales facultates ab elementis eliciat, earumque substantiam ad unam temperiem referat, alibi tamen formatricem facultatem à quatuor qualitatibus omnino disiungit: hæcque illis tanquam operum suorum idonea instrumenta adiungit, & formatorem alium esse pronuntiat: proinde alibi quoque curiosam nimis de naturæ origine & eius facultatum disputationem, tanquam medico infrugiferam dissuadet, cui temperamēti cognitio satis sit, cum ipsum solum mutabile & curabile sit.

De conceptionis symptomatis.

Conceptionis igitur cum propria sit caloris natiui & spiritus genitui in semine otiosi ad formationis opus excitatio, & deductio, eius
 vt &

vt & aliarum omnium functionum tria possunt incidere symptomata: abolitio quæ sterilitas dicitur: diminutio, quæ difficultas concipiendi vocatur, item raritas & tarditas: denique deprauatio, cuius differentia sunt mola, monstrum, hermaphroditus, & superfoetatio.

Primi secundique symptomatis origo est à causis omnibus: quæcunque generationis principia duo, semen & menstruum sanguineum, vel consumere vel corrumpere, vel ab utero prohibere possunt: vel non attrahendo, vel attractum non retinendo. Causæ autem illæ bipartitæ sunt, externæ internæque: ex illis aliæ consumunt: vt aer impensè calidus aut siccus, inedia, vigiliæ longiores: labor corporis animique immoderatus: mœrores & iracundia: aliæ refrigerant immodicè eadem principia: aer frigidus vel humidus, crapula, aquarum frigidarum crassarumque & montanarum, fructuum crudorum & immaturorum: leguminum, lacticiniorum, acetariorum & condimentorum acetosorum intemperans vsus: somniq; & otij indulgentia nimia: Medicamenta quoque eandem principiis duobus noxam inferunt: camphora enim diutius gestata & aqua vini largius potata eorum substantiam depopulatur: sicuti opium, hyoscyamus, cicuta, mandragora, & aqua frigidior testiculis apposita eorundem calorem & facultatem prolificam restinguunt, obtunduntve: idem faciunt ore sumpta: nisi fortasse parcius & calida natura atque ætate florenti: ab hac enim in crassos vapores soluuntur: à quibus longa constansque tentigo oritur. Internæ causæ alias secundum naturam sunt: vt ætas mulieris, habitus, coitus modus, & tempus.

Aetas enim quatuordecim annis iunior & quinquaginta senior fere sterilis est: Illa enim ætate prima fere fit mensium eruptio: mammis interim extuberantibus & prurientibus, pectine pubescente, lumbisque & capite dolentibus, præ sanguinis copia in caua vena iuxta vterum collecti, sursumque euaporantis: atque adeo libidine flagrante, cum sit feminis & mensium idem prouentus: menses autem sensim augente, ad ætatis usque vigorem: in quo cum aliquandiu æquales substituerint, rursus ad finem usque fatiscere minuique solent: interdum tamen citius, aliquando tardius incidunt conceptus: Sed fœminæ ad decimum octauum annum, viri ad trigessimum fortissimi fœtus sunt. mensium denique quantitas mediocris duarum heminarum est: vario tamen pro ætatis, tempestatis victusque, discrimine. Habitus obesior tenuiorque sterilitatem fere inducit si naturalis sit & à temperie. Ille quidem ob feminis menstruique penuriam in pulpamentum versi ob genitalium partium cum virilibus difficilem applicationem: hic ob vtriusque penuriam à calidioribus visceribus digesti dissolutique. Coitus denique vel importunus: ut qui fit serius post fluxum mensium: vel à muliere feminis proprij excretionem vel tardante diutius vel accelerante promptius ante vel post virum. ita enim refrigeratum præ spiritus dissolutione euadit infœcundum: vel coactus aut violentus ut ab enormi mentula: sicuti & frequentior sterilis est semine prorsus exhausto: vel denique qui fit corpore non bene composito directore ita ut recta subire in os vteri semen emissum non possit.

Rursus

Rursus internæ causæ aliàs præter naturā sunt, vel symptomaticæ, vel idiopathicæ: illæ rursus duplices: quædam toti corpori communes, vt cachexia: icterus: pallidi colores, habitus tumidus, hydrops: leucophlegmatias, febres lentæ & diutinæ, diarrhœæ: ab iis enim vel consumitur, vel contra naturam refrigeratur vtrumque generationis principium. Particulares, viscerum singulorum sunt vt cerebri, pulmonis, ventriculi, hepatis lienisque tumores, obstructions, abscessus, vlcera. Ab iis igitur vtrisque causis sympathicis menstruum semenque sterile & infœcundum, penuriæ aut intemperiei causa, editur.

Idiopathicæ sterilitatis causæ sunt morbi omnes: tum aliarum partium vtero adhærentium: vt vasorum spermaticorum, testium & cotyledonum, quales sunt intemperies frigida testiu: vasorum astrictio obstructio ve: cotyledonū obstructio, à qua sanguis ab uteri sinu arcetur, semenq; ab eorūde nexu & adhæsiōe prohibetur: tum morbi quatuor vteri partium, fundi, oris interni, siue colli vterini, ceruicis pudendi, & pudendi ipsius suis partibus externis vt alis, & nymphis circumsepti: fundum enim inuadunt intemperies quæuis simplices & compositæ: nudæ, & humorales: insitæ & aduentitiæ. Ex iis quæ calidior est, seminis substantiam resoluit: siccior absorbet, frigidior non attrahit, aut attractum extinguit semen, humidior obruit & dilabi finit: Eadem est tumorum præter naturam phlegmones, scirrhi, canceri, abscessus, vlcera, & cicatricis in vteri fundum inuasio, sicuti etiam obliquitates, ascensus, descensus, & procidentia, ob quos omnes morbos semen non excipitur, neque con-

cipitur.

Capacitatis etiam vteri affectiones sunt, amplitudo & angustia immodica, vtraque sterilitatis effatrix: illa enim genituram aut embryonem non satis constanter continet & tuetur: hæc fœtum præsertim grandiolem, non capit: vnde abortus eiusdem capacitatis repletio est ab humoribus vel sanguineis, vel pituitosis, melancholicis, biliosis, serosis, flatuosis, & seminali materia: vnde molæ, hydropes, ascites & tympanites: suffocatio matricis, fluores albi, & aliquando calculus expullulant. Horum omnium mixtione seminis excepti menstruique substantia inquinatur, & temperies violatur.

Collum vteri proprium, quæ secunda pars est, duplici ore vel foramine patet: tametsi idipsum perbreue sit: vno quod angustius est, ad capacitatem vteri: altero quod amplius est, ad cervicem pudendi: per quam semen suscipit, & in vteri sinum transmittit. Vtrumque autem os obturatur aliàs secundum naturam: vt in virginibus, castis viduis, & prægnantibus: sicuti secundum naturam hiare latiusque aperiri in puerperis & menstruatīs solet. Aliàs contra naturam clauditur ab aliquo tumore, vt phlegmone, scirrho: tuberculo carnosio: verruca: pinguedine, membrana & epiploo nimis pingui: à quibus omnibus seminis in yterum transfusio cohibetur.

Collum pudendi, quæ tertia pars est vteri, & veluti vagina mentula virilis: obsident organici morbi: vt amplitudo immodica non delectans virum, neque semen retinens, dū ab vtero exsugatur: Itē angustia vtrumque & virum & fœminam dolore molestant, vt in alienum locum semen à viro effundatur.

fundatur. Eadē noxa est cuiuslibet tumoris obstruentis, vt phlegmones, scirrhi, carunculæ, & membranæ circumtensæ, vlcus, & cicatrix.

Pudendum denique ipsum osque eiusdem externum affligunt hæmorrhoides, condylomata, satyriasis, cauda, phimosis, & hiatus: quorum alij semen respuunt ne in vterum feratur, alii admissum præ dolore excludunt.

De signis diagnosticis.

Sterilitatis signa sunt duplicia: distinctiua & diagnostica. Primum enim vtrius coniugum vitio sterilitas accidat, certis experimētis internoscēdum esse authores iubent, ex quibus vnū est, Si maris & fœminæ in eandem aquam temperatam semina vicissim infundantur: cuius semen aquæ innatauerit, huius vitium est sterilitatis. Innatio enim flatulentia & cruditatis assecla est. Alterum est, si vrina vtriusque coniugum ad lactucarum radices affundatur, cuius vrina radicem tabefecerit, illius propria est sterilitas, ex intemperie scilicet calida. Tertium, si grana septem hordei aut tritici aut fabarum in vrinam vtriusque coniugum seorsim mergantur, & deinde terra sepulta germinarint & pullularint: hic, in cuius vrina macerata fuerint, sterilitatis suspicione careat: hinc enim temperies moderata, vrina & viscerum, non acris & tabifica significatur. Quartum, si suffitus aromatum in vuluam ex infundibulo receptus ad os naresque mulieris transmittatur, sterilitatis crimine fœminam liberat. acetabula enim libera & peruia nulloque frigore astricta, aut cicatrice obducta, aut humori-

bus crassis lentisq. obstructa denotat, quib. exceptū semen virile facile adherescat, propriūq. alimētum conceptus alliciat. Caliditatem quoque & siccitatem vteri abesse, significat, à quibus feminis excepti vaporosa substantia digeri conficique possit: sicuti & humorum colluuiem, à quibus extinguatur aut foras impellatur. Quintum est si allia contusa lanaque excepta pelli instar, summissa odore suo nares feriant, ista mulieris fœcunditatem arguunt. Denique si os vulvæ à mensium purgatione madidum & lubricū sit, sterilitatem ex intemperie humida denuntiat: qua semen virile vel extinguitur vel præcipitatur.

De signis Prognosticis.

CAusæ externæ sensibus solis egent. Internæ tū sympathicæ tum idiopathicæ quatuor vteri partium signis artificiosis internoscuntur, satis accuratè præcedenti libello enarratis. quare pauca quædam prognostica hoc loco exponenda sunt.

Primum est quod fœminæ quædam secundâ aut tertiâ ætate magis, quam primâ concipiunt: quæ scilicet humidiores sunt, aliæ magis primâ ætate. Secundum est quod fœminæ fœcundæ sterilibus sint salubriores: quod amplioribus & patentioribus earum acetabulis purgentur magis à multis excrementis cum menstruo sanguine mixtis. Tertium, quod conceptuum multitudo senectutem acceleret: & corporum infirmitatem augeat. Contra sterilitas vires tuetur diutius: & iuventutem prorogat.

De curatione sterilitatis.

CÆterum sterilitatis muliebris causarum omnium tam sympathicarum quam idiopathicarum

rum therapia tota suis indicationibus curatiuis expedita est proximo libello : supersunt tantum duæ sterilitatis causæ à quibus sæpe iurgij occasio inter virum & fœminam, breuitas scilicet siue exiguitas mentulæ, & vuluæ nimia amplitudo. Vtraque enim dum genitalium blandam suauemque confricationem impedit : tum veneream voluptatem, tum prolis spem adimere coniugibus solet, quòd sine delectatione semen vtriusque, aut alterutrus nullo modo, vel tardius emissum refrigeratione euadat ignauum & sterile. Hinc spreto connubij fœdere, alieni thalami & concubitus desiderium cōiuges lacessit. Poterit ergo vtrique affectui cordatus medicus sine vlla turpitudine mederi: paruitati quidem mentulæ vberioris alimenti ad partem prouocatione, in iuuenibus præsertim per multam frictionem matutinam & vespertinam ex panno aspero, donec pars erubescat, cui subinde ex lacte ouillo & bubulo calente adhibendus est focus: cuius lactis crassitie & lentore obductis poris attracti sanguinis & caloris effluuium supprimatur. Deinceps autem post longiorem vsum focus & frictionis, emplastrum ex pice obducendum: quod sanguinem calore suo proleatet, eumque pingui lentore à dissipatione cohibeat. Vis eadem est linimento expulvere sanguifugarum & lumbricorum terrestrium cum lacte tithymali mistorum.

Amplitudini autem succurrent remedia astringentia siccantiaque & odorata: qualia sunt pessaria sequentia. ℞ rad. bistort. balauft. gallar. & rosar. rubr. an. ʒ ij. ligni aloes rad. cyperi. nuc. mosc. & caryophyllorū an. ʒ j. fiat puluis excipiendus lanâ vel cotone: ex quo cū linteolo fiat pessariū, quod ex vi-

Ff

no calēte generoso intromittatur per multas noctes ante coitum, sed finito prius mensium fluxu, ne cohibeantur. Præstantissimum est hoc: quod virginalē vuluæ astrictiōem inducere creditur: cōstatque ex aluminis & summitatum schœnanthi puluere lana pariter excepto in formam pessi. Interea interdium mane & vesp̄ri pudendum fouebitur cum spōgiis admotis: vel diplomatis infusis in hoc decocto: ꝯ cortic. pini contritorū partes quatuor, aluminis partes duas: cyperi partem vnam, decoquantur in vino generoso: huius etiam decocti vapor per infundibulum vtiliter recipiatur in vuluam. voluptas deniq; augetur venerea, saluā post masticatos trochiscos muscardinos vel assam odoratam, zinziber vel piper: itē lotionē penis ex vino infusionis cardamomi, cinnam. cubebar. cum portiuncula galliæ, mosci & croci. Item vnctiōe totius mentulæ ex ciueta: litu denique ex oleo muscatellino, de spica, & de costo, additis aromatum pulueribus si applicentur perinæo totiq; mentulæ.

De conceptu prohibendo.

Fœminis quibuscūq; sterilitas fecunditate potior est, iis nimirū quib. aut abortus violēti, ob corporis totius, vel vteri solius paruitatē, grādiōris adultiq; fœtus incapacem: aut partus funesti, vbi ob colli eiusdem angustiam siue natiuam siue aduentitiā post impregnationē à tumore aliquo obstruente periculū metuitur. Fœminis ergo puellis adhuc & innuptis alterutri periculo obnoxiiis cælibatus, studium cœnobij & castitatis mature suaderi debet: hoc enim conceptus fœtusque corruptione longe minus est indignum facinus: Nuptis autem, ne deinceps concipiant iis præceptis cauendum est, tum ante coitum ne incipientibus & desinentibus

mensib. paucisq; postea diebus vt duob. tribusve cū viro coeant. hæc enim duo sunt cōceptioni idonea tēpora: quibus ob superficiē internæ vteri asperitatem semen facile adhærescat: & ob hiatum coryledonum alimentum proliciat: ne eodem momento sed longiori ante vel post virum interuallo, semen suum emittat, tum vt semine viri exiliente spiritum cohibeat (ne semen eiectum trahant) natesque frequenter agitent & retractent: ne semen recta in vterum feratur: sed cervicis parietib. allidatur. Antē coitum autem os vteri internum astringant medicamētis astringentib. & refrigerantib. aut obstruāt viscosis & lenientibus: vtraque enim seminis in vterum transfusionem prohibent: Huius generis sunt mel, adipēs, mucilagines quouis modo iniecta. Illius sunt sequentia pessaria, finitis tantum mensibus, & per duas vel per tres noctes à muliere mox coitura vsurpandæ. ℥ cortic. pini & rhois coriariorum ana ʒ β terantur, tritaque vino misceantur, & lana excipiantur, & linteolo, vt fiat pessarium, quo post triduum remoto, mulier post duas horas coeat. ℥ malicorij ʒ j gallar. ʒ β terantur cum vino, lanaque excipiantur, & noctu intromittantur. ℥ gallar. ʒ j β mirrhæ ʒ j terantur cum vino &c. ℥ balaustior. & gallar. ana ʒ β absinth. ʒ ij terantur & excipiantur vt supra. Iam vero post coitum mulier à viro quamprimum diuisa exiliat à lecto; meiat, pudendum intus diligenter abstergat: & genibus innixa sternutet, tussiat, saliat, ad posteriora, sexies aut septies (nā ad anteriora saltus semē potius retineret) vociferetur, descendat, ascēdat, curratq. velociter: grauiissima onera gestet, leuetque. Quibus omnibus cōmota genitura & diffuēte

cōceptus impeditur. Deinde si genitura illis motibus incōcussa stare videatur: tum menses prouocandi sunt, & phlebotomia in poplite, vel pede: & medicamentis alterantibus. purgantibusq. de quibus antea in curatione suppressionis mensium: Quin etiā calida acriusq. subtus iniussa ut oleū iuniperinū, rutaceū, laurinū de spica: aut infusum cū cathetere, aut lana exceptū, ut antidoti tum alterantes ut mitridatium theriaca vetus, & purgantes ut benedicta laxatiua, indurmatius: piper quoque tritum & similia semen & quosuis humores alios ex utero protrahunt.

Postremo si genituræ effluxus ante octauum diem non sit deprehensus: tū ab omni medicatione pius prudensq. medicus sibi tēperet, ne cōceptū iam animatum interimat: matremque pręgnātem, si sit grandior fœtus, eodem necis periculo implicet; cui vehementiora remedia non minus quam fœtui infesta & pestifera sunt: ne denique seipsum homicidij crimine & dedecore obliget. Licet quidē periclitātī ex morbo matri remediis opitulari fœtui aliquantū noxiis: noxa tamē eorum quantū per artem licet, accuratissimē moderata. Neq; etiā audiendum est Auic. & Aetij cōsiliū fœtuū trucidatione matrem periculo liberantium. Quin reliquæ etiam impediendi cōceptus formulæ antea descriptæ; tam in coitu, quā ante & post coitum: nisi honestis & periclitantibus fœminis conferendæ non sunt: ne famosis & inhonestis impudicitia tegendæ gratia ars nostra lenocinari videatur.

De superfœtatione.

EX deprauatę conceptionis differentiis superfœtatio censerī possit: quæ nihil aliud est, quam
secunda

secunda ex nouo concubitu post primam cōceptio. Illa quidem brutarum scēminarum speciei familiaris est: quarū vteri partibus duabus veluti cornibus diuisi sunt: ambabus scilicet in plures cellulas ob multiplicē fœtū discretis, quæ cū vno coitu omnes nō impleatur, à vacuis semē masculū altero concubitu emissam excipi cōcipique frequenter cōtingit. Reliquis brutis, quib. vt humanis, vnico sinu vterus patet; secundam conceptionem ante prioris exitum superuenisse numquam notatum est, ne in leporum quidem, aut equarum ordine, tametsi hæ prægnantes præter cæteras brutas maribus fruuntur, non ob vteri angustiam solam, osculique vterini validam astrictiōem: primi conceptus asseruandi gratia: sed obseminis quoque menstruique penuriam, præ ficciori earum natura, victu parciore ficciorique, & vita valde ærumnosa: At vero humanis scēminis secundam conceptionem primā non sublatā cōsuetam esse authores sunt Hippo. & Arist. iis scilicet, quibus per ardorē libidinis vteri os internū recluditur: semenq; virile in id vteri latius recōditur: quod à priori conceptu liberum magisque vacuū relictū est. Itaq; superfœtates scēminas omnes esse natura calidas, thorosas, genitalib. pilosis, acricque semine & mēstruo multo circa vterū collecto, turgentes: vtero denique ipso robustis facultatibus prædito, vt aperiatur, attrahat retineatque conceptum fœtum præ seminis auiditate, neque expellat: vt grauantem sanguinem solet per primos impregnationis mēses. Hæc autē superfœtatio primo aut secūdo aut tertio mēse cōtingit, cū nondū grādiori fœtu totumque vterū implente aut sanguinē cōsumēte, masculæ genituræ nouę secūdoq. cōceptui lo-

cus & alimentū superest: solétque à secundo conceptu, vt à primo rursus vterus arctissimè obturari. Est tamen superfœtatio aut breuior aut tardior: hinc varium est vt concipiendi, sic pariendi tempus, suntque plures isti fœtus diuerso concubitu geniti, pluribus secundis obuoluti. Alia est geminorum conditio vt qui iisdem secundis & inuolucris comprehendantur, quòd totum vno coitu emissum semen vnum in locum ab vtero cogi cogatur & coercetur. Ex breuiori superfœtatione, soboles vtraq; incolumis perferri solet in iustum idem partus tempus: vt de Hercule & Iphiclo fratre eius narratur. Hic enim Amphitryoni Alemenæ matris marito, ille Ioui similis fuisse narratur: Idem apud Plinium de muliere quadam, quæ duplici partu vnius dici fœtum edidit: vnum marito, alterum adultero similem. Idem de Prognœsia ancilla quadam: quæ vno partu duplicem enixa est fœtum: vnum domino, alterum procuratori domus similem.

Alias longior plurimumque post primam conceptionem dierum superfœtatio est. Cuius exemplum est apud eundem Plin. de muliere quadam: quæ eodem iustoque partu nonimestrem fœtum vnum: & quinquemestrem alterum edidit. Item de alia quæ cum septimestrem fœtum enixa esset: subsequutis mensibus geminos edidit.

De mola.

SEconda deprauati cōceptus species mola est: ita dicta vel à similitudine molæ pistrinensis: cuius instar rotunda duraq; fere est: vel à mole & gravitate qua infimus foeminarum hac affectione laborantium venter opprimitur. Est autem caro informis & inu-

& inutilis, nullisque exercendarum functionum instrumentis prædita: siue animalium; vt neruis, musculis sensiteriis: siue vitalium, vt thorace, corde, arteriis: siue naturalium, vt ore, œsophago, stomacho, hepate, liene, &c. sed foris tantum membrana durissima cutis instar, obducta est: intusque pluribus venis conspersa. Molæ generatrices causæ sunt, aut materia vitiosa: aut effectrix languida: aut instrumentaria. Illa quidem duplex est, semen & menstruum: illud quantitate & qualitate peccare potest: quod aut exiguum nimis paucumque sit; vt menstruo dominari nequeat: vel certe crudum & illaboratum: quale est impuberum, senum & intemperantium hominum veneri, crapulæ, & otio nimis indulgentium: quale etiam est à causis præter naturam, vel communibus: vt febribus acutis aut longis, cachexia: aut particularib. vt vasorum spermaticorum à longa gonorrhœa & diuturno ulcere debilium: aut testium ab origine prima frigidiorum, minorumque: aut casu aliquo perfrigatorum, contusorum, attritorum: aut certe magica arte dissolutorum. Menstrui quoque duplex vitium esse potest, quantitatis & qualitatis: exuberans enim, aut crassum nimis spissumq; & viscosum, vegeti etiam caloris facultatem vincit: ne ab eo naturaliter mutetur & conformetur.

Effectrix causa est formatrix facultas: quæ, quod diuinior sit, vitio caret. Huius instrumentum est calor natiuus & spiritus genitiuus omnium fœtus futuri partium ideis onustus, & à generante patre cum suo semine in vterum infusus. Hic vero cum ob intemperiem aliquam vel ætatis vel morbi vel diætæ errorem frigidior,

nec satis principij vtriusque regendi potens est, pro legitimo conceptu vitiosum suscitatur, carnem scilicet vegetabilem tantum, non animal: multo minus hominem. Mola ergo non solo sanguine impensius calfacto constat: cum ipsa sit membranis cincta, venisque intus pluribus conspersa: quæ partes sunt spermaticæ & cotyledonib; annexæ: neque etiam ex solo sanguine muliebri in vterum per infomnia libidinis effuso, ut à monialibus: à iuueniculis inuuptis; à viduis; à maritatis etiam sæpius in coitu post maritos eiaculantibus: cum sine congressu virili mulieres parere molas nusquā visæ sint, dissimili gallinarum exemplo, à quibus ova subuentanea sine galli coitu poni solent, sicciori scilicet harum temperie quam mulierum, redundantem seminis humiditatem consumente. Neque rursus opinandum est molam nihil aliud esse quam tumorem induratum ut phlegmonem aut carnem excrecentem, ex prægresso vteri ulcere: harum enim opinionum vanitas facile confutatur tum substantiæ venosæ & membranosæ in molis obseruatione, tum ex spontanea siue medicamentosa molæ præcipitatione. Quare verius cõcluditur molam esse carnem rudem informem & inutilem ex vitiosis principiis semine & mēstruo & ab inualido calore spiritus genitā. Molarū differentiarum sunt plures, quædam veræ sūt: cuiusmodi descripta modo est: quædam falsæ & multiplices, quæ sūt aut tumores in vteri substantia, aut vicinarum partium indurati: aut in ipsius capacitatem ex quibuslibet humoribus caliditate loci coactis: aut denique varia animalculæ excrementorum putredine suscitata, ut bufones, ranæ, vermes, serpentes & repentes & volantes. Aliæ sunt quoque ex veris recentes & exiguæ

exigua : quæ ob leuiorem cum acetabulis nexum tertio , quarto, quinto, aut nono etiam mense , sua sponte aut medicamentorum vi decidunt: Alię grandiores & vetustæ, quæ ad quartum, sextum, septimū annum aut in totam etiam vitam prorogantur : hæ viuæ Hippocrati vocantur: illæ abortiuæ. Molæ etiā aut solæ sunt: aut plures etiam inter se separatæ : hæ tutiores sunt. Mola vnica est alias sine foetu, alias cū foetu: hæcque vel libere, vel foetui obuincta. Mola quidem cum foetu ipso sequitur, dum semine in vtrumque vteri latus inequaliter diuiso: quod minus est huius particeps, molam capit (victa prorsus à menstrui copia seminis inopia) At multis post conceptum foetum mensib. vt 1. 2. 3. superfœtationis instar mola generatur: dum vteri interno osculo per coitus delectationem recluso exceptum virile semen à menstrui redundantia opprimitur & restinguitur.

De signis diagnosticis.

Molæ & vteri conceptus signa diagnostica ab initio sunt eadem: mensium suppressio & quę consequuntur symptomata : nausea, vomitio, fastidium cibi, pica, malacia, fœdus color: mammarum tumor, vteri & lumborum grauitas. Sunt tamen omnia hæc ex mola quā ex vero conceptu grauiora, circa tertium præsertim aut quartum mensem: tum etiam foetus motus blandus est lenisque in omni parte vteri, omnique tempore & hora tam per somnum quàm vigiliam, estque in fine grauiditatis etiam robustior, neque impulsus loco cedit: neque rapitur moto materno corpore. Contra omnis molæ motus est inuoluntarius & ab initio tremulus, siue à spiritu incluso: siue à matrice

expellere tentante: rādem compressionem sequitur magis in vltimis quam primis mensibus: motūque matre semper mouetur, & cum grauitate magna, saxi instar: mammæ etiam in principio tumidæ per molam, sed tandem flaccidæ redduntur. Adest superarum& inferarum partium corporis extenuatio: præsertim femorum & tibiarum, quæ tandem extumescunt, vnde difficilior ambulatio, faciēsque inflatur: solus venter durior est, eiusque dolor frequens colico similis. Certissimum denique omnium signum est; si legitimæ imprægnationis tempus vētris tumor exceßerit: hydropis quidem ascitis speciem exhibet, totius corporis macies cum solius ventris tumore insigni: ab eo tamen secernitur mola tum duritie maiori, tum ex pulsatione, nullo sequente sonitu: tum nulla fluctuatione, ex corporis materni inflexione. A tympanite mola dignoscitur quia ille subitus est, & toti vtero æqualis, leuis præterea&sonorus, quæ omnia molæ cōtraria accidunt.

De signis prognosticis.

MOla humanis scēminis ob copiā mēstrui accidit nō brutis, quæ mēstruo carent. Viuaces molæ diutius durant vt per tres vel quatuor vel plures etiā annos, & aliquando per totam vitam: & ita obdurescunt, vt saxum referant, ferrique aciem redundant, idque ob crassitiem sanguinis & calorem eximium partis: abortiuæ autem sæpius prodeunt, secundo, tertio, aut nono etiam mense. Mola vna periculosior est duabus vel pluribus inter se diuisis: illa enim ob granditatem ægrius expellitur: hæc ob exiguitatem facilius. Mola vel alligata vel libera alimentum, sæpe etiam vitam per inediam locumque

locū inque foetui excipit. Supra nonum mensem valde est periculosa : non tantum quod grandescat impensius, sed quod vtero etiam arctius agglutinerur : à quo dissolui nequeat , mortē inque orto tandem hydropē maturat : Denique fere incurabilis est: ideoque à veteribus relicta plerisque: nisi fortasse incipiens , sed vetustam tamen non esse omnino negligendam cum Paulo & Actio sentimus.

Curatio.

Mola deturbanda & mouendorum mensium vnus idemque scopus est, eadem remedia foris intusque vsurpanda: Primum quidem phlebotomia in flexu cubiti dextri, in eum finem non solum vt plethorā inaniatur: sed etiam vt mola inedia cōtabescat. Phlebotomiz clyster præponendus emolliens tergensque & phlegmagogus, si alius ignauior sit. Vsurpandum quoque minoratiuū medicamentum; si qua cruditas ventriculū, aut cacoehymia mesenterium obsederit: phlebotomiz purgatio substituēda, phlegmagoga aut melanagoga, sed humoris prius cocti & vacuationi præparati per alterantia tenuantia scilicet tergentiāque apozemata, vel iulepos vel electuaria in plures, vt quinque vel sex dies protracta: purgatio autem ex validiss. instituat medicamentis; ob humoris crassitiem lentoremque, & sedem in maiorib. & minorib. venis distantiorē. Tota porro hæc alterantium & remedium materia causam antecedentem vacuantium enarrata est cap. de suppressione menstruorum.

A purgatione tum causæ coniunctæ vacuatio, id est humoris acetabula obstruentis, tum & rela-

xatio acetabulorum ipforum nexusque dissolutio tentanda est: tam externis præsiidiis emollientibus & attenuantib. vt balneis, semicupiis, infessibus, fortibus, litibus & vnguentis: quàm internis validioribus sumendis & admittendis: vt exempli gratia.

℞ rad. aristol. rotund. gentianæ, rubiæ, costi. baccar. lauri myrrhæ, cardam. piper. cinna. & dictamni albi an. partes æquales, fiat puluis cuius dosis sit ʒj vel ʒij cum pauco iusculo, vel vino albo, vel aqua artemisiæ stillatitia, idque in introitu balnei: Talis est suffitus in vuluam ex infundibulo excipiendus: qui constet trochiscis ex galbano opopanace myrrha castoreo sulfure pulueratis & cum felle bubulo concorporatis. Tale denique pessarium ex opopanace ammoniaco rad. ellebori nigri & aristol. rot. pulpa colocynthid. pulueratis & terebinth. opiatæ instar, exceptis: quæ cum lana, aut linteolo inuoluta intromittatur. Cauendum tamen est ne ab iis acrioribus loci muliebres exculcerentur: Eodem tempore cucurbitulæ semoribus deligationes, frictiones duras adhibebimus euocādorū mensium cum mola, gratiā. Dropaces denique & sinapismos maioris alterationis gratia ventri apponit Aetius. Quod si hæc therapia pharmaceutica non profuerit, chirurgica tum adhibenda est: vel vt extrahatur foras fœtus digitis per ceruicem in cavitatem vteri intromissis, ventre interim vndiquaque altera manu compresso, vt foras propellatur fœtus: Quod si forte præ granditate & rotunditate atque duritie manus apprehensionem declinet, tunc chirurgicum instrumentum (pedem griphi vocant) penitus inserendum infigendumque molæ est: aut scalpello incidenda, vt frustatim educatur. Denique

que si tam contumaci ter in ola acetabulis hæreat: ut neque medicamentis aperientibus & laxantibus: neque manu, neque instrumento chirurgico protrahi possit: tum demum per iniectiones suppuratorias corrumpenda, & putrefacienda erit, ut putrefacta sensim excutiat. Suppuratio tamē periculosa est: grauesque lipothymias & syncopes inducit ex caloris natui corruptione à fœtore insigni, qui idcirco instaurandus gnauiter & roborandus est rebus odoratis intus forisque vsurpatis. Iniectionum eiusmodi materia est vnguentum basilicum dissolutum cum oleo lini & liliorum, sed admiscenda sunt suppurantibus tērgentia, aut seorsim infundenda, fœtoris mitigandi gratia, ut ex dissoluto Ægyptiaco cum decocto agrimon. & absinthij.

De monstrosis conceptibus.

DE prauati conceptus species est monstrum, præter naturam quidem, unde Aristoteles monstra exponenda, Plato clam nutrienda censuit. Sed tamen non omnino cōtra naturam, neque vteri eiusmodi repletio morbus habendus est, Itaque curatio eiusdem à veteribus medicis omnibus prætermissa est, quod certis indiciis à legitimo conceptu secerni nequeat. Sunt autem monstra, quæcumque in animalium aut hominum ordine, dissimili sui generis specie, nascuntur, & quidem aut multiplici rerum diuersarum, aut vnicâ, sed distorta, mutila, truncata, & quouis modo à naturali, mutata.

Monstrorum generatrices causæ quædam remotiores, diuinæ scilicet & incorporeæ, ut Deus ad imminentem cladem hominibus, nisi resipiscant,

præmonstrandam: vel dæmon ad inanem terrorem, hominibus excitandum. Aliæ sunt propiores & corporeæ, vt principiorum generationis seminis menstruique aut matricis vitia, coitus importunus, aut vehemens prægnantis scæminæ imaginatio. Seminis ad monltrosum scetum eximia vis est, ex triplici suo vitio quantitatis, qualitatis, & situs in vtero: nam si semen vnus scetus procreationi redundet, sitque procreatrix eiusdem facultas robustavt mēstruū prorsus vincat, geminos mares: sin imbecillavt ab eodē prorsus vincatur, geminas scæminas: sin partim vincat partim vincatur, marem scæminamque proferet. Quod si semen vni scetui gignendo superfit, quod duobus tamen absolvendis satis non sit, plures quidē quamvis non necessarias partes adiunget: quarum sedes semē ipsum earum gignendarū potentia præditum vel sponte sua, vel alieno impulsu invaserit. Contra si tantula temperati seminis copia vni scetui perficiendo desit, inancum & mutilum scetum, omninoque parte aliqua, nontamen principe quæ ad vitam scetus necessaria sit: sed externa aliqua orbatum exhibebit. Iam si semina parentum aut intemperata, aut inquinata, vt per longam gonorrhœam, per abscessus & vlcus: aut si sanguis menstruus obscænus & impurus fuerit: tunc mirum est, quam novæ inauditæ scetuum deformitates inuehantur: neque enim formatrici facultati vitiosa principia obsequuntur. Situs etiam seminis abundantis in vtero deformitatis causa esse solet: dum enim gemelli in angustis vteri lateribus propinquoires & sine intervallo confident: illi quidem sæpe inter se conglutinantur, aliàs obuersis pectoribus totoque thorace;

thorace: aliàs dorso: aliàs femoribus vel pedibus manibusque confertis.

Matricis etiam infirmitas vel insita vel aduentitia seminum naturam mutat: fœtumque deformat instar vliginosæ terræ ex sincero tritico lolium vel steriles auenas multiplicantis. Importunus autem post conceptum & inchoatum embryonem, ante trigesimum aut quadragesimum diem, nimisq; libidinosus pœrentum coitus, conceptus inuolucra sæpe rumpit, vt particulæ fœtus diuulsæ vltro citroq; temere diffluent, tandemq; alienis partibus & locis affigantur. Ipsa denique prœgnantium primis saltem quadraginta diebus attenta valdè & peregrina cogitatio, animiq; vehemens consternatio: vix credibile est, vt cogitatarû & formidatarum rerum vestigia & ideas fœtui imprimat, traducēte ista spiritu animali ad vterum & spiritum naturalem.

De Hermaphroditis.

VLtimadeprauati conceptus specieshermaphroditus est: fœtus nēpe vtriusq; sexus propriis genitalibus instructus. Etymologia prauam & contra naturam scēminæ marisque compositionem, denotat: dictus enim est à nomine ἑρμῆς, i. Mercurio tanquam mare, & ἀρσενία, Venere, i. scēmina. Hermaphroditum mares veterib. androgyni vocati sunt: quibus præter mentulam virilem muliebri pudendum obtingebat: vnde maris & scēminæ in coitu fungi posse officio credebantur: cuiusmodi populos quosdam Africæ vicibus cœcuntes androgynos vocatos fuisse narrat Plinius: Sic mulieres præter pudendū muliebri mentulā virilē sortitas Cœlius Au-

relian.tribadas, Plautus subigatrices, Arnobius fri-
trices nuncupauit, quod aliis misceantur mulierib.
easq; exerto virili genitali, virorū instar, probe subi-
gant. Hęc hermaphroditorū opinio à vetustissimis
temporibus ad hanc vsque ætatem viguit, quā ma-
gistratus promiscuū vtriusque genitalis vsum mul-
tare solet, alterius tamen optione vsuque conces-
so, quod robustius meliusque cōformatum videtur,
vocatis etiam in iudicium sexus potētioris reliquis
corporū accidētibus, vt colore vultus, motu, gestū,
habitu, capillis, voce, naribus, & studiis omnib. Fœ-
mineitas enim dignoscitur tum ex pudēdo mulie-
bri bene conformato satisque capaci & fluxui men-
sium assueto: tum ex vultu miti & mansueto, gestu
verecundo, habitu laxo & glabro, capillis tenuibus,
& promissis, voce exili animoque timidiori. Con-
tra virilitatis indicium est, tum ex virili genitali
satis grandi rigidoque & semini emittendo ido-
neo, pube pilosa & podice, voce aspera, capillis cras-
sis & breuibus, habitu denso, toroso & piloso, mo-
ribus iracundis & motibus omnibus robustis: At ex
pari omnium robore hermaphroditi agnoscuntur
neutri. Ab hac tamen opinione de promiscuo v-
triusque genitalis vsu in hermaphroditis, Auic. ab-
horruit: neque incubos simul & succubos esse her-
maphroditos duxit: quod scilicet sæpe compertum
fit ex genitalibus duobus vnum debilius esse, eiusq;
opus imperfectius.

Hęc sexuum mixtio in Adamo non fuit, tametsi
sexto die creatus ipse sit mas & fœmina, de cuius
latere fœmina auulsa sit: sed ex vnione arctis-
sima vtriusque sexus amicitia significata est.
In brutorum certe genere frequens inuenitur. Sic
enim

enim Plinius narrat quatuor equas hermaphroditas in Treuiorum agro repertas fuisse à quibus rheda Neronis trahebatur. Lepores quoq; omnes hermaphroditos esse pleriq. venatores innumerabili eorum multitudine persuasi, præter quotidianā eorundem & numerosissimā stragē, prodiderūt; vnde pro infami & impudico pathicoq; lepus vsurpatur: verisimile tamen est tantam leporum copiā menstruis eorum partibus crebrisque superfœtationibus multiplicari. Sunt denique quatuor hermaphroditorū species apud Paul. Æginetam, quarum tres ad viros, vnica ad fœminas spectat: hæc quidem est quādo supra pudendum muliebre, virile innatum est iuxta pubem corporibus duobus extantibus scilicet testiculis & cole medio. hæc species dici potest gallicè *femme-homme* præpollente scilicet muliebri pudendo. Ex illis tribus vna est: quando muliebris pudendi pilis bene obfita forma est sub pube: altera quādo eadem in medio scroto apparet: tertia est quando per pudendum scroti vrina profunditur; possunt vocari gallicè *lehan femme*. Quarta species adiungitur ab Auic. eorum qui neque viri neque fœminæ genitale sortiti sunt: sed exiguū tantum sub pube foramē excernendæ vrinæ destinatū. Hermaphroditorū generatio ab Hippoc. æquali facultati & materiæ vtriusque seminis tribuitur. Porro ex quatuor hermaphroditorum differentiis Paulus tres curabiles per amputationem docet: solam autem incurabilem illam esse quando per scroti pudendum muliebre, homines mēiunt.

De conceptus adiumentis.

ADhuc de conceptus symptomatis tribus: abo-
Gg

litione, diminutione, & deprauatione, eorumque
causis, signis & remediis differuimus: nunc de le-
gitimo & naturali conceptu, eiusque causis, signis
& auxiliis, tandēque de symptomatibus eundē con-
ceptum naturalē consequentibus accuratē differen-
dum est. Mulier ergo sana, corpore bene conforma-
to, lumbis latis, amplo ventre & diductis coxis,
staturā mediocri, habitu eufarco non obeso nimis,
aut tenui, neque dēso, duroq. aut laxo nimis, hume-
cto, & languido, nulla denique insigni intemperie
aut corporis totius aliorumve viscerum communi-
bus: aut partium genitalium propria laborans, æta-
te præterea matura ab anno 15. ad 40. vsque: hæc
inquam fecunda & suapte natura prolifica mulier
iure censeatur: siquidem idoneo viro, vsibusque ve-
nereis apto fruatur. Fecunditas autē ista natua du-
plici ratione iuuanda est, primum totius diætæ me-
diocritate: vt aeris, ne algeat æstuetve: (frigus enim
obtundit, æstus dissoluit seminis substantiam) vt la-
boris otiiq. vt vigilæ & somni: vt cibi, à quo absit
satietas & inedia: sitque qualitate paulo calidiori
humidiori & flatuosa: substantia euchyma, qui san-
guinem semenque cumulare & venerem stimulare
possit. Talia sunt vinum rubrum vetus & calidum:
taliam iuscula carniū vitulinarum, gallinacearum,
veruecinarū cū hormino mentha eruca, nasturtio,
fœniculo, petroselino viridib. elixatarū: eadē e-
nim siccæ seminis spiritus discutiunt. Talia sunt ex
iisdem iusculis cocta oriza, lentes, phaseoli, pisa, fa-
bæ, quibus puluis ducis cū pauco croco aspergatur:
Ex iisdē carnib. tostis expressa iura tū liquida tum
concreta plurimum profunt: sicuti phasianorum,
pipionum, perdicum, caponum, lepusculorum, &
cunicu-

cuniculorum carnes tostæ: fructus quoq; sicci iisdē virib. præstāt spermatis augendi, & cōfirmādæ fecunditatis, vt passulæ, auellanz & amygdalæ tostæ, pistacia, dactyli, ficus, panis albus: vinum calidum, & modicē sumptum. Instans tamē mēsum purgatio acrioribus & odoratis iusculis & obsoniis atq. cōdimētis aromaticis irritāda est: vt & motibus omnib. corporis paulo validioribus, quales sunt ambulationes, tibiarum & femorum frictiones lotionesq. ex decocto calente herbarum hystericarum: euaporationes & perfumationes aromatum subtus per infundibulum admittē, vt sepe antea dictum. Alia ratione iuuatur conceptus fecunda mulieris, si coeat tantum instante menstrua purgatione: vel biduo aut triduo post eandem finitam, dum calet adhuc à recenti mensium fluxu vterus: hiantque cōtyledones: quibus semē adherescat, si libido muliebris ante coitum amplexibus, viri exosculationibus, & venereis colloquiis, incendatur. Conceptus, inquam, iuuatur, si tunc vir: semen rectā infundat in os vteri internum corpore mulieris bene composito, quo tempore victa voluptate mulier balbutire, oculis rubere, & anhelitum celerare cōperit, & mas emissio suo semine, paulo seriùs à muliere auellatur, donec os internum matricis condito semine clausum esse verisimile sit.

De conceptus legitimi signis.

Conceptus legitimi signa sunt, si vteri orificiū castrictū magis, non tamen durum & paulo altius quam antea fuerit: si voluptas in coitu maior mulieris fuerit: si semen virile nō effuderit, neq. pudendū aut ceruix eius maduerit: si primo & secundo à coitu die frequenter inhorrescat, leuiterq. oscitet.

& pandiculetur, cum modica scapularum lūborūq; perfrigeratione, calore scilicet à toto corpore in vterū conuerso, & spiritū vitali conceptionis causa sublimiores partes destituēte: vnde etiā vapores oscillationes pādicationes, Hypogastrij imique vētris modicus dolor ex contracto circa semen validius vtero: Si octo à coitu diebus ad vmbilicum deprimatur venter, collecto ob amplexū seminis vtero, qui paulo post sensim attollitur, ampliaturque, fœtu sensim grandescente: si vncem deinceps fœmina fastidiat: Si primo & secundo mense menses supprimātur, aut pauci admodū effluāt, aut ex venis colli vterini, aut ex cotyledonibus quibusdā liberioribus: cum secundinā fœtuū lateribus vteri magis quam fūdo eiusdē connectātur, sitque ostiolum internum primis diebus paulo laxius, vnde superfœtatio illo tempore accidere solet: Si mammæ tumescāt & dilatentur, papillis rubentibus, aut nigricantibus, & tuberculosi, ex sanguinis copia ab vtero refluentis: si totum corpus ingrauescat; plethora ad vires orta; si totus venter lumbi & ilia ampliora fiant, tumescēte vtero & crescente fœtu: Si lentigines & maculæ variæ vt rubræ fulvæ liuidæ faciem deforment surrecta in vultum cacochymia, quæ sanguini menstruo mixta est. Deinceps à secundo conceptus mense ad tertium signa sunt metus, & mœror spontaneus, deliratioq; melācholica, abundāte crasso frigidoque sanguine, fastidium cibi, impletis venis stomachi sanguine ideoque nihil sugentibus, nausea, vomitio, lipothymia, cruditatib. & caco-chymia interna biliosa & acri stomachum vellitantibus: pica & malacia rerumque ab usu & ciborum consuetudine alienarum appetentia, pro
excre-

excrementi conditione stomachum perfundentis. Iam circa quartum mensem & medium prægnationis tempus conceptus signa hæc sunt; foetus iam perfecti motus non vagus quidem, instar flatuum, nec grauis vt molæ: sed potius blandus, vt muscæ volitantis, manu præsertim calida ventri admota, pectoris & mammarum turgidæ magis duræque venæ, lactis flux & nigricantes: venter amplior, duriorque: pulsus maior & frequentior calore ob foetum iam grandem ingeminato. A quinto autem mense vrinæ substantia magis est crassa, turbida, bullosa nebula, aut eneoremate albicante quidem, sed diuulso instar carptæ lanæ ob mixtos flatus, ex cacochymia in venis multiplicata. Vltimis denique mensibus eadem vrina crassa, rubescens, tandemque nigricans sanguinis menstrui sero per diapedesim in vesicam proximam ex vteri venis trāsfluente, meatus omnes faciei dilatantur: narium, oris, oculorum ob dyspnœam vel ob fuliginum copiam; in femorib. venæ turgidæ, sæpe etiam varicosæ apparēt. Cæterū cum plures diagnosticorum signorū differentię dubiæ sint & infidæ: quòd a mola, hydrope ascite & tympanite vteri alióque menses supprime quouis affectu oriri possint, vnicus circa tertium aut quartum mensem foetuum motus in veris signis conceptionis habendus est. Ante motum illum significatiua conceptus experimēta plura sunt: Primum est Hipp. aph. 41. lib. 5. Si scire velis, inquit, an mulier conceperit: dormiturę aquā mulsum potui dato: & si vëtris tormina patiatur, cōcepit: sin minus, nō concepit. ratio est, quòd mulsa ex vna mellis & dupla aquæ parte cōstans cruda sit & valde flatuosa: somni præsertim tēpore (collecto ad ven-

triculū calore) flatib⁹ excitatis, nec exclusis ob intestinorū angustia à pleno vtero oppressorū: quæ violentius distēduntur. Eget vero doctrina hæc pluribus cautionibus: prima, temporis, vt initium conceptus ab ea eximatur, cū cōtracto circa conceptum semē vtero, intestina minus astricta sunt, & oppressa: vnde subsidere & deprimi venter primis diebus videtur. Secunda cautio spectat habitum, & naturā fœminarum: vt sit vtræque mediocris (flatus enim in biliosa calidaque facile discutitur) idem in duro ventre per se & sine conceptu facile cohibetur, in molli digeritur. Tertia spectat consuetudinem: vt fœminæ nec mulsæ potioni assuetæ sint, nec doloribus colicis frequenter exercitæ. Secundum experimentum est eiusdem Hipp. lib. de sterilitate. si contritum anisum mellique æqualiter permixtum, & aqua dupla dilutum, circa somnum propinetur: hinc enim tormina proueniēt si conceptio est. Huius experimenti ratio eadem est quæ superioris ex flatu intercepto in intestinis ab vtero pleno compressis. Tertium eiusdem est, Si caput allij suo cortice deglubitum, & in cervicem pudendi insertum, odore suo mulieris nares aut sapore os non inferit: grauidam illam esse dicendum erit. Simile est omnino eiusdem Hipp. experimentum de suffitu aromatum subtus appposito, vestibis suis muliere ad pedes vsque obuoluta, cuius odorem mulier nō peregperit. Posteriorum horum experimentorum fides cōstat ex clausione interioris oris vteri tam arcta post semen exceptum, vt odorē aut vaporē nullam admittat: nec exceptū fortasse per cotyledones secundarum nexu occlusos transmittat. Possunt tamen hæc conceptionis signa à multis turbari causis, tum ab omnib. intemperierum insignium differen-

tiis. Calida enim vapores resoluit: sicca absorbet: frigida extinguit: humida obtundit: tum à tumori- bus præter naturam, vt scirrhis & obstructioni- bus acetabula intercludentibus. fortasse etiam va- pores ipsi alia via sursum ad os erumpant (etiam si conceptus sit) tum per occultos meatus, tum per venas vteri collo interno circumductas. Pleraque sunt alia conceptionis à veteribus prodita experi- menta. Primum, si vrina ex crassa & turbida, citrea aut subliuida sit, quæ concussa bullulas emittat sur- sum, & granula deorsum: neque hypostasis sit læuis. & æqualis: sed læuæ malæ carptæ similis. Alterum est si vini albi clari & tenuis permixtione vrina fœ- minæ euadat similis elixarum fabar. iusculo: causa e- nim est multus crudus succus aqueo vrinarum liquori permixtus qui secernitur à vino tenui. Ter- tium est si in fœminæ vrina in vitro bene te- cto condita, & per tres dies in vmbra asser- uata, plura gignuntur animalcula pediculis si- milia, per linteolum non transcolanda: Genera- tionis enim signum est, putredo crudioris succi, quam vmbra accelerat, solis calor inhibet. Quartū deniq; est, si in peluim æneam matutina vrina præ- gnātis fœminæ excepta sit, cui infundatur acus bene tersa & polita per totam noctem: nam si in eadē ex- tracta, mane plures maculæ appareāt, cōceptio erit: alias si nigricet, nulla: maculæ enim ab obhære- scente crudo succo excitantur.

De geminorum conceptu, & sexuum discrimine.

HActenus de cōceptionis signis communibus: nunc de particularib. vnus vel duorum: rarif- sime enim trium aut plurium occurrit, nisi forte in Ægypto ob Niliacæ aquæ nitrosæ & fœcundissi- mæ potationem. Est autem fœtuum geminorum

generationis causa spermatis copia, eiusque in duo uteri latera dextrum & sinistrum partitio : ex vno autem coitu conceptuque non vnicus tamen semper partus sequitur : sed sæpius plures vno vel duobus vel tribus vel quatuor aut quinque dieb. diuisi, ob plurium feminis eiaculationum in eodem coitu varietatem: quarum primæ sunt elaborationis, vltimæ magis iliaborati feminis: suntque gemini vel mares ambo, si virile semen prorsus vincat menstruum: vel foeminæ, si vincatur illud : vel mas & foemina, si partim vincit, partim vincitur. Eaque partus varietas accidit pro vario foetus foetæq; foemine robore: plures enim ex vnico conceptu minus robusti & viuaces esse solent: natura quoq; mulieris duobus alendis æque foetibus impar sepe est, nisi valida admodum sanæque sit.

Foetuum geminorum signa petuntur, tum ex tumore eminentiori duorum ventris laterû, tum ex motu in vtrumque latus eodem momêto aliquando incidente, tum denique ex tumore ventris post editum alterum foetuum aliquantum perseverante.

Signa sexuû distinctiua sumûtur: tû à causis, tû ab effectibus eorû. Marem enim demonstrant ætas parentum iuuenilis, biliosa, aut sanguinea, victus mediocritas, habitusque. Contra iunior aut senioretas, natura pituitosa aut melancholica, intemperans victus, ignauia & mœstitia foeminam designat: Effectus autem sunt: materni corporis accidentia quædam sexus consequentia. Sic apud Hipp. aph. 42. lib. 5. foemina formosior alacrior seipsa non prægnante masculum foetum detegit, ingeminato scilicet eius calore à foetu calido: Sic latus ventris dextrum tumidius ob sedem masculi in dextra uteri parte calidiori

lidiori, ex vicinia hepatis, magisque versus umbilicum & stomachum acuminatum: tum dextra mamma tumidior & solidior, papilla magis erecta, & rubescens, vel liuescens, lacte citius fluens crasso, lentoque, neque ex ungue, aut speculo, aut aliquo corpore polito celeriter excidente: sed bullis rotundis præsertim ad solem hærente: quodque si in cyathum aquæ infundatur, decidit indiuulsum: tum dextra vasa omnia enimentiora: pupillæ dextræ ampliores & splendidiores: venæ sub linguæ dextrâ parte magis conspicuæ, & in brachio quoque & manu dextra: pulsus dextri brachij maior & durior: Tunc etiam ambulatura mulier pedem dextrum promouet primum: surrectura dextræ manui innititur, ob lateris dextri & reliquarum partium robur maius, naris dextra magis ob calidiorem expirationem, rubescens & sanguinem sæpius destillans. Corpus totum magis vegetum & alacre, minusque grauiditatis symptomatis infestum: foetus masculi denique motus citior ut quadragesimo die authore Aristot. sed potius tertio mense, authore Hipp. & in latere dextro. Hæc masculi foetus signa omnia ex ipsius calore & loci in vtero pendent. Ille enim ut ex calidiori gignitur semine, sic & ex calidiori alitur sanguine, locoque moratur calidiori in dextro vteri sinu, ob viciniam hepatis & sanguinis affluentiam.

Contra vero fœmininæ prolis signa omnia (siue causæ sint siue effectus & matrum accidentia) fere omnia sunt contraria: ut color vultus magis ingratus, quam ante imprægnationem, & lentiginosus: corpus magis torpidum, animusque stupidus, & iners: sinistrum ventris latus amplius

præsertim ad coxas ob infirmiorē scēminā : sinistra vasa maiora: lac liquidius minusque album & crassum magisque fluens : hæmorrhagia naris sinistra & serosi sanguinis frequentior: Neutra tamen signa vsquequaque vera sunt: color enim prægnantis iucundior à causis externis accidere potest post conceptum : magis scilicet vigentibus calidis causis : vt sole, cibis acribus, motibus maioribus.

Potest etiam conceptus mas gigni ab effœminato viro : potestque aliquando in sinistro, sicuti scēmina in dextro sinu sustineri. Est enim vterus in medio vtre constitutus, in quo gestatio fœtus non in hoc magis quam in illud latus inclinat, nisi pro materna decumbendi consuetudine maris in hoc quam in illud latus deuoluatur.

Scēminini denique fœtus aliquāto citatior & maturior est motus, quanto māre ipso calidior fortiorque est. Quare iudicium de fœtuum sexu tantisper differendum est ; donec omnia aut plura signa concurrant. Nam præter illa occurrunt etiam experimenta quædā ad dignoscendū sexū efficacissima. Primum si lac in aquam instillatum in cyatho quāprimū lique scat & dissoluatur, scēmina est: si contra fundum petat indiuulsum, mas. Secundum, si aristolochiæ rotundæ puluis melle exceptus cum lana in ceruicem vteri inferatur, & dulcem saporem matri mouerit, mas est conceptus: si amarum, scēmina. Tertium si massa ex lacte muliebri pista & in pastillos coacta ignique tradita vratur, mas est: si crepet media, scēmina est. Quartum si granum salis papillis admotum lique scit, scēmina est: si induratur, mas. Quintum si imprudentis scēminæ

minæ capiti dormientis apij planta cum sua radice supponatur : eaque expectata si pronuntiarit primum nomen masculum, mas est: alias foemina.

*De conseruatione conceptus incolumis
in utero.*

FOetus conseruatur in utero incolumis duplici ratione, tum cōuenienti dicta: tum symptomatum conceptui superueniētium correctione. Dicta sit omnis exuperantiæ expers : quare aer æstuosus aut aliosus nimis declinetur: ille enim vires foetus & foetæ dissoluit: hic impensius refrigerat; sæpeque graui commota tussi ex destillatione capitis, prægnantis corpus valde concutit exturbatque foetum: Absit quoque ab eo omnis olidus vapor, siue excrementorum, siue olerum putrium: siue lucernarum extinctarum. Cibi sint temperati euchymi eupepti, non acres & piperati, ne aperiant acetabula, mensæque moueant; non falsi, ne humidam foetus substantiam consumant, & nascantur sine vnguibus : non frigidi humidique nimis : vt fructus horæi & lactinia : ex quibus multiplicati crudi aquosique humores vincula foetus emolliant: non flatuosi, qualia sunt legumina : ne dolores moueant, vimque vteri retentricem debilitent : non pingues, ne fastidium augeant: non multi, ne conceptus symptomata ingeminent, primis saltem tribus mensibus & vltimis duobus: quibus alimentum contrahendum est, laborque augendus. Semper tamen satietas inedia, & copia ciborū paucitati præferatur: motus quoslibet vehementiores fugiat: tum corporis: vt cursum, saltum, choreas, ascensum, & descensum præcipitem

scalarū & locorum decliuū, vomitionē, sternutatio-
nē, ventris expressionē, vociferationē: solasq; pro-
sequatur leues deambulationes & lanificij exercita-
tiones consuetas: sine brachiorum manuumq; con-
tentione magna: venerem denique nisi raram admo-
dum medijsque tribus mensibus: primis enim fœ-
tui valde infensa est, nono minus grauis: sed plerū-
que salutaris etiam. Vitet etiā animivehementiores
affectus, vt voluptates & gaudia nimis effusa: mœro-
rem & tristitiam: ab vtrisque enim retentrix vteri
facultas infringitur: illis quidem calorem & spiri-
tum agitando, & sanguinem ad fluxum commo-
uendo: his calorem ipsum spiritumque ab vtero
sursum ad cor reuocando: vestitus etiā sit laxis mol-
lisque: ne ab astricto nimis ventre, fœtus euadat aut
abortiuus, aut mōstrosus & deformis. Ventrīs excre-
menta neq; nimis fluāt, neq. subsistāt: quod si tardior
eorū excretio est, cibis molliorib. deturbētur: vt pru-
norū elixatorū iure: vt folior. maluē, violarię, sperma-
cium decocto cum multo recenti butyro, aut o-
leo dulci aut cum ℥ij manne iusculo pulli dissolutæ
vel cum ℥j medull. cass. vel denique cum leniore
clystere, ex decocto omasorum veruecinorum, qui-
bus incocta sint folia herbarum emollientium: sed
horum tamen exigua moles sit: propter angustiam
intestinatorum à repleto vtero oppressorum.

De symptomatum conceptus correctione.

Symptomata grauidarum, aliàs à plethora, aliàs
à cacochymia oriūtur: ab illa proueniunt tēsiua
lassitudo omnium corporis partiū, & grauitas lum-
borum, pectinis, crurumque: consuetus cursus
mensium:

menſium : hæc autem colligitur in ventriculo ante conceptum, aut poſt concepum, ex vitæ intemperantia, aut ex ſanguine cacochymo: cuius excrementitiâ cacochymia in ventriculû reſunditur à vicinis partibus: vt liene, meſenterio, hepate, aut à toto etiâ corpore per hepatis venas meſaraicas: Oriuntur autem à primo conceptus menſe, puſillo adhuc fœtu, neq; ſanguinis menſtrui ſatis cõſumente, deſinũtq; ad quartum menſem, grandiori iam fœtu, & largioris egente alimenti: Eſt ergo iſtorum ſymptomatû origo à conceptu per accidens: quatenus ille plethoram aut cacochymiâ exaggerat priſtinam, ſupreſſo menſtrui fluxu.

Eſt deniq; cacochymia hæc triplex: bilioſa, pituitoſa & melancholica, ex quâ naſcuntur hæc ſymptomata in vtero, fluores albi, aut ſaui, vel etiâ nigricâtes, pruritus, in ventriculo inappetentia, ſaſtidiũ, pica, malacia, ex perfuſione vitioſa & cacochymia ſtomachi: ſingultus quoque, nauſea & vomitio. In thorace & corde per ſympathiam impuri ventriculi dyſpnœa ex diaphragmatis oppreſſione: cordis palpitatio, vertigo. In cerebro ſomnolentia, ignavia, inertia mentis, & torpor artuum omnium, vaporibus ſcilicet craſſis humorum vitioſorum in ventriculo & præcordiis calentium ſurſum in cor & cerebrum ſublatis.

Alia denique ſymptomata ſunt & morbi ſimul: vt mammarum tumores & tibiæ, pedumque: rugæ ventris & vlcera: quæ enim prægnantes febrium differentia inuadere ſolent, ſiue continuæ quæ primariæ ſint, aut ſymptomaticæ: ſiue intermittentiũ: illæ quidem conceptum non vſquequaque comitantur: cum ſint ſine conceptu mulieribus infeſtæ.

Methodus curatiua symptomatum.

Symptomatum quæ plethorâ comitantur curatio constat:primùm victu parco frigido siccoque, & phlebotomia venarum cubiti dextri: si illa grauior sit & periculum minitetur suffocandi fœtus, primis quatuor tantum mensibus: eaque modica vt 3̄ vj. vel viij cui clyster molliens præmissus sit. Cacochymix symptomatum remedia quoque sunt, diætæ & pharmacia. Illa quidem aduersetur cacochymix: vt frigida acidaque biliosa: calida siccaque & acris, pituitosa, & melancholica. Cacochymix species internoscenda est ex ætate, natura, habitu, victuque consueto grauidarum, sapore linguæ, ex substantia & colore quæ vomuntur.

Pharmacia duplex est, alterans & vacuans: vtraque lenissima sit, ob fœtus infirmitatem. Vacuatio igitur constet vel simplicibus: vt aloe sæpius lota cum succo cichorij, rhabarb. & cortice myrobalanorum citrearum infuso aut puluerato tantum. Suspecta fenna est ob dolores flatuosos ventris: nisi cum discutientibus vt zingibere, aniso &c. diutius coquatur: aut in vino albo puro & tenui per noctem maceretur: Vel compositis, vt diacatholic. diapr. simpl. pilulis communibus mastich. alephâg. assaieret (cassia & tamarindor. medulla nimis emolliens & torminosa est: manna quoque eccoprotica tantum est) Alteratio denique intemperiei à purgatione in ventriculo relicte per interna externaque absoluator remedia deinceps exponenda in singulis symptomatum curandis differentiis.

Pica & malacia curatio.

Pica & malacia deprauata est appetentia insalubrium

brium, absurdorū, & inusitatorū alimentorū: huius affectionis causa est stomachi intēperies: nō ea quidem morbosa, prorsusque contra naturam: (cibos enim appeteret sibi dissimiles & contrarios) sed tantum præter naturam: & neutra: estque veluti naturalis ex longa excrementitiorum humorum consuetudine quæ similibus delectatur. Est autē hæc intēperies humoralis multiplex, vt pituitosa, biliosa melancholica, aliasq; sincera: vel mixtione aut corruptione varia: hinc ab illa variorum ciborum desiderium accenditur, vt salforum à salsa pituita: dulcium ab eadem dulci: acidorum à melancholia naturali: siccorum & astringentium (vt carbonum cinerum gypsi gagatis aliorumque huiusmodi à melancholia vsta: amarorum à biliosa: variorum & dissentaneorum, à mixta. Iure itaque à græcis *κίττα* à latinis pica hæc affectio est nuncupata: vtrumque enim nomen auiculæ proprium est, magnitudine palumbæ, alisque vario colore tinctis. sicuti *κίττα* quoque *ἀπὸ τῆς κίττης* i. hedera dicta videri potest: quod vt hæc obuias plantas tenacissimè amplectitur: sic intemperatus illo modo stomachus varios & inutiles cibos vehementer expetat.

Malacia eadem affectio dicta est, à mollitie, languore, & debilitate stomachi eiusmodi intemperiem comitante. Picæ signa sunt sensibilia: Prognostica sunt, quod matrem foetumque aliquando enecet vehemētiori desiderio appetiti à matre sed non impetrati cibi: quodque vtrumque inedia cōficiat & debilitet, foetumque etiam ipsū priuatim si superstes sit debile & valetudinariū exhibeat: tum quod mulierib. prægnantib. virisq; pueris & puellis

cachecticis sit commune symptoma: tum denique quod mul. cr. bus frigidis humidisque & præsertim intemperantibus, multo magis quam biliosis, gnavisque & frugalibus sit molesta.

CURATIO.

Pica omnis curatur diæta & pharmacia. Illa cacochymia: pituitosa, biliosa & melancholica, & intemperiei frigide calidæque opponatur: sitq; euchosmos & eupeptos, ubi malaciâ adiunctâ. Ergo aer paulo calidior sit vel arte vel natura: cibi calidiores, ut panis albus, salsus, anisatus & probe coctus: vinû rubrû generosum, minus cõsucto dilutû: carnes recentes, cum acris herbis elixatæ ut hyssopo maiorana salvia, vel potius assatæ. Condimenta acria nõ tamen aperientia sed modice adstringentia ut sunt macis nux moscata, &c. exercitationes paulo validiores.

Purgatio duplex est, vomitoria & deiectoria: Illa ab abortu tutior est primis mēsis ob raptum humorum sursum, quæ si spontanea est, iuuetur solo iusculo leniente carniû leuiter elixatarum, sine sale: aliàs potione aquæ tepidæ admixto oleo, citanda est, sic enim dilutus humor magis fluidus redditur, & laxatis tunicis ventriculus subuersioni aptior. Quod si difficilior sit vomitio ob crassum lentûque humorem: tum incidente magis & tergente potione proritabitur: ut ex decocto folior. hyssop. organ. admixtis oxymel. ℥ij vel ex decocto seminis raphani, atriplic. & aneth. cui oxymel. scillit. ℥ij miscantur, sicque tota dosis euadat ℥viiij vel x. debet autem hæc vicissitudo præparationis & vomitionis breviori constare interuallo; ut bidui, aut tridui ad summum.

summum. Vomitionem si fortasse difficilis nimis & noxia sit: quod aut insueta sit: aut corpori prægnantis & conformationi minus accommodata: purgatio suppleat ex clementioribus siue pilulis, cuius generis sunt communes, alephang. assaieret, singulæ ad \mathfrak{z} β vel \mathfrak{z} j: siue potionibus vt ex infuso rhei & agarici trochisc. & cortice myrobalanorum citrearum ana ad \mathfrak{z} j in aqua betonicæ, vel ex decocti sennæ \mathfrak{z} β cum cicerib. rubr. sem. carth. florib. anthos & borrag. Vacuationi corroboratio mox subiungenda est ventriculi, per remedia quidem calida siccaque & astringentia, non acria nimis amaraque, ne acetabula aperiant. Talia sunt intro assumenda electuar. aromatic. rosat. diarrhodon albat. vt singulorum dosis matutina sit \mathfrak{z} ij vel \mathfrak{z} iij. quib. superbibantur cochlearia duo vini rubri generosi, quo os totum ante ingurgitationem abluatur. Similes sunt opiata, vt mithridatium, theriaca ad \mathfrak{z} j vel \mathfrak{z} ij cum pauco vino, superbibito: & quæ ex saccharatis plantarum partibus conficiuntur: vt ex floribus rorismar. & saluiæ: cortice mali citrij, aurantij, zinziberis, myrobalanis, & nucibus moscatis conditis, pulpa cydoniorum cum pulueribus electariorum præscriptorum & syrupis idoneis, vt conseruationis corticis citri & myrobalanorum.

R. Conser. florum rorismar. & saluiæ ana \mathfrak{z} j conditur. mali citrij & zinz. virid. ana \mathfrak{z} β carnis cydoniorum, nuc. iugl. & myrobal. ana \mathfrak{z} iij nuc. mosc. conditæ \mathfrak{z} ij puluer. elect. aromat. rosat. \mathfrak{z} iij cum syrup. conser. cortic. citri, fiat opiata de qua capiât \mathfrak{z} iij vel \mathfrak{z} β singulis matutinis, superbibendo vt supra tantillo vini. Similes denique sunt de mentha &

Hh

de absinth. & vina medicata, vt absinth. & aromatis, i. hippocraticum, ad ζj vel ij mane sumenda: foris autem à sterno ad vmbilicum & ad vndecimam dorsi vertebram vsurpetur litus & embrochatio ante pastus, inanique ventriculo, ex oleo de mentha absinth. mardino mastich. muscatellino: ex iisdem oleis vnguenta fiant additis pulueribus aromaticum ad ζij , pro singulis olerum vncijs, vt

\mathcal{R} . olei absinth. & nardini ana ζij muscatell. ζj β pulu. mastices ladani benioini an. ζij . nuc. mosc. & macis an. ζj . ceræ albæ parum, fiat vnguentum. huic respondent ceratum stomachicum Galeni & emplastr. mastichinum. fouebitur etiam regio ventriculi ex decocto plantar. calid. menthæ, absinth. balsamitæ, saluæ, betonicæ, feminis coriandri, flor. anth. ros. & saluæ in aqua & vino rubro, post finitam coctionem, addito: ex quo decocto vel spongia vel gossipium vel lana inebriata & expressa præscriptæ regioni imponatur pluribus vicibus: vel ex vesica suilla, vel ex spleniis. ex eadem aromatica materia puluerata exceptaque pauco cotone & panno charmesino intersuti saccelli aptari eidem loco possunt: & iucundius circumferri.

Vnguentorum vicem emplastra supplebunt, sicuti & pellis vulturis.

In biliosa cacochymia, quæ rarior est in prægnantibus, diæta frigidior sit, sed modicè adstringens. panis ergo salis & anisi sit expers, sæpiusque hordeaceus aut secalinus: carnes recentes præsertim partes neruæ & albicantes, vt sunt pedes genia & intestina, quæ elixentur cum herbis refrigerantibus vt lactuca portulaca acetosa: & earum insculis panis imbutus coquatur. Conueniunt hordeum

deum tostum oriza lentesque. Condimenta sint acida, vt ex succo acetosæ mali granati & aurantij, & ex omphacio & aceto rosaceo. vinum sit oligophorum, & dilutum: fructus quoque astringentes & frigidi, cuiusmodi sunt pruna pyraque, malum cydonium, sorba mespilla, grana ribes, oxyacanthæ & post pastû cibis claudatur dimidio cyatho aquæ frigidæ: vel cochleari vno granorum mali granati.

Purgatio quoque duplex est: vomitoria & deiectoria: illa si spontanea sit & facilis; potionibus tantum lenientibus, vt aquæ tepidæ sinceræ vel hydrelæi, vel iusculis pullorum excitetur: sin parum difficilis: vt cûm bilis mixtione pituita crassior lentiorque euasit: potiones leniêtes quidem sed mixtis tergêtibûs & attenuâtibus exhibendæ sunt: vt ex oxymel. simplici vel scillitico in 3 viij. aquæ tepidæ: vel quod acrius sit, decoctum seminis atriplic. raphani, aneth. & summitat. hyssopi. Alias deiectoria vacuatio tenenda est: vel ex infuso puluerati rhei & agarici: vel ex puluere eiusdem: vel ex pilulis iam prædictis. Hæc autem purgatiuncula, sicuti & vomitio, bis terue reuocanda est per interuallum duorum vel trium dierum, quo humor vacuandus siue sursum siue deorsum magis vergit, concoquatur antequam iulepis refrigerantibus tergentibus & attenuâtibus: vt ex syrupo acetoso simplici oxymel. simpl. oxyfacch. simplici & melle rosato cum aquis eichor. acetosæ & endiuivæ. Puro denique ventriculo relicta intemperies calida protinus corrigenda est, præsidis intus forisque vsurpandis: quæ non solum caliditatem obtundant refrigerando, sed laxitatem etiam substantiæ à caliditate aliena inductam astringendo coerceant.

Intus quidē profint electuar. tabellata vt
 fantalum diamargaritum frigidum. Similes
 rupi de limonib. de gran. acid. foris litus ex
 fac. myrth. lentiscino melino id est cydonior.
 quibus vnguenta fiāt additis pulueribus idoneis
 fantali albi & rubri rosar. femin. lactucæ
 tulacæ cum cera alba. Sic ergo picæ & malacæ
 lectiā prægnaus mulier liberetur his legibus
 statuunt humoris cacoehymi purgationem
 præponendam, & intemperiei mutationem
 ponendam: Vt enim contentum quodlibet
 à suo continente validiori in eius naturam
 tur: & contra: sic ab efficaciori contento
 ipsum mutari contingit (ita enim dolium
 hocque vicissim à dolio inquinari solet) Sic
 culus eiusque orificium (stomachus) à cacoehymi
 humore diutius inhærente & à simili intemperie
 corrumpitur: eiusque facultates naturales
 petitiō deprauantur, impedito fine tum
 nis, id est nutritionis, cui inepta sunt appetit
 lia: tum formæ, quæ non potest ineptæ absur
 ciborum materiæ similis induci membris nutrien
 dis.

De singultu, nausea, & vomitione.

HÆc tria symptomata sunt expulsionis deprauatæ ventriculi. Cum enim toti corpori scilicet quædam expultrix indita sit: quæ quod molestum est, depellat, id ipsum quidem diuersis vni partibus diuerso modo præstant: plurimæ quidem per contractionem, vt cerebrum in epilepsia & sternutatione: thorax in tussi: intestina in deiectione fecum: vesica in mictione: ventriculus in singultu

gultu, nausea & vomitione: vnicum cor dilatatione & constrictione. Communis trium istorum causa est, humor vel grauans copia, vel mordacis & acris qualitatis, cuius humoris sedes diuersa est: tum in substantia ventriculi, vnde singultus: tum in superficie interna, vnde nausea: tum in ventriculi capacitatem, vnde vomitio. Singultus igitur causa est acidum vel acre serum ventriculi tunicis altius infixum: Vomitionis verò & nausæ id ipsum vel morsu vel copia grauiter molestant. illud à bilis speciebus: hoc à pituitoso excremento provenit.

Cæterum vomitio alias spontanea est, & naturalis: tantumque humoris excrementitij expulsio: aliàs symptomatica quæ frugum humorem, & chylosum vnà cum cacochymia excernit, quòd scilicet retentrix facultas per se inualidior sit: vel retentrix violentius irritata à cacochymia acrimonia & fæugine pungente, vel à copia opprimente. Naturalis vomitio vt critica sinenda est si perfecta: sin deficiens, iuuanda, tandemque ventriculus corroborandus. Symptomatica autem coercenda est accuratissime: ne matrem foetumque alimenti penuria debilitet, perimatve: Primum quidem vomitionis remedium est diæta: quæ in vniuersum sit intemperiei humorique vomendo aduersa, substantiæ mediæ, crassæ & viscosæ: non liquidæ: non pinguis: non tepidæ, vt facilius hæreat & interrim concoquatur, condimenta sint calida siccaque vel frigida: & vtraque astringentia: potus exiguus, & nullus à pastu.

Ergo in biliosa vomitione iuscula caponum, veruecum, vitulorum, cum pedibus eorundem

Hh 3

animalium, & porcorum comparentur, vt ex iis fercula crassiora concinnentur, ex incoctis, oryza, semola, lentibus, pane tosto, & hordeo tosto: quibus indatur omphacium, succus malor. granatorum, cotoneorum aurantiorum. Conferunt etiam pulres ex farina hordei tosti cum lacte vaccillo. Potus sit vini-rubei aqua pluuia vel fontana chalybeata copiosè diluti. A pastu deniq; cibus ventriculo includatur frigida modica portione: vel momento pomi pyrive aut cydoniati quib. ventriculus natura vel morbo frigidior est. In frigida & pituitosa vomitione similique ventriculi intemperie, eadem substantia media fercularum assumatur: sed aromatibus condita adstringentibus: vt nuce moscata, macere: non acribus, nimisque aperiētibus vt pipere, zinzibere, capella tenui, ne menses moucantur: vinum rub. generosum odoratum minusque dilutum: cuius sit omnino modica portio: cibus in ventriculo frigido cohibeatur & percoquatur absorpto post pastum puluere digestiuo vocato. vt,

℞. crustæ panis albi tostæ ʒj. sem. coriand. præparati & anis. ana ʒ ij. fragment. sapphyr. & hyacinthi, corall. rub. terræ sigill. an. ʒß tunica interioris gallinarum ventriculi ʒ ij nucis moscata, macis ana ʒj cinnam. crassioris ʒ iij sacch. pondus æquale omnium fiat puluis de quo detur cochlear vnum post singulos pastus.

Pharmacia denique vacuans cacochymiam omnem, siue vomitoria siue deiectoria alterantem & corroborantem antecedit: vt causæ fouentis prior sit, quàm intemperiei ipsius ablatio. Remediorum vtriusque speciei materia & formu-

læ modo enarrata sunt, cap. de pica & malacia. Si tamen vomitionis impetus topicorum efficaciam vincat : tunc cucurbitulæ magnæ & cum magna flamma ad vmbilicum affixæ validissimo tractu cibus cohibendus est in ventriculo mox à pastu : Ab alijs manuum pedumque in gelida infusio vomitioni auxilio esse traditur : Actius præscribit vt fiat in tepida : frigus enim præ dolore & subita alteratione longè à ventriculo auocat calorem & spiritum sine quibus nulla functio, nedum expulsio, fit: voluptas ex tepida eundem quoque allicit.

Vomitio alia est in prægnantibus rarior ex dissolutione ventriculi, & facultatis retentricis prostratione : quæ sinceri cibi potusque est sine vllius cacoehymix mixtione, vel ob humidiores intemperiem à causa manifesta natam, quæ nimis emolliat, & lubricet, vt sunt horarij fructus & præpinguia iuscula : vel ob qualitatem malignam & pestilentem, vt per suffocationem vteri & pestiferum cælum: Illa quidem remedijs adstringentibus sine vacuatione vlla præuia placanda: hæc tum blandis reuulsionibus, tum alexipharmacis temperanda est, cuiusmodi sunt theriaca, mithridatium.

Nausca prægnantium curatur iisdem vomitionis remedijs sola magnitudine differentibus: vt præparantia scilicet tanto magis sint acria amaraque, incidencia & tergentia : quanto materia nauscam excitans contumacior, crassior & viscosior est, atque tenacius ventriculi superficiiei affixa : quæ autem à dissolutione est, maiori quoque adstrictione & præstantiori cardiaca facultate indiget.

Singultus denique prægnantium à repletione

crebrior est à serosa & mordaci caeochymia tun-
 cis infixis : rarissima est ab inanitione , nisi for-
 tasse diuturnam & importunam vomitionem ex-
 ceperit. Hæc statim curabilis est lactis potio-
 ne, & iusculorum (vt vulgo vocant) consummato-
 rum, caponum veruecum vitulorum cum vitellis
 ouorum, amygdalatorum, hordeatorum. Illa à
 sero acri & pungente curatur crebrâ deiectione
 potius, quàm vomitione; post diligentem humo-
 ris præparationem per iulepos & apozemata ante
 exposita.

De bulimo & appetentia canina.

Alia est deprauatæ appetentiæ species famisque
 animalis sine inanitione insatiabilis inexpl-
 bilis & morbosa: nam quæ à cibi penuria & inani-
 tione oritur fames, naturalis est, eaque duplex. Vna
 fit à comuni venarum omnium tractu ab habitu
 ad orificium vsque ventriculi producto: in quo præ-
 ter cæteras partes tractus illius sensus est exquisitus
 crucians & molestans: atq; hæc fames dicitur anima-
 lis, quod animalib. sit propria. Naturalis altera dici-
 tur plantis & cæteris animalium partibus cõmunis,
 estque tacita quædam sine sensu penuriæ & inani-
 tionis cognitio; venarum radicumque tractum ali-
 menti facultatem exsuscitans. Porro animalis illa &
 secundum naturam, inanitionis modo respondet:
 quæ verò contra naturam est, sine inanitione insa-
 turabilis fere perseverat.

Causa proxima, vna est, intemperies frigidior sic-
 ciorque stomachi similem succui venarum sensum
 morsumque & molestiam illi inferens præ valida
 constrictione propriæque substantiæ expressione.
 Differentiæ duæ sunt, vna *βούλιμος*, altera appeten-
 tia

tia canina dicitur. Prima species à frigore tantum externo est : vt incedentibus per niues aut per montes editiores ; ob aeris ventique Aquilonij inspirationem & adhæſionem : tunc enim vel cute conſtricta coactus calor pabulum ſuum voraciter & celeriter conſumit : vel os ventriculi valide comprimit. In illa autem ſpecie prima tametſi fames ab initio imuaſerit rabioſa & implacabilis : haud multo tamen poſt tempore faſtidium ciborum ſummum tantumque ſtomachi languorem conciliat vt extincto penè eius calore : viribus omnibus deficientibus : corde & extremis partibus refrigeratis ; pulſu fatiſcente, ægri exoluantur, animoque linquantur. Magnitudinem famis nomen ipſum indicat.

Alterius ſpeciei & caninæ appetentiæ origo non à frigore externo : ſed ab interno eſt, acidæ pituitæ & melancholici ſucci ventriculi oriſicio impacti. Huc enim ex liene menſibus retentis oppleto per vas breuè reſunditur : ſicuti illa ſenſim colligitur ; vel ex pica & malacia : vel ex eodem menſtruo calorem opprimente. Perpetua eſt hæc fames & appetentia quæ cibis pluribus ventriculum debilem onerat, quos protinus reuomat: hinc canina dicitur.

Βελίμος igitur magis ſpecialis & particularis eſt: appetentia canina generalior ſine vniuerſalior. Fit enim ille ab vnica cauſa & aere externo frigidiore, ſine vomitu, tandemque in eo deſinit appetentia. Canina autem appetentia fit ſemper à frigore interno, vt dictum eſt: & in eo perſeuerat appetentia : rarius fit ab externo, vt frigidiore portione aquæ gelidæ, aut niuoſæ & fructibus frigidiorebus.

Curatio.

ERgo βουλιμῶ laborantibus præsertim viris (sunt enim puellæ & mulieres prægnantes, vt in peregrinationibus hyemalibus rariores : sic ab hoc symptomate tutiores) diætâ conuenit calida actû & potestate, alimentosa, euchymos, & eupeptos, crebra, paucaque: huiusmodi sunt iura consummata vocata, carniû gallinacearum vitulinarum verueccinarum, cum acriû plantarum foliis vt hyssopi sambuci satueiæ elixatarum; aspersus etiam aromatû pulueribus alterata: talia sunt iura earundem carniû expressa, concretaque, vitelli ouorum, butyrum, panis tostus cum oleo: pingua enim laxant frigoris constrictionem, vinum generosum, vel medicatum etiam: vt hippocraticam & pransis & ieiunis exhibendum: odorata quoque naribus admouenda, fatiscientibus præsertim viribus, sensimque exollescente appetentia: huiusmodi sunt panis recens coctus vel tostus vino generoso immersus: moschus & ambra vino diluta, aquæ quoque aureæ vt quæ imperialis cælestis theriacalis aut aqua vitæ dicitur.

Pharmacia alterans tantum, ex vsu est: eaque calfaciens ab intemperie frigida solitaria indicatur: sed caliditatis discrimen ex caloris natui varietate limitandum est: vt quanto hic imbecillior fuerit, tanto minus calidum remedium frigori quamlibet intenso opponatur, siue foris per ignem frictionem balneationem vñctionem: siue intus per vina medicata, & per antidotos vt mithridatium vetus, & the-

theriacam : ne pusilli caloris reliquæ ab alieno calore foras euocentur, aut ab interno dissoluantur.

Appetentiæ caninæ purgatio præter alterationem adhibenda est humoris crassi vel pituitosi vel melancholici : eaque deiectoria potius quam vomitoria ob humoris contumaciam, grauitatem, lentoremque, & crebra vt mediis interuallis humor concoqui incidi tergerique possit per iulepos aposmata & electaria exposita capite de pica & malacia.

Purgationi autem alteratio iungenda est, tum per dietam: tum per pharmaciam in βουλίμω annotatam: ad quam referenda etiam sunt litus & embrochationes oleorum calidorum, vt absinth. nardini, muschatell. & de mentha, & ex illis vnguenta, additis pulueribus & cera: tum fœtibz ex plantarum calidarum decocto in aqua & vino.

De cibi fastidio.

Fastidium cibi aliàs spontaneum est, & integra à cibo potuque abstinencia, aliàs morborum symptoma est oris ventriculi male affecti, intemperatique: illud græcis ἀσπρία, hoc ἀποσπρία & ἀνορεξία dicitur: in qua aliquid cibi tametsi paucissimi assumitur: huius causæ sunt proximæ duæ: Intemperies vehementes stomachi contrariæ, frigida, calidaque & sicca. Appetentia .n. in orificio ventriculi excitatur non ab immoderata frigiditate; quæ eam potius extinguit: sicut tandem in βουλίμω confirmato accidit: nec ab immodico calore, qui eam obtundit: sed ab utroque moderato: aut paulo tantum validiori: sic cappares, oliuæ, sinapi, & salsamenta, appetitum prouocant; vt cepæ, allia

herbæque olentes fessis messoribus æstu. sic acidi succi pomorum aurantiorum, limoniorum granatorum cerasorum, & similium, item acetum & acetata & acetaria eundem exuscitant: sed deiicitur ab intemperie vtraque vehementique nonnunquam simplex & solitaria est, & pendet à causis externis, vt cibo & potu. Sic aquæ niuosæ ingens frigiditas, vel aeris æstiu ardor, balnea, stufæ, vapor febrilis, vinū meracum, cibi fastidium inducunt: à frigidis enim sensus suctionis obtunditur, à calidis stomachi substantia laxatur & exoluitur, vt suctionem venarum non sentiat: sic pharmaci purgantis portione haustuque ob caliditatem appetentia tollitur. Alias intemperies vtraque humoralis est, & ab internis causis fouetur vt calida à bile, & pituita salsa: frigida à pituita acida albuginea dulci & emolliente atque exolūte os vētriculi: quæ autē inappetētia ab immodica vacuatione obrepere solet siue naturali, siue artificiosa, vt à lienteria, diarrhoea, & hæmorrhagia, ea quidē ad simplicē intēperiē frigidā referēda est.

Simplicis intemperiei signa sunt, calidæ quidē ructus nidorofus & oletofus (nisi fortasse cibi prauī aliquid egri sum pserint) coctioque frigidorum ciborum facilior: contra frigidæ ructus acidi, nulla sitis nullaque coctio ciborum crassorum & frigidorum. Humoralis autem & biliosæ signa sunt cardiogmos, cordis dolor, (lancinato à bile acri stomacho) tenebricosa vertigo (vaporib. ab eadē vsta sursum sublatis) oris amaror, quodd interna tunica ventriculi sit ori ipsius œsophago, faucibus, palato, lingue totique ori cōmunis: nausea, vomitus ab eiusdem bilis morfu stomachi, sitis, æstuatō, febris etiam aliquando (orta ob bilis putredinem.) his omnib. iungantur causæ

causę biliosi humoris seraces vt natura calida sicca-
que, iuuenilis ætas, habitus gracilis, tempora & re-
giones similiter calidę sicceq; Intemperiei autę fri-
gidę & pituitę in ventriculo redundantis argumēta
sunt, quod sine cardiogmo, siti; & linguę amarore,
ructus insipidos sputum aquosum & frequens ægrę
foemine emittant linguamque albicantem profe-
rant.

Fastidium denique vt prægnantibus per primos
menses, sic puellis & viduis supresso menstruo, vel
ob vitę intemperantiam molesta esse solet.

Curatio.

CALIDA intēperies simplex curatur tū diætā, tum
pharmacia alterante & cōtraria tantū: illa qui-
dē vt pane posca imbuto, vel iusculo herbarū frigida-
rum vt lactucę acetosę portulacę, potione oxycrati
aut aquę frigidissimę aut oxygalactis: fructibus aci-
dis, vt pomis pyrisq; prunis: condimentis acidis, vt
succo mali aurantij, granati, limonij, fol. acetosę, pi-
scibus in oxycrato coctis: syrupi denique cydonio-
rum de granat. acid. ad cochlearia duo vel tria, bis
aut ter interdiu multum conferant, foris quoque in
regione ventriculi ynguentum refrig. Gal. vel cera-
tum santalinum: sed horum frigidorum remedio-
rum modus sit ne insanabilem relinquant intem-
periem contrariam. Frigida intemperies contra ca-
lido victu vt vino veteri meraco siue Hippocratico,
pane anisato, iusculis carniū elixatarum cum her-
bis acribus: vt hyssopō &c. vel tostis iisdem cum
condimentis aromatatum: tum etiam pharmacia vt
electuario dracalamynthes arom. rosat. theriacę &

mithrid. syrup. de absint. & c. & foris cerato Gal. pro
 stomacho: oleis illinendis: vt nardino muscatellino
 absinthite. At intemperies humoralis quæ prægnan-
 tibus magis familiaris est, pituitosa præsertim, cu-
 ratur vacuatione pituitosæ cacochymix & quidem
 vt plurimum deiectionia: cum ob crassitiem lentō-
 rem & grauitatem vomitioni repugnet: ipsique præ-
 gnantiū naturæ & consuetudini sæpe sit aduersa. Hæc
 vero deiectio mitis sit & clemens, ob molitiem
 fœtus, & crebrius vsurpetur: sed per interiecta in-
 terualla præparatio coctioque humoris, per iule-
 pos incidentes & attenuantes in pica & malacia
 antea descriptas proeuretur. biliosa autem ob leui-
 tatem & caliditatem vomitione potius faciliusque
 extrudatur: nisi ab hac abhorreat prægnans: Proxi-
 matur autem vomitus copiosa portione hydrelæi re-
 pentis vel mulsæ dilutissimæ, vel iusculo pingui, vel
 pitifana pauco oleo addito: tandemque digito vel
 pennis, quæ oleo illitæ sint, in fauces penitus inser-
 tis. Alias deiectio sit clementior vt per pilulas
 dialoes per spatium trium aut quatuor die-
 rum repetitas ad ʒss vel per infusionem rhei & aga-
 rici cum syrupo de cichorio composito cum
 rheis: Diacydoniatum & de succo rosarum simi-
 liaque diagredyata & colocynthifata fœtui nimis,
 & prægnantis ventriculo infensa molestaque
 sunt. Mox denique absoluta perfecta que va-
 cuatione, vtriusque cacochymix, relicta intem-
 peries, topicis sumendis & admouendis contra-
 riis delenda est: sicuti cap. de pica iam expositum
 est.

De sui prægnantium.

Cum

CVm corpora nostra ex quatuor elementorum inter se mixtorum materia & temperie congrui nata sint, quorum substantia à calore nativo continenter digeritur: natura eiusdem conservandæ studiosa duplicem animalibus appetentiam inseruit in stomacho, Vnam alim.enti solidi & substantiæ calidæ siccæque: Alteram frigidi humidique & liquidi (illam famis, hanc sitis nomine vocant). Ad calidam autem siccamque substantiam ignea & aerea terrenaque substantia pertinet: sicuti ad frigidam humidamque aquea & humoralis: tametsi in hac quoque solidæ & terrenæ, nisi sincera aqua sit, sicuti in illa humidæ aliquid contineatur. Sitis autem sicuti & fames duplex est: Vna naturalis plantis omnibus: & singulis corporum nostrorum particulis ingenita, quæ naturali quodam instinctu & inclinatione frigidum humidumque alimentum capeunt, quoties eiusdem penuria laceantur. Altera est animalis soli officio ventriculi propria, ob insignem eius sensum: hinc animalis dicta quod solis animalibus data sit externum alimentum potumque quæsituris. Vtramque appetentiam antecedunt quatuor symptomata: ex quibus primum est extimarum partium sub cute inanitio: secundum est inanitarum partium fames naturalis, tractusque alimenti à maioribus venis & hepate ipso: tertium est ventriculi venarum succus ab officio roridæ substantiæ: quartum est succus istius sensus molestus. Postrema est appetentia animalis: quam naturalis præcessit.

Sitis igitur animalis aut moderata est, & pro-

portionalis venarum tractui: tātūque appetit frigida humidæque potionis, quantum proprium eius humidum incaluit, aut exoleuit à causis naturalibus resolutum. Immoderata sitis duplex est, vna præter naturam: altera contra eandem: Illius causa proxima est intemperies stomachi leuior: vel calida fundens, liquans, resoluens humidum stomachi naturale: vel sicciior idem absorbens.

Huius intēperiei causæ externæ sunt, calidæ: vt insolatus, æstuosum cælum, balneum, stufæ, vnguenta, condimenta acria & aromatica, allia, cepæ, vinum generosam copiosum aut syncerum, motus corporis animique vehementes, iracundia, vigilia. Hæc quæ contra naturam tripartita est: aut enim mera est priuatio, & abolitio: cum aut non sit suctus roridæ substantiæ, aut non sentitur: aut diminutio, cum primæ duæ causæ calfactio scilicet & exsiccatio minores & remissiores sunt: aut denique deprauatio, cum aut vehementior aut absurdi & à natura abhorrentis humoris.

Quæ abolita est aut valde remissa; fit ab intemperie frigida tantum, aut humorali etiam: vel per protopathiam vel per sympathiam totius corporis: cōtingit etiam moribundis & phreniticis prostrata stomachi sensitiua facultate, eiusque omnino temperie euerfa.

Curatio.

HÆc priuatio sitis aliquando accidit prægnantibus: sed rariùs, siue ex humidiori & frigidiori victu: siue ex menstruo pituitoso stomachum perfundente: hæc vero sætū sætāque valde debilitat & extenuat ob primæ secundæque

secundæque coctionis noxam: neque enim siccior
 cibus in ventriculo satis elixatur coquiturve: sed po-
 tius ob diutinam in eo moram vitiat, neque id-
 circo satis exfugitur, aut ab hepate distribuitur.
 Proinde symptomatici huic occurrendum est, frigi-
 de intemperiei curatione: tum simplicis per diætam
 calidam, & medicamenta calidiora foris intusque
 vsurpanda: tum humoralis per crebram mitem-
 que vacuationem pituitæ, præsertim mucilagino-
 sæ, sed coctæ, attenuatæ, & deterstæ, vt sapius iam
 inculcatum est, vel catarrhi capitis auersione & inter-
 ceptione. In ea autem quæ à sympathia est totius
 frigidioris corporis, frigido & humido humore
 scatētis, curandus imprimis primarius affectus vt ca-
 chexia, hydrops: moxque relictæ intemperies expū-
 genda. Quæ denique à partis stupore, aut mentis
 turbatione fit: mortis proximæ indicium est. Quæ
 vero sitis à causa externa est calida siccaque, tan-
 tumque præter naturam citra stomachi morbo-
 sum affectum, sola victus contrarietate refrigeran-
 tis & humectantis extinguenda est: sed refrigera-
 tionis modus sit, vt nec præceptis nimis nec vehe-
 mens sit: ne à potatione frigidiori & copiosiori vt
 putà aquæ, refrigerato hepate & ventriculo hydro-
 pis & cachexiæ periculum immincat.

Quæ cōtra naturā est à protopathia ventriculi bile
 flaua aut prassæa vel pituita salsa affluentis, curanda
 est tum diætā paulo frigidiori humidiorique:
 quæ præterea attenuet & detergeat tum vacuatio-
 ne: non quidem per phlebotomiam: nisi pletho-
 ra valde grauis sit, & abortum portendat: sed
 per purgationem mitem crebramque: vt per
 interualla trium vel quatuor dierum: quibus

interim cacochymia concoquatur.

Purgationis materia idonea erunt pilulæ dialoes, vel assaieret; vel alephangina ana ʒ ss sine custodia, vel infusum rhei & agarici: Coctionis siue præparationis cacochymia vtriusque biliosa & pituitosa materia idonea erunt syrupi non insigniter refrigerantes: sed incidentes & detergentes, quales sunt acetosus simplex, oxysacch. simpl. oxymel simplex, quorum bis in die duo aut tria cochlearia per se assumantur, vel ʒ ij eorundem, aquis stillatitiis vt agrimon. cichor. & acetosa ad ʒ iiij pro singulis dosibus dissoluantur.

Eadem sitis ex corporis totius & viscerum sympathia oritur: ex menstrui retenti scilicet & in venis ob infarctum & putredinem etiam leuem æstuantis, calida expiratione: cuiusmodi etiam sanis mulieribus imminente mensium fluxu, ob eorundem agitationem contingit. Hæc species sitis symptomaticæ curanda est diætâ frigidiuscula tenuiq; & attenuante: quiete, somno, & purgatione mitiore crebrâq; exuperâti cacochymia, vel biliosa, vel pituitosa: Phlebotomia autem nullus locus concedatur: nisi imminente abortus periculo ex sanguinis redundantia: sed tota sanguinis moles foetui relinquatur, quam adultior & consequentibus mensibus, depascatur. Interim autem sitis ipsa consopiat, orisque & faucium ariditas compescatur, vt crebra oris lotionem ex frigida, quæ vt incaluit, sæpius effundatur. Item si pruna cerasaque acida pomorumque frusta, acetosa & portulacæ folia sæpe ore versentur: aut lapilli aut ossicula volutentur: hinc enim pituita aquea in os proluitur vnde humescat.

De

*De connexionē & sympathia vteri cum vni-
uerso prope corpore.*

Connectitur vterus cum plerisque corporis partibus, vt cum cerebro & sensuum motuumque organis, per neruos: cum spinali medulla per vincula duo superiora: cum corde per arteriam aortam: cum liene, per maximas pluresque arterias ab aorta iuxta lumbos prodeuntes: cum hepate per venas hypogastricas & spermaticas: cum renibus, per venas spermaticas: quarum sinistra ab emulgente ortum ducit: cum mammis vel per hypogastricæ ascendētis & mammariæ descendētis coeuntes ramulos: vel potius per hypogastricam & spermaticam cum caua vena & axillari, & ab hac ortis pectoralibus duabus: cum vesica, & recto intestino, non solum per viciniam & membranas peritonæi vterum his partibus annectentes: sed & per communionem venarum ab hypogastrico ramo ad easdem partes diffusarum: cum osse pubis, inguinibus, coxis, ilibus, & osse sacro, per vincula duo inferiora: cum cruribus per ramos duos amplissimos à caua iuxta ossis sacri initium in femora obliquè abductos. Ex hac tam multiplici vteri connexionē, maximus illi cū plerisq; corporis partibus consensus & sympathia intercedit, quibus suos labores suaque tædia facile impertitur: idque vel per vasa, vel per ligamēta propria quatuor: vel cōmunia: vt sunt fibræ & membranæ à peritonæo ductæ: aliàs denique per viciniam. Hinc affecto vtero dolor occipitis, conuulsio musculorum, & artuum: caligo oculorum: sibili & tinnitus aurium: somni

graues: vigiliæ: melancholica deliratio: mania: Sic ex eadem sympathia vteri cum corde: lipothymia, syncope, pulsationis & respirationis defectus. Ex sympathia cum ventriculo vomitio, nausea, pica, malacia, βούλιμος, canina appetentia, fastidium cibi, sitis nulla, aut implacabilis, aut aliena: Ex eadem sympathia cum hepate: vteri sursum ascensus, vel exsiccati per nimiam hæmorrhagiam, vt gratioſo hepatis succo fruatur: vel retracti à venis nimis plenis: hinc quoque icterus, cachexia, hydrops: Ex sympathia cum spinali medulla: rigor, horror, frigus: cum renibus dolor in aluo ex suppreſſo menſtruo aut mox prodituro: cum vesica & intestino tenesmus & stranguria (vtero sc. inflammato) & ischuria eodem à fœtu nimis repleto: cum osse pubis, coxæ ilium, & inguinibus, coxarius ex phlegmone dolor: & claudicatio ex plegmone post partum: Denique ex sympathia cum cruribus varices: cum mammis tumores phlegmonosi oriuntur, & hæmorrhagia per papillam sanguine sursum ab utero ascendente, & lactææ vrinæ post partum.

De dolore vteri & vicinarum partium.

EX illis omnibus per sympathiam vteri prægnantium conflatis affectibus: solius stomachi vtriusque appetentiæ famis sitisque propria symptomata adhuc percurata sunt: reliquarum partium propria deinceps expedienda sunt: qualis est dolor vicinarum vteri partium, vt dorsi renum lumborum inguinum, ossis coxarum, pubis & ilium crurumque: qui dolor prægnantes fatigare solet tum primo imprægnationis tertianario, tum tertio.

tertio seu ultimo: Primo quidem ob redundantiam retenti à conceptu menstrui, atque ab ultimis venis spermaticis & hypogastricis tum in venam cavaam, tum in renales, aliorumque viscerum venas refluents: easque violentiùs distendentis, & impensius calfacientis: (eandem ob causam mensibus iam iam fluxuris puellæ nobiles, viduæ, & quæcumque scæminæ iis partibus grauter indolescere solent.) Ultimo vero tertianario dolor exoritur ob granditatem & grauitatem fœtus præfœctim gemini aut scæminini: hic enim decliuior gestari solet: ob artuum mollitiem, viriumque animalium & motiuarum debilitatem, & vteri corpus omniaque eius vincula tū propria tū cōmunia, vasaque & peritonæi fibras grauter deprimendis.

Vrgens à prima causa dolor quamprimum mitigandus est anodynis topicis: cuiusmodi est litus siue embrochatio lumborum, dorfi, & ossis sacri, ex oleo liliorum amygdal. dulc. violato: vntio ex vnguento resumptiuo, aut ex butyro solo mixto cum recenti axungia porci & pauco croco, fofus ex decocto florum chamæm. meliloti seminis lini caricarum & folior. quatuor emollientium, & applicetur per splenia vel lintheola imbuta: vel ex lacte solo tepido cum vesicis porcinis: vel certe ex sacculo repleto semine lini in lacte elixati. Liceat tamen anodynis istis topicis, refrigerantium portionem addere: quæ contrarietate sua vtramque doloris causam excindant tensionem emolliendo, & æstum alterando: tale est oleum nenuph. violaceum, rosaceum: tale vnguentum populeum.

Mitigato dolore semel, recursus eiusdē prohiben-

dus est: tum diæta frugali quæta & frictionibus leuibus: tum vacuatione per sectionem venarum cubiti dextri, præmisso clystere, communi & emolliente: siquidem abortus periculum ex doloris vehementia & sanguinis copia metuatur. In virginibus autem & viduis menses commoti à dolore isto liberant: Dolor denique à granditate foetus leniendus est: primum quidem tenui & parca diæta; ne cum mole foetus, doloris magnitudo & abortus periculum crescant: deinde pharmacia per topica astringentia frigida: ne laxioribus foetus vinculis fiat eiusdem ante tempus præcipitatio. Illa vero sunt lumborum dorsi ossis sacri regioni applicanda: cuiusmodi sunt litus & embrochæ ex oleo myrthino lentiscino omphac. & melmo. Item emplastrum mastichin. aut ex pice liquata cōfectum, cui puluis astringens permisceatur: vt boli armenæ, sang. dracon. & similia. Ex eadem vteri cum vesica & recto intestino per viciniam sympathia vtraque pars adeò comprimitur ab vtero tumidiori: vt sua excernere excrementa nequeat sine magna contentione & abortus discrimine: Quare mollienda alius est cibus lubricantibus: vt sunt iuscula herbarum malux betæ vel mercurialis, eaque pingua: vel ex carnum leui elixatione: vel ex olei dulcis aut butyri recentis dissolutione, quæ hora prima ante prandium absorbeantur: aut ex prunis elixatis, & saccharatis, aut ex ficibus, vel medicamentis mollibus vt cassia, manna, vel denique clystere communi aut ex oleo simplici: Ita duriores faeces dissolues, & euocabis, vrinam quoque foras propicies corpore prono & curuato, atque adeo hypoga-

pogastrio manibus leuiter releuato : ipsaque vesica ceruice saepe litibus & fotibus praescriptis relaxata.

De rigore, horrore & frigore.

EX eadem vteri cum vniuerso corpore sympathia foeminas praegnantes saepe molestant rigor, horror, frigus : ex quibus priora duo, sunt facultatis animalis symptomata; motus nempe veloces & frequentes partium totius corporis: frigus vero facultatis vitalis & coloris natiui partes deferentis.

Proxima rigoris, horroris & frigoris causa communio est partium sensientium : antecedens materia est pungens irritansque, humor scilicet acris & frigidus, & vapor sine humore frigidissimus & calidissimus; finalis causa est pungentis & irritantis humoris expulsio : instrumenta sunt muscoli articulis cruribus & toti corpori annexi : causa sine qua non, est illa humoris vel vaporis per sensientes partes nerueas & membraneas repentina delatio, & violentus motus: forma, vehemens est totius corporis quassatio & succussatio, dum singulae partes in vicinas molestant & pungentem materiam excutere conantur.

Porro materia haec humor vaporue vel externa est, ut acris frigidi vel aquae frigidae repentinus occursum, sicuti feruidioris balnei praecipuus ingressus & medicamentum acre mordaxque vulneri impositum : Alias interna est, eaque vel calida ut bilis flaua: & atra bilis ex melancholia per putredinem vel vitionem genita, & pituita salsa : eorumque

similes vapores : vel frigida vt acida & vitrea pituita. Porro internæ illæ causæ aliàs cum putredine & febre sunt, vel continua: cuius exacerbationes cum horrore & frigore fiunt: vel intermittente, quæ suas accessiones cum rigore, si biliosa, cum horrore, si atrabilaria, aut cum frigore tantum si pituitosa sit; & à pituita dulci inchoare solet: nam acida & vitrea pituita, si vehementer putruit, rigorem inducit: sin leuiter putruit, febrem epialum accendit, cum mixto frigoris & caloris sensu. Quod si febris absit, rigor horroreque à vitrea etiam pituita commouetur, non tam ex insultu substantiæ eius: quam vaporis eiusdem in partes sensientes impetu & incurfione. Illum quidem rigorem à vitrea pituita sine febre priora Galeno secula non agnouerunt, quòd temperanter magis victitarent: At Galeni ætas desidii otio crapulæ somno & balneis nimis molliter indulgens sæpe experta est: in mulieribus præsertim frigidioris temperamenti. Est autem rigoris horrorisque consecutaria semper perfrigeratio: non quidem ex humoris aut vaporis frigida qualitate: cum ab humore præcalido & plerumque sine humore, vt à tumore, rigor horrorque & frigus inferantur: sed ob caloris natiui repentinum ad intimos corporis recessus recursum, vel interceptionem: donec multitudine aucta propriæ ipsius substantiæ insultantem vaporem reprimat repellatque. Incipiunt autem rigor horrorque & perfrigeratio siue cum febre siue sine eadem à partibus posterioribus vt lumbis; dorso, totaque spina; in mulieribus præsertim natura frigidioribus: & in viris

in viris etiam : quod partes illæ externæ minus
fiat venosæ & arteriosæ carnosæque , sed nervæ
& membranæ magis quam anteriores : ideoque
caloris natiui inopia facilius inalgescunt , & per-
frigerantur : musculi enim foris spinam cingen-
tes in aponeuroses magna sui parte desinunt : sic
in artubus anterior poplitis pars & posterior ex-
ternaque regio manus & pedum promptius quam
inferiores earundem partium frigore laceffuntur.

Est igitur rigor horrorque mulieribus præ-
gnantibus sæpe molestus, sicuti puellis nubilibus
& viduis suppresso menstruo laborantibus : tum
ob acidam & vitream pituitam , ex peruersa vi-
uendi consuetudine ante vel post conceptum in
præcordiis collectam ; aut per venas cum sanguine
sparsam : vel dum propria sua substantia, quando
scilicet à facultate expultrice commouetur : vel
potius dum vaporibus suis tum cum incaluit & a-
gitatur, partes sentientes laceffit. Molestus etiam
est ob menstrui retenti vapores, dum ad venas
vteri à maioribus : aut contra à venis vteri ad ca-
vum & maiores venas visceraque omnia vicissim
fluit refluitque.

Symptomata hæc dum vigent mitiganda sunt,
abortus metu : partim reuulsione vaporum deor-
sum per blandam frictionem : nam durior men-
ses moueret & abortum : partim discussione eorun-
dem per assumenda, vt electaria acriora mithrida-
tium vetus & theriacam ad \mathfrak{z} j vel \mathfrak{z} ij cum cochlea-
ri vno vel duobus aquæ saluæ hyssopi meliss. vel
vini generosi vt maluatici , hippocratici ; idem
præstabit aquarum imperialis cælestis theriacalis
haustus ad \mathfrak{z} ss ab illis enim tenuioris & calidioris

substantiæ aeræ ignæque medicamentis aucti spiritus exhilaratur, calorisque naturalis impetu vaporum crassities & copia celerius vincitur, attenuatur & dissipatur, totusque habitus facile incalescit: partim etiam mitigabuntur hæc symptomata calefactione externa totius spinæ per topica calidiora: vt per totum ex linteis aqua vitæ calida imbutis, aut ex lateribus vino restinctis & panniculo obuolutis: item per litum & embrochen ex oleo rutaceo, laurino, costino, muscatellino cum guttis aliquot aquæ vitæ: deniq; per vnctionem eiusdem regionis ex vnguento Aregon, martiato, & Arippæ, aut ex theriaca veteri cum pauca aqua vitæ aut succo rutæ vt altius in partes nerueas membranasque densissimas medicamentorum istorum facultas & facilius penetret & peruadat. Iam verò præcauentur symptomata hæc, cum ab acida pituita ortum ducunt, tum victu calido siccoq; euchymo & eupepto: tum blanda crebraq; purgatione pituitæ per purgationis interualla, vt trium aut quatuor dierum, diligenter coquendæ: tum deniq; emplastro corroborante per topica vnguenta & linimenta: & per electaria vinâq; medicata, sicuti expositum est cap. de βουλίμω. Quod si à retenti sanguinis menstrui motu per venas vterumq; eadem symptomata oriantur, illa quidem prohibeantur diæta idonea quæ tenuitate sua & parcimonia sanguinis copiam demoliatur: caliditatem frigiditatem & crassitiem expugnet. Vacuatio autem neque per purgationem neque per phlebotomiam conducit: nisi fortasse à cacochymia aut plethora abortus periculum impendeat. Quod si puellas nobiles & viduas eadem symptomata à mensium suppressione inuascent, mox illi quidem necessariis vacua-

vacuationibus & alterationibus citandi sunt, tum purgationibus tum phlebotomiis, non omisis post vacuationes balneis, vnguentis, litibus, suffitibus & pessariis aperientibus & laxantibus. Sin eadem symptomata pituita vitrea protulerit: purgationes crebræ & validiores coctionesque intermixtæ ad eorum curationem instituantur.

*De cachexia, tumore pedum, & hydropo
leucophlegmatia.*

EX eadem vteri cum hepate sympathia oritur cachexia pituitosa (Pallidos vocant colores) & aliquando icterica, nec non melancholica. Hæc icterus niger, ille flauus dicitur. Est autem cachexia corporis habitus tum colore: tum substantia propria vitiatu, & τὸν οὐκ ἔχοντα opponitur, ἔχον enim habitum, κακὸς malum significat. Alioqui vox habitus, interdum apud medicos significat corporis solidas partes & contentas visceraque omnia; alias externas & continentes, quæcumque primæ intentionibus obijciuntur, vt sunt muscoli carne simplici, fibrisque constantes, & ossa foris cingentes. Priori significatione febris dicta est hecticæ, quasi solidis partibus, & visceribus affixa, ex quorum varietate eius differentiæ distinguuntur. Posteriori significatione ex habitu, id est, musculorum genere eiusque differentiis, vt raritate, densitate, gracilitate, obesitate, & colore, viscerum hepatis præsertim temperies observatur.

Vtraque significatione febrium intermittentium materia putrescere dicitur in habitu non solum externo, id est in musculis, sed interno etiam, & in visceribus. Ideoque materia hæc putrida partim

sudoribus, partim vomitione, deiectione & mictione eiicitur: ipsâsq; febriû accessiones criticè definit. Est ergo cachexia habitus vitiiati symptoma vel ab externis causis, prauoque victu: vel ab intemperato hepate per se aut per sympathiâ cacochymû sanguinẽ pituitosum biliosum aut melancholicum fundẽte, & reliquis partib. nutritioni cõferentibus cum scedis totius corporis: sed præsertim faciei coloribus, cuiq; sanguinis speciei congruentibus, vt pallido, citrino, nigricante, adiunctâ corporis grauitate, mollietie, laxitate musculorum, inertia animi, ignauia, & stupore ob caloris & spirituum intemperiem. Pituitosa autem sæpius puellas nobiles, viduasque, & mulieres prægnantes ob mensium suppressionem inuadere solet, dum eorum multitudine ab utero ad venam cauam, hepaticque refluentium, hepatis calor opprimitur. Aliquando tamen ex sympathia ventriculi frigidioris, & obstructi lienis prouenit.

Curanda ergo est prægnantium cachexia pituitosa primùm quidem diætâ calida & sicca attenuante, tergẽte & aperiente, sed omnino modicè, ne menses abortumve promoueat: deinde vacuatione per sectionem venarum cubiti dextri, quæ copiam exoneret, & hepatis, oppressi calorem refocillet: & per purgationem mitem quidem, sed crebram, sæpiusq; iterandam: interim per interualla duorum, aut trium dierum, cacochymia cotumacis & pituitosæ sedula præparatio intercedat. Purgationis & præparationis materia iam sæpe exposita est. Mox deniq; à vacuationibus idoneis viscera roborentur calidis siccisque remediis tum sumendis, vt vino absinthino ad ʒij. quotidie mane: vel syrupo absinthino, & de
mentha

mentha ad \mathfrak{z} j. per se, electario aromat. rosat. &
 diarrhod. abbat. ad \mathfrak{z} iiij. theriaca & mithridatio ad
 \mathfrak{z} j cum pauco vino, pulueris vocati digestiui co-
 chleari vno post singulos pastus: tum denique
 admouendis foris regioni ventriculi, & hepatis, vt
 oleo nardino, absinthino, muscatellino, cerato
 Galeni pro stomacho: Eadem sit methodus cura-
 tiua reliquarū cachexiæ specierum & ex cōsensu vt
 putà lienis, sicuti & pituitosæ, quæ puellas non nu-
 biles molestare solet ex praua diætâ, & cruditatibus
 multiplicatis. Cachexiam pituitosam subsequitur
 œdematosus pedum & tibiæ tumores ex sero
 sanguinis pituitosi in decliues partes istas prolapsi
 à vena caua per crurales duos insignes ramos iuxta
 initium ossis sacri à caua deductos. Tumoris huius
 curatio post causæ antecedentis prædictam vacua-
 tionem & hepatis corroboracionem constat valida
 exsiccatione & resolutione per fotus, vnguenta, em-
 plastra: Fotus materia est lixiuium ex cinere planta-
 rum siccarum vt sarmetorum vitis, ramorum ilicis,
 brassicæ, ficus, tithymali, in quo sulphur, alumen &
 sal liquecat. Item decoctum plantarum acrium vt
 origani, calamenthi, & similiū. Applicetur autē po-
 tissimum per spongiam, qua soluta mox embro-
 chatio fiat cum oleis acerrimis, vt de lateribus, de
 castorea, de terebinthina, de ruta, & de euphorbio.
 Vel etiam ex his oleis vnguentum paretur.
 \mathcal{L} . salis marini vel salis petreæ \mathfrak{z} ss. aluminis sulphur.
 an. \mathfrak{z} ij. soluantur aqua vitæ ad sordium crassi-
 tiem: deinde adde olei rutacei \mathfrak{z} iiij. agitentur
 supra ignem vsque ad vnguenti substantiam. Pa-
 retur etiam emplastrum huiusmodi.

℥.olei veteris ℥vj.ceræ albæ ℥iiij liquefactis adde
 terebinth. ℥iiij tandemque permixtis & refrige-
 ratis omnibus adde salis petre cineris ficuum &
 stercoreis columbini ana ℥j fiant magdaleones.
 Tale denique fiat cataplasma. ℥ stercoreis columb.
 & sulphur. ana ℥j farinæ fabarum & lupinorum an.
 ℥jß cum succo caulium rubeorum,& aceto fiat ca-
 taplasma. Hydrops denique leucophlegmatias,
 quem pedum tumor solet antecedere, curandus est
 vt cachexia pituitosa,cuius est symptoma.

De palpitatione.

Palpitation est inuita & contra naturam partis a-
 licuius distensio, vicissimque facta contractio:
 materia distendens vapor est multus,& crassus, qui-
 que ob crassitiem suam, locique continentis angus-
 titiam,& densitatem perspirare non potest,& exha-
 lare. Itaque tantisper partem dilatat, atollitque,
 & contrahit, donec attenuatus vapor, & expulsus
 transpiret. Causa effectrix vel generatrix eiusmodi
 vaporis intemperies est frigida partis alicuius ali-
 mentum suum non coquentis: siue ea ipsa palpitet:
 siue in aliam palpitationi idoneam,vaporem trans-
 mittat.

Antecedentes causæ sunt partim quidem in-
 sitæ,vt natura frigida, ætas senilis, sexus plerumque
 muliebris; partim adscititiæ, vt cælum frigidius,
 tempus hybernium, otium, satietas, ciborumque
 crudorum & flatuosorum ingurgitatio, somno-
 lentia. Colligitur denique vapor eiusmodi in
 partibus quæ dilatari, rursusque in seipsas fidere
 possunt: quales sunt in primis causæ, vt cor,arteriæ,
 ventriculus,vesica,vterus, intestina, & quæ sine ca-
 pitate

uitate naturaliter molles sunt, vt musculi. Colligitur etiam inter duo corpora solida, quæ à se inuicem disparat (neque enim illa distenduntur) vt sibi cauitatem efficiat, in qua tumultuetur. Sic inter cutem & musculos sanguis qui ante coctus fuerat, refrigeratione postmodum crudior & flatuosus palpitationem inter easdem partes mouet.

Est igitur palpitiatio solius morbi opus, nihil ad eius generationem naturali, aut animali conferente facultate. Differt autem à tremore variis quidem modis. Illa enim distensio quædam est, contractioque partium veluti repletarum, & vicissim inanitarum, quæ cum proprio loco non cedant, vicini tamen aliquid relinquunt, occupantque. Neque enim os, cartilago, neruus, aut vinculum palpitat (cû dilatarî nequeant.) Tremor verò motus est voluntarius deprauatus partium quæ feruntur sursum, vicissimque referuntur deorsum, mutato priori loco, alienoque occupato, ideoque totum membrum tremulum mouetur: nulla eius parte immota, quiesque permanente: Quin etiam in tremore nulla pars affecta est aut ægrotat: sed animalis tantum facultas debilis est: cuius instrumenta nerui, & musculi noxæ sunt expertia etiam in mortuis: Vocatur tamen à practicis nostris tremor: quæ vera est palpitiatio à simili motu vtriusque, & concussionem partis palpitantis & trementis vtròque facta: alias formido in corde dicitur, quod palpitatione laborantes tanquam hoste conspecto terreantur mox superaturo, vixque superando. Ob eandem concussionis similitudinem symptoma hoc ad naturalem partis facultatem sese variè quatientem depellendæ molestiæ causâ, quidam referunt: ideoque di-

cūt non distendi partem quia impleatur, neq; cōtrahi, quod inaniatur: sed quia vapore aliunde irruente, vel in se genito stimulat, quem quod præ immobilitate dissolvere aut arceie nequeat, modo dilatari modo contrahi in sese putant.

De palpitacione cordis.

Cordis autem affectus alij sunt idiopathici, alij sympathici. Idiopathici quidē vt intemperies tum simplices tū humorales, vt obstructiones cordis sinuum, & arterię maioris. iuxta suū initiū, necnō tumores præter naturam, saltem incipientes: necāt enim in suo incremento ægros: vt erysipelas, phlegmone, tuberculum, solutio unitatis: item vlcera & vulnera, saltem non penetrantia. Sympathici sunt lipothymia, syncope, palpitatio, quæ tamen tria symptomata aliquando etiam idiopathicos propriosque cordis affectus sequuntur. Quando autem per sympathiam excitantur, id fit nonnumquā consensu: pericardij sero citrino repleti, motumque cordis præ adstrictione impediētis: nonnumquam totius corporis consensu, dum sanguine multo, & flatuoso abundat, vt melācholico, pituitoso, atrabiliario cordis ventriculos implente: qualis sympathia adolescenti, & alteri cuidam ineunte vere quotannis molesta fuit, tādēque funesta apud Galenū cap. lib. 5. de locis. alias fit vitio præcordiorum & visceris alicuius: vt ventriculi, hepatis, lienis, vteri, ē quorum vitiosis humoribus incandescētib; quacūq; occasione impensius calefaciente, vt exercitatione vehēmenti, irācundia, inedia, vino meraco, eduliis, & condimentis acribus, copiosus & flatuosus vapor sublatus per arterias, vena-

venâsque in cordis sinus subit , quos vt pulsationi suæ noxios cor excutiat, tâdiu sese cōcutit, donec liberum assequatur motum suum, illis extrusis, vel omnino deficiat: vnde sæpe syncope aut mors repentina palpitationem consequitur: præsertim si flatum hunc semper præsentem, & in se genitum, inclusumque præ valida intemperie frigida habeat. Hinc spleniticis, ictericis, hystericis, melancholicis, hypochondriacis, & quibuscumque cachexia laborantibus viris, foeminisq; grauis esse solet palpitatione.

Palpitatione ergo cordis prægnantium foeminarum recens, nec ante conceptum molesta, non ex idiopathia, propriâque cordis intēperie, sed ex sympathia vteri sæpius oritur, suppressique menstrui noxâ, dum ab utero refluyente illo totum corpus opprimitur, venæque maiores, & sinus cordis penè implentur, vel quædam viscera in præcordiis ab eodem priuatim obsidentur, hepar præsertim, & lien, pancreas, & epiploum, ex quo æstuant (vt ante dictum est) vapores per arterias in cordis ventriculos transmissi, nec præ crassitie, & copia sua, aut cordis substantiæ densitate, celeriter discussi palpitationem eius intus suscitant fouentque.

Curatur duobus instrumentis, diætâ, & pharmacîa: Illa sit calida, siccâque, tenuis & attenuans magis vel minus pro diuersa sanguinis euaporantis specie, sæpius pituitosi, & melancholici in prægnantibus, rarius atrabilaris & qualis iam sæpe descripta est in stomachi symptomatis: Hęc verò sit vacuans, alterânque: illa quidem duplex, vna per phlebotomiam, altera per purgationem: illa enim sanguinem redundantem in toto corpore, vel

in viscere aliquo, vaporémque eius cor laceffentem exhaurit, ex præcisis venis cubiti dextri vel sinistri: pro varia sede affecti ab vtero visceris: Huic phlebotomię præmittatur clyster molliens, tergens, resoluens paucúsque, & mediocris deambulatio, quæ torpidum sanguinem ad fluxum exsuscitet. Purgatio quoque clemens & innocens, omnisque venenatæ qualitatis & acrimoniæ, quæ sætui insensa esset, expers, crebráque, & bis, aut ter reuocata, & alternatim in hebdomade phlebotomiæ quamprimùm substituat, quæ cacochymię flatuosæ speciem impunè detrahat, eaque per intervalla duarum, aut trium purgationum sensim coquatur, & expulsionì appareatur. Materia tum coctionis, tum præparationis accuratè satis exposita est capitibus de symptomatis stomachi & ventriculi. Vbi autem causa antecedens, & materialis his vacuationis differentiis phlebotomiæ, & purgationis submotà fuerit, tum demum causa coniuncta, id est, vaporum reliquię, viscerúmque intemperies frigida medicamentis calidis siccisque roborantibus & digerentibus deinceps expugnanda erit: intus quidem theriacæ & mithridatij veteris quotidiana & matutina dosi ad \mathfrak{z} j per se, vel cum \mathfrak{z} ij conseruæ rosar. vel tabellę vnus electarij diagalangę & aromat. rosar. ad pondus \mathfrak{z} ij. vel iij. superbibendo cochlear vnum, vel duo vini: oppugnanda etiam matutina portione vini absinthitis vel decocti eiusdem ad \mathfrak{z} ij. Item si pituitosa materia sit, visceraque impenitus perfrigerata, sumpto cochleari vno, vel duobus aquæ vitæ, præsertim cum aniso destillatæ, imperialis, cælestis, theriacalis, cinnamomi aut eius aquæ, quæ ex duobus, vel tribus cordibus, sicuti
bouis,

bouis, cerui, porci, aromatibus, cinnamomo, caryophyll. zinzibere transfixis, tostisque, & compressis elicitur: vel eius, quæ ex iisdem cordibus per taleolas minimas sectis, additisque pulueris vtriusque galangæ ʒ vj. & seminis basiliconis, macis, & cinnamomi ana ʒ ij. folior. borrag. bugloss. meliss. ana m. ij. post temperationem in vino generoso destilletur. Foris autem regioni cordis palpitantis applicetur theriaca, aut mithridatium, bis aut ter in die, cum pauca aqua vitæ, vel nodulus camphora repletus: vel sacculus puluere aromatico factus, & ante applicationem aqua vitæ respersus. vt,

℞. radic. vtriusque galangæ ʒ ij. cubebarum, seminis nigell. roman. rutæ, basiliconis ana ʒ ij. cinnamomi, caryophyll. macis, santal. citrini, corticis citri ana ʒ j. fiat puluis, excipiatur pauco cotone moscato, & serico rubro, fiat sacculus interpunctus, qui gestetur super regionem cordis suspensus de collo cum filo charmesino. Quod si quando palpitationis, & dyspnœæ magnitudo ad suffocationem vsque creuerit, ex commotis grauitè vaporum tumultibus: cordisque motum intercipientib⁹: vel ex agitata pericardij aqua, vt post choreas, & vehemētē exercitationē puellis cachecticis continere solet: tū primū solutis vestib. & erectis corporib. libera respiratio in loco amplo. frigidōq. remota omni hominum turba, cōciliāda est, moxq; vapores deorsū reuellendi per fricationes, & deligationes tibiārū, & clysteres acriores. Vapores deniq; ipsi cōfestim digerēdi, potione alicuius aquę stillaritię antea præscriptę, vel opiatę. Puellis autē nubilib⁹ viduisque palpitatione laborātib⁹, ob mēsiū suppressionē,

tici, vt opij occursum, aut calefactione per æstum cæli, stuphæ, balnei, vnguenti: tum oppressione & suffocatione per timorem ingentem, tristitiâ, mœrorem, anxietatem & prohibitam respirationem. Eadem vis est causarum internarum in mutanda caloris eiusdem fluentis temperie, & substantia. sic enim corrumpitur, & incenditur ab acutis febribus earumq; symptomatis, fastidio, vigiliis, diarrhœis: alteratur à frigidis, siccis, eorûmque vaporibus vel simplicibus, vel etiam venenatis. Atque his quidem modis spiritus, calorque vitalis læditur. Quæ læsio si communicetur partibus solidis, fiet syncope, aliàs lipothymia tantum, vel etiam exolutio. Huius signa sunt oscitatio, pandiculatio, tenebræ oculis obiectæ. Lipothymix & syncopes: cuius illa principium est, sicuti lipothymix, exolutio: signa communia sunt frigiditas, sensus, motusque, & pulsus priuatio. Syncopæ proprius est sudor frigidus, & viscosus è fronte temporibus, collo, & thorace effusus. Sequuntur autem hæc caloris influentis & insiti vitia, tum idiopathicos cordis affectus: vt intemperiem fortem, phlegmonem, erysipelas, tuberculum, (tuncque cardiaca dicuntur:) & vulnus: tû sympathicos, vt oris vetriculi eisdem affectus: (vnde stomachica vocantur) & præterea dolor eiusdẽ à morfu, vel bilis, vel pituitæ salzæ, acidæue, vel ab aggrauatione, & oppressione: vt à crassis, lentis, humidis, & frigidis humoribus; creditatibus, vel à venenata aspiratione; Sequuntur denique totius corporis affectus, cuius plethora flatuosa obruitur, vel etiam alicuius visceris, à quo emissus vapore quodam venenoso, spiritûque infecto vix omnis vitalis conuelliatur.

Curaturus ergo hæc tria symptomata medicus, causas externas, internasque diligenti studio inquirat, distinguatque, & singulis sua remedia per otium opponat. Grauidis autem mulieribus familiaris, frequensque est exolutio, aut lipothymia à cacochymia ventriculi biliosa, vel pituitosa, ob victum improbabile ante & post conceptum, vel ex mēstruo ab utero in ventriculum redundante, unde mordetur vel opprimitur, & vellicatur (corde ob viciniam condolente) forasque spiritum, & calorem sinente effluere. Rarissima enim est venenatae aure expiratio ab utero prægnantium, vasis eius undiquaque obsessis, eorumque orificiis secundinarum tam arcto nexu obstructis, ut nihil omnino aut vaporis, aut humoris admittere, aut transmittere. sursum possit.

Primum igitur symptomati isti tam præcipiti, horrendoque, & urgenti, ne veram syncopen, mortem, aut abortum saltem inducat, illico succurrendum est: cum vitalium spirituum instauratione persumenda, ut cochlearia duo aut tria aquæ buglossi vel borraginis, & melissæ, vel potius per cochlear dimidium aquæ imperialis, vel cælestis, vel mithridatij, aut theriacæ ꝑj. cum aqua melissæ, vel cōfectio nis alkerm. & de hyacintho ꝑij. cum vino generoso, vel hippocratico paucò. Est enim calidorum, acriumque, & valde aperientium remediorum in prægnantibus magna dosis metuenda, fluxus mensium nomine. Admouendorum quoque magna vis est in spiritibus augendis, ut odoramentorum vaporosorum ad nares: cuiusmodi sunt panis à recenti coctione, aut affatione calēs, vinoque calido, & generoso merisus: aqua rosacea, vinumque generosum
faci

faciei aspersum; aceti odor acrioris vires excuscat
naribus vellicatis: & diplomata aqua vitæ imbuta;
cordisq; regioni admota: Mosci & ambrosiæ aqua me-
lissæ solutorum, naribusque admotorum, vel etiam
illitorum maxima vis est ad spirituum instauratio-
nem. Postremo præcipitanda vestium solutio, &
corporis ad sessionem erectio, facilioris respiratio-
nis causa. Symptomate sic mitigato affectus e-
iusdem author curandus est, intemperies nempe
ventriculi, si præcipua eius noxa sit, & caco-
chymia ex eo omnis tum biliosa tum pituitosa
imprimis exturbanda est, sensimque & per in-
terualla coquenda per alterutram purgationis
speciem, vomitoriæ scilicet vel deiectioniæ, pro æ-
græ naturæ & humoris propensione. Postremo
corroborandus est ventriculus remediis internis
externisq; frigidam eius intemperiem oppugnantibus.
Horum omnium materia formaq; pluribus an-
tea capitibus expressa est. Quod si sine vlla ventricu-
li noxa, lienis aut cuiuslibet visceris sympathia in-
tercedat, à quo putridi humoris tetra exspiratio
spiritum vitalemque calorem exoluit: eiusdem
visceris temperatio confirmatioque, symptomate
prius lenito, animoque reuocato, post caco-chymię
putridæ expurgationem suscipienda est.

De febribus pregnantium.

Febres omnes vel intermittentes, vel continuæ
sunt, & acutæ. Illæ quidē vel simplices sunt, ab v-
nius humoris vno in loco extra venas putredine: sæ-
pe tamē evadūt duplices, triplicesq; vel ob copiam ex
cremētitiij humoris: vel ob diuersam sedē: aliæ sunt
cōpositæ ē duorū humorū concurrente putredine,

vel in diuerſa ſede, & implicitè dicuntur, cuiusmodi ſunt *ἡμικρῖταις*, vel in eadem & confuſæ vocantur: nomen autem à conſuetis periodis trahunt, vt quotidiana, tertiana, quartana, ſed notæ dicuntur. Cæterum ex intermittentibus quædam erraticę occurrūt, quæ ineertis diebus, horiſq; accedunt: vel quòd è diuerſis humorib. quorū ſit ſuus & proprius cuiuſque motus, eadē ſede putreſcentibus accēdantur: ſic ex ſanguine putreſcente tertiana quartanaq; inducuntur, dum uſtione in flauam bilem, atramq; conuertitur; vel quòd ex iſdem accendātur in eadē parte, ad quā viciffim, & per varia interualla, vel à toto corpore, vel à partibus quibuſdam, redundantes amandantur.

Vtraque intermittentiū ſpecie, conſtantiū, & erraticarum, mulier prægnans conflictari ſolet, vel quòd retentus menſtruus ſanguis duplici cacochymia melancholica, & pituitofa ſordeſcat; vel certe quod cum ſimplex ſit, variis tamen interuallis in alias aliāſque partes ab utero ablegetur. Acutæ denique, & cōtinuæ, vel primariæ ſunt, in maioribus venis concepta putredine: vel ſymptomaticę ex viſcerum inſlāmatione, vt phrenitide, angina, peripneumonia. Porro intermittentes omnes tam cōſtantes, quàm erraticæ, foetus foetæq; alimētum diripiunt, abortumq; frequenter ſymptomatū magnitudine, vt rigoris, horroris, doloris lumborū & capitis atq; iactationis artuū prouocāt. Itaq; vtriq; intermittentiū ſpeciei accuratè in prægnātib* eſt medēdū, primum quidē diætā febrī, & cacochymię ad putredinē propēſe cōtrariā, vt pituitofę & melācholicę, tēperata quædem, ne cruditate febrē, & frigiditate excellēti cacochymiā augeat, attenuātē tamen, tergētē, & aperietē ſed

fed omninò modicè : ne menſib' cōmotis abortus fiat: deinde pharmacìa purgāte, alterāte, & coquēte. Illa quidē mitis & crebra ſit: cuius interuallis vt triū aut quatuor dierū humoris purgādi coctio, vel præparatio interponatur. Vtriuſq; autē tum vacuationis, tum coctionis materia, & forma ſēpi' antea expreſſæ ſunt. Quod ſi cacochymi ſanguinis, plethora grauiſq; laſſitudo vrgeat, & venarum tumor emicet, vel vehemētiora ſymptomata acceſſionū torqueāt, vt rigor, cephalalgia, &c. tum moderata & partita potius quā m vnica, venarū cubiti ſectiōe ante purgationem erigendę, leuandęque vires ſunt, præmiſſo clyſtere molliente leuiterque tergente. vt,

℞ foliorum betæ, agriūon. & abſinth. ana m. j. hordei integri, furfur. macri, & roſar. ana p. j. ſemin. ſcenogr. ʒ ſſ ſemin. aniſi ʒ ij coquantur & in colaturę ſſ j diſſol. mell. roſat. colat. ʒ ij catholici ʒ j olei roſat. ʒ iij fiat clyſter. Poſtremo ventriculus topicis antea deſcriptis roboretur, ſi quidem in eo eſt focus putredinis: aliās affecto viſceri, vt hepati, lieni accōmodatis remediis cōſuletur. In viduis autē puelliſq; ex eadem mēſium ſuppreſſorū putredine febricitantibus remedia omnia efficaciora, tūm vacuātia tūm alterātia ſunt vſurpanda; menſeſque validiū excitādi ſunt non ſolūm internis valdē aperientibus vt apozematis, iulepis, puluerib' & antidotis: ſed etiā externis quoq; reuulſionib' deorſū factis, vt lotionib' crurum, femorūque, inſeſſibus, ſemicupiis, balneis, ſotibus, embrochationib' vñctionibus, peſſariis, cucurbitulis ad inguina aſſigendis, deligationibus artioribus femorum, tibiārumque: de quibus lege caput de ſuppreſſione menſium.

Febres acutæ omnes ſiue primariæ, ſiue ſympto-

maticas, lethales Hippocratis edicto haberi oportet: ob matris prægnantis, foetusque communem debilitatem necessariorum remediorum impatientem: Illius quidem ob paucū frugi alimentum: quod à foetu purius & defæcatus ex menstruo attrahatur: huius ob molliciem. Quæ autem sunt sine febribus acutæ ægritudines: vt apoplexia, epilepsia, cōuulsio, eò magis lethales habēdæ sunt; quò facultates duas vitalē & animalē, grauius quàm febres labefactent.

Curanda tamen est mulier grauida, si acutè egrotet: neque omnino ob salutis desperationem deferenda est, quoniam Hippocratis prognosticum ex aphorif. 3 j lib. 5. non in necessariis, sed frequentibus tantum casibus numerandum est. Curatio autem ita temperanda est, vt matri magis, quàm foetui subseruiat, cum illius incolumitate huius vita, non contra, contineatur. Ergo febrī acutæ dixta frigida, humidæque, euchyma, & *ὑπερθερμὸς*, cuiusmodi sæpe antea descripta est, omninoque mediocris opponatur, ne aut alimēti penuria foetum solum, aut copia matrem foetumque aucta febre perimat. Quod ad pharmaciam attinet Hipp. aphorif. 24. lib. 5. secundo tertianario, vt 4. 5. 6. imprægnationis mēse purgationem permittit turgentis præsertim cacochymię. Eandem primo & tertio tertianario dissuasit. Huius præcepti rationē Galenus in commēto apposit, tum matris robur & alacritatem in secundo tertianario à coctionis, & appetentiæ symptomatis liberatæ, tum firmiorem secundinarum cum cotyledonibus nexū; tum densiorē solidiorēq; foetus habitū: quibus cōtraria omnia in primo tertianario adsūt, mater nimis valetudinaria, infirmiora vincula, habitus foetus mollior, & qui à cathartica medicamentorum

torū facultate, eorūq; perturbatione magis infestetur: In tertio autē tertianario, quòd abort^{us} periculū à purgatione peliusius multo sit, ob fœt^{us} grandioris, suaq; sponte toras properātis agitationē, ventrisq; cōpressionē, & vinculorū solubilem ariditatē, vel poti^{us} ob facultatē vteri expultricē à medicamento excitatā, feriātē interim retētrice. Poserit ergo pręgnās mulier ex febre acuta laborās purgari secundo grauiditatis suę tertianario: (maxime si neq; abortui assueta, neq; valetudinaria sit: fœtūq; suum sublimem ferat) turgēte pręsertim cacochymia, à cui^{us} decubitu phlegmones alicuius visceris materni, fœtusq; periculum metuendum est: si tamen humor quietus, coctusque in venis cōsederit.

In acutorum statu & declinatione, vt & intermittentium, lentorumque, hunc quoque humorem non turgentem, sed coctū purgare licet: sed mitius in primo tertianario, quàm secundo, & mitissimē in tertio tertianario. Sic enim Hipp. in secundo tertianario purgationem pręmisit comparatē, & efficaciorē quàm in primo aut tertio. In hoc enim abortus maximum imminet periculum, pręsertim octauo mense, sicuti & quarto. Purgatio itaque mulieris pręgnantis instituatur iniecto prius clystere molli parumque tergente, ex cassia non simplici quidem, ne nimium lubricet: sed mixta, cū rhabarbari pulvere, vel potius eiusdem infusione constet, in qua syrupus de cichorio compositus soluatur.

Veherentiora, vt diagrydiata & colocynthisata medicamenta malignitatis nomine fœtui infensa, & cathartica perturbationis plena sunt. Quieto autem, & desidi humori coquendo iuleporum vsus,

aut apozematum tribuendus est ante purgationem; quo turgens alioqui materia nequaquam egere statuitur. Iuleporum materia constat melle rosato colato, simplici oxymelite, oxyfacccharo simplici, syrupo acetoso simplici, & aquis cōuenientibus endiuix, cichorij, acetosæ, & agrimonij. De phlebotomia autem ita statuendum videtur. Hippocrates quidem à grauidarum ægrotantium curatione grauissima censura illam abdicauit, aphorif. 37. lib. 5. vel quod per eam copiosiore suoque sæculo familiarem fœtui alimentum subduci putaret: vel quòd grauidarum curationi phlebotomiam adhibere nondum consueuisset, ideoque mulieri ex casu aborturæ octauo mense non adhibuit. Nos tamen in singulis tertianariis, omniq; grauiditatis mense tutam & utilem esse ad vacationem in febribus acutis primariis, & ad reuulsionem in symptomaticis putamus: Cum enim purgationem multo magis naturæ aduersam secundo tertianario permittat, cur ab eodem phlebotomia excludat? cur, si primo tertianario toto in quibusdā prægnantibus sanguinis redundantia menstrua periodo exhauriatur à natura, phlebotomiæ vsum grassantibus tum febribus acutis repudiemus? cur denique à tertio tertianario phlebotomiam remoueamus cum sanguinis multum ex primis mensibus residuum sit? Retineatur igitur tam salutare præsidium, quantitate eius conuenienti diligenter æstimata, partim è magnitudine febris, partim ex matris robore, partim ex ætate fœtus: cuius incolumitas ex sanguine materno pender, ideoque primo tertianario parum, secundo minus, tertio minimum detrahendum; idque partitè po-
tius

tius, quàm vniuersim: vt interpositis interuallis vires reficiantur. Phlebotomiæ autem penaria vici-
tus frigalitate supplenda est: præstat enim debi-
lem nasci foetum, quàm abortiuum exire: quod si
urgente necessitate, phlebotomiæ tamen vsus
tutus non sit: eiusdem vicaria sit scarificatio cum cu-
cubitulis ad axillas aut inguina: vel hirudinibus af-
figendis reuulsionis gratiâ.

*De Affeclibus capitis ex sympathia
uteri, & primum de Ce-
phalalgia.*

EX omnibus partibus capitis mēbranas solas do-
lor grauissimus exercet, quia hæ solæ exquisiti
sensus participes sunt, tã internæ duæ, crassa vna cra-
nio subtēsa, tenuis altera cerebro vndiquaq; impli-
cita: quàm externa vna cranio foris circūiecta, quæ
peruraniū vocatur. Est autē dolor symptoma sentiē-
tis facultatis: cuius proximæ duæ sunt causæ, in-
temperies, & solutio continuitatis. Harum rursus
origo duplex est, alia à causis manifestis externis-
que vt frigore, æstu, ictu, odore, ebrietate, vini
generosi, merique potione: alia à causis abditis
internisque, tum idiopathicis vt à frigido, & pitui-
toso vel melancholico sanguine in venis eiusdem
redundante: tum sympathicis, & ex consensu sub-
ditorum viscerum: vt ab humore vaporeve acri &
rodente: vel frigido & grauante: vel flatuoso & di-
stendente: ab utroque enim non solum intemperies
similis, sed continuitatis etiam solutio inducitur, dū
abile & biliosis vaporibus membranæ incalescunt,
roduntur & vellicantur, aut à pituitosis & melan-
cholicis crassioribus distrahuntur. Ex hac doloris
causarum,

causarum, partiumque capitis dolentium varietate
 res notantur eius differētiæ. Cephalea enim totius
 capitis est, & à propria eius intemperie diuturnus
 & inueteratus dolor, ideoque facile irritabilis, à qui-
 buscumque causis internis externisque sopitum &
 quiescētē humorem agitantibus. Hemicrania do-
 lor est partis tantū debilioris & lateris vnus, è subie-
 ctorū viscerum vaporibus, & sympathia facile ex cā-
 descens. Cephalalgia denique ab vtrisque causis ex-
 ternis & internis facile toti capiti inducitur, citoq;
 desinit. Est quidem cephalea & hemicrania mulie-
 ribus sæpe molesta, tum ob capitis idiopathiam
 aut in toto, aut in parte vehementer intempera-
 ti: tum ob sympathiam viscerum impurorum
 exasperati. Est enim cerebrum pro suturarum
 cranij discrimine, & meningum interstitio, tri-
 paritum, in occiput & cerebellum à cerebro se-
 iunctum: synciput: & cerebrum in duo latera
 diductum, cum singulis ventriculis. Sedes autem
 doloris interior ex diffusionē eius ad radices
 oculorum detegitur: ad quas venæ, vasaque è cere-
 bri parte proxima proueniunt: Externus peri-
 cranio pressio, motuque quolibet vt pectinis ex-
 asperatur. Cephalalgia autem iisdem prægnanti-
 bus, primo saltem tertianario, grauissima, fe-
 reque impatibilis, & quotidiana esse solet, ex sym-
 pathia vel crudi, vel cacochymi spurcique ventri-
 cu i, vt sæpe antea repetitum est: vel vteri: ab
 illo crassorum vaporum transmissio fit secundum
 neruos insignes duplices, per palati foramen: ab
 hoc per venas & arterias iugulares internas exter-
 nasque in anteriorem capitis partem, synciput, tem-
 pora & frontem, à quibus meninges calore & acrimonia

monia vellicantur; vel copia distenduntur & diuelluntur. Potest etiam eadem transmissio per obuias quasque partes porosque latentes fieri in synciput, præsertim qua parte cranij ossa tenuissima sunt, valdeque porosa, & plures futuræ transpirationi idoneæ; per quas meningum complures fibræ foras elapsæ pericranio, & panniculo carnosio illas annectunt: quæ quæ sensu exquisitissimo polleant, totâ illam partem anteriorem doloris causis obnoxiam magis, infestamque reddunt. Accedit vasorum iugularium, arteriarum, venarumque multiplex concursus: quorum vecturâ vapores eodê deponuntur. Cæterum occiput, & posterior capitis pars vteroque condolefcit, ex sola illius per spinalem medullam sympathia: cui validioribus duobus vinculis obuiet^r est; sine ullius humoris, vaporisve communicatione, sed sola generis societate: cum iisdem men. branis cerebrum, spinaque obtegantur.

Mitigatio Cephalalgia.

Symptomatis tam duriter cruciantis mitigatio præcedat, causarum eiusdem intemperiei & solutæ unitatis curatio sequatur. Lenitur autem illud reuellendo, reprimendo, tandemque resolvendo. Reuulsio constet deligatione, & fricatione femorum crurumque omnino modica, blandaque; ob fluxus mensium & abortus metum, clysteribus mollibus & pilulis leuissimis, minimūque humores foetūque commouentibus. sed crebrioribus. Clysterum materia sit ex decocti emollientis lb. j. in qua mellis violati, & looch de cassia, vel diacatholiconis an. ʒ. ʒ. olei violati vel chamæmelini ʒ. iij. dissoluatur: pilulae sint communes, vel de hiera, alephāg. & mastich. ad ʒ. ʒ. singul. dosib. Reuulsio etiam fiat lotionibus pedum, & tibiarum, manuumque ex decocto.

foliorum origani, calamenthi, absinthij, artemisiæ,
 lauri & lauendulæ, mixtis paucis frigidis, ne san-
 guis à calore eximiè deorsum tractus descēdat. huic
 decocto vini albi quinta aut sexta pars permisceat-
 tur. Denique cucurbitulis ad scapulas, & ceruicem
 affixis & deligationibus, atque fricationibus bra-
 chiorum validissimis (ab his enim abortus metuen-
 dus non est) sub initium leuiter ab ipso capite re-
 primetur vapor, nec non frontis, & temporum ar-
 cta deligatione per fasciolas, quæ constrictis vasis
 vapores irrupturos arceant; & arteriarum validam
 vibrationem prohibeant, qua membranarum do-
 lor exacerbari vehementer consuevit, tensionem
 denique membranarum flatuosam impediunt. Eadē
 quoque partes illinendæ oxycrato ex olei rosacei &
 chamæmelini ana \mathfrak{z} ij albumine oui vnus, aceti ro-
 facei \mathfrak{z} j (multum enim aceti digerit repellendo,
 siccatoq;) diu hæc agitētur & simul misceātur. Admo-
 uendū quoq; ceratū tale. \mathcal{Z} mastich. & thuris ana \mathfrak{z} β
 boli armenæ & sanguin. dracon. ana \mathfrak{z} ij albuminis
 oui vnus, olei rosacei \mathfrak{z} ij aceti rosacei \mathfrak{z} β extēdatur
 super alutā, fiatq; frontale. Cōferent & odoramēta,
 vt aquæ rosacæ cum modica caphura, & aceti rosa-
 cei cum spongia. Discutientur tandem vaporū reli-
 quæ parti harētium, & concretorum, ipsaq; partis
 intemperies frigida simul delebitur litibus, frōtali-
 bus, odoramentis, & fotibus. Hi quidem cōstent de-
 cocti foliorū saluiæ, maioran. beton. meliss. ana m. j.
 baccarum iuniperi & seminis coriandri ana \mathfrak{z} j flo-
 rum chamæmel. & stœchad. ana p. j huic colaturæ
 sexta vini albi pars admisceatur, & cum splenis
 applicetur fronti, temporibus, & syncipiti rasis
 capillis; vel naribus ex spongia admoveatur.

Litus

Litus ex oleis chamæmelino irino & de stæchade. Frontalia cōcinnētur ex tela forti cannabina incluso puluere cephalico, vel præscriptæ in fotu materia. Hæc quidem cephalalgia sympathicæ curationis est, cuius exemplum ad biliosam, calidamque (si quādo in mulieribus prægnantibus occurrat) transferendū est, augendaque ab initio repellentium facultas frigida, siccaq; sed in declinatione minus calida topica vsurpentur, & magis humectantia, & calore temperata, qualia sunt viscera calētia maiorū animalium, catelli, pipiones, pullique per mediam spinam secti. Tales sunt fotus ex floribus chamæmeli, meliloti sambuci in lacte elixatis: item litus ex oleo chamæmel. anethino, irino, cheirino & catellorū. Mitigata hac arte cephalalgia acerbitate; curatio eiusdem inchoāda est causarū eiusdē à victu primū cacochoymia contrario, vt calido siccoque & tenui, cum à pituitosa ventriculi, aut melancholica vteri viscerūq; exhalatione gignitur: vel frigido humidoq; vbi ex dolore rodēte cacochoymia biliosa suspecta est: deinde purgatione miti, & ex intervallis crebris, quibus interim cacochoymia coquetur, & præparabitur ad purgationem. Vtriusque materia antea sæpius, pleniusque exposita est. Postremo vētriculus intus forisque remediis idoneis roborādus est, vt electarilis, fotibusq; & vnguētis de quib. quoq; copiosē antea,

De peruigilio & somnolentia.

Peruigilium, & cōtumaces vigilie corporum vires omnes prosterne, mentemque perturbare solent. Proximæ earum causæ duæ sunt, calida, & sicca intemperies, ex quibus illa primas, hæc ultimas partes sibi vendicat. Vtriusque intemperiei

causæ procreatrices sunt, aliâs manifestæ: ut æstus cæli, inedia, sitis, labores improbi, studia, curæ graues, amores, zelotypia, dolores: aliâs internæ, & antecedentes: ut sunt calidi morbi, febres, humor biliosus, vel atrabilarius aterque, & mordax vapor cerebri substantiam potius, quàm meningum eius calfaciens, & exsiccans, ætas iuuenilis & senectus. Illa biliosa, hæc melancholica est: vtraque in vigilias prona est. Somnolentia contra frigida, humidæque intemperiei soboles est, ab vtraque enim facultates omnes animales, functionesque adiuæ, motiuæ, & principes obtunduntur, & consopiantur: sic frigus hyemis serpentes stupefacit, sic frigidi cibi, ut lactuca multa, sic pituitosi, frigidi que capitis morbi, quibus apophlegmatismi valde conducunt, soporem & veternum inducunt: eandem esse vini intemperiei humidæ declarant tum balnea, quod caput madesfaciant, tum dilutior vini potio, cibique omnes plurimum humectantes, ut hordeata, amygdalata, tum denique ætas puerilis. Ut ergo intemperies potissimum calida, deinde sicca vigilias, sic frigida per se humidæque somnum accersunt arctiorem, & prolixiorem: sed vtraque iuncta inexcitabilem. De isto symptomate, Hippocratis in aphorismis effatum est. Somnum, & vigiliam, si modum excesserint, malum esse: ille enim humidam, hæc aridam intemperiem humorum maiorem sequitur. Peruigilium autem prægnantibus insensum aliquando est, ex sympathia vteri, suppresso per cõceptum menstruo, eo que tum in venis vteri, tum aliorum viscerum præsertim hepatis, & lienis æstuante, magnamque vaporum calidorum vim

vim in cerebrum per poros occultos, vel conspiciuos, & capaces venarum & arteriarum expirante primo tertianario. Dolor enim aliarum partium, vt ventriculi cruditate, & cacochymia oppressi, dorsi, lumborum, ilium, totius ventris, & lassitudo tensua, corporisque iactatio ob granditatem & grauitatem fœtus tertio tertianario, sepe iisdem quietem interpellat.

Mitigatio per uigilijs.

Comprimitur hoc symptoma primū diæta refrigerante & humectante ex iusculis carnum humidiorum, vt hœdorum, vitulorum, veruecum, pullorum, pipionum elixatorum cum folijs portulacæ, lactucæ, papaueris albi, borraginis, buglossi acetosæ, endiuix, & ex lacte amygdalino cum euulsione seminū frigidorū maiorū, minorumq; vt papaueris albi, hyoscyami albi, lactucæ, cucurbitæ, melonum, cucumeris agrestis, & ex hordeatis eodem lacte dissolutis, & ex lotionibus frigidis, humidisque pedum, & tibiærum manuumque, ex decocto foliorum papaueris albi, hyoscyami albi, solani, cucurbitæ, cucumeris agrestis, vitium, salicis, florum trium communium, & nenupharis in aqua fontana, vel fluuiatili coctorum: Summa denique quiete corporis, animique securitate, & curarum omnium fuga, sedatur. Pharmacia deinde in subsidium vocanda est: & reuulsiones leues primum vsurpandæ: tum per blandas fricationes pedum, plantarum, & manuum, tum per clysteres lenientes & refrigerantes modicè, ex cōmunis decocti lbj. in qua olei nenupharis & violacei ℥iij. cassiz recēter extractæ ℥j. mellis violacei ℥ij. soluantur.

Deinde per repulſiones vt per frigida humidáque fronti, & temporibus apponenda: vt ſunt oxyrhodina, ex olei nenupharis ꝓ ij aceti roſacei ꝓ ꝓ vitello oui vnus: vt ſunt litus earundem partium, & fibrarum aurium, ex oleo mandragoræ, papaueris albi: vt ſunt odoramenta per ſpongiam in decocto refrigerante prædicto, vel in aqua roſacea cum pauca caphura maceratam, vt ſunt denique poma narcotica ex ꝓ ij opij ſtyracis ꝓ j & ꝓ croci ꝓ ꝓ corticis radicis mandragoræ ꝓ iij terebinthina exceptis & redactis in pomum admouendum naribus. His enim remediis omnibus vigiliæ à caliditate & ſiccitate alioqui contumaces tandem vincentur: addito præfertim frontali huiusmodi.

Ꝙ mandragoræ ꝓ j ꝓ ꝓſyllij, & coriandri præparati an ꝓ ꝓ papauer. albi ꝓ ij. opij ꝓ ꝓ contuſa omnia malaxentur oleo nenupharis, fiatque vnguentum; aut addita cera ceratum. Neque verò ſomni tempore aduentante ſyrupi de papauere ꝓ j per ſe, vel cum aqua potabili, aut electarij requies ꝓ ij cum eadem doſi conſeruæ roſarum dilutæ vt ſupra repudiabuntur. Symptomate mitigato legitima curatio cauſarum antecedentium ſuſcipienda eſt; quæ viſcerum cacoſchymiam tum è ventriculo, tum ex aliis viſceribus redundante menſtruo obſeſſis blandè, & clementer, ſenſimque excludat, & concoquat, ſicuti ſæpius antea enarratum eſt, plethora quoque nimis grauem primo tertianario parcè licet, tutòque mediocri ſanguinis miſſione per venas cubiti leuare. Poſtremo ventriculus ex poſitis antea remediis roborabitur: ſi quod eius vitium vigilias fouere notum ſit. Reliquarum denique partium dolores anodynis, litibus & vnctionibus

nibus totius ventris, spinæ & ilium, inguinumque lenire expedit.

Mitigatio Somnolentie.

Somnum autem non naturalem compescas iisdem remediis generibus reuellentium, & repellentium, digerentiumque. Ac reuulsionum quædam leuiiores sunt, vt fricationes, & deligationes tibiarum, lotiones earundem ex decocto superiori simili, sed paulo magis calente: clysteres modicè tergentes, calentesque, vt ex decocto foliorum, absinthij, organi, calaminthæ, maluæ, violariæ ana m. j. flor. chamæmel. meleot. & rosarū ana p. j. seminis anisi ꝓ ij in colatur. ꝥ j dissolue mellis rosati colat. ꝓ ij olei chamæmelini & anethini ana qrt. ꝑ clectarij diacatholiconis ꝓ j. Tales sunt purgationes mitiores, & frequentiores, cacochymia pituitosa, sed interiectis interuallis coctæ & recoctæ, siquidē pituitosa cacochymia tantò contumacior est, quantò frigidior, & crudior crassiorque. Vtriusque tum purgationis, tum coctionis materia, formaque luculenter antea expressa est. Reuulsionones vehementiores brachijs, collo & scapulis decernentur: à quibus nullum abortus periculum impedere potest. Ergo manus & brachia vsque ad cubitum lauibis decocto eodem iam descripto, sed calidiori: & brachia eadem durius fricabis ligabisque: cucurbitulas amplas & cum multa flamma collo, scapulis & summis brachijs impone. Hæc enim tum materiam vaporosam reuocant: tum ægrotantem excitant. Reuellentibus iisdem remedijs repellentia intermiscbis, frontique, & naribus obicies, minus quidē frigida, sed digerentibus mixta, ne inde va-

porum concretio & intemperies frigida cerebri
 crescat: tale est oxycratum. ℞ olei rutacei & chamæ-
 melini ʒ ij. albumen oui vnus, aceti rosacei ʒ ss.
 (plus enim aceti magis siccatur, & consumit repellē-
 do) affundatur frōti, & temporibus vsque ad regio-
 nem futuræ coronalis. ℞ aceti acerrimi lb. j. folio-
 rū siccorū betonicæ, maioran. serpilli, saluæ an. m. j.
 baccharū lauri, & iuniperi cōtusæ, florū chamæmeli
 & stæchadosan. p. j. seminis carui, & cumini an. ʒ j. &
 ss. coquantur, coeantur: hac colatura imbuta spōgia
 applicetur naribus calide, aut fronti etiā & tempo-
 ribus. Repellentibus deriuantia cōiunges percucur-
 bitulas, vt dictum est, ceruicis initio, scapulis, & sum-
 mis brachiis affigēdas. per errhina post proximum
 narium fotum, vt si ex olei irini, & rutacei an. ʒ j. ca-
 storei & seminis nigellæ an. ʒ j. & ss. aceti scyllitici
 ʒ ij. ceræ tantillo fiat vnguentum ilinendum nari-
 bus interioribus. per masticatoria, vt radicem pyre-
 thri in aceto per noctem infusam: per vnctionem
 palati ex theriaca, mithridatio, aut cathartico vt
 diaphœnicone. Post vacuationem causę anteceden-
 tis per reuulsiones & repulsiones: tum demum cau-
 sę coniunctæ vacuatio, digestio, resolutioque tan-
 dem inchoabitur, per fotum capitis, rasis prius ca-
 pillis, ex decocto foliorum origani, calaminthę, sam-
 pfuci, serpilli, maioranæ, betæ, pulegij, baccharū iuni-
 peri, florum rorismarini, stæchados, in quo tertia,
 vel quarta pars vini albi dissoluta fuerit: foveatur cū
 sponsia totum synciput, cui metasyncritica subiun-
 gantur. ℞ olei irini, destæchade, rutacei, & musca-
 tellini an ʒ j. olei de castoreo de spica & laurino an.
 ʒ ss Vtendum etiam suffitu acri, valideque exsiccā-
 te, ex aceto forti in laminam ferream igne candē-
 tem

tem sensim infuso iuxta nares: obtectis oculis, oreque clauso: vt vapor eius copiosè, promptèque subeat. Præstat tamē eidem aceto sequentia vt cymas hyssopi, satureiæ, sampluci, serpilli, & pulegij incoquere, baccas lauri, & iuniperi, flores stæchados, & rorismarini. Sic enim intemperiem frigidam cerebri cum vaporibus concretis discuties. Postremò dropace composito cum semine lauendulæ, baccis lauri & iuniperi, radice cyperi & galangæ & pice: tādē denique synapismo vel phœnigmo tum discutientur reliquiæ vaporum humorumque, tum frigida ipsa humidaque intemperies expungetur. Dixta quoque calida, siccaque tenuis, locusque calidus & lucidus præscribatur.

De melancholica deliratione.

EX eadem vteri cum cerebro sympathia, prægnantes mulieres primo præsertim tertianario aliquando infestat melâcholia: hic vero morbus est intemperies frigida nempe siccaque, substantiæ cerebri, à causa effectrice nuncupatus: sanguine scilicet crasso, atroque & duobus pathognomonicis signis, timore, & tristitia comitatus. Duplex autem à sede suæ causæ melancholia distinguitur, idiopathica vna est: sympathica duplex: vna ex totius corporis, altera ex præcordiorum consensu. Porro idiopathicus cerebri & primitiuus affectus fit, ab atrabilario sanguine in cerebro congesto, à calidioribus causis excalefacto: tum manifestis: vt solitudine, cura, studio, mœrore, vigiliis, amore, æstuatione: tum internis, obscurisque: vt phlogosi, & phrenitide: atque tum nulla totius corporis, aut præcordiorum affectorum

signa conspicua sunt : estque deliratio perpetua
 atque indefinens. Sympathicam affectionem to-
 ti corpori communem, causæ externæ, internæque
 cum habitu ipso declarant : hic enim si naturaliter
 sit macer, hirsutus, venosus, nigricans, aliquando e-
 tiam subruber, & flauus, sed à causis manifestis
 vltus : vniuersalem melancholiam insinuat : A-
 liàs præter naturalem istam constitutionem san-
 guinem melancholicum cumulant hæmorrhoids,
 aut mensis suppressus, aut cibi melancholici
 crassi, frigidique, & sicci : vel etiam calidi, vt sunt
 bubulæ, caprinæ, leporinæ, aprinæ carnes, limaces,
 pisces grandes, brassicæ, legumina, & maximè lentes,
 panis furfuraceus, vina crassa, nigraque, vetus cæcus,
 & obsonia omnia salita, piperata, frixaque, præ-
 ter victum fortasse euchymum, & eupeptum : e-
 xercitationes vehemētes, tempus anni autumnale,
 & hyemale, regioque : senilis & declinans laborantis
 ætas. Sympathicā hypochondriacā portendunt, pro-
 pria vetriculi facultatisq; eius coctricis, symptoma-
 ta : vt sputum humidū, multumque, sumpto præfer-
 tim cibo dyspepto, calidoque, vetricis rugitus, & mur-
 murilla, ructus acidus, vetriculi dolor, ad dorsum
 vsque, qui coctione prioris cibi, desinat : & à poste-
 riore recrudescat : vomitio crudi cibi, pituitæ salsa,
 amaræ, acidæque : quibus omnibus symptomatis
 auctis ipsa quoque melancholica affectio augeatur,
 sicuti à vomitione, deiectione alui, probaq; coctio-
 ne, & ructibus leniatur. Signa communia om-
 nium melancholiarum specierum duo sunt Hipp. 23.
 Aphorif. lib. 6. metus, & mœstitia, longo tempore
 perseverantia, sine causa manifesta : (vt expo-
 nit Galenus.) quorum ratio nulla alia reddi possit,
 præter

præter corporis peculiarem constitutionē. Vtriusq;
symptomatis causa ad propriam cerebri intempe-
riem, in idiopathica, crassique sanguinis abun-
dantiam, in sympathica vniuersali referenda est:
sed in sympathica hypochondriaca, ad exhalationem
fuliginosam à melancholico succo, & sanguine
feruido sursum in cerebrum & cor sublatam. (Sice-
tiam è ventriculi euaporationibus, suffusiones,
vertigines & dolores capitis alias mordaces, a-
lias grauantes, alias tendentes, alias stupe-
facientes. Sic ab iisdem denique morbus co-
mitialis, aliquando contingit). Vt ergo exter-
næ tenebræ omnibus fere hominibus (nisi for-
te audacibus vel doctis) terrorem incutiunt: sic
melancholici humoris crassi, atrique color cali-
ginosus mentis sedem obsidens, eam timore con-
cutit: dum enim per animalem spiritum obscurio-
rem, anima sensibilis rerum simulachra percipit,
omnia horridè excipit: sicuti alacriter solet dum
ex sanguinis copia splendente spiritu vritur. Est
autem niger color temperamenti frigidi sicciq;
comes: temperamenti autem propria est actionum
corporis mutatio: attamen lætitia mœrori aliquan-
do intermiscetur (sicuti iocus, risus, saltus, tripu-
dium) aliquando etiam maior quam per sanitatem
consuetæ fuerat, quod sanguis ille flagrans hetero-
geneus sit; & portioni sanguinis temperati, clari,
& rubei mixtus: qui vicissim vt melancholicus exar-
descat, vel debili interim ratione impetum affectuū,
humorūque motum non satis tēperante, vel quod
sanguis dū vritur, multo clariùs quā ex propria na-
tura exsplēdescat, spiritumq; animale magis illu-
stret. Timoris deniq; comes indiuiduus est mœstitia:

qua non homines alios tantum, sed vitam quoque suam oderint; tametsi mortem pertimescāt; eandēque sibi tandē cōsciscant. Duo quidē illa sunt hypochondriaci affectus, vt aliarum duarum specierum signa timor, & tristitia. Plurimæ tamen sunt melancholicarum delirationū species, quæ in ipsa humoris essentia frustra omnes inuestigentur, quū potius ex ad postremas ante delirandi principium cogitationes ægrotantium pertineant: multæ tamen etiā ad humoris ipsius qualitatem primam, secundamq; referri possunt; vt in eo qui se fictile vas putabat, ob humoris melancholici toto suo corpore diffusi siccitatem, & eius qui se tympanum corio tectum fingebat, ob flatuum præcordia implicantium; & distendentium multitudinem.

Curatio melancholia hypochondriacæ.

Mulieres prægnantes melancholia fere hypochondriaca primo tertianario, non continenter quidem: sed per accessiones laeessit. Causa proxima est vapor, ater & caliginosus cerebri substantiæ circumfusus. Antecedens causa est obstructio venarum in præcordiis ventriculo præsertim contiguus, vt in liene, pancreate, mesenterio sæpissimè, aliquando etiam in hepate. Obstructionis materia aliquando est ipsa melancholia naturalis, excrementitia, & sæci vinaceæ similis, ex liene in vicinas partes redundans: quoties ob ingluuiem, eius multitudine opprimitur: aliquando cum tumore cōspicuo, cum eam per destinatas vias in ventriculum suo tēpore non deposuit: alias sine tumore cum ipsa lien imbecillus ab hepate non attrahit; sed sanguini permixta relinquitur. Aliàs hæc materia est succus quidam

quidam melancholicus, sanguisque crassior aut ob hepatis intemperiem frigidiorē, sicciorēque, aut ob victum vitiosum & cacochymum. Ab utraque enim melancholia exsuperante tum alimentaria tum excrementitia sanguis conspurcatus & incrassatus, in prædictis venis hæret, sensimque præ obstructione & perspirationis interceptione incallescens tetros interim caliginososque vapores in cerebrum expirans: præsertim quum à causa manifesta internaue commouetur: miserabilia symptomata inducit vt sunt æstus ventris, cordis lipothymia, & palpitatio, cephalalgia, faciei rubor, ardorque, oculorum caligo, mentis perturbatio, summa vitæ desperatio: quæ omnia extincto dissipatoque vapore tantisper mitescunt: donec denuo ab eadem causa calefaciente excitentur, & recurrant. Aliàs crassior ille sanguis ex uteri sympathia, in præcordiis colligitur: quoties menstruum sanguinem crassiorē ob conceptum uterus cohibet refunditque in venam cauam, vnde in vicina viscera effunditur. Duplex itaq; instituaturs tam molesti symptomatis curatio: vna mitigatiua: altera præseruatiua: illa accessionē coerces, lenitq; vaporib. à cerebro tū reuulsis tū repulsis, corde interim cardiacis confirmato, quod per accessionē vehemēter affligitur. Reuulsio cōstet leuissimis clysterib⁹ vel bala-
 lanis, & deligationib⁹ crurū quidem, & femorū, sed brachiorum vehementissimis, cucurbitularū ad ceruicē appositione. Repulsio absoluenda est oxyrrhoidinis ad frontem, & tempora ad futuram vsque coronalem apponendis & subinde commutandis: odoramentis, vt aquæ rosacæ, vel solius vel cum pauco aceto aut caphura mixtæ: crebraque oris

ablutione cum gelida sæpius mutanda. Interiorum quoque remediorum vſus opportunus eſt cum repellendi vaporis, tum roborandi cordis gratia, quibus idcirco, ob humoris *κακός* & *δύσας* cordi aduerſam, cardiaca miſceantur. Hæc omnia ſub forma Sympliciorum iuleporum opiatarum & conditorum præſcribuntur, vt ℞. ſyrupi de pomis vel de granatis acidis vel de limonibus ℥ ij. capiat per ſe ex cochleari mulier in acceſſione melancholica. vel ℞. aquarum roſarum & florum boraginis vel acetosæ, ſucci mali limonij, granati acidij, pomorum redolentium & ſacchari roſati an. ℥. j. coralli rubri raſuræ eboris an. ℥. j. fiat iulepus. vel ℞. conſeruæ roſarum, & florum borraginis an. ℥. j. fragmentorum ſapphyri & hyacinthi & margaritarum an. ℥. j. confectionis alkermeſ ʒ. β. (maior enim doſis fugienda eſt, ne calore acceſſionem exaſperet,) cum ſyrupo de pomis fiat opiata, capiat ʒ. ij. vel iij. in acceſſione cum pauca aqua borraginis. Ex eadē materia fiat cōditū: remouendo ſyrupum addendoque ſacchari roſati quantum ſatis cum foliis iiij. vel vj. aureis. Epithemata quoque eodē tempore uſurpanda ſunt & liquida & media vt ℞. aquæ roſar. nenupharis, borraginis & acetosæ an. quartar. j. aceti roſacei ℥. ij. pulueris electarij diambrae de gemmis & diamargariti frigidi an. ℥. j. ſantalorum omnium coralli rubei raſuræ eboris & cornu cerui an. ʒ. β. trochiſcorum de caphura ʒ. ij. granorum Kermes. ℥. iiij. fiat epithema applicandum cum pauco carmeſino. Ex opiata præſcripta fiat quoque epithema.

Præſeruatō.

V Bi acceſſio cōpreſſa fuerit: tum præcautio eiufdem

eiufdem fufcipienda eft, primum quidem per dictam modicam frigidam & humidam antea expofitam, feruidoque fanguini repugnantem: deinde per fectionē cubiti venarum moderatam (nifi plethora valde vrgeat) tumque partitē etiā potius quā ſimul & ſemel fiat: poſtremo per purgationem mitē quidem, ſed frequentem, terque aut quater repetendā, idque interiecto ſpacio trium aut quatuor dierum, quibus interim concoquetur humor purgandus.

℞. polypodij quercini recentis, radicis cichorij & acetofæ an. ʒ. ij. foliorum endiuiz cichorii acetofæ meliffæ capillorum veneris cetherac pimpinellæ ſummitatum fumariz & lupulorum an m. j. ſeminum quatuor frigidorum maiorum cōtuſorum an. ʒ. ij. pomorum curtipendulorum purgatorum par. ij. trium florum communium & hordei mundati an. p. j. ſemin. melonū & cucurbitæ an. ʒ. ſs. decoquantur, & in colaturæ lb. j. ſs. infunde foliorum ſennæ orientalis mundatorum ʒ. iiij. agarici trochiſcati ʒ. j. ſs. rhabarb. & epithymi an. ʒ. ſs. zingib. & ſpicæ nardi & ſemin. aniſi an. ʒ. j. poſtremo colentur & exprimantur. In expreſſione diſſolve pulueris electarij diarrhodon Abbatis ʒ. ij. ſacchari albiſſimi lb. j. fiat ſyrupus de quo capiat ʒ. ij. aut iiij. cum decocto florum & fructuum, purgationis cauſa.

Eodem apozemate detractis omnibus medicamentis laxantibus, humores coquendi ſunt & præparandi ad purgationem: præcordia ipſa denique refrigerante & humectante litu & vnguento mane & vesp̄eri obducentur, temperandi eorum ardoris cauſa, & ad extinguendum humorum melancholicorum incendium: tale eſt vnguentum refrigerans

Galenitale vnguentum rosaceum & ceratum san-
talinum succo cichorij vel acetosę vel inal. limonij
decies lotorum, tandemque multum fricando & te-
pidè & cum paucò aceto albo applicandorum.

De epilepsia pregnantium.

Epilepsia pregnantibus. fœminis & puerperis se-
pe funesta est. Est autem epilepsia conuulsio to-
tius corporis nō perpetua, sed per interualla recur-
rens cum mentis sensuumque læsione: cuius causa
proxima est rei tristis & infestæ sensus: cuius de-
bellandi gratia, tota facultas animalis, cum com-
muni instrumento suo & spiritu animali in suum
principium vel ventriculos cerebri sese recipit
hinc functiones animales conquiescunt & inter-
mittuntur, tum principes imaginatio, iudicium,
memoria: tum sensitiuæ vt visua, auditua, & cæte-
ræ: motiua enim remanet, sed deprauata & super na-
turam aucta: Sic laborante corde facultas vitalis
cum calore natiuo in cordis ventres sese colligit,
reliquis partibus frigore expallescens: ipso-
que corde seipsum ad expellendam noxam vehe-
menter agitante. Porro eorum, quæ lædunt cere-
brum, duplex genus est: aliud enim copia, aliud
qualitate noxium est: illud humor est frigidus cras-
sus viscosusque vt pituitosus, aliquando etiam me-
lancholicus. Hinc puerilis & senilis quædam epi-
lepsia est: vterque enim in ventriculos cerebri af-
fatim irruens ex parte tantum implet ita vt per eos
facultas vnà cum spiritu moueri liberè & ad muscu-
los transmitti possit: ipsumque cerebrum cōprimi
& vicissim dilatari, dum humor lacerans motu &
quassatione in spumam versus foras prodeat, orique
adhæ-

adherescat. Est inter epilepsiam & apoplexiam discrimen, quale inter paralyfim & tremorem intercedit: Vt enim in hoc humor superfluous sola gravitate sua sine obstructione, in illa cōtra obstructione solā motus conatusque naturæ intercipit: sic epilepsiā eiusque symptomata omnia humor excrementitius, non quod obstruat ventriculos: sed quod cerebro tantum gravis sit & molestus, excitat: eoque fit vt facultas animalis in suo principio collecta in proprię noxę depulsionem spretis reliquis sensuum mentisque operibus incumbat: in apoplexia autem sinuum cerebri integra repletio obstructioque expultricem vim exsuperat, quæ coarctata angustius idoneo, quo sese moueat, spatio ad excutiendā molestiam destituitur. Est ergo epilepsiæ causa vna humor crassus frigidusque cerebrum sua mole molestant, & gravitate lacescens. altera eiusdem causa est vapor acris mordaxque, aut etiam malignus & venenatus per occultas & manifestas vias in cerebrū subrepens, idque ipsum vellicans proritanque: donec excussus agitando digerendoque fuerit. Ex hac duplicis materiæ sedisque varietate epilepsiæ differentię tres desumuntur, Vna idiopathica & primaria est, cum frigidus crassusque humor in cerebro circa eius meninges aut substantiā collectus repente eius vētriculos comprimit vel obfarcit: siue ex propria cerebri intēperie frigida humidaque; siue ex improbabili victu vt aere humido frigido, alimētis vaporosis vt vino meraco aut copioso. Altera sympathica est, eaq. duplex, vna ex vētriculi exhalatione acris vt bilis, ciborū, humorūque; corruptorū, vel crassa & distēdēte vētriculos: altera ab aliis partib. tū internis, vt vtero, hepate, liene, tū externis vt crurib. & brachiis

ortum habet, à quibus fere semper malignus & deleterius vapor à venenata materia sublatus cerebrū graviter offēdit: vimque eius expultricem vehementer proritat. Causa sine qua non, est cerebri imbecillitas ab intemperie nativa, non tamen excellenti & morbosa: cuiusmodi arthritidum, omniumq; morborum hæreditariorum causa esse solet. Est ergo hæc epilepsia sympathica in fieri posita, veraque affectio, sine morbo & obstructione ventriculorum cerebri, qualis singultus est, vel ab oppressione stomachi præ copia cibi, vel vellicatione eiusdem ob condimenti acrioris & pungentis ut piperis vel bilis acrimoniæ. Est ergo mulieribus prægnantibus sæpius epilepsia sympathica quàm idiopathica molesta, idq. ex cōsensu stomachi utriusque, ex quorum corruptela & spurcitie putri, venenata exhalatio sursum in cerebrum diffunditur: aliquando tamen etiam idiopathica cerebro pituitosis humoribus referto sese prodit. Communia omnium epilepsiæ differentiarum signa sunt, convulsio omnium corporis partium quassatioque, non perpetua, sed ex crebris intervallis recurrens, cum sensuum intermissione & principum mentis functionum. Intermissionis causa non est penuria spiritus animalis suppressi in obstructis cerebri ventriculis, quem confertim potius affatimque in singula corporis membra spargi diffundique constat, ex vehementissimo epilepticorum motu per accessiones, tametsi violento depravatoque: neque enim sensitivus à motivo specie aut sede dissidere spiritus putandus est: cum eidem nervo sensum motumque sæpissimè tribuat: neque maior eiusdem spiritus ad sensuum quam motuum opera affluentia est necessaria

faria, neque denique impediti sunt ventriculorum cerebri meatus, sed liberi & expediti: per quos spiritus sensitivus motivusque liberè quoquoersum in motus sensusque organa transluat. Causa igitur est facultatis totius in noxæ cerebri depulsionem conuersio: sensusque communis ex nimia quassatione & compressione cerebri perturbatio, ne sensibiliū alterationes factas percipiat & diiudicet aut recorderetur. Vt enim plerique subdormientes moueri & ambulare sine vllō tamen sensu sæpe visi sunt: vt etiam qui cogitationi rei alicuius attentissimè addicti sunt, amicos obuios neque agnoscere, neque loquentes audire, aut salutantes resalutare deprehenduntur: sic laborante sensu communi functionū mētis sensuumque omniū intermissio fit: cū nullas ille à sensibus species distinguat, agnoscātque, & excipiat. Cōstat autem epilepticorum motus valida crebrāque compressione & dilatatione cerebri, instar multarum partium interna cavitare præditarum: vt cordis, vnde palpitatio eiusdem inclusō flatu, vel vapore humoreve molesto cominouente naturalis quidem est, sed deprauatus auctusque supra naturam motus à læso cerebro membris omnibus confusè & deprauate imperante motum, quō molestiam excutiat, neque singulis musculis extensionis laxationisque legitimæ modum præscribente, fatui insanique regis instar sua vi, suorumque subditorum obsequentia abutentis: Accidit tamen per accessiones gonorrhœa & vrinæ excretio ex vehemēti muscutorū abdominis horūque extremētorū compressione laxato per vim sphinctere. Porro vniuscuiusque differentiæ propria occurrunt signa. Idiopathicā accessionē paulo ante antecedunt

stupor sensuum, torpor mētis, inærtia totius corporis, & ignauia animiq; tristitia, cephalalgia grauās, somnia turbulenta, prout pituita vel melancholia vrget: aliquando desipientia & obliuio: nullius interim alterius partis cōspicua noxa cuius cerebrum possit esse particeps. Sympathicam indicant ventriculi fluxiones, eiusque compunctiones & cardiogmōs: aliquādo nausea & lipothymia ieiuno sæpius ventriculo si biliosa sit, eodēque saturato, si pituitosa. Vtraque vomitione & solutione alui leuari solet. Sympathiā biliosā hepatis declarat totius corporis flauescēs color, capilli nigri, cutis arida, at pituitosam albicās color, corpus laxū & pingue. Sympathiam lienis, dolor in eius regione & aliquando inflatio, aliās cum tumore renitente, & semper cum melancholicis notis.

Sympathiam vteri testantur mensium aut seminis suppressio: aut quorūdā humorū in vtero collectorum corruptela & putredo: dolor in pectine & utroque inguine, & in lumbis cum grauitate circa vteri sedem. Sympathiam denique artuum declarat frigida auræ ascensus sursum indeque vertigo tenebricosa. Mulierum igitur grauidarum epilepsia cōtrahitur sæpe ex ventriculi sympathia cibus vel humoribus corruptis referti, sæpe etiam vteri, ab exhalatione putris cuiusdā & seminalis materiæ menstruæque circa vterum, & in venis eius collectæ: ex qua etiam suffocatio miseras opprimere solet.

Mitigatio symptomatis.

IN paroxysmo mulieres, aliorum epilepticorum instar, ab assidentibus continendæ sunt: ne capitis & totius corporis violenta iactatione sibi sueque

que foetui grauem noxam inferant, & vincula dissoluant, dentes diducendi inserto inter eos baculo tereti lenique, ne linguam præscindant: ore autem aperto, medicamento aliquo acri vt sinapi theriacali mithridatio, aut cathartico etiam vt diaphoriconne palatum obducendum est: naribus acetum scilliticum obiciendum: vt ab illis humor à cerebro per palati foramen deriuetur, idemque humor & vapor intus consumatur: olea denique in aures præcalida sunt instillanda, vt de stoechade, costinum, laurinum, & de castoreo.

Curatio epilepsia idiopathica.

EXtra paroxysmum hæc primùm dicta instituantur. A vino prorsus abstineat, & aqua cum saccharo & paucis cinnamomo cocta, aut hydromelite utatur: abstineat quoque à fructibus crudis & horariis, à lacte, & lacticiiniis, leguminibus, acetariis omnibus, & si certum statumque sit periodi tempus, octo vel decem ante illam diebus bis aut ter per interuallum duorum aut trium dierum clementer purgetur, humorque interiectis interuallis coquatur.

℞. foliorum betæ, parietariæ, agrimonij ana m. j. prunorum dulcium paria vj. fursuris macri hordei integri, florum chamæmeli, meliloti anethi ana p. j. seminis anisi & fœniculi ana ʒ j. β coquantur & in colaturæ lb. j. dissolue electarij diacatholiconis ʒ j. hieræ picræ ʒ β mellis rosati colati ʒ ij. olei chamæmelini & anethini an. quart. β fiat clyster, iniiciatur pridie sequenti.

℞. hieræ picræ ʒ iij electarij diacatholiconis ʒ β misce, fiant boli plures, capiat die sequenti mane cum saccharo. vel, ℞. rhabarbari ʒ j. β agarici

trochiscati 3 j. foliorum sennæ orientalis mundatorū 3 ij. infundantur in aquæ absinthij vel melissæ vel betonicæ per noctem addendo zinziberis 3 j. deinde colentur & in colaturæ 3 ij. dissolue syrupi de cichoreo compositi 3 j. fiat potio, detur mane cum custodia, deinde per spacium trium dierum humor concoquatur ex iulepis cum syrupis acetoso simplici oxymelite simplici & melle rosato dissolutis in aqua betonicæ melissæ & agrimonij, tum demum iteretur eadem purgatio. Finita purgatione caput & ventriculus roborabuntur electariis & pulueribus tum intemperiem humidam frigidamque, tum occultam proprietatem tota substantia oppugnantibus. Tale est hoc electuarium.

℞. conferuæ rosarum & florum anthosana 3 ij. condituræ corticis citri, zinziberis viridis myrobalanorum chebularum & carnis cydoniorum an. 3 β pulueris electarij aromatici rosati 3 iiij. coralli rubei cornu ceruini rasuræ eboris radicis & seminis pœoniæ, vngulæ alces & visci quercini ana 3 j. theriacæ veteris 3 j. cum syrupo conseruationis corticis citri fiat opiata, capiat 3 iiij. ieiuno stomacho horis tribus ante cibum superbibendo cochlearia duo hydromelitis aut aquæ betonicæ.

℞. seminis coriandri præparati sceniculi & pœoniæ maris ana 3 ij. cornu ceruini vngulæ asini syluestris cranij humani & visci quercini ana 3 j. macis, nucis moscatæ ana 3 β cinnamomi electi 3 ij. sacchari albissimi pondus duplum, mosci optimi 3 β fiat puluis, capiat cochlear vnum post singulos pastus. Roborandum etiam caput est asperfusionibus puluerum cucuphis irrigationibus fotibus sinapif-

finapismis & dropacibus. Sympathia ventriculi hepatis lienis & vteri eadem diætâ eademque purgatione, in prægnantibus, omnino leuissima indiget: deinde pars ipsa accurate roboranda est contrariis intemperiei suæ remediis, calidis frigidisue, internis aut externis. Postremo sympathia artuum eiusque accessio arcenda est, prohibito vaporis venenati ascensu, iniectioneque partibus sublimioribus arctissimo vinculo: vel frictionibus deorsum ductis: vel denique cucurbitulis ipsi loco impositis: curatio tandē subiūgenda est quæ ab explorato prius veneni loco idipsū violētius foras protrahat: vt per phœnigmos aut cucurbitulas cū scarificatione aut tādē per velicatoria.

De dolore dentium in prægnantibus.

Dolor dentium prægnantibus tam frequens est & familiaris: vt plerisque earum certissimum sit & indubitātū conceptus signum. Dolor autem dentibus præter reliquorum ossium conditionem affingitur: qui tantū nervorum tertiæ coniugationis dentium radicibus substratorum & gingivarum eos ipsos obuallantium proprius est: sed harum partium dolor ob viciniam, dolentis dentis specie ægros etiā ipsos fallit. Oritur autem dentium dolor, reliquarum eius specierum instar, ab intemperie frigida calidaue humoralis, cum solutione continuitatis, tensione scilicet, aut rosione, ob destillationē à capite vel pituitosam, vel biliosam & acrē, & sanguineā. Phlegmone tamē rarior est: nisi ex sympathia vicinæ gingivæ inflāmatæ: sicuti & vermiculorum punctus morsusque: nisi in diuturna cavitare dentis. Destillationis materia

gignitur aliàs ab intemperato cerebro vel frigido humidoque: vel calido siccoque: alias sine cerebri vitio, ab improbabili victu: vt frigido crassoque & flatuoso: vel calido & vaporoso: vel certe ex viscerum subiectorum sympathia: vt hepatis calidioris, ventriculi frigidioris, lienis tumidi obstructique, & vteri suppressio menstruo oppressi: aut incluso foetu & secundinis repleti. Harum enim partium vapores in capite in aquam coeunt tandem relapsuram: materia hæc coaceruatur intus forisque in capite: intus quidem circa meninges & substantiam ipsius cerebri, eiusque ventriculos: vnde deuoluitur in os per palati foramen, indeque in subiecta viscera, faucésque, asperam arteriam pulmones ventriculum vterum & vesicam, sæpe etiam in organa sensuum vt nares aurésque: aliàs etiam motuum: vt spinam & propaginies neruorum. At verò foris coaceruatur circum pericranium, atque hinc in externas corporis partes labitur vt maxillas, dentes, lacertos, spinam, lumbos, os sacrum, ischium, indeque in articulos genuû pedumque. Deturbatur autem deorsum ex vtraque capitis regione, vel sponte sua ab expultrice facultate irritata & non ferente opprimentem copiam vel stimulantem acrimoniam, vel à causa manifesta comprimente vt cælo frigido: vel laxante vt calido cælo: vel agitante humorem corpûsque perturbante: vt exercitatione.

Curatio.

Curatio duplex est: ordinaria & extraordinaria. Illa triplex, diætetica, pharmaceutica, & chirurgica. Diæteta autem sit calore frigoreque temperata,

temperata, euchymos, & mediæ substantiæ, potius vel liquidæ, ne duriorū attritio dolorem exasperet: eiusmodi sunt panatellæ, hordeata, amygdalata & contusæ carnes. Pharmacia constet reuellentibus deriuantibus intercipientibus & vacuantibus topicis. Reuellunt obscurè quidem validiores frictions & deligationes crurum femorumque in prægnantibus mitiores: reuellunt etiam periapta, vt allium tritum carpo alligatum: sicuti & folia ranunculi & tithymali contusa: sed hæc exulcerant. Purgationum eadem habenda ratio est vt in aliis, efficaciores & per pilulas in prægnantibus mitiores, quarum sæpe antea meminimus, instituantur. Phlebotomia deniq; cephalica fiat, siquidem certa sit calidæ fluxionis ex doloris specie, coniectura. hæc vero in aliis temperanda est pro virium ægotantis modo: in prægnantibus, fœtus præterea commeatui est consulendum: ne ob phlebotomiam indigeat. Inter deriuantia numerantur frictions & deligationes brachiorum: cucurbitulæ vel siccæ, vel frigidæ, vel humidæ & cum scarificatione, si calida fluxio subest. Phœnigmus etiam & tandem cauterium potentiale initio cervicis applicabitur, & epispasticum emplastrum ipsi vertici. ℞. massæ emplastri de mucilagine & stercoris columbini an. ʒ. ʒ. sulphuris ʒ. ʒ. cum terebinthina incorporentur. item ℞. eiusdem emplastri ʒ. j. aceti rosacei ʒ. ij. misceantur & extendantur supra telam fortem: fiatque frontale fronti applicandum.

℞. massæ emplastri contra rupturam ʒ. ij. opij ʒ. j. cum terebinthina fiat emplastrum applicandum temporibus. Quoad topica ore continenda, illa

pro tempore & specie fluxionis variant. Nā in principio frigida fluxionis pauca adstrictio, multa; digestio: vt antecedens inhibeatur: & coniuncta causa vacuetur, necessaria est: si vero calida sit fluxio, sola percussio conuenit. Cæterum topicorum omnium cuiusmodi sunt gargarismata, siue calidorum siue frigidorum materia coquenda est in aceto vt magis penetrare densiorem partem, quodque mixtis paucis calidis corrigitur eius frigiditas. In statu & declinatione sola digestionem opus est: sed vehementiori, in frigida fluxione, ob humoris impacti crassitiem lentoremq; Calida enim fluxionis materia tenuior & magis dissipabilis est.

In calida fluxione sub initium hæc præscribi poterunt.
 ℞ radicis bistortæ ʒ j foliorum plantaginis solani & saluæ ana m. j. coquantur in aceto vel saltem in oxycrato, vel

℞ foliorum hyssopi hederæ terrestris & plantaginis ana m. j. corticis malorum granatorum, balaustiorum nucum cupressi & aluminis rochæ ana ʒ β coquantur in vino astringenti vel aceto. At vero in frigida fluxione sub initium hoc præscribetur.

℞ radicis pyrethri & cyperi ana ʒ j malorum granatorum, balaustiorum aluminis rochæ & rosarum ana ʒ β foliorum origani calaminthi, pulegii, hyssopi, satureiæ, saluæ thymi & maioranæ an. m. j. gallarum iuniperi ʒ ij coquantur in vino forti & fiat gargarismus vel fiat perinatio ore patulo.

Tandem in declinatione digerentia sunt adhibenda, vt decoctum piperis cum vino: collutiones oris ex aceto scyllitico calido: Item ex decocto ultimo incoctis astringentibus suffitus fiat, ex foliis & radicibus methastri.

thastri auulsi & aqua calida aspersi, exceptique capite veste obuelato & ore patulo. Ipsi denique denti præsertim cauo aquæ alchymisticæ sunt applicandæ vt ex essentia saluicæ, thymi, caryophyllorû. Sic in aurem dolenti denti vicinam aquæ illæ & similia olea guttatim sunt instillanda.

Extraordinaria curatio.

Quod si doloris acerbitas persistat inuicta siue ob copiam, siue ob acrimoniam fluxionis, siue ob contumaciorem inhaesionem: tunc narcoticorum vsus est opportunus qualia sunt theriaca & mithridatium recetia, dentique apposita: quale philonium romanum: quale denique est ceratum eiusmodi. ℞ seminis hyoscyami albi, papaueris albi & mandragoræ ana ʒ i opij ʒ i β cum oleo rosato fiat ceratum. Tales pilulæ de cynoglossa dissolutæ: tale decoctum foliorum & radicum mandragoræ hyoscyami, foliorû solani: si detineatur sepe & diu in ore.

℞ opij & castorei an. ʒ ij dissoluantur cum oleo rosaceo & guttatim intromittantur in aurem. Aqua gelida sæpe diuque in ore versata & reiecta: item aqua stillatitia aliorum cum opio: oleum de mādra-gora, de papauere, temporibus applicatum: similia narcotica ore sumpta, stupefacta mente dolorē tollunt: vt philonij romani ʒ ij mithridatij vel theriacæ recentis eadem dosis: vel pilularum de cynoglossa ʒ i vel ʒ β syrupi de papauere ʒ j vel ʒ j β vel ʒ ij ad summum. Tutior quidem est anodynorum quam narcoticorû sed tamen inefficacior vsus: tale est butyrum dentibus oblitum: talis collutio oris ex lacte: aut ex oleo rosaceo: aut ex oleo amygdalino dulci:

& fofus maxillæ ex decocto florum chamæmeli & meliloti, anethi, fambuci, & rofarum an. p. j. feminis lini & malux an. $\frac{3}{4}$ β ficuum num. iiij: contufa leuiter omnia coquantur in lacte inclufa in facculo; quo leuiter expreffo pars foueatur, vel decocto eodem imbuta fpongia aut goffipium applicetur.

Curatio chirurgica.

Curatio chirurgica verè præferuatiua eft: hæc enim grauius dolente aut inflammato dente fufpicienda non eft: ne conuulfio excipiat doloris exacerbationem: fed dolor tantum leniendus. Dens ergo fuperficie tenuis vitiatus, liuidus, nigrefcens, flauescens, fcalpro vel aquæ alchymifticæ (fortem vocant) fricatione deradatur: vt quod incolume eft conferuetur: fi idem cariofus perforatus & vacillans fit, forcipe dentario euellatur, vt eo auulfo liberius neruus tranfpiret: & conuenientia remedia facilè admittat: quod fi non vacillet, ferrumque æger abhorreat: tum dens tabefaciendus eft, neruusque adurendus, vt illius confumpto humido primigenio dentis fubftantia particulatim diffoluatur. Ferrum ergo igni candens in foramen dentis inferatur, ad radicem, vt & neruus eidem fubstratus aduratur: vel oleum vitæoli: vel aqua alchymiftica pauco cotone excepta. Sic radix pyrethri & cucumeris agrestis per triduū in aceto acerrimo macerata tritaque in foramen intromiffa iuuat: fic exuuium ferpentis vel integrum denti admotum, vel decoctum, vel vftum, & cum melle oleoque mixtum: fed tamen aduftio fepè iteranda eft, donec dentis cōpages diffolutioni proxima diffipato humido fub præuideatur.

De fluxu alui pręgnantium.

PRofluuiorum alui differentię ab excretę materię varietate quinque distinguuntur: Aut enim cibi crudi incoctique mox à pafu defluunt: (hęc lienteria eft) aut chylofa fubftantia cinerea & albicans fine vlla ciborum afpectabili differentia feriusque à pafu (hęc paffio cœliaca dicitur) aut humores excrementitij vt pituita, bilis, & melancholiā, ficerique, vel mixti (hęc diarrhœa eft) aut adipofa & oleofa fubftantia (& colliquatio vocatur) aut denique cruenta & fanguinea (quę dysenteria eft vel hepatica vel intestinalis). Porro lienteriam inducit coctricis & retentricis imbecillitas ventriculi, vel à pinguibus & mollioribus cibis, & fructibus horeis: vel ab intemperie frigida humida idiopathica, vel fymphathica, & fluxione pituitofa à cerebro. Eamdem quoque commouet expultricis facultatis irritatę robur: vt ab vlcere ventriculi, à bilis pungentis aliqua fpecie, à veneno acri & lancinante, vel denique ab antipathia & qualitate maligna, cibi alicuius humorifue corrupti in aliqua corporis fede. Cœliacam affectionem inuehit distributionis chyli frustratio, ab obftructione venarum mēfenterij, lienis, hepatis, & attractricis hepatis facultatis imbecillitate. denique à potione frigida copiofa ciborumque humidorum & horeorum indulgenti nimis efitatione. Diarrhœam excitat propria ventriculi & intestinalium vel fymphathica potius intemperies, ibi genitis vel exceptis aliunde, vt à cerebro, hepate, liene, vel à toto & venofo genere, vitiofis & excrementitiis humoribus: moxque è ventre

profusis. Fluxum colliquatium inducit calidior
 partium pinguium & carnearum intemperies sub-
 stantiam earum colliquans, fundensque, siue ex fe-
 bre acuta, vt causo: siue pestilenti: siue diuturna, vt
 hectica; quæ visceris alicuius corruptelæ succedat,
 vt in phthisi & suppuratione. Dysenteriam denique
 humor acris & biliosus vel atrabilarius vel pitui-
 tosus salsus, tum è propinquis visceribus, hepate, lie-
 ne, mesenterio, refluxus: tum ex distantioribus ma-
 ioribusque habitus venis: alimenta etiam acrisque
 excrementa & exulcerantia inuehunt. Dysenteria
 alia cruenta & sanguinea sine dolore, hepatica dicta ex
 hepatis vel imbecilli coëtrice & retëtrice: vel expul-
 trice valida. Mulierum prægnantiû genus sæpe exer-
 cent lienteria & diarrhœa. illa quidem è cruditate
 ventriculi & *βραδυρρηξία*, quæ primo impregationis
 tertianario superuenire solet, vt declaratum est cap.
 de pica & de fastidio: hæc ab eadem cruditate ven-
 triculi siue ab improbabili victu, siue à consensu
 præcordiorum & maiorum venarum, ortum habet.

Prognosticum.

OMne profluuium ventris Hippoerati aphor.
 34. libri 2. abortum solet prouocare tum cau-
 sæ morbi que magnitudine: tum quod mulierum al-
 uus fere tardior sit: tum inedia & alimenti penu-
 riæ ratione: cuius coctionem & distributionem in
 hepar, indeque in venas præceps excretio anteuer-
 tit: tum quod excretionum frequentia vires fluen-
 tes exoluat: non solum desidendi labore, motuque
 corporis importuno: sed spiritu quoque cum ex-
 crementis vacuatione: tum humoris per intestina
 descendens tetro odore: aut amarore, aut etiam
 fælugine

sal fugine foetui aduersissima: tum vteri compressione in desidendi conatu: tum denique vinculis vteri à profluuiio nimis humectatis, & relaxatis: aut si nihil confluat impensius resiccatis: vnde promptior est eorum dissolutio & abortus procliuior.

Curatio.

Lenteriz & diarrhœæ pituitosæ iidem sunt curationis scopi duo: vacuatio cacoehymiz, & corroboratio ventriculi, & intestinorum. Vacuationis prima species est clyster modicè calidus siccusque & abstergens. ℞. foliorum absinthij, prassij, origani, calaminthæ an m. j. hordei integri fursuris macri, rosar. rubear. an p. j. seminis anisi ʒ. j. decoquantur in colaturæ lb. j. dissolue mellis rosati colati & sacchari rubri an. ʒ. ij. hieræ picræ ʒ. iij. fiat clyster, iniiciatur ante omnia.

Altera species vacuationis est purgatio lenior tergensque & frequens, vel per bolum ex electarij diacatholicon. ʒ. vj. pulueris hieræ ʒ. iij. incorporatis cum syrupo rosar. siccar. vel per potionē cōfectam ex infusione ʒ. ij. sennæ orientalis, rhabarbari ʒ. j. β. agarici trochiscati ʒ. β. spicæ nardi ʒ. j. in aqua absinthij. colatura detur ante omnia ad ʒ. iij. Deinceps humor coquatur per spacium duorum aut trium dierum: quibus exactis reiteretur potio vel bolum laxatiuus.

℞. mellis rosati colati oxymelitis simplicis & syrupi de absinthio an. quart. β. hydromelitis lb. j. nucis moscatæ ʒ. iij. misce, fiant iulepi tres.

Vacuata cacoehymia roboretur deinceps ventriculus intus forisque accommodatis remediis, scilicet calefacientibus siccantibus & astringentibus, vt,

℞. conferuæ rosarū saluæ & summitatum absinthij pontici an. \mathfrak{z} .j. conditura corticis citri, carnis cydoniorū, zinziberis viridis, nucū iuglandum, & mirobalanorū chebularū an. \mathfrak{z} . β . tunicæ interioris vetriculi gallinæ \mathfrak{z} .ij. pulueris electarij aromatici rosati \mathfrak{z} .j. cū syrupo cōseruationis corticis citri fiat opiata capiat \mathfrak{z} .ij. quotidie horis tribus ante pastus superbibēdo vini rubri cochlearia duo. simile est vinū absinthinum ad \mathfrak{z} .ij. propinatū quotidie mane & syrupi absinthini \mathfrak{z} .j. similis est hic puluis.

℞. seminis coriandri præparati & anisi an. \mathfrak{z} .ij. pulueris electarij diacydonites sine speciebus & aromatici rosati an. \mathfrak{z} .j. coralli rubei fragmētorum sapphiri & hyacinthi an. \mathfrak{z} . β . nucis moscate & macis an. \mathfrak{z} .ij. cinnamomi \mathfrak{z} .ij. mosci optimi \mathfrak{z} . β . sacchari æquale pondus omnium. fiat puluis, capiat cochlear vnum post singulos pastus. foris autē ventriculus inūgatur cerato Galeni: vel liniatur oleo absinthino, muscattellino, mastichino, de mētha, aut emplastro de mastiche tegatur: tādēmq; si inuicta persistat debilitas, & fluxus cōtumacior, dropace vel sinapismo. Intestina roborētur clystere ex vino rubro, cui cōseruæ rosarū antiquæ \mathfrak{z} .ij. mastichis \mathfrak{z} .j. additæ sint. Itē ex fotu podicis per spongiam ex vino rubro & adstringenti mixta aluminis parte duodecima. vel suffitu eiusdē partis per sellam perforatam vini feruentis eiusdē astringentis recepto vapore: neque enim fotibus, linimentis, aut vnguētis abdomini impositis licet intestinorum robur in prægnantibus reuocare: cū obuius supra intestina occurrat in vtero fœtus. Dicta autem in vtraque fluxus ventris specie pituitosa instituitur, calida siccaque euchymos & eupeptos, ex cibis mediæ substantiæ parumque adstringentis,
ex pa-

ex panatella, asperfo puluere ducis, vel nucis moscatæ, & ex contulis carnum gallinacearum: & succis earundem (gelatinas vocant) ex vino rubro generoso aqua chalybeata diluto, & modicè sumpto: ne fluctuet cibus: qui etiam in ventriculo continendus erit: donec concoquatur apposita cucurbitula. At lienteria & diarrhœa biliosa & falsa curantur iisdem scopis vacuationis & corroborationis. Purgationis materia fere eadem est, si infuso rhei agarici & senæ, addatur syrupi de cichorio cōpositi ʒ. j. quæ detur mane & reiteretur interposito interuallo trium dierum: quibus humor concoquetur, per iulepos incidentes tergentesque: vt ex oxymelite simplici & acetoso simplici cum aquis endiuizæ & cichorij. Roborabitur autem ventriculus tum syrupis acidis & astringentibus ad ʒ. j. vel ij. ex cochleari sumendis, per duas horas ante singulos pastus, tum per electarium triasantalinum ad ʒ. iij. per se sumendum, superbibendo prædictorum syruporum ʒ. j. tum denique externa vñctione mane & vesp̄i ante pastus, ex vnguento rosaceo & cerato santalino probè lotis cum succo malorum granatorum aut cydoniorum. Diæta denique decernatur frigida siccaque, qualis sæpe antea descripta est.

De præcautione deformitatis ventris.

PRægnantium mulierum ventrem frequentibus dolorib. torqueri, cuiusq; cutem in hypogastrio, præsertim iuxta ilia, inguina & pubem, rugis & rhagadibus defœdari sæpe contingit, dum à grandi grauique, vel gemino etiã fœtu, tum membranulæ, quibus ad vicinas partes vterus alligatur, sicuti

antea expositum est: tum cutis ipsa eiusque fibræ membranæ neruæque violentius distenduntur. Ex distensione sola rugæ in puerperis, utroque exonerato, succedunt: sed ab earundem ruptione, rhagades siue fissuræ: & inæque, vlcuscula eblonga & angusta succrescunt. Rugarum etiam in senioribus origo est, ex laxitate cutis, & consumptione carnes molis: quæ in iunioribus beneque habitis subtenfa & læuis erat, atque polita. Rhagadam autem origo est aliàs à vehementi frigore & siccitate borealis venti in manib. & labiis: aliàs ab humoris vaporisue acris & bilioli siccantissimi appulsu. Precauetur ruge & rhagades in prægnantibus si violenta cutis abdominis extensio ruptione prohibeatur, matura eiusdem emollitione, & relaxatione, ut distensionem facilem & sine ruptione sustineat, dum à puerperio ad amplitudinem naturalem contrahatur. Eiusmodi autem sunt emollientia medicamenta mediocris substantia, calore temperato, ad primum ordinem, & humore aereo multo conferta, non aqueo nulloque sapore insigni: sed pingui tantum & oleagino: cuiusmodi sunt oleum maturum non falsum, adeps & medulla recens alicuius animalis domestici; butyrum, mucilagines radicum althææ, & seminis maluz, extractæ ex decocto ficuum. Inchoabitur ergo tertio aut quarto imprægnationis mense, istorum remediorum vsus, & ad partum vsque prorogabitur: ut augescenti sensim foetui sensim relaxata quoque ipsa cutis cedat. Vnguentorum forma commodissima est non liquidorum: ne citius expiret, aut à pressis linteolis absorbeatur: neque durior, ut emplastri, ne ventrem nimis oneret. Vnguentorum formulæ sunt.

℞ olei

℞. olei amygdalarum dulcium \bar{z} iij. axungia recentis gallinæ, cuniculi & butyri recentis ana \bar{z} ij. mucilaginis radicum althææ & seminis lini extractæ ex decocto florum chamæmeli \bar{z} iij. ceræ albæ \bar{z} iij. mosci optimi \mathfrak{D} β fiat vnguentum applicandum mane & vesperi toti ventri.

Simile est vnguentum resumptiuum & de althææ simile & hoc valdeque apud practicos celebre.

℞. triginta pedes veruccinos, qui contractis omnibus ossibus perfectè decoquantur: deinde sublata ab igne olla donec refrixerit, concretus adeps colligatur: eique addantur spermatis ceti \bar{z} ij. medullæ cerui axungia caponis anatis ana \bar{z} j. tum liquabuntur omnia in vase vitreato sine feruore & colabuntur, & postea lauabuntur in aqua rosacea, donec alba euaserint: tuncque recondentur ad vsum vngendi ventris mane & vesperi: qui postmodum tegetur pelle canina aut hœdina diligenter rasa lotaque in aqua rosacea primum, & aqua angelicæ: deinde siccata in vmbra macerabitur in oleo amygdalino dulci, hypericonis, & myrtillorum ana ad \bar{z} j. β diligenter subigendo versandoque cum manibus: vt postea rursum in vmbra siccari possit: postremo aptabitur ventri, & circumferetur ad partû vsque: atque hac ratione rhagades & fissuræ præcauebuntur dolorque lenietur, rugæ denique à partu delebuntur.

*De mammarum & uteri sympathia lactis-
que generatione.*

PRægnantium mulierum mammis multi grauesque affectus ob sympathiâ uteri succedunt. Hanc autē vtriq; parti intercedere pleriq; tradūt per cōmunes venas quatuor hypogastricas inde ab epiga-

gastricæ imaque abdominis regione per rectos abdominis musculos sursum ad thoracem supra cartilagineum mucronatum ascendentes: totidemque mammariis descendentes occurrentes, & utrasque sibi inuicem aut vicinas tantum: aut contiguas, aut continuas esse: varia enim est multorum de venarum istarum societate & communitate sententia, cum interim de earundem origine inter se cōsentiant, nam Hypogastricas ad initium ossis sacri à vena caua, ante eiusdē in cruales ramos duos insignes diuisionem: Mammarias tū ab axillaribus infra clauiculas, tum supra easdem ramis eiusdē venæ cauæ trunco proximis propagari docent: Itaque per istas venas vteri mammarumque ambarū, proprias quas continent materias inuicem transferri & exonerari: lacte quidem mamas in vterum: sanguine mēstruo vterum in mamas sese exonerare. Sic enim redēdātem mensiū fluxū apposita sub māmīs cucurbitula magna ab Hipp. cohiberi docemur: Sic lactis puerperarū magnā grauēmq; copiā, die septimo puerperij octauo nonoq; in vterum à natura refūdi: sic mēstruis suppressis virginū & viduarū castarū mamas multo lacte extuberare. Sic eadem puertatis ætate vtramq; partē vterū māmāsque accēdere mēstruo crescere: fierique vterū concipiēdo, mamas alendo fœtui, lactique cōficiendo idoneas. Sic lactis collectionem à puerperarum māmīs mox à partu repellentium medicamentorū circa mamas appositione, & ab vtero affluentis sanguinis repressione prohiberi. Sic quoq; lactis prouentum in nutricibus crebra māmārū tractatione fricatione fortuq; & lactatione calfaciente, cucurbitulis denique thoraci apposis, omnibusque remediis sanguinem

ab

ab vtero ad mamas deducētibus cumulari. Sic denique blanda suauique papillarum fricatione vterum suauiter affici: fieriq; voluptatis eiusdē participem. Cæterū de cōmunitate ista externarum vteri mamarūque venarum à pluribus probabiliter dubitatur, qui eam ad axillares & hystericas venas per mediam cauā referre malunt, eo quod exiles valde sint hypogastricæ externæ: neque mammariis semper aut contiguæ, aut continuæ, nec etiam proximæ: sed interuallo satis distāti disiunctæ appareāt. Quapropter neq; ab vtero sanguinis ad mamas, neq; lactis à mammis ad vterum tam præcipitē & copiosum affluxū, quantus in puerperiis quotidie cernitur, fieri posse: sed potius per axillares & hystericarū venarum meatus cōtingerē tuētur, maximè vero cum lactæ puerperarum vrinæ, indeque lochia albicantia eodem tempore prodeant: portione vna scilicet lactis redundantis per axillares in cauam translati: indeque ad renes per emulgentia vasa partim rapti à renibus, partim ad vterū transmissi. Itaque per eandem viam axillarium sanguinem ab vtero ad mamas naturæ spōte tū arte & cucurbitulis sub mammis affixis ferri referrique pronuntiant.

De lactis generatione.

Porro lactis procreatio sic breuiter explicetur. Lac excrementum est benignum & vtile tertiz mamarū coctionis (vt semē est testiū) ex quo foetus alimentum intus forisque promendum sit. Materiz eius est sanguis menstruus totusquidē neq; diuisus, sed reliquo venarū sanguini similis: & ab impedito vtero vel per cōceptū, vel per obstructionē morbosam, ad mamas ingenita naturæ doctrina trāslatus.

& in earundem laxitatem glandulosam deposita
vbi lactescat. Effectrix siue generatrix lactis causa est
propria mammarum temperies, & substantia glandu-
lulosa rubeum sanguinem albo colore commutans,
quæ per multiplices frequentesque venas suscipiunt,
alias quidem internas, à venæ cavæ axillam petentis
descendente ramo: alias vero internas ab eadem ca-
ua pariter ex iugulo summoque sterno descenden-
te. Hæ autem partim absumentur in mammas &
musculos pectoris internos: partim ad xiphoidem
cartilaginē rectosque abdominis musculos delapsæ,
paulo supra umbilicum furculis aliquot suis totie-
dem venarum hypogastrii furculis occurrunt, unde
consensus ille vteri mammarumque tam ambitio-
sè celebratus. Quare haud temerè proditum est
sanguine materno lac esse frigidius humidiusque
ob frigidiorē glandulosam mammarum substan-
tiam, à qua sanguis supra naturam veluti recruda-
tur. Est autem lac prægnantium, viduarum, virgi-
numque, suppresso menstruo, specie potius quam
forma & usu affine, cum hoc serosum, aquosum, sal-
sum sit, minimèque alimentarium cernatur. Finalis
causa generandi lactis duplex est, vna priuatam mā-
marū nutritionem & naturam respicit: altera com-
munis est, foetus scilicet alitio, cuius gratia sangui-
nem ab utero ad mammas circa quartum mensem
dirigere natura incipit: sed euidentius multo que
vberius natalibus mensibus 7.9.10. quamquam ne-
que vltimis iis mensibus adhuc benignum est, pro-
batique alimenti: tametsi dulcescere tum & con-
coqui incipiat, ideo neque mox à puerperio foetui
alēdo adhibēdū est: sed tātisper differēdū dū ipsum
totū exhaustū sit: tum papillarum sucū alieno, tum
eiusdem

ciusdē expurgatione cum lochiis per triginta dies ab editis maribus: & per quadraginta à fœminis exclusis. Recentius enim lac ob crassam terrenamque crudam & turbidam substantiā cacostomachū est, & ab educatione infantulorum abdicandū: colostrū vocatur, & colostratio puerorū ex eo contracta egritudo: puerique colostrati, quibus stomachus ab illo læsus est. Forma lactis est color albus, & substantia mediocris, alendōque fœtui idonea. Commune autem naturæ consiliū fuit in dealbādo lacte: ut ab ipsis vitæ foribus infās humanitati assuescat, cuius index albus color est, utque morū feritatem abhorreat: quā rubeus quasi à cœdibus & rapinis color accendat. Eodē consilio mammaspectori natura affixit: verecundiæ & charitatis gratia: tum ne partes obscenas detegere inter lactandum, brutorum instar, mater cogeretur: tum ut fœtum lactantem palpare intueri & exosculari posset.

De differentiis mammarum in pregnantibus.

MAMMARUM in pregnantibus varia est constitutio, aliæ nimis amplæ plenæque sunt tantum, vel etiam lacte diffuentes, aliæ graciles & subito extenuatæ, aliæ nimis duræ, aliæ denique solidæ, mediæque inter graciles & duras, magnas & paruas: atque hæc secundum naturam sunt sanique fœtus indices: cuius nutritioni sanguinis menstrui tantum superest: quantum ad com meatum fœtusque nascituri, ex lacte alimentum in mammas colligendum satis sit. Mammarum autem exsuperās amplitudo fœtui matrique multorum incommodorum ante & post partum author est: turpes enim & indecoræ generosis præsertim matronis à nu-

tricatu abstinentibus habentur: & ne ad opus & manus & brachia admoueant, impediunt: in mammis quoque morbos plerosque excitant: vt phlegmonas, abscessus, vlcera, cæcos, & scirrhos, ex cõtusione & oppressione: præterea foetus alimentum & lac redundans corrumpunt, eique nasum fere sinum reddunt. Amplitudinis immoderatæ causa est vbertas vel laudati vel illaudati sanguinis crudique & flatuosi. Lactis verò redūdantis causa externa fere est ciborū, nempe humidorū flatuorum frequēs & copiosus vsus: vt & acetariorū, olerum & quæ ex iisdē parātur iusculorum, fructuū horeorum, naporum, raparum, castanearum, leguminū, piscium deniq; & lacticiniorum: Potatio itē plurima aquæ aut vini dilutioris, otium, somnolētia, thoracis laxitas, sāguinis laudabilis probeq; cocti vbertatē exaggerāt. Idē facit ætas iuuenilis, natura sanguinea, ingluies ciborum præsertim lautorum & euchymorū: hilaritas vitæ, negotiorum securitas, multiq; vini rubri & generosi ingurgitatio, peçtoris cordisque caliditas. Hinc natura & sine grauiditate māmose sunt scemina, vulgò iudicantur vinosæ, & ob mammarū cum vtero consensum libidinosæ. Huius amplitudinis præcautio à quarto statim mense grauiditatis, motuque primo foetus, inchoanda est. Primum quidem per diætā calidā siccāque, tenuē & attenuantem, si sanguis flatuosus ex victu consueto deprehendatur, vel refrigerantē siccantēque & paruā: si redūdantis sanguinis certa sit cōiectura. Deinde per remedia reuulsoria mitiora: vt sunt femorum, crurumque deligationes, fricationes & cucurbitulæ inguinibus affigendæ, necnon clysteres lenes: postremo per topica reuellentia frigida siccaque & astringentia, fots & vnguenta

circa mammas apponenda, quæ earum calorem obtundant, ne sanguinem alliciat, & quæ substantiam laxiorem porosque coerceant: ne affluentem excipiant: hinc enim solidæ & mediocres permanebunt: huiusmodi sunt gestatio tenuissimæ laminæ chalybis vel plumbi inter duas mamas, & exiguorum sabboris frustorum sub axillis: illa enim refrigerando repellunt, hæc adstringendo: Item fots ex aqua stillatiæ vel decocto foliorum lysimachiz vtriusque, equiseti, sanguinalis, tapsi barbati, plantaginis, somach, solani, prunellorum, nucum viridium, forborum mespillorum, rosarum, admixta aceti rosacei & aluminis an. sexta parte: talis denique est capsula plumbea, quæ succo cicutz intus oblita sit. Quod si repressio nec in tempore facta, nec satis efficax fuerit: iamque lacte collecto aut flatu enormis amplitudo displiceat: tunc digerentibus remediis exhaurienda est, mixtis tamen paucis astringentibus, quæ substantiam partis ab emollitione nimia & relaxatione tueantur. talis fots est ex decocto foliorum hederæ sylvestris, saluiz maioris, vineæ peruinæ in æqualib. partib. aquæ ferratæ & vini rubri, & aceti rosacei 3. ij. tale est decoctum stellariz (alchymillam vocant) tale denique cataplasma sequens. ℞. farinæ fabarum orobi lentium & cicerum rubeorum an. 3. iij. coquantur in oxymelite, addendo pulueris foliorum mentastri absinthij & meliloti an. 3. ij. olei chamæmelini 3. j. Iam si ex iisdem venis plenis tumidisque largius lactis effluuium in vltimos imprægnationis menses natales vt septimum nonum decimum inciderit, fœtus infirmitatem & instantem abortum portendit: lac enim copiosum ex abundanti sanguine est ab vtero

ad mammas regurgitante, quòd eius minimam portionem infirmior fœtus attrahat concoquat absumatque, maximâ eiusdem parte relicta, & in mammas transmissa, ibique in lac conuersa aquosius crudiſque : cuius multitudine victa mammarum retentrix facultas continenter ipsum diffluere finit: cum tamen ante maturum fœtus exitum, cui pro comiteatu est, prodire non debeat. Hinc ab illo effluxu molles ſenſim mammæ euadunt. Si tamen exiguum ſit lactis effluuium, ſintque mammæ interim ſolidæ firmæque, robuſti ſanique fœtus certum eſt augurium. Profluuium hoc immodicum comprimendum eſt: primum quidem victu euchy-
mo & cupepto vinoque generoſo, mater fœtusque roborentur: omneſque animi & corporis graues motus fugiantur: deinde leuib. deorſum verſas vterû factis reuulſionibus, vt frictionibus, & deligationibus crurû femorumque, lenibus clyſteribus, cucurbitulis ad inguina affigendis: poſtremo topicis aſtringentibus infra ſupraque & iuxta axillas apponendis: ſic enim præcluſis vñis veniſque pectoralibus axillaribus eſt hypogaſtriciſ conſtrictiſ interceptus ſanguis ad fœtum in vterum reflectetur, quo vberius alatur, & ad iuſtum partuſ ſpatium aſſeruetur: cuiuſmodi aſtringentia ſunt vnguentum de bolo & comitiſſæ, ceratum ſantalinum : ipſæ interim mammæ digerentibus pluribus munientur, pauciſque mixtiſ aſtringentibus (de quibus modo agebamus) diſcutiendi lactiſ gratia, ſiue metu recidiuæ fluxionis & recurſuræ repletionis ob adſtrictionem. Tale eſt iſtud.

℞ vini acerbi, aquę fabrôrum aut aquę plantaginis an. partes æquales, aluminis roche partem ſextâ.

Item

Item & farinæ fabarū & hordei an. ℥ ss pulueris rosarum rubearum & myrtillorum an. ʒ j coquantur cum oxymelite & fiat cataplasma applicandum ter aut quater interdiu mammis ipsis.

De mammis gracilibus.

QUod si mammas prægnantium circa vltimos menses, septimum, nonum, decimum, quibus collecto sanguine & lacte naturaliter extumescere consueuerunt: repente flaccescere inaniri & extenuari sine vlllo lactis euidenti effluuio contingat: certum id est futuri abortus indicium: Huius enim extenuationis causa est sanguinis mamarum lactisque inopia: vel quod menstruus sanguis parcius sit, totusque à fœtu in vtero absumatur: adeo vt nulla eius portio ad mammas, lactis causa, trāsmittatur: haurit enim primū quidem è venis vteri cauaque sanguinem, quo nutritioni suæ non respondente com meatum in mammis conditum exhaurit, per venas communes aut axillares: vel certe quod sanguinis lactisque motus ad vterum præ tumore aliquo, vt phlegmone, erysipelate, vel vinculorum ruptione ab ictu saltu casuque grauiter dolentem, repente subsidij causa à toto corpore mammisque à natura conuersus sit. Cæterum mamarum extenuatio, quæ totius etiam corporis communis est, vt ab externa causa corporis humorem substantiam sensim & sine sensu digerente, vt inedia, diarrhœa, purgatione, vigiliis, laboribus, mœrore, hepatis intemperie, morbisque diuturnis, ea quidem non necessarium & inuitabilem abortum præfagit: cum incidere possit septimo, nono & decimo mense imminente par-

tu: aut vacationis causa ante abortum desinere:
ægraque mater refocillari: & sanguis instaurari:
quo rursus mammae expleantur, solidæque & fir-
mæ fiant: foetusque saturetur, vel maior etiam fœ-
tus copioso sanguine fruatur in utero: ex quo sa-
tis idoneum illi alimentum suppetat, lactis in-
terim materia deficiente. Repentina autem mamma-
rum modo plenarum & solidarum extenuatio in-
stantis abortus certior testis est, necisque foetus: vel
à suffocatione vel à dissolutione nexus acetabulorū:
Itaque illi extenuationis speciei, quæ ab inedia est,
solavitæ ratio analeptica auxiliari potest: quæ facile
prompteque sanguinis & lactis ubertatem alendo
foetui implendisque mammis suppeditet. Posterior
species ob sanguinis & lactis à mammis ad uterum
recursum fere immedicabilis est: solaque in reuul-
sione per superiores partes celebranda est, quantum-
vis exigua subsit spes. Quæ autem mammae est uni-
prægnantium inopinata extenuatio: gemellorum
alterius immaturum exitum abortumque portedit,
siue inediae ratione, siue sanguinis lactisque ad
uteri alterutrum latus refluxu contigerit. Cer-
tum autem est gemellos vno coitu pro sinuum
uteri & mammarum muliebrium numero gigni
naturaliter posse: eorumque singulos propriis præ-
ditos esse umbilicis, per quos è venis uteri sangui-
nem alimenti sui gratia proluciant, quo tamen non
respondente collectum antea è mammis sangui-
nem & lac ad sese protrahunt, unde eiusdem subita
succedit vacuitas & inanitio, quæ directi & vali-
dioris foetus abortum ostedit, masculi si dextra: fœ-
minini si sinistra mamma gracilescat. Sic enim dis-
crimen sexuum in propria uteri sede Hippocrates
distinguit

distinxit aphori. 38. sect. 5. Excitantur quidem fœtus plures è seminis sœcundi maiori copia : quæ duorû generationi satis sit: sicuti diuersi sexus è diuersa signum temperiæ : est enim sinister frigidior, dexter calidior: vel certe ob feminis dissimilarem substantiam, cuius prima secundaue ei aculatio calidior sit, posteriores minus calidæ : quæ deniq; à motu lactis ad vterum repentina extenuatio oritur, ea fere vtriusque fœtus necem demonstrat.

De mammis pregnantium durioribus.

M Ammarum durities aut proprium earum laborem: aut aliarum partium quibuscum illis sympathia est, vt coxarû, oculorû, genuû noxâ præfagiunt apud Hippoc. aphor. 5. lib. 5. aut etiâ insaniam eodẽ authore apho. 40. libri eiusdem. Est autẽ durities hoc loco audienda non pro concretione lactis aut siccitate scirrhosa, sed pro tensione ob repletionẽ lactis & sanguinis; quæ magis renitẽs sit, quàm simplex plenitudo & soliditas. Obturantur enim nimisq; tenduntur venę à copioso sanguine ab uterò per imprægnationẽ regurgitate, qui tamẽ pro crassitie lentore frigidityte aut sola etiâ copia neq; resoluitur, neque suppuratur, sed incalescit tantum diutinaque mora vritur efflatis interim in cerebrum feruidis atrisque vaporibus & melancholicis: vnde insania & furor: vel tumor etiam canerosus ex iisdem suscitatur: vel certe à valida natura in alias partes amadatur. Quod si Hippocrates ab ea duritie abortum non metuat, de permanente quidem audiendus est, non de ea quę protin' disparet, sanguine ad vterum conuerso, vbi vel erysipelas vel phlegmonem lethalem accendat, vel fœtum suffocet. Huius duritiei eadem curatio est, quæ amplitudinis

enormis mammarum exposita est, digerens scilicet tergensque: sed admixtis paucis emollientibus.

De partu.

HActenus de conceptus causis omnibus & symptomatis actum est: nunc de partu. Est autem partus tertia vteri organica actio. Qui duplex est: naturalis, & cōtra naturā, illegitimus, & vitiosus. Vtrinque discrimen desumitur ex quatuor notis, tēporis, figuræ, accidentium, & euacuationū cōsequentium. Tēpus enim partui humano idoneum est septimus, nonus, & decimus mensis ipsius gestationis, & initium etiam vndecimi. At verò sexto mense & prioribus partus præcox & immaturus est, funestusque foetui semper, per sæpe etiam matri: vel quod foetus suis partibus omnibus nondum descriptus sit: ut tribus primis mēsis (quibus genitura, embryo foetus nominatur: sicuti superiorib. quib. motus euidētior est, puer) vel quod idem inualidior sit, ob mollitiem artuum & habitus: ex luxuriante humiditate, vnde nec se excutere foras potest: nec aeris insueti appulsū ferre. Nos verò de legitimo partus spatio, & mēse accurata satis declamatione transigimus huic argumento affigenda. Sextus igitur mēsis errore mulierum tantum numeratur pro legitimo partus spatio. Septimestris autem partus vitalis est, perfectis omnib. membris, & validioribus. Octimestris partus vitiosus est, & calamitosus, eò quod cū septimo mense exitum quæsiuerit foetus, vires eius ex eo conatu frangūtur. In Ægypto tamen, & Hispania ob cæli caliditatem potius, quàm ob robur matrū æstu cæli & regionis languentiū vitalis est. Nonimestris foetus maxime viuax est: firmissimis, tum mēbris, & corporibus: Decimestris quoque salubris est, foetus

fœtus præfertim fœmineus qui tardius formari & a-
 dolescere mouet. q; in vtero solet ob seminum vte-
 rique frigidiorē constitutionē. Alioqui fœminæ
 extra vterum citius quam mares crescunt, & matu-
 ratur corpore & animo: qui tamē crassissimi & ma-
 ximi fœtus sūt non solū in diuerso brutorū genere:
 sed in eadē etiā specie tardius perficiuntur & veluti
 serius maturatur, atq; in lucē proferuntur. Hinc forte
 fabula orta est de Iouis cū Semele per tres dies no-
 ctesq; cōtinuato cōcubitu, Herculis gignendi causa.
 Secūda nota spectat ad figurā fœtus ex vtero exeun-
 tis: si primo pronosq; capite manib. ad eoxas reflexis
 tā mas quā fœmina elabatur: idq; non ponderis ra-
 tione, sed facilitatis gratia, & vt vitetur periculum
 frangendorū artuum: violandeq; matris, & matricis.
 Ideoque apud vetetes Romanos moris erat vt ca-
 dauera pedib' primisefferretur, cōtraria scilicet cor-
 poris figura ei, qua pueri primū lucē aspexerunt. Si-
 tus tamē in vtero fœtus humani est fursū versus: sic
 enim cōglobatus est vt calces natibus, manus ge-
 nibus opprimatur, caput verò mediis genibus infe-
 ratur auriū tenus: hac enim artuū contorsione gra-
 uiditati fœtus & angustię locellorū muliebriū con-
 sultū esse oportuit. Ideoq; molliores cercoq; & fle-
 xibiles artus natura effinxit: minorq; spacio occu-
 pando idoneos. Neq; vero soliditatē eorundē artuū
 firmitatē & constantiā exigebat ambulationis post
 partū necessitas, quæritandi victus & indagandæ ma-
 tris gratia: quæ præsto futura erat fœtus sui alendi,
 seruandiq; studiosissima. Quadrupedum autem fœ-
 tus figura est extensa, ob vteri amplitudinē artuūq;
 soliditatem ad victū extra vterum illico à partu ca-
 pessendum. At expedum vt pisciū ob promissā cor-
 poris vteri; longitudinem, situs fœtuū obliquior

est, ad angustiarum damna facienda, parandumque; fœtus granditati spatiū. Bipedū denique; volucrūque; contractus situs est, ob testē quā clausa sunt rotunditatē. Ergo humani fœtus partus naturalis est, ut primo pronōque; capite exeat, nō naturalis verō & vitiosus quadruplex est: 1^o si in nascēdo, nō caput, sed pes aut alter, aut uterque. primus exiuerit: 2^o est si manu una, vel ambab. primis: 3^o si alterutro latere: 4^o si everso vel vētre, vel spina prodeat. Illis naturalib. partub. deā Profam, nō naturalib. Postuortā vetus Romanorū religio præfecit. Tertia nota est à symptomatis, dolore scilicet, fœtæque; & fœtus offensione, quibus leuissimis & breuissimis partus naturalis constat, quum sit partus *ελειστος* quedā species. Ceterum dolores illi nascuntur ex diuulsione membranarum fœtum continentium allantoidis amnii & chorij, vasorumque ab acetabulis venarū & arteriarum vteri disunctione: ex quibus vmbilicalia duo constituuntur quæ fœtum sanguinis materni comineatu eiusdemque caloris fotu sustentare & fouere possint. Nascuntur præterea ex orificij interioris vteri, eiusque nervosæ ceruicis violenta dilatatione, ossiumque coxygis distractione, nec nō intestini crassi pressu violentiori: ut liberior ampliorque emerfuro fœtui via pateat. Quod si graui & diuturno dolore, magna; matris & matricis iniuria fœtus exeat, partus hic iam naturalis non est: sed vitiosus & difficilis. Quarta nota ab euacuationibus necessariis sumitur, aquarum scilicet & lochiorum. Porro aquarum origo est ex vrina fœtus, non per vrethrā quidem, sed per *ὀυράχον* inter amnium & chorium, refusa. Nihil enim materię alienę inter allantoidem & amnion intercurrit, siquidem pauca admodum aqua nonimestri gestationis spacio congeritur, eò quod maternus sanguis

à fero aquoso antea perpuratus sit, quàm ab vmbilicalibus vasis ad hepar fœtus raptus sit. Excremeta fœtus primæ coctionis nulla sunt: neque enim in fœtu quandiu vtero continetur, aut ventriculus, aut intestina, aut anus aliquo munere funguntur: nisi fortasse nigricans quiddam atroque sanguini persimile ex hepate refluens, ex intestinis, edito statim fœtu, erûpat. Secundæ coctionis excrementum præter urinam paucam nullum est: secreta autem bile & melæcholia ab hepate materno. Tertiæ denique nullum est, præter sudores & mucos quosdã: quibus internæ partium naturalium inanitates obsessæ, totusq; habitus circumlitus conspicitur. Mulierum vulgus seu inale materiã concretã falso suspicatur, ex recenti concubitu, quã prolabens fœtus è muliebri sinu vel ceruice eiusdem corraferit. Hæc tamen neque ibi diutius hære, neq; subire prægnâtis sinu potest: ob signato orificio interiori: neq; si hæreat, cõcrescere solet: sed potius liquefcet & diffluet spiritu & calore exolefcẽte. Neq; rursus cor spiritui elaborãdo, aut pulmones aeri trahendo emittẽdoque inseruiunt, dum fœtus est in vtero. Horum defectus suppletur à matre. Sensus quoque nullus est vsus: Hinc vita plantæ ante motum fœtui tribuitur. Lochia denique (puerperia vel purgamenta muliebria latini vocât) reliquię sunt impuri mēstrui sanguinis ex alimēto fœtus lactisq; in vberibus elaboratione, quę reliquię in vterinis vasis: vel potius in caua vena coaccruantur, & patefactis acetabulis ex vtero prorûpūt per plures dies, vel pauciores, pro puritate vel impuritate puerperarũ, victu, & natura, tēperanti magis vel intēperanti: atq; adeo pro sexus varietate: nã ex partu maris lochiorum ad 30. dies vacuatio ad sũmũ producitur: alias ad 35. & 40. diēs. Quod spatiũ sũmũ puerperarũ

quieti in thalamo Hippocrates designauit. Ergo naturalis partus est, quem necessariae vacuationes antecesserunt; ut aquarum, vel subsequuntur sunt; ut membranarum & lochiorum. Non naturalis contra in quo aliquid earum materialium in utero, vel eiusdem venis relictum retentumque est.

De partus symptomatis.

Est igitur naturalis partus, ut cuiuslibet actionis, noxa triplex: una abolitio, quæ fit vel matre mortua, incolumi foetu: vel hoc ipso enecto, matre viuentē; vel utroque simul emortuo. Altera diminutio, quæ difficilis partus antea vocabatur, fitque magno cum dolore, grauique foetus & foetæ offensione. Tertia deprauatio est, ut cum partus anticipat ad sextum usque mensem (abortum vocamus) vel cum indecenti figura foetus profilit: hicque vitiosus & præposterus appellatur: vel cum retinentur aut membranæ aut lochia, unde vteri phlegmone ex eorum circa vterum mora & cunctatione, vel febres ardentiores ex eorundem intra venas maiores corruptela.

De prima deprauati partus specie.

Abortus symptoma est retentricis vteri facultatis; nempe immatura & ante septimum mensem, foetus formati, vitalisque exclusio. Effluxio enim vocatur seminum commixtorum & coagulatorum prolapsio sub membranarum, concretisque sanguinis specie facta (vulgus obstetricum falsum germē vocat.) Causæ sunt & internæ & externæ: hæc quidem multiplices. Talia sunt, quæ foetui alimentum suum detrahunt; aut humoralem, aut spirituosum. Illum quidem detrahunt inedia, vigilæ, labor immodicus, purgatio vehemens, profluuium alui quodcumque; immoderatum

tū, vt lienteria, diarrhoea, dysenteria, tenesmus, phlebotomia, vltimis præsertim mēsis, hæmorrhagæ, ex quacūq; corporis parte eisdem etiā mensibus, vide lib. 5. aph. 31. 34. 40. 50. Spirituosum subripitne ea quæ calorem matris ad fœtum fluentem impensius refrigerat vt aer borealis, potus niuatus: aut quæ calorem eundem dissoluunt, vt estuosum cælum vaporq; thermarum, & balnei calidioris cuiuslibet, lætitia, risus minus effusus: aut quæ calorem eundē ad suum principium, id est cor maternum reuocant, vt timor, incēror, lipothymia, syncope: aut deniq; eundem suffocant, vt inspiratio aeris fumosi, crassiq; & olidi, vt ab extinctis candelis, obstruit enim præcrassitie vapor vmbilicalia vasa, & transpirationē tollit; suffocat quoq; crapula & ingluties. Ad externas quoque causaspectant ea, quæ ligamenta fœtus dissoluunt, vt quilibet motus corporis animiq. violentior, cursus, lapsus, ictus contundens, coitus post septimum mensem. Internæ causæ sunt, vel morbi, tū communes: quales sunt acuti, siue cum febre siue sine febre, lege aphor. 30. & 43. lib. 5. tum vtro proprij vt intemperierū species omnes, vlcus, tumor, & Hippocrati lib. de sterilib. paruitas vteri & magnitudo: sed illa augmentum potius fœtus prohibent, quam vitam exemplo catellorum inclusorum: hæc si natia sit robusta quoque est, arteque circa fœtū cōtrahitur: at aduētitiæ ex prægressis partibus laboriosis, vterū debilitat. Cōcurrūt denique causæ morificæ vt plethora suffocans, & cacochymia inepta ad alendum, vel saltē ligamēta molliens & dissoluēs, vt mucosa pituita. de qua vide aph. 45. libri quinti.

Diagnosticæ signa causarum externarum ex ægræ fœminæ relatione: internarum ex habitu prægresso

sumenda sunt: tum ex propriis morborum eiusdem symptomatis, tum ex tempore abortus: nam primis diebus fit vel extenui nimis aquosusq. virili spermate, vel ex lubrico vtero humidoque: vel ex laxiori orificio eiusdem. At 2. 3. 4. 5. & 6. magis à cacochymia prouenit.

Prognostica signa abortus futuri duo sunt cōmunia Hippocrati, vnū lactis multi effluxus è māmīs & spōtaneus. vide aphor. 52. lib. 5. fit enim ab abūdātia lactis & sanguinis ex vtero redundātis, quē sanus firmusque fœtus nutritione propria nō cōficit. Alterum est māmārū gracilitas vel vtriusq. vel alterius tantum, pro fœtuū numero situq. vide lib. 5. aph. 37. & 38. Oritur enim extenuatio hęc ex inopia sanguinis, vel ab acuto morbo, vel ab inedia matris, sensim cōsumpti, vel ad vterū à quocūque affectu obsessum, vt erisipelate, phlegmone, aut cōtusione, subito cōuersi, vel saltē à robusto fœtu absūpti, quia limēti inopia laborare deinceps cogitur. Tertiū est certa mēsiū periodus. Instātis abortus signa sunt, laterū & superioris ventris coarctatio, lumborum coxarumq. grauitas, motus omnis languidior, descendente, prementeq. infimas matris partes, fœtus mole. Deniq. mulieres omnes per abortū magis quā verum partū laborant, & periclitantur: fœtu nihil iuuante matris conatus. Minus tamen quæ sanæ sunt mulieres, media ætate, aluo lubrica, & quæ vel plures, vel paucos sed grandiores enixæ sunt pueros. Contra accidere solet iunioribus & primiparis aut etiam senioribus puerperis.

De abortus præcautione ante conceptum.

A Bort^{us} præcautio duplex est: vna ante cōceptū, cuius

cuius finis est: vt mulieres sanæ cōcipiāt: altera post cōceptum, cuius finis est, vt incolumi matre fœtus incolumis proferatur in nonū vsque mensem. Præcautio prior constat neutrius mulierum status correctione, & amotione vitiorum abortū prouocantium, qualis est habitus obesitas, plethorica, aut tenuitas immodica. Illa victu pauco & attenuāte, hæc copioso & incrassāte emēdatur: vterq; sane fœtui futuro funestus est, ille alimenti excrementosa copia, hic sanguinis & seminis inopia. Caco-chymia quoq; siue toti corpori cōmunis, siue vtero aut alicui visceri propria, vt ventriculo, hepatis, lienis, cerebro, cuius excremētis vterus ipse inquinetur: hæc, inquā caco-chymia delēda est, vbi species ei⁹ ex causis internis, ætate & natura, & externis: vt victu progressu explorata ad amissim fuerit: Illi enim primū diætā cōtraria, deinde pharmacia opponetur: tum alterans, quæ concoquat eam: tū euacuās quæ cōcoctam eandem materiā, expurget. Alterationis & vacuationis humorū materiā methodūq; annotauimus cap. de suppressione mēsiū. Discrimen tamē est purgādæ caco-chymix, quæ si vniuersalis sit, vniuersali tantū egeat vacuatione: sin particularis, duplicē exigit: & vniuersalē priorem, & particularem posteriorem tum mandantis visceris, tum recipientis vteri. Postremus alterationis scopus est roborare tum viscus, tum vterum ipsam. sicuti leges capite de fluore albo.

Præcautio abortus post conceptum.

PRæcautio abortus post conceptū constat præter victum grauidarum antea descriptum: primū declinatione causarū externarū tū alimētum fœtus subducētiū, quales sūt inedia, labor, vigilię, vacuatio insignis: tū calorē spirituūq. materiā fœtui eripien-

tium: vel extinguēdo refrigerandoq;, qualis est aer borealis, & potus niuatus: vel calefaciendo impensius digerendoque, qualis thermarum estus: vel reuocando ad principium suum, qualis n. ceror est, & metus: tum deniq; ligamēta foetus diuellētium, qualis motus saltusque est vehementior. Cōstat deinde hęc ipsa præcautio internarum causarum correctiōne, quæ morbi sunt, grauioraque symptomata: aut habitus venter, qualis est plethoricus, vel tenuis nimis & macilentus. Horū ille præter victū attenuantem phlebotomia quoque cubiti demendus est: primis præsertim quatuor mensibus, hic plena & inorassante diætā indiget. Sic cacochymia vniuersalis frigida, victu contrario, & purgatione sola tollitur: sed calida, vt biliosa, præter victum contrarium & purgationem, phlebotomiā quoque indicat. Morbi autem vel communes sunt, vel particulares: illi vel acuti vel diuturni: hi solo victu contrario protrahuntur sæpe ad partus tempus legitimum: illi & victu & vacuatione indigēt; victu quidē contrario, sed nō pleno: neque rursus tenuissimo, sed tenui tantum, id est paulo parciore, quam esset ante morbum consuetus. Purgatio autem primis mensibus id est 1. 2. 3. & vltimis id est 7. 8. & 9. mitissima celebretur: idque maxime si materia turgeat: at mediis mensibus vt 4. 5. & 6. fortior concedatur, mistis quibusdā diagrediatis, aut colocynthisatis cū benignioribus, iisque vel simplicibus vel compositis, quæ exposita sunt cap. de victu grauidarum: admiscendum tamen semper est, roborandi foetus causa, astringens quoddam medicamētum. Si verò materia non turgeat: sed fixa impactaque sit alicui visceri: mitioribus potius iis per epierasim vsurpatis, quàm violentis

lentis & semel, expurganda est cacochymia. Vide aphorismum I. lib. 4.

Phlebotomiæ quoque quantitas quam morbus acutus indicarit, hoc modo temperanda est: tum ex viribus matris habitûque, tum fœtus, necnon ex ætate, nam in vniuersum potius primis mensibus matresana atque eusarca, quam vltimis, matrêque tenui sanguis detrahendus. Semper autem ex venis brachij, nunquam poplitis aut malleoli in grauidis phlebotomia tentetur, ne citatis mensibus, fœtus præcipitetur. In quo sensu exponendus est aphorismus Hippocratis lib. 5. vel certè de largiori phlebotomia in cubito, vbi ait, Mulier misso sanguine abortit. Particulares morbi sunt sæpe mitiores: Tales sunt ventriculi intemperies, eorumque symptomata, fastidium, pica, malacia, nausea, vomitio, dolor & singultus: quorum omnium curatiua methodus exposita est. Talia sunt capitis symptomata ex sympathia impuri vetriculi grauidarum: vt vertigo, epilepsia, somnolentia, torpor mentis, & corporis, quorû ibidem exposita est curatio. Talia ventris & intestinorum: vt diarrhœa, tenesmus, dysenteria, quibus omnib. vacuatione & alteratione est succurrendum. Illa suscipiatur tû ex clysteribus primum tergentibus, deinde agglutinâtibus, & astringentibus: tum ex potionibus medicamentorum, benignorum vocatorum, de quibus antea quoq; transactû est. Alteratio electuariis cõstet solidis ac mollibus, pulueribus, emplastris, fotibus & vnguentis: quorû omniû formulę sub exẽplo vetriculi frigidioris curadi, expositę sunt. Talia deniq; sunt vteri, pulmonis pectorisq; propria symptomata, vt tussis, dyspnœa, periodica mēsiû fluxio, fluor albus, vteri de-

scensus ad pudendum, lumborum dolor ardorq. quibus fluxus mēstruus vltimis præsertim mēfibz cōprimēdus est, tū victu frigido siccoque, tum reuellētibz remediis vt phlebotomia in cubito dextro, deligationibus & frictionibus brachiorum, cucurbitulis sub māmīs appositis: tū deniq. remediis internis externisq. topicis adstringentibus, de quibus lege caput de redundantia mēstruorū: fluoris quoq. albi curationē eodē cap. leges. Denique descēsus vteri (nā de ardore & dolore paulo post) ob mollietiem ligamentorū curabitur quoq; per purgationē benigniorem ex rhabarbari puluere & infusione: & roborantibus internis & externis, de quibus mox in corroboratione lumborum.

Tertia præcautionis ratio constat corroboratione ligamētorū vteri, fœtusq; vinculorū, hæc q; locum habet in omni abortus causa: idq. per medicamenta astringentia, id est siccæ & terrenæ substātię, quæque vel calida vel frigida sint, calida enim frigidis: calidis verò naturis & tēpestatib. frigida accommodētur quę substantiā cōtrahant aliena humiditate cōsumpta. Ea vero intus forisq. vsurpātur toto grauiditatis tēpore in suspectis abortus nomine mulierculis: huius generis prostant in officinis emplastrum pro matrice, & vnguētum comitissæ vulgatissimum &c. Quorum omnium exemplo alia etiā comparentur, mixtis cum astringentibus quibusdam aromaticis penetrationis & odoris causa. vt,

℞. ladani puri ꝑ ij. calami arom. boli armenę, sanguinis draconis, terrę sigillatę, lapid. magnet. coralli rubr. corticis malor. granator. an. ꝑ j. ꝑ. acacię, hypocistid. an. ꝑ ꝑ. picis naualis & gummi arabici an. ꝑ ꝑ. terebint. q. s. fiat emplastrum. Vel

℞. ma-

℥. mastich. ʒ ij radicis bistortæ, tormentillæ, symphyti, corticis mali granati, & coriandr. præparat. an. ʒ ij rosar. rub. nucū cupressi & myrtillorū an. ʒ j olei lentiscini, & myrtini an. ʒ j ꝑ ceræ parū, fiat vnguentum.

Quod si suspicio calculi aut ardor nimius dolorq; lumbos exerceat : emplastris abdicatis vnguentorū tutus erit vsus. Vtraque inducentur regioni lumborum, coxarum, & inguinum. Ardor quoque lumborū cōpescetur cerato satalino, & vnguēto rosaceo sēpi⁹ lotis in aqua plātaginis & eū paucō aceto albo & pauca caphura applicatis. Sequens vsitatissimum mihi oxyrrhodinum. ℥ olei lentiscini ʒ ij albumen oui, j vnguenti populei ʒ iij trochiscor. de caphura ʒ acetī & aquæ rosarum an. ʒ j misceantur multa agitatione & applicentur frigide & frequenter. Similis est facultas vnguēti refrigerantis Gal. recenter dispēfati. Interna eiusdem generis sint, sed præterea spirituosafatū vt viscerum substantiam roburque contineant, humiditate absumpta: tum vt eorundem calorem foueant. Talia sunt electaria solida, aromaticum, rosatum, diamb. de gemmis, diamargarit. frigid. & mollia, vt confectio alkermes & de hyacinth. Eorum exemplis sic alia concinnentur.

℥ conferuē antiquę rosar. ʒ ij condit. corticis citri, & carnis cydoniorum an. ʒ j myrobalanū vel nucē iuglandem conditam n. j. corall. vtriusque terræ sigillatæ, behen albi & rubri an. ʒ j nucis moschat. & macis an. ʒ ꝑ cum syrup. de mentha vel conseruationis corticis citri fiat opiata.

Si loco syrupi reponatur saccharū rosatū addāturq; v. aut vj auri foliola, fiet cōditū. Quod si quartam partē præscriptę materię saccharo dissoluto aquaro-

farum excipias, fient tabellæ. Harum omnium dosis est à ʒ j ad ʒ iij superbibendo parum vini rubri austerique. Huic etiam scopo vtilissim⁹ est pulvis vocatus digestivus cum multa mixtione materiæ siccantis vt corallorum, cornu cetrini, rasuræ eboris, fragmētorum sapphiri, & hyacinthi, terræ sigillatæ. Vide exemplum cap. de victu grauidarum.

Vltima præcautio abortus est per medicamenta, quæ putantur physica, occulta proprietate fœtū cōtinere, & vterū roborare, foris intusq; vsurpata. Illius generis sunt lapis aquilæ è collo suspēsus gestatusq;, & sidonius lapis pariter alligat⁹, lapis in vtero ceruæ inuētus, os de corde cerui, suffumigatio de pilis ceruinis. Huius generis sunt pulvis canceri fluuiatilis epotus, sicuti coagulū leporinū cū aqua vel vino, corallus cum ouo haustus. Vulgatissimū est & hoc cōtra abortum à causa aliqua procatactica scilicet semen nēpe (germen vocāt,) sex ouorum gallinaceorū vino albo dissolutorū, epotūq; calidè sex matutinis cōtinuis adhibita interim corporis quiete. Illæ igitur omnes præcautionis species continuandæ sunt donec instātem abortū medicus præsentiat ex enumeratis signis: tum enim curationi soli studeat: quæ partum accelere, & eiusque labores minuat. Quæ ratio exponetur capite de difficultate partus.

De secunda deprauari partus specie.

Secunda species non naturalis fœtus est cum fœtus exit non capite primo, sed alia quacunq; corporis parte prima, isq; vitiosus priuatim vocatur, cuius differētiæ sunt quinque: Prima cū alter pes vel vterque primus exeritur, & qui ita nascuntur, vocantur agrippæ malo corporis & animi omine: secunda cum manus vna vel vtraque: tertia cum alterutrum
latus:

latus: quarta cum nates: quinta cum venter primus profertur. Causæ sunt tum amplitudo nimia vteritum temerarij parturientis matris dolore percitæ motus: tum deniq; partium fœtus robur dissimile, vt validior quæq; prima prorumpat. Signa diagnostica sensilia quidem sunt, obiectæ fœtus partes visu tactuque perceptæ; artificiosa ex motionib⁹ matrû, & fœtus ante partum desumuntur. Prognostica sunt q̃ omnes alienæ figuræ à naturali sunt periculose & matri & fœtui, minus tamen periculosa quæ fit pedibus primis: reliquæ periculosissimæ.

Tertia species partus deprauati.

Tertia species partus non naturalis est is qui fit tardi⁹ ægriusq;. Symptoma est facultatis tû naturalis retentricis vteri; tum animalis motuq; ex diuulsione violenta ligamentorû fœtus ab acetabulis, vteri; & cervicis eiusdē valida extensione: orto dolore; qui maior est fœminarû humanarû, quā brutarum: vel ob vitam sedentariā, vel ob capitis humani amplitudinem in vtero: vnde vocantur pueri nani. Causæ sunt vel externæ & communes vtero, matri, & fœtui: vt aer squallidus, æstuosus, crapula, incidia, mœror, vigiliæ multæ, labor immodicus, morbus acutus vel diuturnus prægressus, & quælibet euacuatio immodica, vel sanguinis per nares, vterum, hæmorrhoides vel cacoehymix per intestina, quales sunt tenesmus, dysenterix, lienterix, diarrhœæ. Aliæ sunt internæ & propriæ singulorû trium, matris, vteri, fœtusque; matris quidem vel natiua vitia; vt stature breuitas, obesitas, gracilitas, ætas iunior, viginti duob⁹ annis, & senior quadraginta apud Auicennā: alia aduentitiæ vt morbi, metus, mœrorque. Vteri vitia quoque alia sunt natiua: sicut in-

temperies ficcior & præsertim frigidior, angustia oris vteri cernicis & pudendi: alia alcititia; vt morbi omnium generum, quales sunt intemperies obstructioque à tuberculo vel tumore aliquo, & astrictio à pressu vicinarum partium, vt præpinguis abdominis, intestinorum sæcibus duris obsefforum, vesicæ, à calculo, & lumborum cavitae, hæmorrhoidibus & rhagadibus tum ani, tum pudendi. Fœtus quoque difficilis partus causa est, ob sexum. Si enim fœmina sit, languidior quidem est, & minus crucians, sed tardior, si capite sit grandiori, à natura aut morbo vt ὑδροκεφάλω, contusione: aut nimis paruo, quod vias genitales non satis aperiat reliquo corpori: vt cùm geminus est, aut monstrosus, aut aliena figura obtrusus, aut denique mortuus. Partus quoque difficultas prouenit ex membranarum contumacia, vel fragilitate immodica earundem: quæ ante partum longiori tempore frangantur antea quam exeat infans. Ita fit vt aquæ excidant longè ante fœtum, vnde dolores in exitu maiores. Difficilis partus signa diagnostica in vniuersum ex doloris regione petuntur. Nam ad imum ventrem iliaque & femora expeditum facilemque: ad lumbos, difficilem portendit. Causarum signa, ex parte matris sunt, consuetudo, natura, ætas, habitus, & victus: ex parte fœtus, magnitudo eiusdem percepta, ex ingenti tumore ventris, dolore ad umbilicum, morte quoque eiusdem: cuius signa sunt inferiorum partium vt pectinis pudendique & alui oppressio, venter iuxta pubem frigidus, cervix quoque frigida, stomachi rosio, nausea, vomitio, halitus putridus, lipothymia, oculorum cavitae, faciei pallor, epilepticæ conuulsiones, ventris superioris

rioris & laterum depressio. Prognostica signa sunt, quod omnis partus difficilis foetui matrisque periculosus est: qui extenditur supra quartum diem enecat foetum: item rupto peritoneo herniam, ruptis venis pectoris, hæmoptoë, phthisin, tussim, pupillis dilatatis visum offendit, fissurâ sæpe ab ano ad vuluam diducit: ossa quoque coxigis distrahit. At verò partus foelix esse solet mulieris ætate media, anno constanti, habitu eufarco, moribus integris, & cælo temperato.

Curatio.

Medicatio difficilis partus partim προφυλακτική, partim curatiua est. Illa initio noni mēsis, paucō ante partum tempore vsurpanda est, hæc in ipso partus principio. προφύλαξις igitur constat primum causarum externarum remotione; vt aeris æstuosi frigidique, crapulæ, inediæ, vigiliæ, & grauiorum animi symptomatum. Deinde internarum ablatione; vt debilitatis, per cibos euchymos alimentosos, minime excrementitios, neque astringentes: sed potius emollientes & modicè aperientes: qualia sunt iuscula caponum, veruecum, & vitulorum elixatorum cum foliis maluæ, spinachiorum, borraginis, petroselini, fœniculi, nasturcij, erucæ: & quæ duritiem ligamentorum foetus emolliunt partiumque genitalium angustiam laxant: vt sunt coitus multiplicati, motus corporis sensim augendi, balnea, infessus & linimenta lumbis, peccini & pudendo adnota, relictis emplastris astringentibus. ℥ foliorum maluæ, bis maluæ, cum radice, violarū, parietariæ, acanthi, mercurialis, artemis. nepetæ, sabinæ an. m. ij.

feminis lini quart. j. caricarū paria x. baccarū lauri & juniperi, flor. chamæmel. melilot. & lauēdulæ. an. p. ij. decoquātur in aqua dulci &c. pro infessu & balneo in quo tepido moretur per horam mane & vesperi per octo dies. fatus supplebit balneū infessumque.

℞. olei irini amygdal. dulc. pinguedinis recentis gallinæ, & butyri non saliti vel loti an. quart. β. medullæ cruris vituli vel veruecis, & spermatis ceti an. ʒj. radicis iridis florentiæ ʒ β. radicis aristolochiæ rotūdæ, myrrhæ, sabinæ & cinnamoni an. ʒj. β. croci, & feminis lauendulæ an. ʒj. cum cera citrina fiat vnguentum applicandum post balneum, deterfo iam corpore.

Hæc remedia producuntur ad quartum diem ante partum: quo tempore pulcres aperientes & electaria vsurpentur.

℞. cinnamoni interioris & radicis pucedani an. ʒj. β. sabinæ ʒj. fiat pulvis, detur scrupulus vnus cū vitello oui, superbibendo hyberno tempore parum vini hippocratici, æstate verò albi, idque post exitum ex balneo, & vñctionem.

℞. cinnamoni electi ʒj β. corr. cass. fistul. ʒ iiij myrrhæ & sabinæ an. ʒj. conferuæ radicis eryngij ʒij. excipiantur saccharo aqua artemisiæ dissoluto, fiantque tabellæ inauratæ ponderis ʒ. iij.

℞. myrrhæ & castorei an. ʒj β. cinnam. ʒj. styracis & sabinæ an. ʒj β. omnium pulvis melle excipendus, vt fiat opiata, de qua capiat ʒ. iij. vt supra.

Eadem facultate clysteres fingendi sunt ad molliendas fæces duriores, laxandaque foetus vincula, & vteri ceruicem: sed pauca quantitate. Glandium ob acrimoniam & irritationem retētricis vteri facultatis vsus est suspectus. Tutiora sunt brodia præpinguia

pinguia, ex decocto summitatum maluz, violariz, mercurialis, betz & caricarum cum oleo dulci multo, aut butyro. Tuta quoque inanna granata, & medulla cassiæ. Morborum denique quorundam curatio præponēda est: siue cōmuniū quales sunt febres acutæ aut diurnæ alui fluoris, & hæmorrhagiæ: siue propriorū vt tumorū rhagadū hæmorrhoidū.

Curatio vniuersalis.

P Artus difficilis curatio necessaria est in dolorum insultu: suntque eius ministri apud Platonē in Theeteto necessarij duo, medicus & obstetrix. Hæc perita sit artis huius, multipara, cōstans & prudens: quæ exemplo suo parturientem firmet, omniaque circa partum naturæ imitatione moliat: tum in fœtu leniter ducendo, capite primo: tum in genitalibus laxandis manu blanda, resectis vnguibus, & oleo pinguiue aliquo lubricata: tum in imitandis parturientis laboribus, & conatibus tempestiuis atque interpolatis. Dum instat exitui fœtus in strato ante focum parato in conclauī vel cubiculo bene clauso, mater decumbat, & redeuntes atque repetentes ex interuallis matricis & fœtus conatus & quietē emuletur, ipsiq; interuallis quiescat. Medicus diætā & pharmaciam instituat: illam ex aere temperato, cibis alimentosis & euechymis, id est qui multum pauca mole & celeriter nutriant, qualia sunt iuscula, consummata expressaque caponum, carniū vitulinarum & veruecinarum: expressa iura earundem assatarum, succique concreti, vinum generosum aut etiam hippocraticum, vitelli ouorum. Licebit etiam odora-
menta permiscere cibis, lipothymiz reuocandæ

causa, vt confectionē alkerimes, diamosch. dulce, ambram, moschum (neque enim metus est imminente partu vteri sursum ab odoribus retrahendi) aquæ quoque auræ dictæ: vt imperialis, cælestis, & aqua vini, per se vtilissime vsurpentur. Præscribantur etiam intestinorum vacuationes per balanos acriores, vt irritetur excretrix vteri facultas. Conficit denique dicta ex motibus violentis, donec aperiat sponte vterus: tunc enim quies tutior est vel in lecto vel in sella. Pharmaciā quoque instituat medicus primum quidem generalem, quæ partum iuuat à quacunque causā impeditum & difficilem per medicamenta interna externaque, tum manifestā, tum occulta proprietate, partum accelerantia: Huius generis sunt lapis aquilæ alligatus femori, polypodium quercinum sub vtraque planta pedis collocatum, suffitus ex oculo piscis saliti, aut ex vngula equina aut asinina, cor è gallina adhuc viuente extractum, & dextræ coræ alligatum. Item radix ciclamini, aristolochiæ, spoliū serpentis, & corrigia ex pelle cerui parturienti instar cinguli applicata: anisum tostum odoratum, magnes manibus tractatus: Incantamenta etiam quædam obstertricibus: non solum medicamenta Plato permittit in Theeteto. Manifesta verò sunt aut externa aut interna, valde aperientia & tenuis substantiæ. Internorum exempla hæc sunt.

℞. cinnamomi electi & corticis cassiæ, fistul. an. ℥ iij. croci ℥ j. fiat puluis, capiat ʒ j. cum vino albo aut aqua artemisiæ.

℞. cassiæ fistularis, radicis dictamni & cinnamomi an. ʒ j. fiat puluis, capiat vt supra: addito boracis ℥ j. fit validior puluis: sicuti per se potatus ad ℥ ss. cum

cum vino albo. In maiori difficultate conueniunt hæc. ℞. fabinæ, assæ fœtidæ, ammoniaci an. ʒj. croci cinnamomi castorei an. ʒß. cū aqua artem. fiant pil. capiat ʒj. vel ℞. foliorū rutæ siccorū ʒij. assæ fœtidæ & myrrhæ an. ʒj. fiat puluis capiat ʒj. cum decocti fabinæ ʒij. vel iij. Externa sunt aut adinouenda aut immittenda: in horum numero sunt pessaria, quædam uehementiora, quædam leuiora. Violentioris hæc exēpli causa erit formula, ℞. alum. myrrhæ an. ʒ. j. ellebori nigri ʒß. fiat puluis, & cū vino pessariū ex cotone & serico rubro. vel ℞. ellebor. nigri seu staphidi sagriæ aristoloch. rotūdæ, pulpæ colocynthid. ammoniaci an. ʒj. fiat puluis & cū melle pessarium. Leuiora sunt ut quod à Galeno describitur 6. καὶ τόνος ex melle myrrha & decocto lupinorum: tale quoq; hoc sit, ℞. croci & succi porri q̄rt. ʒß. fiat pasta. Item ℞. radicis raphani ʒß. folior. mercurialis m. j. cassiæ ʒj. succi fabin. ʒj. croci. ʒj. contundantur simul omnia, & cū linteolo fiat pessarium. Tales deniq; asseruantur trochisci de myrrha, quorum ʒij dantur ex aqua artemisiæ. Suffitus quoq; excipiantur ex ligno aloes, cinnam. ladano styrace & ex trochiscis ex gallia & alipta muschata: adinouentur lumbis, pectini, inguinibus & perineo fetus ex decocto foliorum artem. nepetæ, valerian. pulegij vtriusq; , graciolæ, satureiæ & similinm. Item ex eadem cocta tusaque materia, fiunt cataplasmata, sicuti etiam linimenta, quale est ex pœoniæ semine puluerato cum oleo chamæmelino. fortius est sequens.

℞. succi rutæ ʒij. fellis rauri ʒj. medull. colocynth. ʒij. cinnam. ʒiiij. olei irini quant. s. misce, fiat linimentum. Huc spectat clamor ingēs, iterputatio Hippocrati aph. 35. libri 5. commota puluere

piperis albi aut ellebori albi in nares immisso, & vomitus penna in fauces immissa concitatus.

Curatio particularis.

Curatio particularis singulas difficilis partus causas internas ut matris uterique & fœtus propriis remediis excindit. Matris igitur debilitatem vel ex natura vel ex ætate vel ex casu aliquo; roborat prædicto victu sæpe parceque adhibito: timiditatem confirmat exemplis mulierum quæ fortiter & salubriter eisdem labores exantlarunt. Sicciorem intemperiem vel insitam vel adventitiam ex ætate, sicuti angustiam uteri ab eadem causa, fœtusque ligamentorum duritiem contumacem emollientibus emendat fotibus, & oleis ac vnguentis expositis in *προφυλάξερ*. Huiusmodi etiam sunt blandæ pudendi, foris intusque obstetricum tractationes manibus vinctis ut ante dictum est. At angustiam eiusdem ortam ab abdominis obesitate corrigit, corporis figura dilatandis hisce partibus idonea: sicuti ex intestinorum compressione, & extractione fœcum per suppositoria aciora eandem ortam tollit. Angustię autem naturalis hæc incommoda declinantur, fugâ nuptiarum, aut conceptus declinatione: tum per victum sterilitati aptum: tum per emissionem seminis in diverso tempore: tum, post coitum, per præcipationem genituræ, ante septimum diem: aliis enim temporibus ab ea cavere debet medicus probus Hippocratis consilio, maximè per medicamenta vehementia: quæ matri sicuti & fœtui sunt funesta. Fœtum grandioreni post relaxationem partium uteri, dissolutionem ligamentorum fœtus, irritationem expultricis uteri facul-

ri facultatis, per remedia interna externaque paulo ante exposita, obstetricū manibus vnctis duci mol-
liter oportet, quæ sita prius corporis apta ad dilarā-
das partes figura. Quod si nihilominus resistet: etiā
num viuis prænuntiato mortis euentu fœtus fœ-
teque sinendus est, nisi sectione cæsarea extractionē
eius ex vtero matris viuæ tentare lubeat. Huic ta-
mē repugnare omnino videtur tū phlegmones ma-
gnæ periculum ex vulnere ingenti, venarum & arte-
riarum vteri plurimo sanguine turgētium: tū quòd
cicatrix relictā, vulnere sanato nouæ prolis auctio-
nem intercipit, dilatatione vteri prohibita: tum de-
nique quia viriū matris infirmitas ex labore & co-
nato pariendi dolori nouo, & hæmorrhagiæ cessu-
ra est. Sin tamē mortuus sit, neq; prædictis remediis
duci possit: ad ferrum & chirurgiam tandem decur-
rendum est, prius obuelato capite matris linteolis:
ne tam horrendo huius carnificinæ spectaculo exa-
nimetur, authore Hipp. lib. de fœtus sectione, quam
perdocuit accurate Paræus chirurgus libro de gene-
ratione hominis. Prius tamen & ante chirurgiam
eductio ea tentanda est linteolis siue fasciis toti
corpori circumductis, aut tenaculis obstetricum
lindeolo obductis. Hæc tamen chirurgia non
suscipiatur debilibus matris viribus, deprehenden-
dis ex pulsu paruo raroque, expiratione simili-
ter parua raroque, facie cadauerosā, sudoribus fri-
gidis, extremitatibus gelidis: sed tunc vnicum
mortis prognosticum medico satis sit. Denique si
plures sint fœtus duo, vel tres, vel quatuor, si-
gillatim extrahantur, nulla interposita mora: ne
expultrix facultas matris vterique primo conatu
fracta, omnino langueat post quietem in secundo

aut tertio. Præpostera etiam figura fœtus exituri obstetricis aut chirurgi manibus reformatur, vt ante expositum est.

Retentio lochiorum.

Quarta & vltima partus symptomatici species est, cum fit sine consuetis vacuationibus, cuiusmodi sunt secundarum, excrementorū fœtus, & lochiorum. Secundæ tres sunt membranæ fœtum in vtero obuoluentes : prima & extima omnium amplissima totam vteri & cornuum eius superficiē totumque fœtum complectitur : membranis constat duabus, inter quas venæ arteriæque ab acetabulis vteri ortę ad fœtum nutriendum, deducuntur. Nascitur autem ex virili semine crasso & viscoso circa superficiem siccescente, à calore infuso, tum feminis tum vteri: vt dictum est. Chorion vocatur vel per *ὁ μαιρὸν*, quod arculi & coronæ instar totum fœtum circumdet : aut quod in eo tanquam in choro quodam vasa sint disposita : vel per (ω) quod illa sedes sit fœtus, vel quod cū fœtu *χαρπὴ* id est procedit, alio nomine vocatur *δευτέραιον* id est secunda, vel quod à fœtu secunda formetur : vel quod natum infantem sequatur : vel denique tanquam fascis altera mulierem grauet, Gallis *arrierefaix*. Ita autē antonomastice designatur peculiariter hæc membrana ob maiorem ipsius amplitudinem. Alioqui enim hoc nomen etiā cōmune est toti fœtus inuolucro, tribus membranis cōstātī, alio nomine *ὕσπερ* vocatur: quod tamē ad vterū etiā pertinet. Sic apud latinos lochij mēbranę istę nominantur, quo etiā nomine vterus auditur. Secundā mēbrana è seroso fœminæ semine imbecillo paucq; nata infantē fasciæ modo à mucronata cartilagine ad ilia tantū cingit: tū ab vno vteri cornu

eorū ad alterū porrigitur: tenuis enim ea est infirma angusta cauaque, ex duplici membrana cōtexta: hinc ἀλλαντοειδής dicta quod intestinis similis sit ex quibus sarcinina fieri consueuerunt: non quod carnibus concisis plena sit, quin potius fere vacua: nisi cū urinā fœtus repletur, ab οὐρά'χω delata. Tertia est fœtui proxima: quem totum inuoluit ἀμνίον dicta ob mollitiē, cū sit tenuis, sed valde dēsa fortisq; ne rumpatur fœtus pondere eiusq; motibus & aquarū quas cōtinet copia, quasi sudorē mitē omnino & innoxiiū, ne violet fœtus cutē: cōcrescit autem fortasse aqua hæc è vaporibus frigide membranæ contactu refrigeratis.

De partu naturali, & non naturali.

Est autē ordohic in edēdo partu naturalis: primū infans inuertitur, crebrisque & magnis motibus interiores mēbranas ἀμνίον, & allantoidem abrūpit: ac tādē χάριον ipsum, quē excluso iam fœtu proci-
dunt: aliquando tamen fœtus prodit amnio membrana inuolutus omine quidem, nōn felicitatis aliquius, sed salubritatis futuræ: ea tamen aliquando partum remoratur, ideoque aperienda est prudenter ab obstetrice & sine vlla fœtus noxa. Non naturalis igitur partus cēsendus est: quoties excluso fœtu mēbrana restāt. Symptomā est excreticis facultatis, cuius symptomata comitantia sunt suffocatio hysterica, nausea, vomitio, singultus, lipothymia, syncope ex fœtidis vaporibus. Causæ sunt infirmitas matris excludēdo fœtui lassatæ, vel viarum genitaliū interceptio & angustia à tumore orto ob difficilē partū, aut ex frigore imprudenter admissio: vel quia utero adhuc inherēt venarum & arteriarum nexibus: quod fere fit in abortiuo partu: vel denique quia in

vtero arido, nimisque sicco, post effusas omnes cum foetu aquas, cunctantur.

Curatio.

Communes curationis scopi tres sunt, vt mater roboretur, vt viæ genitaliū laxetur & vincula foetus dissoluātur: deniq; vt expultrix facultas sollicitetur. Robur ex victu exposito querēdū est, laxitas partium, & dissolutio vinculorum foetus cōparanda est è malacticis internis externisque, & præterea ex mixtis aperientibus ante expositis: Sollicitanda quoque expultrix est topicis immittendis, ad-mouendis, sumendisque, tum etiā olfaciendis antea expositis. His omnib. sternutatio, vomit⁹, singultus, vociferatio iūgūtur. At victis remediis his, obstetricū opera implorāda est vel chirurgorum: qui molli tractu vmbilicalium vasorum membranas diducant, aut si hoc modo non licet, manibus vnctis per pudendum & ceruicem, in locos muliebres illatis molliter easdem apprehendant: aut hac & illac blandè concutiant, si forte cotyledonibus adhuc hæreant: sed sine violentiā, ne vase aliquo rupto hæmorrhagia funesta sequatur, quæ phlegmonē abscessum & gnagrenam gignat: néve ligamēto vteri neruoso aliquo diuulso vteri procidentia aut conuulsio fiat. Monenda quoque obstetrix est, vel chirurgus: vt reuulsis secundis sanguineos tosumbos, diligenter abstergat, ne eorum putredinem suffocatio & syncope sequantur. Quod si ne hac quidem arte chirurgica foetus ex vtero extorqueri possit: tum ad putrefacientes iniectiones decurrendum est: vt ex vnguento basiliconis cum oleo lillorum dissoluti: vt corruptæ secundæ frustatim per vuluam tandem excludantur.

De

De excrementis fœtus.

EXcrementa primæ coctionis nulla sunt, in fœtu, quia eius ventriculus os & intestina sunt otiosa, neque chylosin ullam inoliuntur, cum sanguine materno excrementis vacuo nutriatur. Secundæ coctionis excrementa duo sunt: vnum crassum (sanies cruenta) id est crassus & sæculentus sanguis, qui residuus est à coctione sanguinis materni, in hepate: & per venas mesaraicas in intestina, indeque in choriæ membranæ spatium refunditur: alterum est tenue, id est vrina per porum vrinarium (*ὀυρηχον* vocant) seposita in cavitatem allantoidis membranæ, ne cutem fœtus & vteri tunicam rodendo violaret: & irritata facultate expultrice immaturum partum præcipitaret. Tertiæ coctionis excrementa duo etiam sunt: crassum, quod sordium nomine designatur: & tenue, sudor nempe ex vaporibus frigide membranæ contactu cōcretis. Vtrumque in amnio conclusum fœtui pro mollissima culcitra est. Est enim mitissimum, purgata scilicet omnibiletum per vrinæ, tū per propriam vesiculā tam in corpore matris, quā fœtus ipsius. Omnia hæc excrementa in vteri propria sede coaceruantur ad instantis vsque partus tempus: neque enim ante foras profluere dehiscence vteri orificio sine abortus discrimine possent: dum eruptione sua, genitales partes emolliendo, humectando & lubricando laxat, partum procliuem efficiunt: siquidem paulo post fœtus emittatur, alias grauis partus esse solet, nisi partes illæ, naturæ imitatione, pinguibus oleis intus forisque madeant & perungantur.

De excrementis puerperarum.

EXcrementa verè muliebria sunt, lochia purgamentum

ta dicta, quæ post partû & secûdas foetusq; excremē-
ta euacuātur. Sūt autē vera *καταμνία*, nili quod post
partû, illa verò ante partû profiliant: materia enim
eorû est reliquû sanguinis illius mēstrui, qui nō solû
initio cōcepti seminis & ante absolutâ foetus con-
formationē in corpore matris retentus est: sed qui
toto gēstationis tēpore superfuit nutritioni foetus
eiusdē. Eorum vacuatio varia est, pro sanguinis mē-
strui abundātia, sexûsq; foetuum discrimine: nam in
mulieribus foeminam enixis, ad duo & quadraginta
dies pertingit perfectissima: vacat tamē periculo, si
ad viginti quinq; dies prouecta sit. In puerperis ma-
rē enixis, dies triginta implet perfectissima: perfe-
cta tamē est vigesimo die: foeminā enim marēmq;
dissimilib. istis dierû spatiis cōformauit ob dissimi-
lē vtriusq; ex semine tēperiē, maris calidiorem sic-
ciorēmq;, foeminę frigidiorē & humidiorē. Ob hāc
etiā temperiei dissimilitudinē foemina minus in v-
tero, mas plus alimēti cōficit. Variat etiā lochiorum
abundātia, ob ætatem puerperarû. Iuuenes enim in-
fra 22. annû parcius minûsq; repurgantur, quod mi-
nus illis sanguinis supersit, vt quē in augmentû pro-
priorum corporû absumāt. Seniores vero copiosē
magis & diutius, vt potē quibus nulla sāguinis pars
accretionē corporis proprii cōsumpta est. Variat de-
niq; ex natua vel accidentali causa singularû puer-
perarû. Illa duplex est, vna ex genere, altera ex natu-
ra. Illa nascitur, si generis & familiæ illius cēterę mu-
lieres ita purgari parce vel abundāter cōsueuerint.
Hoc Hippocrates vocat vterinû, siue ex vtero mā-
tris allatum, quasi hæreditarium, siue ex vteri vitio-
sa quadam cōformatione, proueniens: vterus enim
ficcior, frigidior, densior, & angustiores venas ha-
bens sanguinis parû continet, redditq; Vt secūdum

naturam spectatur si à prima eruptione lochiorum, in primo partu suo vsque ad postremum vltimūq; partum, pariat semper multitudine vel paucitate eadem perseverante. Causa aduētitia est vel egritudo aliqua: qualis est exposita cap. de suppressione & redundantia mensiū: aut vitiosus prægressus delicatior, vel ærumnosus. Vacuationis quantitas initio quidē sit hemina Atticæ vnius, quæ pendet ℥viiiij & β. quæ purgationis quātitas sensim minuatur, donec omnino desinat. Sanguinis species in bene valente similis sit sanguini vitimæ, quæ non nisi eximia & saluberrima deligitur, hoc est sit sincerus & ruber, nec vlla in re vitiosus, non citò nimis, aut serò concrescens: illud enim siccioris, hoc humidioris signū est. At in intēperata puerpera sanguis parcior & vitiosus nec cito concrescens exit. Porro huius vacuationis sicuti & mensiū symptomata sūt suppressio, deprauatio, & redūdantia & diminutio. Suppressionis causę euidētes sunt refrigeratio, subitus mœror, metus & ira. Internę sūt vteri peruersio, orificij interioris obturatio, vel à grumo sanguinis cōcreti, vel ab inflāmatione, aut tumore aliquo. Redūdantia autē fit in puerperis ruptis, & nimis dehiscentibus acerabulis venarū vteri: vel à laborioso nimis partu, vel abortu. Illinc morbi acuti duplices: alij particulares, vt phlegmone totius vteri, pleuritis, peripneumonia, phrenitis, &c. alij vniuersales vt febris cōtinua. his aut efficacissimè medetur promptissima & copiosissima phlebotomia in venis poplitis & malleoli, primis saltē puerperij dieb. nā mediis aut vltimis, quib. iā finita lochiorū vacuatio est, phlebotomia parcior conuenit. In particularib. cōtra vt phrenitide, &c. venæ cubiti aperiendæ sūt, (missa saphena) deriuationis simul

& reuulsionis gratia. Purgatio quoque omittenda non est, quæ cacochymiam educat putredinis materiam. Redundantiæ lochiorum eadem methodus est curatiua, atque mensium immoderatorum, ante exposita capite proprio, atque per reuellentia primum remedia, qualia sunt, deligationes & frictiones dolorificæ brachiorum, cucurbitulæ magnæ, cum flamma multa, siccæ sub mammis appositæ: deinde per phlebotomiam si opus sit in cubito: postremo per topica astringentia & refrigerantia, quibus adde victum similem. Vide cap. de redundantia mensium.

De affectibus puerperarum.

Puerperas multi affectus exercent, ab utero & in utero. Hi sunt, rhagades pudendi, exulceratio cervicis, dilaniatio perinei, tormina, tumor, amplitudo, strangulatus. Illi sunt rugæ ventris vlcera, & particulares phlegmonæ abscessusque, ut laterum, pulmonum, faucium, cerebri, febres acutę primarię, & mammarum tumores.

Dieta puerperarum.

Horum omnium curationi præponenda est puerperarum diætā conueniens: cuius tres sunt scopi: Instantio virium, lassitudinis leuatio, & præcautio torminum, febrium, lactis vberioris, & aliorum affectuum. Victus quidem tenuissimus esse debet ad septimum vsque diem, sed creber: tum ob virium, ex copiosa vacuatione magnoque dolore, debilitatem: tum ob periculum declinandum febris, lactis &c. In primis tamen sit cibus valde alimentosus, & euchymus: qui prompte vires satiscen-
tes

res colligat. Tale est expressum capi, iusculum & consummatum eiusdem cum croco & puluere ducis: talis gelatina & panis tostus vino aromatite tinctus. Tales vitelli ouorum duorum &c. Deinceps vino abstinendum est & alimentosis illis cibis quos mulierum ignara sedulitas ex caseo & concisis carnibus concinnare solet: idque ex consilio Hippocratis & Galeni 2. de diæta in acutis. Vtuntur iusculis pullorum tantum, aut carnum veruecinarum, paneque in eis tincto. Lassitudo vteri, totius ventris, & lumborum aptissime lenitur, secundinis adhuc calentibus ab vtero, citissimè impostitis hypogastrio, & circiter horam vnā ibidem relictis: deinde iisdem sublati mox inducenda est lumbis, præsertim toti ventri, ad pubē vsque pellis veruecis aut arietis recens iugulati, quæ per quinque aut sex horas ibidem sinatur, coque tempore puerpera indulgeat quieti & somno, clausis diligenter cubilis, & fenestris & ianuis, ne quis aer subeat: tum demum deterso sudore vel madore, & pelle retracta, rugarum ventris prohibitioni studeat medicus. Hic affectus præcauebitur tum fuga frigoris clauso diligenter conclauis, vt dictum est, & decussatis femoribus, ne frigidior aura prorepat in vuluā: vnde ipsa refrigeret & intumescat, & acetabula occludantur, lochiaque supprimantur: vnde phlegmonæ, febres, tormina, aliaq. funesta symptomata oriuntur. Præcauetur etiam quiete corporis & animi, ne motus violentus & intemptius vterū vel præcipitet vel peruertat, laxioribus adhuc vinculis: aut ne metus mœrorque lochia cohibeat: aut gaudium effusū exaggeret. Denique hypogastrii constrictione per fasciam quatuor digitos latam: quæ tum sanguinem

cuiusquegrumos ex vteri sinu totaque eius substantia exprimat:tum ab eodem coangustato aerem frigidum arceat. Inicienda autem est fascia confestim remota pelle veruecina.

Rugarum ventris puerperarum curatio.

R Vgæ ventris puerperarum delentur medicamentis malaëticis & modicè astringentibus hypogastrio impositis, bis quotidie, post remotam pellem veruecinam: idque toto decubitus & puerperij tempore:Eorum exempla hæc sunt.

℥ spermatis ceti ℥ ij olei amygdal. dulcium & hyperic. an. ℥ j β seui hircini ℥ j fiat vnguentum.

℥ olei hyperic. aneth. & chamæmel. ana ℥ j olei myrtini ℥ j olei mastich. ℥ j β spermatis ceti & seui renum hirci ℥ β axung. ℥ j croci ℥ j mosch. ℥ β ceræ citrinæ quantum sufficit, fiat vnguentum. Præstantissimum est sequens.

℥ limacum rubr. ℥ j florum anthos ℥ viij concisa omnia coniiciantur in vas fictile plumbo oblitum: quod fideliter obturatum, demersumque in finum equinum sinatur ibidem per quadraginta dies: deinde totum id exprimatur, expressoque liquore vngatur quotidie bis hypogastrium, vt dictum est, cum regione inguinum: post vñctionem tegenda est continenter regio eadem tela dicta (galderina) quæ ligetur diligenter cum fasciis lineis. Telæ apparatus hic est.

℥ ceræ nouæ ℥ iiij spermatis ceti ℥ ij terebinth. Venetæ aqua citranguli lotæ ℥ j β olei hyperic. & amygd. dulcium an. ℥ j olei mastich. & nardini ana ℥ β axungie cerui ℥ j liquefiant omnia simul: deinde liquefactis atq; ab igne remotis statim immerge telam

lā enanabinā, ad vētris magnitudinē quā circūferat puerpera toto (vt dictum est) decubitus tempore.

Dilacerationis perineæ curatio.

Dilaceratur perineum aut grādiōis fœtus partu difficili, aut mortui extractione violenta, quæ podicis & vuluę foramina aliquando cōiungit. Curatur futura & medicamentis agglutinantibus impositis, vt bolo, terra sigillata, sanguine draconis cum albumine oui, oleo rosaceo in forma m vnguēti super stupas cannabinas: ne quid tamen subeat ceruicem, ne vacuatio lochiorum impediatur. Curatio hæc pudendum coangustat inducta cicatrice & alterius partus facilitatem aufert.

Rhagadum pudendi curatio.

Rhagades & fissuræ extremitatū neruearum in labiis, papillis, ano & pudendo, sæpe oriuntur: à causa distendēte & diuellēte; vt in puerperis à partu difficili: vel à causa supra modū exsiccante: veluti vento boreali, aut æstiuo, vel ab expiratione viscerū calidiorum: aut transfluxione humorum acriū, & salforū. Curationis scop⁹ triplex est, lenitio doloris, mollitio sicce intēperiei, & agglutinatio laborū dissidentiū. Formula talis est in primū & secundū diē.

℞ album. ouor. ij olei hyperic. & myrtini an. ʒj s misceātur & cum linteolis & stupis applicētur rimis pudendi externis, intacta ceruice. Profuerit tamē decoctō sequenti fouere. ℞ vini rubri lbj aquę lbj s rosar. rubr. & florū hyperic. an. p. ij fiat decoctio & fotus bis in die, deinde ad quintum vsque diem decubit⁹, sequentibus fotibus & vnguentis erit locus.

℞ vini albi lbj. aquę lbj s rosar. rub. p. ij acinorū vuæ, corticis malorum granatorum, myrrhæ & aluminis

an. ʒ ij. decoquantur, & fiat fofus.

℞. olei hyperic. ʒ ij. ſpermatis ceti ʒ ſſ. cum cera alba fiat vnguentum.

De puerperarum torminibus.

TOrminum in puerperis proxima cauſa eſt, ſolutio vnitatis venarum vteri à vehementi earum diſtentione præ copia & craſſitie etiam menſtrualis materiæ, quæ toto geſtationis ſpatio collecta eſt, & ab vniuerſo corpore adiuuante expultrice facultate, in vterum inanem & vacuum à fœtu irruentis. Huius etiam pars calore partis ſoluitur in flatum diſtendentem. Frequens etiam eorundem cauſa eſt ſanguis in vteri cavitare retentus, liquidus cōcretusque, iamque putreſcens & vapoſus, quem laſſata vteri expultrix facultas ob priorum laborum vehementiâ non aggreditur. Cauſæ hæ impugnantur ſanguinis concreti extractione per manus obſtetricis: Prior illa curatur internis medicamentis externisque, calefacientibus quidem omnibus: ſed his laxantibus etiam & digerentibus: illis aperientibus, attenuantibus, & flatum conſumentibus. Illorum exempla ſunt. ℞. ſem. aniſi, ligni aloes, & cinnam. an. ʒ ij. nucis moſchat. cornu ceruini vſti an. ʒ ſſ. nucleorum daſtylor. vel amygdal. ʒj. fiat puluis, capiat ʒj. cum vino albo vel cum aqua artemiſ. ℞. rad. conſolidæ maioris ʒ ij. nucleorum perſicor. & nucis moſchat. an. ʒj. carabe ʒ ſſ. ambregriſeę grana iiij. fiat puluis: detur vt ſupra. Externorum hypogaſtrio apponendorum exempla ſunt, ℞. vitell. ouor. ſub prunis coctorum n. xij. ſeminis lini & ſcænugræc. an. ʒ ſſ. florū chamæmeli, meliloti & aneti an. ʒ ij. coquatur in oleo chamæmelino, donec reducantur ad formā cataplaſmatis: quod

quod applicetur calidè ventri, semper reiterando antequam refrigescat. vel ꝑ. chamæmel. meliloti aneti & anthos an. ꝑ. j. sem. anisi lini scœnogr. cumini an. ꝑ. j. decoquantur in iusta portione vini & aquæ fiatq; cataplasma. Commoda quoq; hypogastrij totius per fascias deligatio torminibus medetur, dum ex vteri venis compressis lochia exprimit.

Curatio tumoris vteri.

TVinet puerperarum vterus flatuum copia, vel ibidem genitorum (ex restitantium lochiorū in flatum versione à calore loci) vel à temeraria vteri refrigeratione auræq; admissione. Curatur emolli-
tione & discussione per externa remedia, qualia sunt cataplasmata ante exposita, qualia oleū rutaceum, laurinum, costinū, philosophicum petroleum, mixta cum oleo liliorū & chamæmelino: qualis denique sacculus lineus, avenæ, milij, salis, surfuris, & cumini in sartagine frisorum, paribus portionibus repletus, & calens superadmotus. Pulveres præscripti idonei quoq; sunt, sicuti & clysteres discutiētes vocati, aut etiam pessaria & iniectiones vterinæ.

Curatio motuum vteri.

MOuetur puerperarum vterus, sursum deorsū (ascensus & descensus dicitur) & foras (præcipitatio dicitur) & ad latera, vnde peruersio eius & obliquitas nascitur. Motus huius causa naturalis est, non animalis: interdum quidem facultas attractrix, quæ rem gratam persequitur: interdum vt in puerperis expultrix, dū delitescentē intus saniē, aut corruptum sanguinē fugitans huc illuc insanis motibus per ventrē torquetur. Altera causa incitans interna,

est sanies vel corruptela sanguinis retenti. Sic causa sine qua nō est laxitas appendicū vteri orta ex gestatione grādiōris fœtus: vel copiosi sāguinis perfusione, vt pituitosi. Conuelluntur tamen etiam ab inflammatione iidem appendices cum dolore implacabili & furore vterino: huius casus vnicū & singulare remedium est galbanum hypogastrio impositum: in cuius medio moschi momentum vel galliæ admixtum sit: quod tantisper sinatur, donec vterus sese exonerarit. Haftenus de affectibus vteri à partu.

De affectibus mammarum.

EX affectibus ab vtero præter febres acutas & phlegmones diuersarum partium, quidam etiā mammas priuatim exercent: vt redundantia lactis, & eiusdem corruptio per caseationem, grumefactionem, suppurationem, putrefactionem, maligna vlcera, menstrui abundantia, ex qua phlegmone, abscessus, vlcus, scirrhus & cancer, quorum omniū curationi anatome mammarum præponenda est.

Sunt igitur mammx corporis partes in vtroque pectoris latere ob vicini cordis calorem sitæ, glandulosæ & venosæ, semicirculares, vt sint sanguinis & lactis capaciores: lactis procreatrices & conseruatrices, substantia quidem glandulosa, pro sexus atq; ætatis discrimine, admodum varia. viris quidē fere nulla & puellis pusillis: vtriusq; sanguine ad propriā nutritionem suppetente tantum: at iuueniculis & nubilibus compactior & duriuscula ex sanguine menstruo sursum regurgitante: vetulis flaccidæ, deficiente sanguine ob caloris inopiam. In mammarū medio papilla est, quasi capitulum quoddam: ex quo lac extrahitur: substantia penis simillima, foris scilicet cu-

cet cu-

cet cute admodum sensili quodammodo neruea, intus spōgiosa: vnde erigitur, inflatur, laxaturq; accedente, vel recedente spiritu & sanguine, vt per frictionem & mulctum. Cōtinet venarum furculos per glādulosam substantiam sparfarum: è quibus lac effūditur. Cingitur ambiturq; circulo quodam nigricante (φῶς vocant græci) Quia autem mammæ lactis gignēdi & continendi instrumenta sunt, cuius materiā à sanguine menstruo suscipiunt, idcirco plures ramos à vena caua descendente accipiunt: tum internam brachij quæ sub axilla fertur: tum externam tam quæ super humeros repit, quam quæ ex iugulo summoque sterno in pectus descendit: quarū aliæ in mammas absumentur: aliæ in musculos rectos abdominis delapsæ furculis aliquot suis paulo supra vmbilicum occurrunt totidem fureulis venarū hypogastrij, vt quibusdā anatomicis videtur, ex eodē concursu vtriusque speciei venarum, vtriusq; partis sympathiā statuentibus, nec non materiarū mutuā trāsmissionē: de qua antea plura disseruimus: Inde q; cōsensus oritur mutuus maximarum & vteri, atque materiarum hinc, inde, reciproca trāsmissio. Lactis igitur generādi materia est sanguis mēstruus & rēdūdās: effectrix causa est natiua facultas assimilatrix glandularū, sicut ex sanguine eādē vi testium, qui glandulæ sunt, semen exalbescit elaboratum. Tēpus in puellis non grauidis est pubertatis ætas, sed tamē verum lac non est: in grauidis quando moueri cœpit fœtus: id est tertio mense vbi mas: quarto vbi fœmina geritur. Huius signa sunt Hippocrati libro de natura pueri, mammarum & papillarum extuberantia: sanguis enim nec à fœtu assumptus, ob multitudinem: nec vtero venisque contentus,

magna ex parte regurgitat in mammas, tum necessario: ut in earum vacuitatem recipiatur: tum certa naturæ prouidentia, ut inde puer alatur. Ob istud igitur mammarum & uteri consortium, ex utraque materia sanguinis menstrui & lactis, prædicti affectus puerperarum mammas inuadere solent. Redundantia lactis symptoma est secundi generis, nempe excrementi, tametsi utilis, præter naturam in mammis retenti: quod foetui matrique est noxium, illi quidem, vernis conuulsis vel ob cruditatem crasso replente flatu, vel acri putrique lancinante: huic distentis, inflammatis, & exulceratis mammis. Huius redundantie proxima causa est sanguinis menstrui affluentia, sæpe quidem ex partu; aliquando etiam ex suppressione menses: propter graviditatem: aut aliam causam morbificam; in non gravidis foeminis: in his enim si non in habitum, sanguis exuberans regurgitet, aut alio foras per venas, ut per hæmorrhoidas & nares feratur, in vbera raptus, in speciem lactis vertitur: maxime si mulieres sint natura humida, calida, ætate florenti & victu indulgenti, neque tamen in non gravidis, gravidisque, sicuti nec, biduo aut triduo à partu, in puerperis lac verum est, & utile foetus alimentum: habet enim tunc concretionem quandam & spissitudinem spongiosam: ob quam in recens natis, in speciem casei, facile densatur, unde epilepsiæ, viscerum obstructions, febres, & vomitiones. Vitium hoc lactis, ut ante dictum est, colostrum & colostram latini vocant (Græci proprio nomine carent) & pueros ab eius lactis suctu affectos, colostratos: qui nempe lac matris quæ nuper peperit: aut nutricis prægnantis fuxerint. De hoc dicebat Plinius lib. 2. cap. 41. lac mater-

maternum biduo à partu gustasse mortiferum esse, fœtui scilicet. Hinc denique nutricibus interdicitur coïtus, medicorum consensu: qui aliàs libidinem earum extingueret vtiliter.

Curatio.

HVius redundantiz terapeia, partim *προφυλακτική*, partim curatiua est. Illa constat d'eta primū tenui ad septimū à partu diem tēperata siue aromatis, vino, ouis, carnibus, soloq; pane intincto in iure pullorum aut panatellis, amygdalatis, hordeatis, aqua pro potu, sūma animi & corporis quiete. Arque hic sit victus puerperarum, at in grauidis & non grauidis constet aere vel frigido siccoque, vel potius calido & sicco, lactis substantiam digerēte, & æstate aut autumnō, motu corporis vehemēti, vigiliis, cibis frigidis siccisque, sicuti antea expositum est capite de duritie mammarum. In pręgnatibus alia pręseruationis ratio tota est reuulsoria & percussoria. Reuellentia igitur remedia sunt præter frictiones duras, deligationes arctas, crurum femorumque, atque eorundē & pudendi fots, per lintheola calida sæpe repetita, cucurbitulæ siccz internę femorum regioni, & externę pectinis ad finē rectorum musculorum appositę, & clysteres molles tergentesque & aperientes. Phlebotomię si lochia procedant locus non est: at iisdem parcius procedentibus illius vsus est in poplite & malleolo, in pręgnatibus verò in cubito, ne citetur abortus. Venę inferiores aperiantur in effœtis & non grauidis tum ex cubito si plethora sit, tum ex inferioribus partibus reuellendi causa. Purgatio quoque lenior reuulsionis causa effœtis & pręgnantibus conuenit

pro cacochymix specie admixto astringenti puluere vt rhabarbari & myrobalanorum : sed puerperis nocerent. Alterum *προφυλάξιως* caput est in remedium repellentium vfu positum quæ eligantur leuiora non nimis frigida & adstringentia: tum ne lac sanguinemque antea collectum congelent: tum ne cordi & respirationi nimis refrigerando obfint : sed leuiora frigida aut validiora , aut paucis laxantibus & discutientibus mixta in principio, idque linimenti vel fots vel cataplasmatidis vel cerati specie. Formulæ tales funt.

℞.olei rosae.& myrt.an.℥ iij.aceti rosacei ℥ misce & liniantur mammæ calidè in circuitu ter, quaterue quotidie, & continuo aspergantur puluere myrtillorum.vel,

℞.vnguent.rosac.& cerati santal.an.℥ j β olei rosac.& chamæm.an.℥ ij.fiat vnguentum, applicetur vt supra toto primo die.vel,℞.vnguent. albi ℥ iiij. lauentur cum aceto acri. vel, ℞. argill. forti aceto mixtæ quart.β id est ℥ iiij. vel, ℞. nidum hirundinis in aceto solutum instar vnguenti, vtere his omnibus ad finem diei, atque hæc in circuitu ad astrictiõnem venarum & interceptionem dilatationis sanguinis vsurpentur. Toti verò mammæ ceratum ex cera noua & digerente ob mixtum lac obducetur relicto foramine per quod papilla ad lac fūdēdum se exerat. Quod si fluxionis impetus tum re-percussus videatur,admouebis ceratum sequens reliquo decubitus tempore māmaram magnitudinī æquale.℞.mastich.℥ β boli armen.terræ sigill. irid. flor.an.℥ iij. nucis mosch. seminis erucæ & fœniculi an.℥ ij.olei myrt. & amygdal. dulc.an. ℥ j.β ceræ nouæ quantum sufficit, fiat ceratum.

Reme-

Remedia incrementi.

Contra si tumor calorque & dolor mamarum
 augeatur: primū calor extinguendus, vt ap-
 positis foliis lactucæ, nymphæ, sæpiusque mutatis,
 aut incoctis etiam cōtusisque, vel miscella prædicta
 aquar. rosarū & aceti: Deinde laxatium & digeren-
 tium dosis augenda, modūque repellentium mi-
 nuendus, atque hoc curationis veræ est initium. In
 incremento & statu hæc poterunt vsurpari.

℞. folior. hederæ terrestr. vincæ peruinæ, bursæ
 past. rosar. rubr. & florum chamæm. an. p. j. alumimis
 rochæ ꝑ ꝑ coquantur in oxycrato. Ex hoc decocto
 fiat fots cum linteolis & spongiis ter quaterue
 interdiu, tepide per semihoram singulis vici-
 bus. vel,

℞. aquæ lilior. menth. & chelid. maior. an. quart.
 ꝑ aquæ ros. & plantag. an. ꝑ j. misce & foueatur pars
 supra. Similis est sæx vini aceto diluta instar yn-
 guenti. Similis quoque est cancrorum fluuiatilium
 vstorum cinis cum aceto mixtus. Cataplasmata pa-
 rantur ex decocti præcedentis residentia cōtusa.
 Eodem tempore vtetur etiam puerpera internis ex-
 siccantibus & absorbentibus lac. vt,

℞. agni casti ꝑ j. seminis cumini ꝑ ꝑ croci ꝑ ꝑ co-
 quantur in brodio & capiat ꝑ viij. mane & vesperi.

Efficacior est hic pulvis sequens. ℞. seminis fœ-
 nigræ. ꝑ ꝑ sem. petros. & viticis an. ꝑ j. corall. rubr.
 & cornu cervini vstorum ana ꝑ ꝑ sacchar. pondus
 duplum, fiat pulvis, capiat cochlear vnum mane &
 vesperi cum paucio iusculo. Iam vero in declinatio-
 ne, euanescente scilicet sensim tumore calore
 & dolore digerentibus solis sine repellentium
 mixtione locus esse debet. Exemplo sunt hæc:

℞. decocti foliorum betę, apij & menth. quāt. sufficit, fiat fots. Ex eadē materia cōtusa fiat cataplasma. vel, ℞. decoct. foliorum berulę, cressonum, menthę in vrina & vino albo coctorū quāt. sufficit, fiat fots. Ex residētia fiet cataplasma efficacissimum, vel

℞. folior. salu. apij menthę cerefol. & chelid. an. m. j. cōcisa omnia minutim cōcorporētur in cataplas. quod apponatur ter aut quater quotidie calidē & priori reiecto. vel ℞. farinę fabar. orizę & lentium an. ℥ ss succi chelid. & menth. an. ʒ iij. oxymel. quant. sufficit, fiat cataplasma. Quod si horum remediōrum vsu lactis redundantia dissipari nequeat id ipsum suctu copiose extrahendum est, vel per instrumentum vitreum, vel potius per admotas papillis virgunculas aut mulieres cordatas, quę leuiter & sine dolore exsugant. Suctus tamen ille nusquam nisi repletionē mammarum immodica & mulieribus lactationis doloribus assuetis vsurpandus non est, quod alias dolore aucto & sanguinis fluxione lactis copiam augeat: vt enim vasa spermatica coitu, sic mammarum venę suctu dilatantur. Atque hęc therapeia protinus in fine partus post sex horas: sed remota prius pelle arietina est producenda, ad integram lactis dissipationem in puerperis puerum non alituris, id est ad finem vsque fluxionis lochiorum: sed in aliis lactaturis ad initium tantum declinationis, cum iam materiā repressa in initio, & paulo post breuiter discussa, calor deferbuit & dolor leuatus est, per medicamenta modicē digerētia laxātiaque, quale mulierculę nostrę conficiunt cataplasma.

℞. mellis partes quatuor, butyri recentis vel loti partes ij. succi menth. & betę vel chelid. quant. suff. fiat

fiat cataplasma. Huic simile est ex melle & butyro solo. Sic & vnguentum resumptiuum: sic & folia betæ & acanthi ad ignem tabefacta & imposita.

De caseatione lactis.

M Ammarum tumor è lacte non dissipatus degenerat tumorum aliorum naturalium instar, in scirrhum aut abscessum aut corruptelam & gangrenam. hic scirrhusus mammarum tumor ex lacte aliis grumefactio, aliis caseatio vocatur, ob similitudinem sanguinis extra vasa à frigore, aut lactis à coagulo concreti. Causa materialis est lac præsertim crassum terrenumque, quale est ex reliquiis menstrui sanguinis à fœtu non absumpti, in prægnantibus aliquando, in puerperis semper, in quibus tribus aut quatuor primis à partu diebus coagitur. Causa efficiens tum calida tum frigida est. Cum enim Aristoteli 4. meteor. liquidorum concretio à frigore, sic solidorum à calore existat, lac vtriusque substantiæ serosæ & terrenæ particeps vtriusque concretionis speciei & causæ est obnoxium. Tam intus quàm foris à frigore quidè cogitur apud Gal. 3. de facult. alimentorum cap. de oxygalacte: à calore verò lib 5. de facult. simplic. medicam. cap. 13. vbi diuretica cum coagulo comparat. Est autem coagulum lac diutius retentum in tertio vêtre animalium ruminantium, ibique fermentatum, unde astringens est, propria substantia; igneum, incidens & acre ex alieno calore, sicuti & fermentum ex pasta diutius cõseruata acre euadit ex putredine. Sic etiã in ventriculo hecticorum lacte nutritorum duplicem subire corruptelam lac solet, vnam à calore vt indicat ructus nidorosus, alteram à frigore quod apparet ex ructu acido. V-

trâque medici declinât mixta aqua aut saccharo rosaceo si calor, vel melle si frigus metuatur. Cōcrefcit igitur etiâ lac in māmīs ab vtrâq; intemperie, calida fcilicet & frigida, siue illa māmātū propria fit, siue aſcitiua vel ex aeris exuperâtiua vel medicamentorū appoſitorū, reperiunt: ū aut minus digerentiū vſu. naſcitur autē hic tumor ex variis particulis durioribus. Calidā autē intemperiem demonſtrant, tumor maior, dolor acrior, calor vrens papillas & partes vicinas, denique febris: frigidam teſtantur tumor grauius, minorque frigoris ſenſus in mammis.

Methodus curatiua.

CVrandi huius ſcirrhoſi tumoris ex lacte concreto ſcopus vnus eſt cōmuſſimus, vacuatio materię eius per reſolutionē, terminationis tumorū naturalium ſpeciē optimā & facillimā. Indicationes curatiue multiplices occurrūt: à materia quidē attenuādi, detergēdi, emolliēdi: à cauſis verò efficiētibus, calefaciendi & refrigerādi: vtrâq; indicationes materię, & cauſę efficiētis ſunt permixtę. Cū enim cōcreta ſit lactis materia, quod vi caloris concreuit, illud frigidis: quod vi frigoris, illud calidis diſſoluēdū eſt. Cōcretioni lactis à frigore cōueniūt calida quidem remedia intus foriſque: ſed leuiſſima, ne calidiora deſiccando cōcreti lactis cōtumaciam augeant: aut irritata ſanguinis fluxione materiam eiſdem multiplicent & inflamment. Internorum medicamentorum exempla hæc erunt.

℞. rad. eryng. & ſcēn. an. ʒ i eimarū petroſel. ſcēn. cereſol. & hyſſopi an. m. ſ. ſem. api ʒ j. cicerū rubr. p. j. coquātur, & in colat. ʒ viij. diſſ. ſyrup. de quinq. radicib. & oxymel. ſimpl. an. ʒ j fiat potio detur bis n die. Coagulum leporis aceto ſolutum aut vicum pauco cinnamomo. ad ʒ j ſingulariter

sanguinem & lac concretum dissoluit si potetur ad
 ʒj. Externa verò in hunc modum præscribi poterūt.
 ℞ radicis altheę, lilior. & raphani an. quart. j flor.
 chamæmeli, melilot. an. p. j ficuum paria viij semin.
 cumini & lini an. ʒj s sem. apij ʒ iij coquatur simul
 cum aqua, & hoc decoctum cum spongia tepidum
 vsurpetur mane & vesperi per horam integram. Itē
 ℞ olei lilior. chamęne. & anethini an. ʒ ij misce fiat
 embrochatio post fotū. Deniq; residua decocti
 cōtusa cretaq; miscebitur cū farine scœnugręci ʒ iij.
 croci ʒ ij myrrh. ʒ ss & sapę q. s. vt cataplasma fiat quo
 deinceps pars tegēda est. Cōcretioni lactis à calore
 cōueniunt, si quidē acrior est calor: tū linimentū ex
 mucagine seminis psyllij cum cera alba: tū embro-
 chatio ex aque tbj vini albi ʒ iij aceti ʒ ij. Mitigato
 calore vsurpentur sequentia in primis oxyrrhodinū
 ex olei rosarum & chamæmel. an. ʒ ij aceti rosacei
 ʒ j croci ʒ j myrrhæ ʒ ij. Itē puls ex farine scœnugr.
 tbj olei violac. ʒ iij aceti ros. ʒ ij. Fetus deniq; & ca-
 taplasmata prædicta paulo ante si cum oxycrato pa-
 rētur. Quod si tumor non digeratur, tunc degenera-
 re solet in nouā affectus speciē vt abscessū, scirrū,
 gāgrenā & maligna vlcera: de his curādis cōsulenda
 chirurgia est: solius abscessus curādi indicationes hīc
 apponendæ sunt. Eius autem signa sunt incremētū
 caloris, doloris, ruboris, tumoris, nā à putredine al-
 licitur fluxio sanguinis in superficiem partis: medi-
 camenta autem suppurantia sunt calore mediocri
 & simili tēperamento partis & substantia, empla-
 strica.

Hęc cōposita prostāt in officinis, vnguētū resūp-
 tiuū Agrippę, basilicū, emplastrū diachylō vtrum-
 que, & de mucilaginibus. Simplicia sunt, aqua tepida

deinde partib⁹ quibuscūq; ut pudēdo, utero eiusq; cer-
uici, vētri, mānis, faciei & manib. naturalē restituat
venustatē. Corporis vniuersi emēdāda vitia sunt, for-
des relictæ à lochiorū fluxu & remediorū vsu ut fo-
tuū, cataplasmatū, & linimētōrū: itē lassitudo artuū
viscerūq; ex part⁹ laborib. Medicamētōrū genus du-
plex indicatur: abstergētīū quidē à sordib⁹: à lassitu-
dine anodynorū id est laxatiū & modicē digerētium,
quib. tamē, roboris viscerū causa astringētīū al^qd
sēper miscēdum est. Quātitas remedij ad molē tāta
indicatur quanta toti corpori muliebri admoueri
possit, nepe aqua tāta copia, in labro vel in dolio tā
capaci ut in eam puerpera collo tenus mergi possu:
sit autē aqua fluuiatilis vel per bidui quietem depu-
rata, vel potius pluuialis. Qualitas pro virib. & tēpo-
re anni immutatur, ut hyeme calidiū actu & pote-
state, æstate min⁹ calidū vsurpetur. Tēp⁹ vniuersale
quādo scilicet vtēdum sit, indicatū antea est in ter-
tia hebdomade: particulare diei vniuscuiusq; ut ma-
tutinū & vespertinū indicatur à corporis cōditione,
cuius neq; vēter fæcib. neq; vētricus cibis refertus
sit, neque prima regio obfessa cruditatib. ante pur-
gandis minoratiuo aliquo medicamento. Utendi
spatium biduum aut triduum potius esto, ut sensim
insueto balneo puerpera assuescat, sensimque habi-
tus laxetur, humores, vaporesque dissoluantur.
Quiescat primo die tepidiū breuiūsq;, ut per ho-
rulæ spatium singulis vicibus, secundo & tertio die
paulò calidiū & diutius: mora tamen præscribetur
ex mulieris robore. Denique puerpera ab egressu
balnei in lecto vicino & calefacto, atque in concla-
ui tranquillo, pluribus stragulis oblecta sudabit
pro viribus: sudores quoque citabuntur huius vel

similis opiatæ vfu.

℞ conseruæ flor. borrag & anthos an. ʒj conditur. cortic. citri ʒ β cōfection. alkerm. ʒ iiij. mosch. opr. gran. iiij fiat opiata. capiat ʒ iiij superbibendo parū vini aqua gramin. diluti: deterfo sudore vbi iam corpus deferbuit cibis salubribus alatur, compressis etiam omnibus animi & corporis vehementioribus motibus.

*Balneorum æstiuorum primi diei
exemplum hoc esto.*

℞ aquæ fluuiatilis vel potius pluuiialis quant. suff. quiescat per biduū in labro vel doliocapaci, deinde in eius portione coquātur ex lebece sequētia. & rad. alth. bryon. & cucumer. agrest. an. lb ij vel iiij folior. agrimō. scabios. betæ, mercurial. artem. tanacet. matric. an. m. iiij flor. chamæ. melilot. & anethi an. p ij colatura misceatur toti aquecum vini albi parte xij. inter coquendū ferrum candens semel mergatur in decoctū, & ab exitu ex balneo sudet in lecto primo die. Secūdo verò & tertio die calidorū tergentiū & astringentiū materia augebitur, ideoq; addetur alumin. rochæ lb j dū in balneo manebit fricabitur totū corpus sacculis duob. lineis repletis farine fabar. & scenug. an. lb β farine orobi & lupulorū an. quart. j salis ʒ ij gran. tinctor. ʒ j nucis mosch. & garyoph. an. ʒ ij. Hyemalis balnei exēplo erit illud, in quo vini quantitas & calidorum medicamentorum dupla portione augebitur, iisdem deinde sacculis totum corpus astringebitur.

Partium cosmeticæ.

PVdendi, & cervicis vteri à partu laxitas ingrata infœcūdaq; sicuti vteri ipsius mollities cōmodè coercetur finitis quidē balneis per remedia astringentia, &

gētia & calefaciētia, qualia sunt fatus, suffitus & emplastra, ex quibus fatus & pudendo & ceruici, reliqua duo vtero efficacius opitulantur, idque per hoc tridui spatium mane & vesp̄ri.

℞ rosar. rub. summitat. myrti & sumach, an. p. j. alū. roch. ʒ j mastich. nucis mosch. schœnanth. granor. alkerm. & cort. citri an. ʒ ij myrrh. ʒ iij cōtrita omnia & sacculo lineo capta ferueāt in vino rubro eoque expresso sacculo foueatur pudendū bis quoridie per vnus horæ spatiū mane & vesp̄ri. aliud, ℞ fol. maioran. & salu. an. m. j. alum. ʒ β gall. nucū cupressi, malicor. & cort. citri an. ʒ ij calami aromat. & schœnāt. an. ʒ j nucis mosch. & macis an. ʒ β contrita omnia coquantur vt supra & applicentur in sacculo prius feruefacta in vino rubro. Suffit^r exēplum hoc esto. ℞ ligni aloes crudi vel santal. citrin. ʒ β nucis mosch. cort. citri, boli armen. sanguinis drac. cornu ceruini, gallar. balauft. & calam. arom. an. ʒ ij. myrrh. & ladani an. ʒ iij mosc. ʒ β fiat puluis crassior, & ex eo cum vino rubro trochisci ad suffitū matricis per siphonem & sellam perforatam excipiendi componantur: foris autem imponetur emplastrum pro matrice.

*De erugando ventre, & contrahendis
densandisque mammis.*

Solēt quoque à puerperio rugosus vēter molles & pēdulę māmæ displicere, quib^r vitiis succurritur per remedia astringētia & modicē calefaciētia ne subiecta viscera lēdātur idq; post balnea relicta. forma liq̄da & media ex vsu est. For^r exēplum hoc erit.

℞ gallar. & nucum cupress. an. ʒ β lateris vsti quart. j alumina. roch. farin. gland. & fabarum

an. quart. β . boli arm. \mathfrak{z} j. fiat pulvis infundendus per triduum in aquis stillatitiis prunorum syluestr. cor-morum, inespillor. quod si hæc aquæ desint in aqua fabror. addendo aceti ros. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ β . ouorū album. xij. mastich. & myrrh. an. \mathfrak{z} j. sanguin. drac. \mathfrak{z} β . fiat destillatio ex alambico plumbeo lento igni: hac aqua stillatitia insolata prius per decem dies lauentur venter & mā-næ pannis insiccatis donec exsiccentur.

Pulvis exemplum.

\mathcal{L} . farin. fab. orysæ gladiū & amygdal. dulc. an. \mathfrak{z} ij. lateris puluerati quant. s. nucū cupressi an. \mathfrak{z} β . boli armen. granor. tinct. nucis mosch. & calam. aromat. an. \mathfrak{z} ij. contrita leuiter omnia coquantur vt supra, & fiat puls addendo sub finem aquæ citrang. & rosar. an. quart. j. applicetur bis in die post coctionem prædictam.

Faciei remedia.

Quod si facies lentiginosa, subobscura & scabra fiat, hæc aqua lotionē singulariter profutura est. \mathfrak{x} . casei recentis sine sale $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. j. carnes capi vnus iunioris detractis ossib. & intestinis, minutū incisas, oua recentia cum suis testis confracta n. x. amygdal. amarar. \mathfrak{z} iij. farin. orob. & lupinorū an. quart. β . fiat destillatio.

Aqua alia dealbans & leniens magis.

\mathcal{L} . micæ panis vnus albi in succo limonum infusi $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ β . mell. crudi quart. j. oua recentia cum suis testis n. vj. aquæ ros. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$ β . fiat destillatio, lauetur facies postquam deterfa fuerit lotionē aquæ infusionis micæ panis albi.

Alia aqua erugans, leniens & dealbans manus.

\mathcal{L} . aquæ stillat. flor. altheæ & malu. $\mathfrak{t}\mathfrak{b}$. ij. aquæ ros. & ci-

& citrang. an. quart. j. misce & in iis infunde per tres dies prunorum syluestrium crudorum & minimi incisorum lb.ß. destillentur vt supra.

De lacte.

Siquidem mater foetum suum educatura est, illa augendo non imminuendo lacti studere debet. Lactis autē generatio vel confectio laeditur 4. modis, abolitione, diminutione, redundantia, depravatione. Abolitio & diminutio dicitur penuria lactis vel defectus: estque symptoma primi generis, cuius causæ aliæ internæ, aliæ externæ sunt. Hæ versantur in victu aut nimis tenui, aut nimis intemperato, aut nimis resolvente: illæ sunt morbi vel peculiare mamarum vt paruitas, obstructio, & intemperies frigida, vel communes toti corpori, vt sunt intemperies siue nudæ sint, quales succedere solent febribus acutis vel diuturnis, & euacuationib. immoderatis aut spontaneis: vt sunt diarrhœa, dysenteria, tenesmus, hæmorrhagia, per nates vterum hæmorrhoidas: siue humorales, biliosæ, pituitosæ, melancholicæ.

Victus.

Harum causarū discrimine adhibito, victus vitia sola diætæ emendantur, quare ea sit calida humida, copiosaq; & minimum resolvens: aer calidus, humidus, somnus & quies multa, vita hilaris & curarū, veneris, coitus, & libidinis expers. Cibi sint panis triticeus albus, carnes animalium domesticorum recenter mactatorum, vt vitulorum, hœdorum, veruecum, agnorum, porcellorum, gallinaceorum omnis generis, vbera vaccina, exque elixæ potius quam assatæ, lac caprillæm bubulum elixatum cum

flore farinæ tritici, pisces absint nisi pauci, coctiles, & saliti. Omnia condimenta absint tum acris & piperata, tum acida, solus concedatur modici salis vsus irritandę appetentię causa, vt cibus, potus, sanguisq; ad mammas transuehatur: potio sit non aquę simplicis neque vini meracioris præsertim generosi, sed eligophori, rubelli, vel albi, præsertim dulciusculi & modice lymphathi: atque eiusmodi victus calidus humidusque proprie & per se lac auget: intemperatus autem per accidens hoc facit, quatenus remouet intemperiem nutricis lacti generândo contrariam, vt putà frigidus biliosam, & calidus pituitosam vel melancholicam.

Cause.

EX causis internis alię sunt communes toti corpori vt intemperies tum nudę tum humorales, ex quibus nudę curantur vnica indicatione contrarij victus, & pharmacię. Sic calida siccaque emendatur potione aquę sincerę, iusculis refrigeratib. prædictarum carniū incoctis foliis lact. acetos. portul. endiu. betę & fructus cucurbitę, fructuum præcoctium vsu multo somno & quiete, recenti caseo lacte caprillo vel bubulo, ex quibus fiant pulres cum farina hordei: frequentib. balneis aquę tepidę dulcis incoctis foliis herbatum frigidarum & humidarum vt 4. emollientium, betę, mercurial. & vitis. Frigida humidaq; & pituitosa tollitur victu & medicamentis calidis in 1. aut 2. gradu, sine siccitate eximia: calidiora enim & sicciora siccândo absumunt lactis materiã & aperiêdo prouocât vrinas vel menstruũ. Cōferūt ergo herbę sequentes in brodiis coctę, eruca, mentha, anethũ, apium, polium: sed virentes adhuc: siccę enim

enim nimis siccando nocent vt dictū est, sicuti & calefaciendo nisi pauca quantitate multis laxantibus misceātur sanguinis ad māmās transfundendi causa. pastinacæ & sceniculi radix sem. apij porri sceniculi anethi. Balnea quoque paulo calidiora sed sine sudore tū naturalia, tum artificialia, & decoctiones plantarum calidar. conuenient. Frigida quoq; & sicca intemp. qualis relinquitur à febris & euacuationib. immoderatis, corrigitur victu calefaciente humectante plurimū qualis ante descriptus est, & præterea fructib. siccis pistachiorū nucleorum pini, amygdalar. dulciū datylorū, auellanarū, vnde etiam lac ex eoq; pulles fiāt. Quod si ad eas intēperies similes humores accesserint, tū duplici indicatione curantur, vna primaq; purgandi humoris prius cocti, altera intēperiei delendę. Ceterū purgātia sint clemētia, non vehemētia, ob causā iā expositā, qualia sunt χαλαρωγὰ māna, cassia tamarindi. tales sunt syrup. vol. ex plurib. infusionib. de rosis pallidis diaprunū simplex, tryphera persica, & diascebestē sine diacadio. Syrupi coquētes sūt de succo endiuie de cichorio cōpositus, & acetosus simplex. Talia φλεγματαρωγὰ sunt aloes agaric. hierapicra, diaphœnic. coquētes syrupi, mel rosat. colatū, oxymel simplex, de artē. de betonica. talia sunt deniq; μελαναρωγὰ simplicia lenna, epithymus polypod. diacatholic. diasenna, syrupus de succo buglos. de violis & de pomis odoratis. Ex peculiaribus mammarum morbis paruitas tum natia tum ascititia per medicamenta adstringentia, à teneris annis incurabilis est. Obstructio māmārum cōmunis est totius corporis venis. Itaq; curāda est instar pituitosæ intemperiei primum quidem per purgationem & coctionē pituitosi humoris. Deinde

per alterantia remedia calida aperientia modicè: primum quidem interna quæ tum frigidam intemperiem corrigunt, tum reliquias obstruentium humorum discutunt & sanguini ad mammas ascensuro vias venasque expediunt, qualia sunt iuscula è decocto capi & herbarum viridium, erucæ, menthæ berulæ creffonis fœniculi: tales sunt pultes prædictæ addito pulvere ducis. Postremo per topica modicè calefacientia & laxantia vt sunt crebræ frictiones, cum manu vel linteolis tepidis, cucurbitæ, infra supraque & ad latera vt ad axillas appositæ: tales quoque sunt foci per spongiam vel splenia inducti ex decocto emollientium & calidarum plantarum. vt,

℞ folior. maluæ, althææ orig. calam. puleg. & betoniæ an. m. j sem. lini fœnic. apij an. ʒß florum chamæmel. & anthos an. p. j. coquantur in aqua dulci addendo vini albi partem sextam: finita coctione foueantur mamme tepidè tribus vel quatuor vicibus in die. Sinapismi & dropaces validissima remedia sunt, modo non hæreant diutius, sed ad ruborem tantum & tumorem exiguum partis, ne lactis substantia digeratur. Frigidæ intemperiei mammarum eadem curatio est per topica sola prædicta. Atque hæc sunt quæ manifestis qualitatibus lac restituit nutritibus, Aliis occulta facultas est eiusdem lactis gignendi, qualis est lapis galatites pro amuleto ex collo super mammas pendens, idemque tritus & cum aqua ʒj pondere sapius potatus. Tales sunt lumbrici terræ vino albo loti ficcati pulueratique & ʒj vel ij pondere cum vino dulci propinati: vel non ficcati septem vel viij contriti & cum ij aut iij ovorum vitellis cocti addito pauco semine anisi & fœniculi. Denique in elect. solidū redigantur hoc pacto.

℞ nucleor.

℞. nucleor. pini & amygd. dulc. an. \mathfrak{z} iij. daſt. mundat. orū par. iij. lumbricor. terræ lotor. par. iij. ſem. rapæ, eruc. & menth. an. \mathfrak{z} j. β cōtuſa omnia excipiantur ſaccharo aqua meliſſ. diſſoluto, fiāt tabel. ponderis \mathfrak{z} ij. capiēdæ ſingulis matutinis ſuperbibēdo parum vini dulcis diluti: vel excipiantur eadem melle & fiat opiata pariter uſurpanda per plures dies vt 10. aut 12.

De corruptela lactis.

Tertia ſpecies læſæ mammarum functionis deprauatio eſt, (vedūdātia antea expoſita eſt) noſcenda ex ſubſtantia & qualitate lactis triplici, colore, odore, ſapore. Saluberrimi autem lactis ſubſtātia mediocris eſt à temperato ſanguine non diſfluens, prompta, neque diutius cohærēs: Color albiſſimus à glādularum in māmīs ſanguinem coquētium albedine. Sapor dulciſſimus à ſanguinis dulcedine temperati. Odor nō ingratus, quare neque lac liuidum, melius albo, neque nutrices liuidas ſaniores albis verē Ariſtoteles prædedit. At vitioſi & inſalubris lactis ſubſtantia & qualitas ab optimo ſanguine aliena eſt: Subſtantia enim aut nimis liquida, ſi promptius ex vngue polito aut ſpeculo diſſuat, aut craſſior ſi diutius guttis indiuiſis hæreat: Color eiufdem eſt vel pallescens vel liueſcens vel varius. Explorandus autem color eſt lactis, linteī candidiſſimi in idipſum infuſione & ſiccatione in vmbra: Sapor aut amaricans, aut inſipidus, aut aceſcens: aut odor denique ſcetidus ſi calens naribus apponatur. Aliæ quoque ſunt vitioſi lactis notæ tum à nutrice cuiusque natura, ætate, victu, conſuetudine, moribus, habitu, colore, & à puero etiā ipſo multoq; ei⁹ educatu, carijb. flaccidis, linteolor. madore aut ſiccita-

Rr

te, & ex pruritu & ardore femorū imique vētris. Infalubris & vitiosi lactis materia propria est impurus sanguis menstruus, sicuti salubris utilisque lactis sanguis purus & temperatus: neque enim lac ex sanguine pinguisimo & purissimo semper fit ut docet Hipp. lib. 1. de morbis mulierum. Sed aliquando etiam ex impuro, quare ex sanguine pituitoso lac est liquidum, minus album & acidum: ex bilioso tenue quoque, pallidum, & amaricans: ex melancholico crassissimū liuidumque & acescēs. Huius vitiosi sanguinis menstrui causa aliās externa tantum est, victus infalubris, cacochymus & intemperans, à quo sanguis similis proferri solet, repugnāte etiam muliebri temperie. Hoc genere continentur cibi prauī, putridæ carnes aut salitæ, piscesque, porrum, allium, cæpe, aromata, herbę prauę, quibus dum vescitur nutritrix, infantem apud Gal. lib. 3. de alim. facult. cap. 5. prauis vlceribus replet. Tum etiam exercitationes immodicæ, inertia, vehemētiorā animi symptomata, amor, libido, coitus. Aliās internæ causæ sunt intemperies nutricis vniuersales, hepatis præsertim tum insitæ tum ascititię, & mammarum particulares ut ex inflammatione scirrho grumefactione: sic enim apud Hipp. lib. 4. de morbis mulierum lac impurū fit ex mala corporis nutricis temperatura biliosa, pituitosa, melancholica, prauis cibis à quibus lapides in vesica pueri generantur.

Curatio.

Vitia lactis ex prauo victu, solo nutricis bene alioquin habitæ *eu G' punc*, & viuidi floridique coloris corriguntur victu, nempe cibis euchymis & salubribus, coctione eorundem bona, excrementor.
ven-

ventris tempestiua deiectione, vini pauciferi diluti
 potione, somni, vigiliæ, motus & quietis mediocri-
 tate: curarum, amoris & libidinis fuga. Quod si diu-
 tino nimis vsu victus prauæ cacochymia contracta
 sit, pauca quidem naturæ committenda est, & copiosa
 expugnanda est clementioribus remediis. At vitia
 lactis ex intemperie vniuersali nata vel aduentitia
 curantur tum victu contrario intemperierum spe-
 cies, tum purgatione cacochymicæ, biliosæ, pi-
 tuitosæ, melancholicæ: denique intemperiei
 alteratione per medicamenta externa internaque.
 De lactis defectu paulo post in libello de puerorum
 educatione. Peculiares mammarum affectus pbleg-
 monosi, œdematosi, scirrhusi curandi vt cap.

proprio expositum est: vlce-
 ra cancrique ad chirur-
 gos relegari de-
 bent.

Rr 2



IOANNIS HV-
CHERI BELLOVACI
CONSILIARII MEDICIQUE
REGII, ET MONSPELIENSIVM
Medicorum Cancellarij, de Sterilita-
te vtriusque sexus.

Liber quartus & ultimus.

*De occultis sterilitatis causis, seu de
maleficiis.*

DECURSIS omnibus de Sterilitate viri-
lis sexus naturalibus causis, morbisque
eiusdem authoribus expositis similari-
bus, organicis, & cōmunibus, vnica su-
perest, occulta, & falsa, Fascinatio scilicet. Hanc
autem definiunt noxam, vel lēSIONē ab oculis male-
ficorum tum virorum, tum fœminarum (illi Magi,
hę Lamix vocitātur) cū ira & inuidia in alios acrius
cōspectos emissam. In hac descriptione voces illę
(noxa, lēSIO, passioque) non morbum, aut symptoma,
quę vt incorporea sunt loco mōueri non possunt,
& ab egro in sanum corpus trāsferri, sed insalubrem
causam, & tabificā qualitatem denotant, tetro cui-
dā corpori, spurcove spiritui visorio inherētē, quā
idcirco

idcirco ira affatim in oculos fascinantium impellit, & inuidia cum radio in sanos eminus cōspectos dirigit. Hinc apud Græcos βαρκαίειν pro inuidere & fascinare vsurpari solet.

Fascinationē autē nō vanā vulgīq; fictā opinione, sed verā rem quādā esse, pluribus cōprobāt rationibus, & testimoniis. Et ratio vna est, quod plurima olim prodita sint fascinationis remedia, quę, si vera, certaque sint, nō potest ars fascinatrix aut fascinatiō esse falsa, cū physicorum remediorū cognitio solis experimētis cōparetur. Eiusmodi sunt apud Plin. lib. 28. coriū frōtis hyēnē. apud eund. lib. 26. orchis satyrij species. apud eund. lib. 13. c. 1. officula quædam lunata, & dente polita. Apud Diosc. verberna, chamæleon albus, hypericum, & multa alia. Eiusmodi hodie habetur gagates puerulorum collo appensus.

Testimonia eiusdem fascinationis plurima sunt diuina, humanaque. Deus enim 22. Exod. maleficos occidi iubet generatim: quos speciatim Deuteronom. 18. compellat necromantes, sciomantes, prestigiatores, magos, infames, & exorcistas. Paul. ad Galat. Quis vos fascinauit, inquit: &c. Ecclesiastes nil peius oculo esse pronuntiat.

Canonistæ eandem fascinatricem artem agnouerunt, vt iuxta cap. Si per forciarios. causa 13. quæst. 22. Si per forciarias, inquiūt, & maleficas artes Deo permittente, & diabolo concurrēte concubitus nō sequitur. Neque verò agnouerunt tantū, sed in eiusmodi artifices mortis supplicio animaduērēt, quicumque vel incantatione, vel inuocatione, vel coniuratione vtuntur. c. illos. caus. 26. & quæst. 20.

Pleni sunt clarissimorum iurisperitorū libri fa-

fascinationis significatione: legitur enim Cod. titul. de Maleficis, &c. quorum artem scientiæ nomine Imperatores ibidem decorarunt; eosque nō ob artem, sed ob damna illata mulctandos sentiunt in l. eor. Catit. de Maleficis. cū illam ruri sæpe vtilem esse imbrum, ventorum, & grandinum auertendarum causā, ne paterentur segetes compertum esset. Postremò non desunt præclara auctorum de eadem fascinatione suffragia. Virgilij versiculus est,

Nescio quis teneros oculus mihi fascinat agnos.

Plinius quoque quasdam in Africa fascinatrices familias refert, quarum laudatione intereant pecudes, tabescant arbores, & infantes sensim liquecant. Idem Pin. lib. 1. cap. 2. Solinus & Isigon. in Triballis, Plin. Scythicis, & Parthicis populis quasdam gentes affirmant, quæ attento aspectu & iracundo alios aspectos effascinant & interficiunt, quibus est in oculo duplex pupilla, quarum etiam corpora mergi nequeant. Sic Plutarchus galgulam siue icterum auem ab ictericio ægrotante bilem flauam ad sese rapere, ægrumque liberare ait. Atq; hæc sit fascinationis confirmatio.

Fascinationis partes tres ex triplici nocendi & fascinandi modo distribuunt, Naturalem vnam, siue substantialem; alteram Accidentariam; tertiam Voluntariam. Ex illis vltimam, siue tertiam imaginatione, solaque voluntate & nocendi desiderio constare volunt: ideòque certo homini priuatim nocere; cū reliquæ species duæ tabifica qualitate obuios quoslibet indiscriminatim afficiant. Naturalem siue innatam ex vi quadam individuali, cœlesti, & sydereâ (quæ infelix, infauusta, & funesta sit) oriundam esse.

Cū

Cùm enim ars sit naturæ imitatrix, sitque ars quædam fascinatricis, naturam quoque quorundam fascinatricem esse, & maleficam oportere. Hinc Ophyogenes in Hellesponto serpentum moribus solo tactu mederi solitos esse: sic Psyllos solo odore eisdem necasse serpentes: hos pilorum scæminæ vstorum vapore fugari etiam compertum est. Deinde vires quibusdam quorundam morborum medicatrices ingenitas esse, vt Gallorum regibus strumarum: Vespasiano Imperatori, cæcitatis, surditatis, claudicantis: reginæ Anglorum, epilepsia: articulo pedis dextri in Pyrrho, lieni tumido: capillitio Samsonis, contra hostes. Vim itaque fascinatricem quibusdam innatam esse, eamque spiritu visorio, eiusque pestifero radio in obuium quemque scuire, & debacchari statuunt.

Accidentariam pronuntiant ex solis vaporibus malignis existere, è corpore putredinem continente quoqueuersum in quemlibet obuium (cùm voluntati nostræ non pareant) effluentibus. Humores enim sæpe corruptione venenatos euadere testari Galenum capite quinto libri sexti de loc. Itaque vetulas & effætas iam scæminas sæpissimè fascinatrices videri è suppressi corruptique menstrui perniciæ, qua etiam per hysterica passionem grauiter ipsæ tentantur, cùm hac noxa careant secundum naturam constitutæ, quod ipsarum nobiscum innoxia consuetudo, infantium conceptus, educatio foris & intus, clarissimè patefacit. Accedit anicularum istarum ex opinione contemptus, maior iracundia, humorum, animorumque perturbatrix.

Tres autem istas fascinationum species communi omnes ratione, scilicet per aerem, fixum

trucemque intuitum lædere tradunt : per quem magna vis spiritus animalis aut solius , vt in naturali fascinatione , aut tetrīs vaporibus inquinati, vt in accidentaria , ad oculos fascinatorum deducitur ; è quibus vicissim in astantium conspectos oculos clam subrepant. Oculos enim viuentium ob cutis nuditatem vaporibus & spiritibus tum emittendis, tum admittendis maxime peruios esse statuunt: sed contrarium in pestilentium & venenatorum animalium cadaueribus accidere, vt minus viuis sint infensa, non solum ob animi symptomatum, & humorum sedationem, sed ob caloris etiā, spirituum, vaporumque penuriam , multoque magis ob oculos adductis palpebris clausos , totamque cutem conniuentem. At quæ spontanea est, nullis neque spiritibus neque vaporibus grassatur, sed vnico pessimæ imaginationis fascino.

Insidiosam denique & pestiferam esse omnem fascinationis luem formosissimis pueris, & puellis, lætis segetibus, frugibus, fructibus, arboribus, fruticibus, & plantis, brutis obesis optimisque, vt agnis, equis, gallinis, &c. accedente præsertim intuentium fascinantium admiratione, & inuidiosa laudatione. Hinc enim religiosam consuetudinem inter probos viros fluxisse bene illis precandi, quorum præstantem formam, raramque sclicitatem aliquam suspiciunt, ne videlicet laudatos velle fascinare videantur.

Itaque ex tribus præcauendi maleficorum fascini vulgaris rationibus hanc vnā esse aiunt, bonam sc. ominationem siue benedictionem ; quæ admirationi beneuolentiā , non odium & inuidiam esse

esse coniunctam significet. Alteram vocant ficam excomplicatis digitis , quæ laudantis fastidium non inuidiosam admirationem indicat. Tertianam denique eius qui aspicitur expuitionem : quæ suspecti fascini repulsionem significat.

Sed enim quod de fascinatione , eiusque partibus hæcenus probatum est, probabilissimis aliorum improbatum argumentis. Primū enim fascinationis propositorum remediorum nullam vim esse eiusmodi , sed totam aut naturalem, aut physicam esse demonstratur. Rutam enim ventris , vterique dolores compescere , dæmones fugare , insomniorum terribilia propulsare , idcirco ab Aristotele in Probl. & Hippocrate libro de virgin. morb. traditum est, quod redundantis seminis, & opprimentis cruditaris flatus sine vlla fascinatione absumat. Satyrium calfaciendo , humectando , & coitus stimulando insomnia dispellere. Hypericum, chamæleonem album, & verbenacam attenuando , calfaciendo , siccandoque insigniter , sicuti & pœoniam crudos crassosque flatus variorum capitis morborum authores , ut *ἰσχυρά* vertiginis , epilepsiæ , catalepticos, dissipare: quorum omnium origo ab imperito vulgo fascinationi tribuebatur. Satis quoque constat superstitiosum esse ex fica , spuitione , & precatatione quæsitum remedium : sublata enim imaginatione eius qui se lædi putat, nihil interest placeat ne, vel displiceat intuenti mago, ab eoq; vel ametur , vel odio habeatur. Deinde testimoniorum quoque productorum fides clarissimis rationibus, & expositionibus eleuatur.

Deus enim omnem nocendi facultatem quam

sibi, suæque arti magi, & lamiaæ arrogant, dæmonum totam propriam nouit; sed tamen prauam eorum nocendi voluntatem, & idololatriam vindicat. Theologi quoque & Canonistæ cùm istius dæmonum fraudis, & noxæ ignari non essent: eorum tamen consultores magos & instigatores, tanquam manifestæ impietatis, mortisque reos esse voluerunt.

Imperatores autem & Iurisperiti omnes maleficorum facinora omnia fascinatrici eorumdē arti tribuerunt, quorum auctores fuisse dæmones ignorabant; cum sit philosophorum magis propria, quàm magistratuum, cauissarum cuiusque rei inuestigatio. Virgilius quoque pastores, non Aristotelem, aut Hippocratem vulgaris falsæque de fascinatione sententiæ auctores exhibet. Porro Plinij, Solini, Gellij de Triballis, Scythicis, atque Ponticis quibusdam fascinatricibus familiis, earumque immerfabilibus corporibus, & duabus in vno oculo pupillis, atque laudatione tabificæ; fabulosissima constat esse commenta. Neque enim terrena grauiaque corpora aquosis, leuibus & simplicibus sustineri posse: neque duplicem magis pupillam, quàm vnicam esse veneficam credendum est: sed huic fabulæ originem dedit, quod feroci aspectu pueros familiæ illæ prope exanimarent. Sic Arismapos creditos esse monoculos, verisimile est, eò quod cùm essent sagittarij, alterum oculum collimando clauderent. Sic Thessalos habitos esse cætauros ob equestre eorum primam exercitationem. Sic Psyllos morsibus serpentum mederi existimatos esse ob consuetum veneni istorum suctum. Dicemus eandem

Plinij

Plinij vanitatem esse de palmularum lunatis officulis dente politis : nam superstitiosè hoc factitatum indicat ipse. Plutarchum quoque de gulgulo non esse probandum , à quo bilem per habitum ægrotantis effusam ad se rapi, aut hepatis intemperiem & obstructionem explicari , non posse certum est.

Pauli ad Galatas orationem metaphoricam esse apparet. Quis vos fascinavit ne obsequamini veritati? quasi dicat, Quis vos decepit argumentando? Eâdem metaphorâ avaritia nugacitatis fascinatio à Iacobo vocata est. Eâdem metaphorâ ab Ecclesiaste invidia & avaritia oculorum nomine suggillata fuit; quod rerum alienarum oculis expositarum cupiditas animos & corpora lædere videatur. Eâdem infans amor fascinationis nomine accusatur , & ab oculis amatae mulieris per oculos amantis in cordis sedem penitus inculcatur , vnde eius valetudini obest. Eadem Lacedæmonii, oratores, tanquam fascinatores , quique orationis præstigiis populo imponerent, è ciuitate sua ablegarunt , cum omni Rhetoricæ tanquam fascinatoriæ artis studio. Eodem sensu φιλαυτία fascinare creditur , quod hominibus sui amantissimis iudicium omne eripiat : sicuti de Anthemide , & Narcisso à poetis proditum est.

Eodem denique de fascinatione opinionis errore Romani è puerorum suorum collo Priapi effigiem appendebant prohibendi fascini causâ : quin Priapum ipsum fascinum vocarunt, quasi fascini depulsorem. Ideoque illum quoque

triumphalibus curribus alligabant ad retorquendum in authorem fascinum. Postremò ipsa quoque inferendæ fascinationis exposita ratio per acrem, trucem, & inuidiosum intuitum refellitur: neque enim ab oculis quantumvis à palpebra detectis affluentius quàm ab ore, naribus, totoque corporis transpirante habitu, pestiferi tetricue vapores in vicina corpora prorumpunt. Neque insuper spiritus ipse animalis & visuius cum suo radio foras ad obiectos oculos spargitur, cum visionem receptione, non emissionem constare maior philosophorum pars statuat: sitque crystallinus humor veluti speculum quoddam animatum. Neque denique invidia per se, sed ex accidenti noceat, corrumpendo scilicet proprios humores, eorumque vapores corruptos & malignos ad eruptionem concitando.

Subiectum autem propositum fascinationis ab iisdem irridetur, quippe norunt formosos pueros, puellasque opprimente plethora plerumque ægrotare; quam idcirco protinus soluendam esse monebat Hippocrates, & Celsus libro secundo: aut certè ob habitus mollitiem, & laxitatem contagione facilius labefactari, quæ à fascinatione differt. Cætera denique bruta, & plantas non à fascinatione lædi, sed omnem illis à cælo, & pabulo perniciem accidere, nisi dæmonum intercesserit peruersitas.

Adhuc fascinatio vaiuersim sublata est: iam singulæ eius partes, & species refutando tollantur. Prima quidem naturalis scilicet & substantialis, quæque vel ex temperamenti occulto quodam modo, & substantiæ inexplicabili proprietate

tate, vel ex infœlici alicuius syderis natalitij influxu ingenita sit.

Primum enim φιλόφρων naturam in eum finem nequaquam homines finxisse vt mutuum sibi perniciem alerent, necemque concinnarent. Neque animalium eiusdem speciei dissimilitudinem tantam excitasse, vt sibi inuicem sint exitiosum venenum, quod à maxima tantùm naturæ, & temperamenti contrarietate, summoque totius substantiæ dissidio fuscitari potest. Vt falsissimum omninò sit, quosdam patres familiarum suarum veros fascinatores fuisse: quibus potius contagiosi fuerunt.

Sicuti & illud quod capillorum fœminæ vstorum fascinatorio odore serpentes necantur: crasso enim potius eorum vapore, vt & cornuum, suffocantur ob meatuum spiritalium angustiam.

Multò minus credendum ex hominibus aliquem à seipso propriè fascinari: cum vna sit vnus natura, & temperies, atque substantia: sed vel ab illati fascini metu & suspicione, vel ab inueteratis animi, & tabificis vitiis odio, & inuidia, vel ab insana quadam φιλαυτία valetudinem propriam tentari, afficique & debilitari statuendum. Sic neque ex feris Basiliscum & Catoblepam se ipsos suo visu necare.

Deinde etiam è toto syderum cœtu nullius vim tam pestiferam esse, cum omnia ea hominum causa condita sint: aut tam eruditam & coniuratam, vt vnũ tantùm homini, non omnibus sub se nascentibus diram fascinationis luem inspiret, cum tamen per paucos fascinatores, vel potius nullos, antiqui-

tas notarit. Neque enim Philostrato in Apollonij vita credendum est, Sturnium quendam Ephæum fascinatorem non aliter, quàm basiliscum omnes solo aspectu interfecisse referenti: quod spurcæ eius, & contagiosæ naturæ potius, quàm fascinatoriæ tribuendum est.

Quare insitarum medendi facultatum proposita exempla valeant: eaque fidei, & imaginationi ægrotantium, non medicatricibus hominum ingenitis viribus tribuantur: quæ dignitatis illorum, regniq; & imperij aut raræ cuiusdam sapientiæ, potius quàm naturæ comites sunt & affectæ.

Altera species creditæ fascinationis, quæ tetri cuiusdam vaporis, & tabificæ qualitatis diffusionem constet, à contagione aliena non est, ægrique ipsi non fascinatores, sed infecti: sicuti morbi, quorum vi expirationes illæ malignæ fiunt (qualis est febris pestilens, ophthalmia, scabices, elephas, phthisis, & Italica lues) contagiosi, non fascinatorij, vocandi sunt.

Nihil enim aliud contagio est: quam deleteriæ cuiusdam qualitatis impressio, quæ à vapore & putri, & lento, calidoque ab ægrotantibus corporibus quoquoversum in aerem sparsa haurientibus obuiis corporibus similem cladem inferat, dum expiratione, transpiratione, & aspectu foras excluditur, includiturque.

Itaque statuendum suppressi menstrui, aut intestini veneni nullam fascinationem esse, sed verum contagium, cuius à fascino discrimen est,

est , quòd istud aut spiritu , aut voluntate sola certo homini , illud verò quibuscumque obuiis cum vapore expirante , & sine voluntate vlla ægro-
tantis communicetur.

Tertia denique fascinationis species , quæ spontanea vocata est , hoc vno manifestæ falsitatis nomine condemnanda est , quòd nulla , neque tetri spiritus visorij , malignique ; neque vaporis noxij ex fascinatorum oculis vibratione ; sed inuida tantum , prauaque eorum nocendi cupiditate , constare dicatur , adeo vt quem velint hominem , brutumve aut sensim tabefaciant , aut confestim interficiant : cum tamen nullus affectus , aut qualitas sine corpore , cui inhæret , ab vno in aliud corpus transire possit. Id autem ipsum , quo lædi aliquis à fascinatore creditur qualitas sit , & affectus quispiam oportet : Quare à fascinante in fascinandum corpus migrare sine suo subiecto nulla ratione possit.

Hoc autem ipsum non potest esse aliud , quàm vapor , aut spiritus ; quorum neutrum fascinationis esse idoneum vectorem , vt antea disputatum est , sic nunc quoque ostendatur.

Vapor enim , aut putris est , aut imputris : ille è corpore putredinem habente per aerem sparsus sanos obuios haurientes eum inficit (hæc infectio potius contagio est , non fascinatio) imputris verò ex substantia partium humorumque excitatus , cum excrementitius sit , & à naturæ muneribus alienus , nullisque

imaginibus ornatus, quæ in cerebro solo fingi solent, nō posset fascinantis imaginariam qualitatem secum efferre. Sic neque spiritus siue animalis, siue vitalis fascinationis eiusdem idoneus vector habendus est, cum ab anima intus contineatur ut suis functionibus seruiat; aut dissolutus pereat, ut in syncope. Quod siq̃n aere etiam permaneret, cum ratione careat, in fascinandum certum hominem, brutumve à seipso dirigi nequeat; aut ab ipso fascinando attrahi, cum alienum corpus non moueat, nesciatque ubi & quando in aere vagetur: aut, etiam si sciat, eundem tamen quem senserit salutis suæ inimicum, exturbet potius præ eximio seruandi sui studio, quàm ut in sui perniciem amplectatur. Multò minus ab anima ipsa foras dirigatur, cum à corpore cuius est forma nusquam discedat: neque discedentibus spiritibus vim suam inurat; aliàs aer cui spiritus misceretur esset animatus & viuens.

Quare vis fascinatoria cum neque sola sine subiecto suo, neque per vaporem & spiritum animale communicari sanis possit, ut hæctenus demonstratum est, concludendum erit nullam omnino fascinationem esse veram, & fascinantium hominum propriam: sed totam dæmoniam, eamque neque morbi physici differentiam, aut causam esse: neque denique rem ullā veram, & constantem, sed antiquam vanamque superstitiosi vulgi opinionem, quamlibet hominum brutorumque cladem, & segetum calamitatem inopinatam fascinatorum maleuolentiæ adscribentis.

Itaque neque morbos illos verè fascinatorios esse, sed diabolicos omnes metaphysicos à dæmone per flagitio-

flagitiosorum hominum impia facinora, tanquam idonea instrumenta inferri solitos teste Thom. 3. ad Galat. & Basil. Magno in homil. de inuidia. Nam verè diuinos, & à summi optimi Dei voluntate profectos, causas naturales habere constat regis Ioram exemplo lib. Paralip. c. 21. qui quòd populum à lege Dei auertisset, ex improbabili diætâ in insanabilem diarrhœam iubentè Deo lapsus est.

Huiusce conclusionis veritatem & constantiam breui claraque fascinationis instrumentorum refutatione demonstramus. Cum enim duplices sint fascinationis artifices, vel ministri potius dæmonum; Magi; & Lamiæ, siue Stryges, siue Sagæ, siue Veneficæ (tot enim nominibus Latinis sceleratæ fœminæ vocantur) hæc quidem nulla neque arte, neque libris; neque verbis fascinando vtuntur: sed imaginatione sola lædunt, quos lædere se putant, propriaque vi sua ex pacto spontaneo cum dæmone contracto. Illi contra nullum sine arte, libris, verbisque conceptis, & exorcismis opus aggrediuntur: seseque non cacodæmoni parere, sed cacodæmonē sibi ipsis sacrorum verborum, aliorumque instrumentorum viribus arbitrantur. Illa autem sunt verba, carmina; exorcismi, amuleta, periapta, philtrea, ligaturæ, imagines, characteres, numeri, figuræ: quorum omnium æstimâdis deinceps viribus Platoniorum, & Peripateticorum & Theologorum placita conferrentur. Nam Platonici nimis creduli fortasse & superstitiosi fascinatorios morbos receperunt, eorumque inferendorum instrumenta, & sanandorum remedia probant, eaque experimentis quotidianis vulgi comprobant. Peripatetici Logiatri omnia ista tanquam ludi-

cra & inania improbant. Theologi dæmonum præstigias propriaque opera, non Magorum, aut Lamiarum arbitrantur.

De Lamiarum imaginatione, cuiusque viribus.

PRimum igitur imaginationis virtute proprium corpus alterari & fascinari posse demonstrant, idque ex vario spiritus & caloris nativi motu, quem animosa & naturalis facultas ab imaginatrice laeçssita prouocat intrò foràsque: sursum, & deorsum. Sic videmus gaudio ex præsentis boni opinione habitum incalescere, laxari, erubescere: mœrore, & inuidia habitum perfrigerari, densarique, & præcordia inflammari. Sic diutinis attentisque matris prægnantis cogitationibus liberos similes permutari: indèque multò plura in hominum, quàm brutorum genere vultus discrimina ob maiorem ingenij humani celeritatem, & imaginationis varietatem apparere. Hinc foetuum corpora appetiti vehementer à grauidis matribus negatique cibi specie mutari: sicut pullos gallinaceos pannorum incubantibus gallinis obiectorum coloribus. Hinc mulierem Romanam olim ex albo patre nigerrimum puerum sustulisse ob serui æthiopis domesticam consuetudinem. Hinc Iacobi gregem obiectarum virgarum variegatos colores ouibus grauidis expressisse.

Hinc frigoris imaginatione nos ipsos perhorrescere: aliis lugentibus lugere, lætantibus exultare, meientibus meiere, oscitantibus oscitare. Hinc denique rei rubræ aspectu hæmorrhagiam commoueri, cibique acerbi memoria dentes obstupescere

stupefcere. Hinc igitur imaginationis eximiam quandam effe vim in alterandis , & fascinandis corporibus propriis conftare putant. Addunt inſuper aliena corpora ab eadem imaginatione alterius permoueri , fascinarique poſſe: dum ſpiritus amica vel inimica qualitate inſtructus & in aerem ſparſus ab obuiſo, vicinoque corpore rapitur : Vires autem imaginationis omnes fauſtas, infauſtasque: à quibus odium , amor , morbus , & ſanitas conciliari ſolet , à ſyderum formis ſuſcipi, ſub quibus fascinatores aut naſcantur , aut ad quas imaginationes ſuas vehementiſſimas referunt, vt voluptuoſas ad Venerem, iracundas ad Martem, inuidioſas ad Saturnum: eas enim ſyderum formis ornatas cœlitus relabi : quibus vel noceant, vel proſint: cogantque ſydera ipſa, tanquam cœlo auulſa, ſibiipſis, vt intelligentiis cœleſtibus, parere.

At verò fascinationis ſpecies vtraque, tum propria, tum aliena, facillimè conſutatur: propria quidem eò quòd non eſt naturalis, ſiue temperiem ſiue ſubſtantiæ modum ſpectes: tunc enim aleret , non læderet proprium corpus. Neque etiam voluntaria eſt, cum omne animantium genus ad ſuæ ſalutis ſtudium à natura ipſa trahatur. Quare ſi quando proprium corpus imaginatio alteret, non id quidem per ſe, & proximè fit; ſed per accidens , & per obiectionem imaginum ſenſibilium boni, maliue ſpeciem habentium: vnde appetitus, calor, & ſpiritus ab animoſa, & naturali animæ facultatibus variè conturbatur: quæ cum ſint eiufdem animæ, & ſuppoſiti, id eſt animalis,

tanta est inter se earum sympathia, vt se mutuò ad proprias actiones permoucant. Quare si qua sit ab imaginatione propriorum corporum noxa, nequaquã fascinatio naturalis, & voluntaria, sed læsio accidentalis habēda est ex iudicij prauitate, animique vitiorum & symptomatum vehementia, vt amoris, odij, inuidiæ, mœroris: à quibus caloris natui substantia vel dissoluitur, vel inflammatur, vel extinguitur, quæ cum sit functionum omnium animæ communissimum instrumentum: inde morbus & sanitas consequuntur.

Alienum quoque corpus ab imaginatione alterius alterari non posse explosis quorundam Platoniorum sententiis contrariis, deinceps docebitur. Nam neque vt à causâ effectrice: neque vt ab idea & exemplari hoc fit: illa enim sit aut potentia ipsa, aut res imaginata, aut imaginandi actus oportet. At enim potentia nō agit per se quicquam, nec mouet per se, & sine specie imaginabili, sicuti nec oculus clausus sine visibili obiecto. Rursus non est species imaginata, cum res vlla omninò non sit, sed rei potius signū, simulacrū, spectrumque, quod rem tantum externā, cuius signum & vmbra est, significare potest, siquidem nihil supra naturam suam & essentiam agere potest. Quòd si imaginabilis rei species realis, forma rei imaginatę fingatur, eam quoque à sensibus ipsis de subiecti potentia excitari, educique contra veritatem fingendum erit. Neque enim formæ reales maximarum, infinitarum, & contrariarum rerum, aut per exiguam pupillam prouchi ad crySTALLINUM humorem, in eoque simul confidere possint, quòd eas cum suo subiecto extendi contrahique Aristot.

disputet.

disputet. Ideoque species illæ imaginabiles, clarioribus philosophis rectè vocantur intentionales & notionales formæ, quòd ab illis ad rerum externarum & imaginatarum notitiam animus producat. Nec enim credendum saxum, lignum, aurumve, aut realem eorum formam imaginantis cerebrum subire. quomodo enim idipsum protinus aureum, saxeum, aut ligneum fieri cogitabitur? aut medici caput ægritudines meditantis illicò ægrum, cùm præsertim à re incorporea, qualis est obiecti sensibilis imago, corpus solidum, & per se subsistens effingi absurdissimum auditu, dictuque sit.

Quare imaginabiles species, alieni corporis motrices non esse constat, cùm alterius animæ nullomodo offerri posse antea probatum sit, & paulo post breuiter probandum.

Actus autè imaginandi minus potest alienum corpus permutare: nam vnus agentis & patientis vna est actio numero, sicuti sensus & rei sensibilis sensio: ita imaginatricis facultatis, & imaginis. At imago imaginabilis refert tantum rei naturam, cuius est: Quare & imaginandi actus. Cùm enim illa circa duo obiectorum genera versetur: vnum eorum quæ sunt singulorum sensuum propria, alterum communium, vt figuræ, magnitudinis, numeri, non decipitur ab vtrisque imaginatio, nisi aut sensus vitiiati sint: aut medium sit ineptum. Hinc baculus rectus intra aquam cernitur obliquus, aut distantiora obiecta, minora. Hinc ob cœli distantiam videntur stellæ parvæ: & immota littora, mobilia.

Deinde omnis actio fit per contactum: at ima-

ginatio manet in imaginante , sicut visio in vidente : ergo extra imaginantem mutare corpus nullum potest. Aliàs auditio mea esset auditio alterius.

Huc accedit , quod vt res sensibilis non mutatur à sensu patiente potius & recipiente, quàm à agente; sic neque res imaginata ab imaginandi actu recipiente sensibilium simulachra & intellectui obiiiciente mutari nullomodo potest. Aliàs res omnes essent tales quales cogitarentur; & ex sola sapientiæ cogitatione, sine studio, labore, multum scirem.

Præterea omne agens contrarium est patienti, vel formaliter vt calidum frigido, & reliqua omnia quorum est mutua inter se actio , passioque; vel potentialiter , vt frigori lux, quæ calorem excitat. At neutra contrarietas inter species imaginabiles, & res imaginatas intercedit; non formalis, species enim sunt simplices, res fascinandæ sunt compositæ, ideoque non in eadem communicant materia: non etiam potentialis, quia species imaginabiles à corpore imaginantis migrare in alium nullomodo possunt.

Rursus maior vis est agentis in propinquum quàm in distans contrarium (aliàs infinitæ essent actiones) Ergò imaginantem potius, quàm distantem aliquem imaginatio fascinaret.

Insuper agens & patiens debent communicare in materia. Iam si species imaginabiles cum corpore fascinando communicent, ab illo vicissim fascinabuntur; si vero non communicent, non agent in illud, neque fascinabunt. Item omnis
actio

actio est aut formalis, ut ignis calefactio: aut potentialis, ut seminis procreatio: aut in eminentia, ut solis in res omnes sublunares: atqui specierum imaginabilium nulla huiusmodi est actio, visque ad agendum in res externas: quapropter nec eas fascinant.

Denique certior est ars imaginatione vaga, & instabili: at ars agere non potest sine instrumentis, imò ne corpora quidem cœlestia sine motu & lumine. Ergo imaginatio sine instrumentis, quæ nulla omninò esse probauimus, corpus externum nullomodo permouebit. Aristot. sane libr. de motu animal. cap. 7. Sensus alterat (inquit) imaginatio, & intellectus. Verumtamen, quo ad sensus, alterant quidem corpora propria gustus, & tactus: à quibus reales species obiecto rû alitioni, & vitæ necessariæ excipiuntur: cui vterque sensus præcipuè, sicuti & olfactus inseruit. Visus autem & auditus, qui cognitioni soli seruiūt, intentionales tantum rerum species recipiunt, quæ corpora non alterant. Imaginationem autem & intellectus per accidens alterare potest, quatenus species rerum tristium, vel iucundarum tractat, unde appetitus, caloris & spiritus motus varij cōcitantur, cuius propria alteratio est. Quòd si imaginatio res alteraret, res ipsa esset intus, quam temere foris prosequatur aut fugiat imaginans homo: essetque omnis auarus Midas quidam totus aureus: ob vehementem auri sitim & imaginationem.

Falsæ sunt igitur alienorum corporum à lamiarum, magorumque imaginatione, quæ vulgò creduntur alterationes, & fascinationes: falsaque co-

eorundem producta testimonia. Quorum primum est medicorum erga salutem egrotantium potentia: non enim agris vehemens medicorum desiderium, sed eximia quædam potius opinio de eorundem fide, industria, & beneuolentia agris salutem conciliat, dum eorundem remediis libentius utuntur, & consiliis obsequuntur: vel certè excitatus optima spe calor nativus humores noxios validius percoquit, expellitque.

Falsum quoque est alterū argumentū de similitudine liberorum, in sexu & facie cū imaginationibus matrum, siquidem illa quæ sexus est, è seminis temperie, quæ verò faciei, ex eiusdem proprietate ferè semper oritur. Inde fit ut cæcæ sceminæ similes patribus quos nunquam conspexerunt. & pleræque bene oculatæ auis, atavis, & proavis liberos enitantur similes non vultu tantum, sed moribus etiam, colore, odioque, & amore quorundam ciborum, ut vini, casei, lactis. Quod si quando ab attenta longaque matris cogitatione alienus character fœtui inuritur; non tamen propterea extra matris corpus inustus videtur, cū eodem spiritu fœta, fœtusque fruuntur, & iisdem facultatibus sustineantur.

Simile est apud Gal. lib. de theriaca ad Pison. sceminæ Romanæ exemplum ex deformi patre formosissimum puerum ob diutinum picturæ pulchræ intuitum, enixę. Simile est in eadem gente sceminę alterius ex albo patre æthiopę parentis. Simile est in Bibliis illud de grege Iacob ex albo, & viridi colore variegato, ob virgarum similiū intuitum potionis & coitus tempore. Simile denique fuit apud Aegyptios de boue maculis albis candentibus insigni, quem

quem illi (Apis nomine) tanquam propitium Deum colebant, Augustin. lib 18. de ciuit. Dei auctore. Censet autem pius vir ille vaccæ coëunti, concipientique effigiem talem similis propagandæ proli causa, ut idololatriæ occasio esset, obtrudi à dæmone consueuisse.

Nimirum imaginatio, & procreatio variarum quidem animæ facultatum (sentientis & naturalis) partiumque diuersarum (cerebri & genitalium) sed tamen vnius animæ, eiusdemque subiecti functiones sunt; ideoque propriis actionibus & passionibus mutuas operas conferunt, suæque instrumenta ad agendum inuicem exsuscitant. Hinc alio oscitante, meiente, lugente, ridente, oscitamus, meimus, lugemus, ridemus: sicuti bibente alio & comedente esurimus & sitimus. Hinc præstantis mulieris formæ cogitatione, tentigo, sicuti semine redundante libido accenditur.

Anima autem sensitiva corporis commercio nunquam carere, nihilque sine illius ope agere patitur potest (cùm anima rationalis sola multa comprehendat & iudicet singularia, & coniuncta) ideoque non anima bouis, sed bos ipse sentit. Porro sentiens & cognoscens ipsa anima dum rerum omnium species vna cum corpore concipit, fit quodammodo omnia; sicuti corpus ipsum quodammodo simile ei quod cognoscitur, idque secundum partes etiam corporeas, non tamen corporaliter, & quâ materiales sunt (neque enim oues aspicientes variegatas virgas variegatæ cernentibus videbatur) sed formaliter siue spiritualiter, utque sunt instrumenta sensuum quibus cognoscit.

Itaque cùm animal actu cognoscens formaliter

fit simile ei quod cognoscitur : quod autem gignit sibi simile reponat ; sanè quod cogitat & generat simul, aliquid ei simile quod cogitatur gignere potest. Hæc autem impressio imaginationis in edendo fœtu multò magis ipso coitus fervore, & libidinis æstu, quam conformationis accidit, cùm generator sibi simile generet, non qui fuit, aut futurus est, sed qui nunc est. Neque enim in toto coitu ita impeditæ sunt facultates omnes, quin imaginatrix sedulò aliquid apprehendat, sed in ipsa tantùm seminis emissionem languent : fit tamen ut ipso conformationis tempore gravidæ matres rerum quas execratæ sunt, formidarunt, aut vehementius appetiuerunt notis, fœtus suos insigant.

Quare absurdum etiam est gallinarum exemplum pullos similes coloribus obiectorum pannorum excludentium : illæ enim incubantes non formam ovium, sed fecunditatem largiuntur excitato calore nativo : ideoque ex variarum volucrum ovium pullos varii generis excludunt. Eadem vis moderati caloris in fornace. Eadem ratione cuniculi & pulli colorem mutant, si capite fœminæ velatæ pannis coloratis ipsa à mare ineatur.

Est autem imaginationis vis maxima, cùm uterque parentum eidem cogitationi vacat : præsertim matutino tempore, cùm cibo & semine per cibum concocto corpus alacrius & robustius, & cerebrum absumptis vaporibus vacuum est.

Matutinum enim tempus verno ; meridianum, æstivo : vespertinum autumnali ; nocturnum hyemali simile. Hæc enim diei partitio & anni ex duplici solis motu est, ex proprio, & eo qui raptus dicitur.

Hactenus

Hactenus Lamiarum, Magorumque instrumentum vnum conuulsum omninò est, omnisque fascinatoria facultas facinorosa eorum imaginationi Peripatetica disputatione nostra adempta est. Quam si veram esse fateamur, vt sine dubio vera est, falsæ quoque sint oportet humanorum corporum in brutorum, & plantarum corpora, vt Vlyssis sociorum in fues; Mœris in lupum; Apuleij in asinum; D. Augustini viatorum in asinos; Actæonis in ceruum: Ius in vaccam; Calyptas in vrsam; Hecubæ in catulam; denique complures aliæ poetarum versibus celebratæ metamorphoses.

Nam si propriis officiis & muneribus animalium corpora, partesque singulæ conuenientem figuræ, magnitudinis, & temperiei apparatus fortitæ sunt; sine quo delirent, & insaniant, nihilque omnino, aut nisi peruersè agant; quomodo in lupino, canino, asinino, aliorumque brutorum corpore anima humana ratiocinetur? Neque enim animæ ipsius in belluinam mutatio magicis artibus & incantamenti affingenda est; Hæc Dei vnus singulari & absolutæ potentia, qua rerum naturas inuertit, non tamen ordinariæ propria est, vt cum Nabuchodonosor regem in bouem: Loth uxorem in salis statuum commutauit.

Quare si quibus propriæ formæ mutatio vnquam persuasa sit, istorum mentis error fuit ab ægritudine aliqua melancholica perturbatæ; vt Lycanthroporum, & rabiosorum; ex quibus illi quòd se lupos putent, hominum consuetudinem fugiunt, sylvas, & speluncas prosequuntur; obuios denique homines, & pecora dilacerant.

Tales sunt apud Septentrionales populos permulti: hi canum more mordent, latrantque, tametsi eorum species externæ à naturalibus, & pristinis non degenerarint.

Quòd si sanis etiam, neque desipientibus conversio eiusmodi foris videatur, dæmonis istæ sunt præstigiæ, fraudes, & ludificatio lamiis, magisque singulariter expetita: vt sub alienis, catorum, canumque & aliorum brutorum formis possint impunè saluti humanæ insidiari.

Reliquæ metamorphoses, quæ leguntur, commēta sunt aut fabulosissima, aut certè allegorica ad hominum insipientium & improborum belluinos mores carpendum. Fuit enim quoddam philosophandi genus cum per fictas fabulas aliud significarent antiqui: quo vsi sunt Æsopus, Cyprius Lybicus, multique tum poëtæ, tum philosophi. Hęc tamen à posteris incautè, nimiumq; simpliciter accepta sunt, quasi sine vlla figura vulgarētur. Hinc creditum à multis est Castori eam insitam esse naturā, vt sibi testes præcidat, vt illis in sequentes venatores proiectis, incolumis euadat: & serpentibus vt aures sibi obturent, ne vocem incantatoris exaudiant: sed potiùs Castoris nomine homo prudens significatur, qui imminente naufragio, fortunarum suarum omnium iacturam facit spontaneam. Et serpentum nomine homines designantur intemperantes, qui salubria vitæ sanctioris consilia repudient.

Hinc denique fortasse etiam Pythagoreorum metempsychosis orta est, vt homines metu territi animarum suarum migrationis in vilissima quædam bruta, iustam, piamque & innocentem vitam

tam colerent.

De fascinatrice magorum visione.

Secundum Magorum instrumentum est visus: cum enim oculi ministri sint animi: inuidi, & malefici radijs suis & spiritib. vitiosa qualitate imbutis obuia hominum, brutorum, & plantarū corpora posse fascinare putantur. Talem scribunt visionem fuisse mulierum Ponticarum, quibus in altero oculo duplex pupilla fuit, aut figura equi impressa: quarum etiam corpora immersabilia fuisse proditum est. Hac oculorum vi à basilisco aspectos homines necari: à gallo gallinaceo leonem terreri, & ab ariete elephantem: à lupo rabiem contrahi: à testudine oua foueri & pullos excludi: à menstruosa muliere speculum inquinari: ab aue galgulo auriginem sanari: ab ophthalmico sanū inficere: ab aspectu formosæ mulieris insanum amorem accendi credunt, vt Phyllidis erga Demophoontem filium Thesei: vt Iphidis erga Anaxaretam: Byblidos erga fratrem: vt Antiochi regij filij erga nouercam Stratonicein.

Sed hæc omnia facile est refutare: & fascinationē visoriam & exempla proposita. Primū enim visus non vt videndi facultas, neque vt visoriæ facultatis actio, neque denique vt obiectum i. color, fascinare quemquam potest. Colorem enim in se recipit: vel eius imaginem, à quo illustriori, nimisque fulgido læditur potius quàm lædat. Visio autem, actio est manens tantū quamdiu sit: vbi definit fieri definit esse, neque in aliud corpus transit quod fascinet: facultas quoque visoria si

actiua fingatur, species visiles in seipsa reconditi,
 sin passiuæ, colores obiectos recipit, non alte-
 rat. Quare externum corpus non fascinat visio.
 Deinde visio nulla radiorum & spirituum emis-
 sione in rem videndam constat. Sic enim in te-
 nebris, vt in luce visilia viderentur obiecta,
 sufficiente ad hoc oculi luce interiori: neque o-
 culus membranis egeret ad spirituum exitum co-
 hibendum, neque vicina magis quàm distan-
 tia cernerentur, aut celerius, quia vtrisque lux
 interna oculi æqualiter conueniret. Adde quod
 per ventos, & tempestates turbatis spiritibus vi-
 sio turbaretur: Neque tantuli radij ingentem re-
 rum molem complecti, neque repente in cælum,
 & in res distantes æqualiter, vt in vicinas efferri
 possent. Sed insuper assidua illa radiorum & spiri-
 tuum eiectione visio citissimè desineret, refrigera-
 tis scilicet oculis, neque lux solis, neque candor ni-
 uis oculos occæcaret. Sed & reliqui sensus recipien-
 do propria obiecta, non emittendo radios aut
 spiritus fiunt. Denique si exeant ab oculis radij,
 aut spiritus, quo duce in rem videndam vehan-
 tur, quaque via colores visiles ad oculos reuehen-
 tur? Videntur quidem colores varij in tenebris ab
 imaginatione rerum diutius cōspectarum. Lignum
 putre, & boleti, & vermes quidam nocti lucæ cer-
 nuntur quoque in tenebris densissimis ob lucem
 emicantem ex debili quodam calore in putri li-
 gnorum humiditate. Inest etiam in oculis lux
 proxima quæque collustrans, maximè si lucis &
 spiritus adsit plurimum: vt in animalculis præ-
 dictis quæ sua luce loca proxima illustant, vt in
 obscurissimis tenebris cerni possint. Idem proditum

tum est de Mario , & Tiberio Cæsare : quorum oculi micantes noctu cernebantur cominus , & cernebant. Tales sunt aues quædam noctu videntes , vt nocturæ ; tales sunt felles ob splendentem oculorum substantiam igneam , aqueamque qua proxima quæque vident , lucis oculorum adiumento , non tamen eminus.

Quare exempla visoriæ fascinationis abeant. Basiliscus non visu , sed maligno halitu necat. Gallus gallinaceus leonem , aries elephantem , antipathia terret. Lupus raucedinem vel ob timorem & vociferationem , vel ob putrem anhelitum inducit. Testudo oua vel obseruat ne abducantur , videndo : aut fouet halitu : sicuti serpentum oua solus terræ calor fouet & excludit.

Menstruata mulier specula inficit non spiritibus visoriis, sed vaporibus & halitu. Sic lippitudo vaporibus putribus inducitur. Amor conficit amantes & extenuat, non spiritibus receptis amatæ , sed effigie eius recepta : eiusque vehementi imaginatione. Aureolus non haurit icterû. Quod si maleficarum aspectu pueri lædantur , id vel à contagione vel à timore præ deformitate vetulæ : aut à dæmonia facultate est, qua segetes etiam, iumenta, plantæ lædi solent : sicuti S. Thom. 3. ad Galat. ex quibusdam fascinatoribus audisse se testatur, dæmones per oculos maleficorum lædere solitos. Cui sententiæ Basilii Magn. in homil. de Inuidia assentitur, ita vt morbi illi per visum illati , si non contagiosi : saltem vel dæmonij, vel diabolici habendi sint.

De lamiarum fascicante tactu.

VLtimum Lamiarum instrumentum tactus est, quo se nocere vitæ, & sanitati alienæ falsò putant, idque vel immediate, vel mediate, dum vapor vitiosus ex fascinatricis corpore in fascinati cor proxime exceptus, inde in habitum per arteriarum pulsationem transfertur: vel, dum ex aëre contiguo in quem teter vapor expiratus est, intrò rapitur inspirando, transpirandoque. Cæterum tactus fascinare non potest, neque ut facultas tactrix, quæ è cerebro nascitur, in quo nulla fascinandi vis, nisi forte à prava imaginatione spiritus tactorij falsò inquinari fingantur: aut etiam foras in externum corpus excludi: neque ut obiectum tactus, quod qualitates sunt primæ & secundæ, quæ si etiam cum voluptate excipiantur, habitumque diffundant, & laxent, vaporemque emittant, aut admittant, nullomodò tamen fascinât. Vapor enim ille, si imputris, & incorruptus est, à fascino abhorret: si putris, contagiosus est, non fascinatorius, & certis tantum animalium speciebus, ætatibus, partibus, & sexui noxius, ut de lipitudine, phthoe, & peste constat: cùm vis fascinatoria quæcumque tangit corruptibilia corrumpat. Neque etiam tactus fascinare poterit propter instrumentum tangendi: non enim cutis temperatissima, non vlla pars similis, non cor vitæ fons, non cerebrum, hoc faciat. Nec rursus transpiratio excrementorum, cùm infantes maximè excrementitij nutrices tamen suas non fascinant. Non adolescentes, & iuvenes excrementis vacui: non denique senes excrementosi. Homines igitur nulla corporis sui parte,
aut æ-

aut ætate fascinare, sed sola aliquando contagione nocere possunt. Quare omnis quæ tactu lamiarum repentina noxa, aut mors superuenit, dæmonis est earum tactu ex pacto abutentis: aut saltem à venenis quibusdam, & medicamentis arte diabolica præparatis; quæ contactu non solum immediato, sed mediato etiam & longiori grassari solent, Cuiusmodi solent condi sub limine, aut supra limen, aut in via, per quam progressuri sunt greges: aut spargi per agros & pascua; aut affricari sellis equorum & frænis: cibus etiam aliquando miscentur sensim nocitura.

Sic ergo exempla euaporationis, & noxarum inde contractarum exponenda sunt. Quod autem torpedinis contactus membra piscatoris per contum longiorem stupefaciat, verum id quidem est, sed physicum est, ob antipatheiam scilicet. Serpentis occisi virus apud Auicennam secundum lanceam militem enervauit: id quoque physicum est, & venenum.

Quidam tactu maleficæ protinus resolvuntur: hoc metaphysicum, & diabolicum est; aut saltem veneficium diabolicum. Hyenæ contactu canes obmutescunt. Fortasse ex terrore, aut antipatheia: qualis etiam est leonis & galli; arietis & elephantis: Serpentes necari creduntur tactu folij quercini, & fraxini: physicum id est & venenum.

Serpentes sistuntur obiecta ibidis pluma: requiritur experimentum, potestque tamen esse physica antipatheia. Vipera percussa virgis faginis protinus torpet: fortasse spina fracta à virgis tenuibus, & corilorum virgaltis. Capra depasta car-

duum capitatum totum gregem sistit: hoc fortasse fabulosum est, aut dicendū vapore grato masticati cardui gregem allici. Echeneis pisciculus remoratur nauem quamlibet grauem, & ventis impulsam: physicum id est. Magnetis tactu ferrum illitum torquetur semper ad polum: physicum id est, & per sympathiam. Plumæ aquilarum contactu reliquas auium plumas tabefaciunt, physicum est, & ex antipatheia. Ophyogenes in Hellesponto solo tactu morsibus serpentum medebantur: suctu enim extrahebant venenatam saliuam è vulnere. Psylli, Marisque solo odore serpentes necabant: hoc ex veneno, quod in diuerso genere animalium crebrum est, & sic hominis saliuam viperam necat. Pulsata citharæ quædam chorda eandem chordam alterius citharæ resonare cogit: id fit ab eodem aeris contigui pulsu, & modò pariter tensa atque proximè admota sit. Sic pulsata chorda lupina rumpuntur agninæ: sed ob antipatheiam, estque physicum. Ruta brassicam necat: quia subducit alimentum validiori tractu & calore. Sic denique homicidæ contactu sanguis manat è cadauere hominis recens occisi: physicum fortasse hoc est, & ob antipatheiam: vel certè fit vi facultatis animæ sensitivæ, & vitalis post discessum animæ rationalis tantisper residuæ, dum calor naturalis omninò exhalet: vel fortasse quòd homicida vellicando vulnus digito sanguinem exprimat.

De falsis verborum viribus.

PRæcipuum & frequentissimū Magicæ fascinationis instrumentū vox habetur & oratio, cuius vim

vim tum ex causis & origine, tum ex effectibus & monstrosis operibus demonstrant. Inquiunt enim vocem & orationem, vim suam accipere vel à corde, ex quo materia vocis, quæ exsufflatio est, vehemensque & copiosa spiritus in vocalia organa, ut asperam arteriam & laryngem, exclusio emissioque: vel à prava imaginatione, hostilique voluntate incantatoris, eo quod cum habitus corporum, vehementiora animorum *passiones* sequantur, idcirco etiam rerum vehementius expetitarum cogitationi & appetitui respondent: inde est quod ægri ex fide in medicum conualescunt. Addunt etiam vocem vim obtinere ex ipso orationis contextu: vel denique ex astris sub quibus aut voces pronunciantur, aut nati sunt pronunciatores ipsi.

Itaque incantatores & malefici Magi verbis quibusdam vel prophanis, vel barbaris nihilque omnino significantibus, vel diuinis etiam, rerum vires permutari, augeri, infirmari, tandemque obliterari, nouis quibusdam, & alienis conquisitis, affirmant: ut puta astra cœlo detrahi, fulmina elici, ineteora concitari, & profligari, nubes, ventos, pluuias, grandines, fulmina, tonitrua, vnde animalium, & frugum strages miserabilis, morbos denique & sanitatem conciliari, aliaque admirationis plenissima opera præstari: pueros, armenta, pecora, segetes tabescere, lapidari, sternique: humanas formas in alienas brutorum, & plantarum mutari: corpora sua, alienaque in distantissima loca repente exportari: mures, locustas, aliosque vermes ad fruges euocari, & ab iisdem

abigi, serpentes cōgi, fugari, enecari, ideoque ab illis aures obturari ne incantatoris voces audiant, alteram terræ pressu, alteram caudæ immisione. Sic aiunt magum quemdam obmurmuratis in aurem bouis quibusdam verbis, bouem ipsum subito prostrauisse: alios carbones ardentes impunè ingurgitasse: alios ensium mucrones nudis pedibus superasse.

Sic Tusciam Vestalem verborum vi cribro aquam hausisse & longius exportasse, Æmiliam quoque Vestalem innocentiam suam cū de extincto igne sacro accusaretur, lacinia vestis suæ, quam in aram adiuratæ Vestæ proiecerat, sponte sua exardescere probasse: Vestales quoque alias fugitiuos plerosque seruos in vrbe remoratas esse. Eadem denique vi verborum amorem, & odium inflammari volunt. Quid quod verborum eandem vim magi ipsi confirmant medicorum nobilissimorum auctoritate, quos vt pharmacis, ita verbis non solum pronuntiatis, sed alligatis etiam & suspensis morbos debellare constat. Sicut legere est apud Plin. libr. 28. c. 2. Cato prodidit luxatis membris carmen auxiliari. M. Varro prodagris. Theophrastus ischiadicis. Eadem vi verborum manantem olim è vulnere Vlyssis sanguinem à filiis Autolyçi suppressum fuisse legimus. Eadem vi vulnera prope omnia hodie quoque persanari, & spicula ex ossibus euelli absentium & ignotissimorum hominum constat, & quosdam, ense quo vulnerarunt, eodem ægros sanare, cūque illum attollunt, & digitis fricant, dolorem leuari: sicuti cū deprimunt, exacerbari. Cardanus certas verborum formulas describit Homericæ

ricæ curationis similes, quibus ter recitatis hæ-
morrhagia quælibet cohibeatur.

Sanguis mane in te, sicuti Christus fecit in se:

Sang. mane in tua vena, sicuti Christus in sua pœna:

Sang. mane fixus, sicuti Christus fuit crucifixus.

Aëtius lib. 8. c. 50. os faucibus infixum & pertina-
citer hærens huius carminis vi educit.

*Egredere os, sitamen os, aut festuca, aut quicquid
tandem existis, quemadmodum Iesus Christus
Lazarum è sepulchro eduxit, & Ionam ex
ceto.*

Trallian. lib. 9. c. 4. asserit Galenum seniore In-
cantationum vires, quas iunior spreuisset, maxi-
mas tamen evidentissimis exemplis comprobasse.
Idem quoque de seipso ibid. subiicit: Si Galeno
& veterum medicorum plerisque probetur vsus
characterum, annulorum, & verborum, quid
vetat nos quoque quæ probauimus & vera com-
perimus, & ab amicis accepimus in vulgus ef-
ferre? Multa equidem habeo occulta remedia ad
frangendum lapidem, sed nullum est par Annulo
ex Cyprio ære. Cuius conficiendi modum eodem
loco legas.

Q. Serenus vocem hanc barbaram (Abracadabra)
in charta scriptam, linoque inclusam, & collo ap-
pensam hemitritæum curare ait.

Apud Plin. etiam pronunciata vna vocula (Duo)
visi scorpionis impetus comprimitur, ne ictum
vibrare possit.

M. quoque Seruil. senator Rom. lippitudinem
diuturnam literis duabus (Ϟ) & (α) collo circum-
ligatis cohibuit.

Quidni igitur naturales verborum vires curan-

dis quibusdam morbis salutare esse fateamur? Nam si verba quædam sint noxia & lethalia, quales parentum imprecationes sæpe fuisse comper- tum est, cur quædam etiam salutaria nō esse puten- tur? Hinc enim sternutanti bene ominari sole- mus: & amicis ad Calend. Ianuar. fausta om- nia vicissim precamur. Sed insuper istæ verbo- rum vires ex eo confirmari videntur, quod Ec- clesiæ auctoritas exorcistas iubet certis verborum formulis dæmonas è corporibus obsessis fuga- re. Nec mirum id quidem est si efficiendi vis a- liqua verbis tributa esse videatur, cum verba naturam sortita sint, rerum viribus affinem, præsertim Hebræa ab Adamo imposita. Iure itaque Magi, & Lamiæ, & Cābalistæ Iudæi, Incan- ratores malefici eximios & singulares verborum effectus promittere videntur.

Sed enim ratiunculas istas de facultate verborum, vique carminum, & incantationum effectiua veris- simis argumentis improbari posse, ipsaque facul- tatis eiusdem proposita exempla confutari facile posse arbitror.

Primum enim facultatem eiusmodi neque à syderibus delibatam: neque ab imaginatione quamlibet vehementi: neque ab imaginantis visceribus ut cerebro, & corde, totoque corpo- re deriuari posse clarissimè est antea demon- stratum.

Deinde nullam facultatis huiusce causam, neque naturalem & efficientem: neque forma- lem: neque finalem: neque instrumentariam esse constat. Vox scil. aut articulata est, ut homi- nis: aut inarticulata, ut bouis: illius finis triplex,
tum

tam mentis & consilij nostri explicatio, quod aliis notum esse volumus: impetratio boni alicuius: & prohibitio mali, idque vel ab hominis, vel numinis alicuius ope.

Porro verborum facultas nulla est à natura, cum naturalia ipsa non sint: Alioqui enim eadem essent apud omnes gentes: essentque omnes homines vel vnus tantum sermonis innati: vel duplicis, insiti à natura, & adscititij à doctrina; & vsu: surdi etiam loquerentur: neque imponerentur rebus nomina pro hominum arbitrio, Neque idiomatica mutari contingeret, vt quæ olim celebria fuerant nunc omnino vilescant, soliusque scripturæ beneficio significationem suam antiquam antiqua verba permulta retinerent: non essent rebus creatis quam primum à Deo imposita nomina. Insuper verborum partes, literæ scilicet & syllabæ, essent quoque naturales, & quantitas contra omnem philosophiam actiuum principium statueretur, cum sit oratio quantitas numerosa: actio etiam naturalis esset inter ea, quorum non est materia communis, vt verborum & corporum viuientium. Denique naturalis actio fieret sine contactu agentis, aut qualitatis eiusdem, aut virtutis cum passio, cum verba res disiunctas non tangant. Iam vero nec à formâ sua actiuam vim consequuntur ipsa verba. Illa enim est articulatio, quæ nihil præstat, nisi quod conceptus nostros exprimit, quemadmodum digitorum gesticulatio & aliquando oculorum. Atque vt ex hac nemo intelligat cur illa huius vel illius rei nota sit, nisi inter quos de nota cuiusque rei conuenit,

ita nemo quomodocunque loquatur, nisi ab ipsius sermonis perito intelligatur. Ideoque neque Gallus Hispanum, aut hic Germanum, sicuti neque Græcus Latinum, aut alium intelligat sine doctrina vsuque sermonis eiusdem.

Tametsi igitur loqui homini sit naturale, vt ipsa linguæ conformatio indicat, ipsa tamen idiomata hominum arbitrio & consensione constant & significant, cùm loqui nihil aliud sit, quàm certis linguæ motibus mentem detegere. Seruantur a. res ab iisdem causis, à quibus procreatæ sunt: Verborum ergo significationes non ex natura, sed ex voluntate vtentium aut sordescunt, aut negliguntur, aut excoluntur, nullumque verbis ipsis cum rebus significatis est naturæ commercium & similitudo, cùm illa tantùm sint aër quodammodo à lingua diuerberatus: ideóque hæc verba has res, illa illas ex hominum arbitrio solo insinuant.

Denique si verba vim habrent aliam, quam significatiuam, omnis omnium hominum sermo semper verus esset, semperque rebus significatis responderet, omninoque res quælibet propter affirmationem vel negationem nostram aut falsa aut vera esset.

Porro actiuam vim verbis impertiri propria eorum materia non potest, quæ spiritus est è corde in asperam arteriam & laryngem copiosè & vehementer excussus: variant enim tantùm ob sanguinis, spirituum & symptomatum animi, & instrumentorum vocalium varietatem, vnde eundem sermonem omnium hominum esse contingeret; tantumque in leuitate, asperitate, grauitate,

grauitate, tenuitate, & similibus discrimen esset. Ipsa denique instrumenta verbis, agendi vim nullam conferunt: si enim totus thorax, tum maxime pulmo, aspera arteria, larynx: noxiam quandam vim expirant, ut in phthisicis, ea contagiosa, non fascinatoria est. Quare incantatio omnis aut falsa est, dum ea quæ non fiunt, fieri tamen delusa plebecula sibi persuadet: vel impia penitus & dæmoniaca, cum auctore dæmone stupenda eduntur opera, nullaque omnino incantationi, miraculi aut fascinationis per se facultas tribuenda est, ut serpentes, lupos, ratos tardandi, euocandi, fugandi: morbum, sanitatem, abortum prouocandi: coniugij iura prohibendi: tauri, aut equi ad certam arborem, ut ficum, domandi; sed dæmoniaca facultas eiusmodi habenda est. Itaque hanc de vi verborum credulitatem irridet Ouid.

Nec media Marsis finduntur cantibus angues:

Nec credit in fontes unda supina suos.

Athenienses quoque mulierculam ex verbis medentem edicto lapidarunt, omnem medendi artem in plantis, & metallicis constituentes. Irridentur quoque à Gal. lib. 6. de simpl. medic. facultatib. & à Theophrast. l. 9. de hist. plant. & à Pericle, à Caracalla Imperatore febrium curatores ex verbis condemnantur.

Medici quoque docti incantationem morborum curationibus sæpe profuisse senserunt, non tamen ob propriam eorum efficaciam, sed ægrorum potius stultam credulitatem, & confidentiam, qua natiuus eorum calor, i. natura morborum medicatrix roboratur.

Quod si absentibus etiam verba prodesse comper-
tum sit, id verò ex dæmoniaca fraude & facultate
est, dæmonibus hoc verborum prætextu maleficos
magos fallentibus, quibuscum vel apertum, vel
tacitum pactum habent. Eiusmodi fuit ranarum, &
serpentum per magos Pharaonis productio à dæ-
monis præstigiis, non verborum aut carminum ef-
ficacia inductarum.

Itaque incantationes omnes prohibentur tum
à Deo ipso Leuit. capite vigesimo, & Deuteronom.
capite vigesimo, octauo & Esaïæ capite quadra-
gesimo septimo: & ab aliis quoque sacris aut ho-
ribus, ut D. Augustin. l. 7. in Euangel. Ioannis.

Quod autem exorcistarum concepta verba
quædam dæmones fugare videantur; non ob eo-
rum naturam propriumque sonum, aut descri-
ptionem, sed ex Dei nutu verborum significationem
adiuuantis. Sic venerabile nomen (Iesu) non ob ma-
teriam, sed ob significationem suam saluatoris, a d
omnia pia, iustaque opera efficacissimum est.

Quod si imprecationes parentum propriis
liberis nocuisse contigit; aut ex liberorum ipso-
rum terrore, aut ex diuino nutu noxa orta est.

Si horis matutinis diurnam, Cal. Ian. an-
nuam salutem amicis deprecamur: si denique
iisdem sternutantibus, ægrotantibus, & quod-
uis negotium aggredientibus bene ominari con-
sueuimus; non sane à verbis nostris, sed ab vno
Deo ominis exitum secundum expectamus.

Si piorum hominum iustis ad Deum precibus
vermes, locustæ, tempestates, & pestes propulsari,
arcerique videantur: numinis rogati, non verbi hu-
mani, ista vis est.

Fulmina,

Fulmina, fulgura, tonitrua, venti, turbines, pluviae, niues, grandines, omniaque meteora, naturæ sunt opera. Quod si quando, naturæ quasi-repto suo iure, magico quodam carmine obmurmurato flagitiosorum hominum votis quasi respondeant, nonne dæmonibus potius, quàm magicæ incantationi id ipsum tribuamus? At ab illis meteororum materia arbitrata suo versari solet. Sic Haquinus rex Noruegiæ Danorum exercitum grandine & imbre oppressit. Sic rex Suetiæ Aeoli cuiusdam instar ventorum flatus regebat. Sic quidam ex eadem gente magi mercatoribus ventos vendebant apud Holum Magnum.

Num arbitremur homines dæmonum potius astu, quàm verborum vi in alienas brutorum species mutari? Falsæ tamen sunt illæ: verè enim Aristoteles in Metaphys. non à simplicib⁹ formis physicas, sed à mixtis in materia excitari posse disputat.

Itaque neque verba, neque sydera, neque dæmones ipsi corporum physicas formas, nisi fictè & verisimiliter transmutent, ut est paulò antea à nobis disputatum. Cùm enim rerum naturalium vires, effectus, & causas exquisitè calleant, promptissime easdem colligunt ex omnibus orbis partibus, & ad fictitias formas quaslibet accommodant. Sic per Pythonissam necromanticam Samuellem exhibuerunt prophetam: sic socios Diomedis, in aues; Vlyssis, in fues: Arcades in lupos, mutarunt. Vera tamen est aliquando physicæ formæ in alienam mutatio, ita iubente Deo, ut vxoris Loth in statuam salis. An rursus suspicemur, Magorum, Strygumque corpora tam

longè, tamque celeriter vi verborum, non dæmonum, transferri? Cùm enim corporeæ substantiæ simplicibus & incorporeis naturis pareant (teste Augustin. 3. de Trinit.) sintque dæmonum, vt Angelorum simplices naturæ, cur impuros magos sagasque in motu locali (permittente Deo) sibi parere, vt eorum corpora quocumque velit portet, exportet, traducat, versetque? At hoc ipsum de Simone Mago, Circe, Medea, Canidia, Tyridate olim proditum est. Sed & nostris quoque temporibus in plurimis impietatis magicæ cultoribus comprobatum fuit.

Verba ergo, & Carmina in tollendis per ærem corporibus vsurpari solita, symbola sunt pacti inter Magos & dæmonas quibus sollicitantur (illi tamen etiam turbatis dormientium mentibus impurissimis quidquid vigilantes optarint quorundam vaguentorum, suffituum, & herbarum viribus se per somnum præstitisse facillime persuadent) Nam neque verba etiam diuina, neque prophana quæcumque ore sacrilego obmurmurare possint, vlla miraculorum facultate pollent. Peccantque impiæ eorum preces tum in materia, cùm res iniusta naturæque iuribus contraria, & Deo odiosa petatur: tum in forma, cùm plura verba, quàm rerum intelligentiam æstiment. Tales sunt preces, & verba & barbara colligendis herbis insusurrata: quarum tamen vii à prima rerum creatione Deus nunquam mutauit. Talia sunt & Euangelia ipsa collo obligata ad ægritudinum curationem, aut præcautionem.

De amuletis & periaptis.

AMuleta & Periapta remediorum species est aduer-

aduersus fascinum propriè, & veneficium ex Sortilegiis vsurpari solita. Sed ad Medicinam etiam morbosq; curandos, & præcauendos pertinet. Amuleta vocata sunt à vi amoliendorum & depellendorum venenorum. Periaptra ab vsu, quod partibus quibusdam corporis, vt collo, carpisque alligari soleant. Sunt a. duplicia, physica, & metaphysica: hæc inanib, quibusdam verbis prophanis, sacrilegæ, aut diabolicis etiam nominibus constant, intermixto etiam ad tegendam dæmonis fraudem, venerabili nomine Iesu, Augustin. test. in euang. Ioan. tract. 7.

Est enim genus hoc magorum & maleficorum hominum impium, & sacrilegum: ideoque bonis omnibus medicis authore Gal. respuendum: à quo præcipitur libro sexto & decimo de simplic. medic. facultat. sic medicamentis esse confidendum vt eorum substantia, non incantatorum verba iuuare credantur. A Theophrasto etiam de hist. plantarum absurda putantur quæcumque alligata corporibus, ædibusque, singulariter opitulari iactantur. Sic ab Antonio Caracalla Imperatore authores periaptotum ad febres intermittentes reprimendas, condemnati sunt. Sic à Pericle Atheniense iidem contempti, quem à morbo graui vbi conualuisset stultitiæ suæ apud amicos palam puduisse refert Plutarch. quod sæuientibus morbi symptomatis sibi ab agyrtis, & circulatoribus appendi remedia, alligarique passus esset.

Itaque ex circumforaneis qui versutissimi sunt, Amuleta sua magica à contumacibus morbis, & acutissimis febribus remouent: eaque mitioribus

& brevioribus, ut & intermittentibus, idque immi-
nente solutione admovent. Quòd si adhibitis a-
muletis, omiffisq; artis auxiliis morbi quidam per-
curentur, non ea quidem curatio amuletorū est, fed
aut robustæ naturæ leuiorem morbum discutientis,
aut ægrorum confidentiæ : aut certe cacodæ-
monis.

Hinc Theologorum decretis repudiari & inter-
dici pijs omnibus iure solent : præsertim cū ver-
bis omnibus siue prolatis siue descriptis effi-
ciendi vim aliam, præter significationem rerum
quarum sunt symbola, nullam Deus conces-
serit.

Alterum genus amuletorum & periaptorum
naturale est, constatque physicis remediis, eorun-
demque manifestis, vel occultis facultatibus. Cū
enim physicæ formæ sint duplices, anima, &
natura, propriis facultatibus instructæ, vtraque
species in animatis præclara est: sicuti in inani-
matis altera, natura scilicet. Animæ facultates
sunt procreatrix, auctrix, motrix, sensitiva,
& motiua: quæ indefinitæ sunt & sæpe contra-
riæ. Naturalium facultatum ex origine genus
bipertitum est. Vnum est manifestarum, alte-
rum occultarum: illæ ex temperamento, pri-
marumque qualitatū elementarium mixtione
emergunt: quæ quod sensu internoscantur ea-
rum alterationes, possintque earum effectus ex-
plicari ex qualitate vincente, manifestæ idcirco
vocitantur. Occultæ ex mixti forma prodeunt
& tanquam riuuli ex fonte emanant, quæ forma
rursus ex propriarum cuiusque elementi formarum
vnione pullulat: ideoque occultæ facultates
nuncu-

nuncupantur, quarum causa incognita, inexplicabilis, indemonstrabilis, nulloque sensu perceptibilis sit, ob ignotam formæ essentiam: tantumque de illis sciri potest τὸ ὅτι, aut ab experientia, sed non διότι. Alias totius substantiæ qualitates, vel proprietates nuncupantur, quia pendent à forma, quæ mixti totam substantiam complet, integrat, & perficit.

Quemadmodum igitur temperamentorum, sic formarum etiam inter se sua similitudo, & dissimilitudo est: quæ Sympatheia, & Antipatheia vocantur in omni rerum genere, siue eodem siue diuerso illustres & perspicuæ.

Sic in plantarum genere sua est inter se antipatheia vitis, & brassicæ: quercus, & oleæ: hederæ, & aliarum arborum, quas complexu suo necat.

Eadem est antipatheia inter venena, quæ sese inuicem obtundunt, & aliquando expellunt sudore, vomitu, deiectione, sicuti per sympathiam quandam sese inuicem attrahunt, ut testudo & salamandra, sublimatum & crystallum, &c. Sic in animalium genere, galli & leonis: elephantis, & arietis, atque suis: icneumonis & crocodyli: elephantis rursus & rhinocerotis: cameli & equi: aquilæ, & draconis: cornicum & noctuarum celebratur antipatheia. Neque ea in solis viventibus, sed in mortuis quoque viget.

Sic enim tympanum ex pelle arietina pulsatum raucescit, altero ex pelle lupina resonante. Sic cytharæ chorda lupina arietinam diffringit. Sic plumas

reliquarum auium, permixtæ aquilinæ tabefaciunt. Sic denique cadauer hominis occisi præfente homicida cruentari aliquando solet.

In diuerfo genere antipatheia etiã est, hominis & veneni: aut cibi etiã vtioris alicuius, vt pomi, caſci, vini, &c. Reliqua ſympatheia, & antipatheia exempla apud hiftoricos diſces.

Sunt ergo rerum prope omnium, & medicamentorũ inſitæ facultates duplices, tum naturales & manifeſtæ ex temperamento, & vincente in eodem vel qualitate vna, vel duabus oriundæ, tum phyſicæ & occultæ ex forma & ſubſtantia mixti. Ex naturalibus illis, & manifeſtis facultatibus concinnata amuleta, & periapta propriæ ſubſtantia, vaporis que effluuio inſpirato, tranſpiratoq; interiorem morborum cauſam oppugnare, morboſque ipſos expugnare poſſunt. Sic melanthii ſemē catarrhū: radix & ſemen pœoniæ albę epilepſiam: ſtercus lupi colicos dolores, tollere perhibetur.

Similia ſunt ad febres intermittentes pleraque periapta carpiſ admouenda, quæ vel per ſe & refrigerando: vel per accidens & attrahendo digerendoque putridos vapores ne acceſſionem pariant. Illius generis illud eſt apud Hollerium ex ſoncho, plantag. & ſambuc. æeto ſubactis. Aliud eſt ex fuligine furni, & foliis ſaluia cōfuſis mixtiſque cum oui album. & appoſitis. Simile quoque eſt ex eadem fuligine cum allis, cepis, albumine & germine oui, acetoeque ſubactis.

Sed illa tamen amuleta & periapta ita demum propriis viribus & manifeſtis pollere putanda ſunt, vt ab iis omnis ſuperſtitio, ſuſurri, & aniles preces remoueantur, dum præparantur, colliguntur,

guntur, & vsurpantur.

Alterum genus amuletorum & periaptorū physicis medicamētis constat: quę antipatheia, occultaque proprietate tum contra fascinum, & veneficium ex sortilegio, tum contra morbos pugnanti. Occultam. a. proprietatem Gal. recipit tum lib. 3. de loc. aff. contra Pelopem præceptorem, tum lib. 11. de fac. simpl. vbi ait, Cinerem quidem cancri esse exiccatorium, sed eum tamen substantiæ ratione mirabiliter eos qui à cane rabido morfi sunt iuuare. Idem in lib. 2. de nat. hum. In expirationibus, inquit quæ proprietate substantiæ potius quàm qualitate corpora offendunt, rectè Hippocr. curationē instituit per mutationē loci, & exiguæ spirationis vsū. Porro proprietatē li. 5. de simpl. facult. explicat facultatē nō cōmunē aliis reb⁹: sed propriā alicui substantiæ, per quā aliquid peculiariter agat.

Proprietates autē totius substantiæ dicuntur, quasi nō formæ solius, & temperamenti, quæ forma mixti est: sed materiæ etiam quā mixto peculiariter temperies excitauit. Hinc dicuntur insitæ, & intimæ. Vt enim elemētorum facultates à primo cōditore cōditæ sunt: sic à temperamento mixtis facultates accedunt, non solum manifestæ, sed obscuræ etiam, ex materiæ implexu cum ipsa temperie.

Quare nulli morbi solius formæ statuendi sunt, cum sola neque agere, neque ægrotare possit, sitque incorporea: sed substantiæ totius, id est, formæ & materiæ occulti morbi sunt, ex mixtionis ignorata ratione: cuius tamen principium fuit ipsa temperies. Idcōq; morborū istorū curatio cōtrarietate constat, & qualitatis tametsi sensibilis alteratione.

Ridicula autem est refutatio curationis per anti-

Vu

patheiam medicamentorum. Primum enim etiam si multorum antipatheia obscura est, est tamen quorundam certa: reliquorum multiplici, & accurata experiētia perceptibilis. Deinde ad curationem nō est opus motione locali, aut morbi, aut causæ internæ in superficiem corporis: satis enim ad salutē est si loco suo obtundatur & corrigatur vtrumque. Postremò curatio intemperierū constat quidē alteratione per qualitates cōtrarias & sēsbiles: sed curatio per antipatheiā cōstat qualitativē etiā, sed obscuris, ignotisq; ob mixtionis elementorum incertā rationē. Sunt ergo amuleta & periapta physica efficacia: sed ea non tam lectione, aut ratione quā experiētia probanda esse Gal. indicat c. 5. l. 2. de cōposit. secund. loc. vbi Archigenis amuleta ad cephalalgia instituta aspernatur, tanquā sibi non satis perspecta eorum proprietate, solaque remedia eiusdem recipit, quæ manifesta qualitate eidem profint. Experiētia itaque illa frequens & multiplex sit & eruditi hominis, nec fallacibus vulgi experimentis traducatur.

De philtis.

Fascinandi, nocendique cupiditas duobus potiss. animi symptomatis cōmouetur, amore, & odio: vtrūque ab appetitu animali animæ sensitivæ oritur: ali^{us} enim naturalis, alius rationalis animæ appetitus est, dū illa boni, maliue alicuius antea percepti (ignotum enim & inuisum aliquid vix quisquā aut oderit, aut amet) opinione ducitur, quod vel fugiat, vel persequatur.

Est autem amoris species, vna benevolentia proxima (amicitia dicitur) cū aliquem propriæ virtutis

tis & felicitatis causa amamus : Altera libidini magis affinis est , cum aliquem nostræ voluptatis causa, aut cōmoditatis diligimus. Ex hac specie amoris, si fruamur amato, gaudium, & lætitiā: si careamus, desiderium nascitur. Huius amoris finis est coniunctio, duorumque in vnum (nisi alterius eorū interitus obstet) conuersio, cuius desperatio perditos amatores ad fascinum & pharmacū amatorium trāsfert. Idem quoque inuidorum accommodatissimū instrumentum est, quo inimicos suos perniciosis ægri tudinibus & calamitatibus domesticis clam nemine intelligente & facile opprimant, sicuti deinceps docebitur. Nunc de amore vitioso transigamus.

Porro vtrumque illud animi symptoma (amor, & odium) non alienis tantum, sed suis etiam authoribus pestiferum fascinum est. Vterque. n. ille viciscendi, hic fruendi immodico desiderio flagrans sensim confici & cōtabescere, tandemque morti oppetere aliquando violentam solent.

Hoc mortis genere Phyllidis, Iphidis, Byblidis, Sapphus puellæ, Timagoræ, multorumque aliorum funera ab historicis, & poetis celebrantur.

Est enim vehemens ille amor (*ἔρως* dicitur) nihil aliud, quàm atrabilaria quædam animi desipientis egritudo, pulchritudinis alicuius imagine, & iniqua æstimatione perciti, & perturbati.

Tametsi autē amor ab initio sit voluntarius, omninoque ex arbitrio amantium fluens, multa tamen tum in natura, tum in arte, tum in Magia quæ sita sunt auxilia quæ philtrea amatoria vocantur, quibus vi conciliatur. Enimuero natiua corporis venustas, mundities, nitor, cultus, adolescentia, quan-

tam vim habeat conciliandi amoris, nemo nisi humanitatis & amoris expers dubitet. Philippus Macedon. rex cū Olympię accusaretur quod molliter nimis Indam quandam amaret, producta in publicum, detectaque palam Indæ pulchritudine, en phil:rum inquit. Multò maiorem naturarum sympathēia, ingeniorum morumque similitudo amoris vim ostendit, dum ignotos, aut immeritos, aut deformes etiam amamus. Bene enim poeta:

Non amo te Sabidi: nec possum dicere quare.

Hoc tantum possum dicere, non amo te.

Maximam verò facundia, quæ deformitatem etiam amabilem efficit.

Non formosus erat, sed erat facundus Vlysses.

Omnes porro etiam cordatissimos homines, & Herculem ipsum amoris imperium mancipat. Ideo-que Vlysses Sirenum cantus ne exaudiret aures suas cera obturavit. Diuinissimam denique vim aurea munera amoris alliciendi consequuta sunt, ut casta verè sit matrona quam nullus auro sollicitavit.

- Quid non mortalia pectora cogis

Auri sacra fames?

Itaque Iupiter ipse imbris aurei ficta specie in gremium Danaes deuolutus est.

Artificiosa philtrea à ratione ut plurimum sunt aliena. Alia. n. multiplicata seminis substantia, & acrimonia: incensisque visceribus, renibus, vesica, & genitalibus libidinē quidem incendere possunt (ut cātharides, satyrij, eryngis pastinac. radices, multaque alia) mutuum tamē duorum certumque amorē proritare nō possūt. Quædā & sōnū & ebrietatē adsciscūt, ut vino somnoq; sopitę mulierculæ ab amatorib' facilius iniri possint, voluptate cōgressu certe mini-

minima, cum alterius cōgrediētū volūtas nulla sit.

Magica amoris incitamenta & philtrea quædam sunt vanissima maximèque ridicula: Quædam venenata etiam, animique & corporis sanitati aduersissima. Illius generis sunt abrasiones pedū, vnguiū, pilorū ex partib. omnib., mēstruorū, saliuę, sudoris, vrinę, sęcū: quę omnia nequeunt concoqui, & assimilari possint: neque si coquātur à vescentibus amorē eorū magis incitare in eam cuius excremēta sunt quàm suillę, aut bubulę carnes erga boues, aut porcos ipsos possint. Eiusdē magicę vanitatis sunt pili rostri hyęnę ad mulieris labra admoti: ossiculum lateris sinistri rubetę: & pilus quidam euulsus è viui lupi cauda: & hippomanes. In plantis quoque amatorię quædam numerantur, vt frutex quidam charitoblepharon dictus, staphylinus Plinij, herba centum-capita vocata, airoidis herba, çatanance Thesfala: phyteuma: sagittę è corpore eductę vt terram non attingāt, & cubantibus subiectę. Quę omnia si amantium vota aliquando explere videantur, non eorum tamen physica aliqua facultas, sed tota dæmonum propria est.

Huius generis philtreorum quædam venenata sunt, quę non amorem magis quàm odium proritant, morbósque potius quàm sanitatem animi corporis-que excitant. Neque enim animos mutare, & ad amandum stimulare, nisi temperie vehementer mutata possunt. Itaq; eiusmodi epotis philtreis venenatis dementati quidam fuisse leguntur, vt Caligula à Cæsonia vxore: quidam etiam necati, vt Lucretius poeta, & Lucullus Romanor. dux clarissimus. Quare sapienter amandi magister Ouid.

Ergò quisquis opem nostra sibi poscit ab arte,

Vu 3

Deme veneficijs carminibúsq; fidem.

Cæterum infani amoris remedia alia sunt phyfica & euidentia, quæcumque sanguinis & feminis vel substantiam depopulantur, vel caliditatem hebetât: vt inedia, parçior ciborû potionûmq; vsus, aer frigidior, aut calidior, labor, vigiliæ, phlebotomia, purgatio: & libido cum quolibet scorto exsaturatum etiâ graues curæ: absentia, & intermissa consuetudo aspectuû & colloquiorû. Sic enim Lucret.

Sed fugare decet simulachra & pabula amoris:

Abierrere sibi, atque alio conuertere mentem:

Et iacere humorem collectum in corpora quæque.

Alia sunt Magica philtrorum amuleta. Athenis olim antequâ nupta ædes mariti ingrederetur, oleo & adipe suillo postes inungebantur: vel felle canis nigri domus tota perfumabatur: vel genitale animalis alicuius sub limine defodiebatur. Sic enim primorum puellæ amorum niemoriâ deleri creditum est, ne in præritum languidior esset eius affectus, indeque iurgij, & sterilitatis occasio emergeret. Sic puluere asperso è mulæ volutabro amoris ardorem extingui scribit Plin. Sic ossiculo è sinistro latere ranæ rubetæ amorem inhiberi. Sic denique chamæleontis iocinore philtra amatoria dissolui Democritus prodidit: sicuti ab epoto sanguine iugulati gladiatoris, Faustinae amor suadentibus Chaldaeis Magis solutus est. Horum autem omnium Magicorum amuletorû cum nulla omnino sit manifesta, & naturalis facultas, metaphysicam eam esse, & dæmonum propriam oportet, à quibus amor mirificè incenditur, vel succis, cum semine, & partibus genitalibus supramodum inflammatis, vel excellentis cuiusdam pulchritudinis aucta &
con-

confirmata amantium opinione, cū imaginatricem hominum facultatem quibuscumque spectris, rerūq; fictis simulachris pingere, & lacessere possint.

Eadem vi, astuque dæmones odijs implacabilibus coniugia perturbare solent, coniugesque ipsos ad peregrinos amores prouocare, dum vel humorum, seminumque temperiem in altero refrigerat, in altero vrit & peruertit. Inde enim morum dissimilitudo, dissidii, iurgiiq; domestici parēs: vel corporis, animiq; vitiorū opinionē auget: vel denique alterius coniugum voluptates venereas inflamat, & restinguit. Potest enim sanctissima matrononij iura, & legitimos coniugum ipsorum congressus multipliciter cacodæmon cohibere: dum vel coniugum beneuolentiam excitatis odijs dirimit, vt dictum est: vel coitus facultatem marito adimit, vt genitalis virilis rigorem laxando, vt spiritus & seminis affluentis vias intercludendo ne foras in vterum (bene etiam tenso inguine) profluat: vel denique vterum excrementorum illuie inquinando. Hæc omnia cacodæmonis portentosa opera nemo irriferit qui 7. Saræ viros non sola coeundi potestate, sed vita etiam priuauit: aut qui maritos quosdam coniugum suarum amplexibus ineptos, alienarū aptissimos esse viderit: multas quoque scēminas maritorum suorum securas audiuerit, quæ aliorum virorum sint cupidissimæ, aut maritorum suorum absentium amantissimæ, quos præsentis odio plusquam Vatiniano exhorrescant.

Sed ex omnibus coniugiorum & coitus impedimenti vnum est non minus vetus (de quo Augustinus conqueritur) quàm frequens, Ligatura

hodie dicta ex virilis genitalis mollitie per ligaturam, & quorundam verborum formulam induta, dum matrimonij symbolum diuinum à sacrificulo pronuntiatur. Hanc ligaturam Virgil. insinuat:

Neſte tribus nodis trinos Amarylli colores,

Neſte Amarylli modò, & Veneris dic vincula neſte.

Hoc autē fortilegium ridiculo plane remedio ſolui ſcribit Villanouanus, ſi vir pronubum annulum permingat. Reliquorum fortilegiorum, quib. non ſolam coitus impotentia, ſed quaſlibet etiā obſcuriores ægritudines dæmones inferre ſolent, remedia deinceps exponentur.

De Numeris.

Solent malefici homines & ſceminæ magicis operibus ſuis facultatem eximiam tribuere à certis & definitis numeris, à quibus rerum phyſicas vires mutari, augeri, minuique opinantur. Huic opinioni alluſit poeta hoc verſiculo,

Neſte tribus, nodis &c.

Hęc autem magica numerorum obſeruatio à Pythagora, & Platone ad vulgus Magorum fluxit: à quibus duobus cœlos, animā, rerumque vniuerſitatem numerorum viribus excitatam primū, conſeruari etiamnum, & propagari traditum, hiſque rationibus ferè & exemplis comprobatum eſt.

Primū enim philoſophum phyſicum à mathematico hoc intereſſe, quod ille res corporeas concretasque, hic eaſdem concretionis omniſe expertes, nudas, ſimplices, magiſque ſinales (quales ſunt numeri & lineæ) tractet: à formis autem efficientiam rerum omnem manare: quare & à numeris efficiam maximam oriri in rebus permutandis, aut conſer-

conseruandis. Deinde quorū sunt simpliciores minusque mixtæ naturæ, vt Angelorum & Intelligentiarum, eorundem facultates omnes præstantiores, actionesque validiores esse: ideoque numerorum multo maiorem, quàm rerum physicarum & concretarum efficaciam haberi oportere.

Hinc igitur orbem totum certis numeris olim cōflatum nunc quoque conseruari; vt elementis 4. planetis 7. signis Zodiaci 12. partus humanos mensibus duobus vitales esse 7. & 9: caducos 8. Crises 7, 14, 20. die esse salutare; aliis aut imperfectas aut lethales. Totius vitæ annum criticum esse 63; Climatericum dictum ex 7. & 9. numeri multiplicatione, quem cū incolumis superasset Augustus, sc̄licitati suæ apud amicos gratulatus legitur.

Hinc musicos quoque concentus & è numeris inuentos esse; à quibus hominum mentes in diuersissimos gaudij, mœroris, tranquillitatis, & iracundiæ affectus iactari, versarique solent. Hinc enim infantium in cunis vagitus nutricum cantu reprimitur. Phalangij venenatus morsus musica symphonia curatur. Hinc quoque cantu Lydio, Phrygioque adolescentes interdixisse Platonem proditum est, quod ab illo luctus, ab hoc libido, & proteruia commoueretur. Ægistum quoque non prius Clytemnestra esse potitum quàm trucidato musico pudicitix eius custode, dum egregiarum sc̄minarū laudes coram ea decantaret. Hinc variantes sonos animæ nostræ gratos esse: eosdem vniformes, ingratos: (quod per eos nihil noui discat anima, inquit Aristoteles) raucos, discordes, & obstreperos ingratisimos; à quibus horrorem dentium incuti, icta

grauiter auris membranula , neruuloque ad radicem dentium contracto, contingit.

Quid quod bruta etiã numerosis sonis gestire & exultare videantur? Nonne apuin palantia errantiaque examina sonoris numeris coguntur? Nonne auium garritus ab iisdem excitantur? An non denique mulorum labores tintinnabulorum de collo suo pendentium sonitu ita leuantur vt sarcinulas suas alacrius ferant?

Hæc igitur magica numerorum defensio est Pythagora & Platone authoribus instituta. Cuius tamen futilitatem perbreui responsione nostra constanter refelli posse confidimus , vt nihil à numeris pestiferum , aut salutare communi vitæ conferri posse clarissimè intelligatur.

Primum enim Mathematica illa rerum abstractio intellectu & arte constat. Naturæ autem agendi physica vis tota est, non artis. Deinde cum abstractio illa mathematica intellectu & arte non natura excitetur; neque numeri sanè, neque res vllæ tam simplices & sinceræ, quàm sunt Angeli, & Intelligentiæ, concipi fingique animo possunt.

Iã verò elementa, planetæ, astra nō à numero quo definita sunt, sed à motu & lumine suo efficiendi vim suam sortita sunt. Partus septimestres, & nonimestres sunt quidem vitales, octimestres caduci: hæc feminum proprietas est calidiorum , vel frigidiorum.

Sic in segetum genere quoddam triticum trimestri spatio maturatur, aliud octimestri.

De climaterico anno ita statuendum : plures ægritudines , mortesque aliis ætatis humanæ spatiis , annisque , quam hoc climaterico contingere,

tingere , quoties scilicet excrementorum insuperabili mole natura opprimitur. Numerosi denique musici concentus animos humanos dissimiliter iactant, non sanè quâ numeri sunt, sed quâ per eos sonorum & symphonix rationes modique omnes inueniuntur, cò quod unicuique, authore Aristotele, solet quod ordinatum distinctumque est vehementer placere.

Constat igitur numerorum vim agendi nullam esse physicam : sed totam (si qua fortasse est) metaphysicam & diabolicam esse existimandam : nisi si qua eiusmodi est diuinis oraculis præscripta.

De imaginibus, figuris, characteribus, & annulis.

ALia maleficorum instrumenta sunt imagines, figuræ, & characteres, quibus fascinatoriâ vim cœlitus euocatam inanium quorundam verborum, vt ante ostendimus, & carminum ope conciliare sese confidunt. Ergo. septem animi symptomatis planetas totidem à quibus ipsa regantur adfingunt Astrologi, magique : vt amor & libidini Venerem (sicuti antea quoque enarrauimus) odio, inuidiæ, & avaritiæ Saturnum: crudelitati, vindictæ, & iracundiæ, Martem: iustitiæ, beneuolentiæ, & hilaritati Iouem : ambitioni Solem ; fraudi furtoque Mercurium : inconstantix & leuitati Lunam.

Eosdem quoque planetas septem hominum ætatibus præesse volunt. Infantix Lunâ: pueritiæ, Mercurium : adolescentiæ, Venerem: iuuentuti, Solem: constanti ætati, Martem: primæ senectuti, Iouem:

mediæ, & vltimæ, Saturnum.

Sic denique 12. Zodiaci signa totidem corporum partibus imperitare & dominari tradunt: Capiti Arietem: collo, Taurum: bracchiis Geminos: pectori Cancrum: scapulis & lateribus Leonem: intestinis Virginem: dorso & natibus Lunam: genitalib. Scorpionem: femoribus Centaurum: genubus Capricornum: tibiæ furis Ganimedem: pedibus denique Pisces.

Hæc cœlestis imperij syderumque & planetarum fortunatorum & infortunatorum in animos & corpora humana Astrologorum, Magorumque diuino est. Quorum omnium vires, si Deus faxit, in imagines, & characteres arbitrato suo pellicere sese posse sperant.

Ergo fascinati aliquem magi infaustum sydus obseruant ætati, partique fascinandæ maximè infestum. Atque tum effictæ expressæque in cera imagini acum, pugionem, aliudue telum infigunt obmurmuratis quibusdam anilibus verbis. Verè enim ingeniosus Poëta de Medea decantauit.

Deuouet absentes, simulachraque cereâ finxit,

Et, miserum, tennes in iecur vrget acus.

Sagaque Phœnicea defixit nomina cera.

Eiusque vulneris noxam eadem corporis hominum, brutorumue parte excipi opinantur. Neque id temerè vt his ratiunculis sibi persuadent. Primum enim (inquiunt illi) quidquid in aliquo rerum genere est principium, cæteris vim suam impertitur: Cœlestium a. syderum & planetarum figuræ, magnitudine & tempore facile primæ sunt, & figurarum omnium principes, quibus idcirco vim
suam

suam communicant.

Deinde ut natura principium est internum rerum naturalium, sic artifex artificialium: artifex vero ab arte & voluntate, hæcque rursus à cœlesti causa mouetur. Quare in imagines artificiales & characteres occulta quædam vis & diuina deuolui potest. Præterea formæ mathematicæ (cuiusmodi sunt imagines, & characteres) quod sint omnibus loci, temporis, & materiæ circumstantiis vacuæ, ad metaphysicas proximè accedunt: ideoque physicis efficaciores multò & actuosiores sunt. Huc accedit quod similia omnia magis conueniunt in proprietatibus: magis autè similia sunt quæ figura & qualitate conueniunt, quæ si à natura desit, arte suppleri potest. Itaque plurimum referre dicunt, quo cœli positu sementis, messis, triturationis, lignorum cæsis, aliaque opera rustica suscipiantur. Constantem denique cōmunemque esse omnium Astrologorum de hac cœlestium virium in artificiales figuras, imagines, & characteres instillatione sententiam. Magi igitur illi, simili syderum observatione annulos certis characteribus & figuris impressis conficiunt, quorum eximia sit in utramque iuuandi nocendique, amandi & fugiendi facultas.

Ad hanc ergo facultatem eliciendam, cum Luna in medio cœli constituta est, & dominator planeta, cuius vim & influxum exoptant, tunc ex metallo aliquo huic Planetæ dicato annulum conflare iubent, eique characteres quosdam imprimi: vel in eiusdem cauitatem lapidem certis characteribus insignitum defigi, cui subiecta sit herba, huic quoque planetæ conueniens. Tum demum obmurmuratis quibusdam verbis rapta huiusce planetæ facultate annu-

lum suum muniri contendunt. Sic à Iosepho narratum Salomonem annulos amoris & obliuionis confecisse, eorumque ministerio miracula pleraque edidisse, & præter illos Hebræum quemdam nomine Eleazarum annuli applicatione dæmonem extraxisse è naribus cuiusdam obsessi fuisse verò eius annuli signaculo, quæ à Salomone reperta sit subditam radicem. Sic annulorum beneficio Apollonum Tyaneum supra 103. annum saluberrimè & perpetuo iuuentutis flore & robore vixisse.

Sic Gygen Lydorum regem annuli virtute, in cuius cavitæte lapis draconis effigie inclusus esset, inuisibilem euasisse legimus, ita vt rege occiso regnum & reginam facile inuaserit.

Sic Trallianus affirmat lib. decimo capite primo annulum cui Herculis imago leonem suffocantis affixa sit, colicis doloribus mederi.

Sic denique Eudemum philosophum annulos fabricari solitum esse tradunt aduersus fascinum, serpentum morsus, morbos, & dæmones.

Hæc est Astrologorum magorumque de illucindis viribus in imagines, figuras, characteres & annulos doctrina, quibuscumque possunt rationibus & exemplis comprobata. Nostrium autem consilium animusque est huiusce argumētationis fidem quàm dubia, lubrica, incertaque sit, breuiter clarèque aperire.

Nam principiū nullum (sic enim singulæ eorum rationes ordine excutiendæ sunt) nisi effectiuū sit, verique generis ratione præditum, pluribus vim suam impertiri potest: figura autem cœlestis principium effectiuum non est: Neque cū cœlum ipsū sit naturale, artificialem figuram mutare, aut noua
aliqua

aliqua virtute donare potest. Figura quidem rotundæ morum iuuat, lata inhibet: vt hinc tabula aquis innatet, cùm acicula promptius in eas mergatur: At primo & per se, & naturaliter non agit.

Deinde sunt quidem voluntas & natura actionum nostrarum principia duo: ex quibus illa ab hac trahi solet: Attamen à syderibus natura vt illi putant, non mouetur: vt ab hac impellatur volûtas & ars ad imagines fabricandum, ad quas syderum facultas allabatur. Neque enim vlla est agentis naturalis in obiectû artificiale facultas. Neq; stellæ hominem possunt ad aliquod priuatum opus, vt putamissionē, oscitationē, visionē &c. prouocare, cùm sint causa vniuersalis, & cōmunis omniû sublunariû corporum: vt est cor in homine, cuius facultate vitali reliquæ partes pariter fruuntur.

Porro mathematicæ figuræ incorporeæ quidem sunt: sed earum abstractio intellectu constat & artes artis autem in naturam, & contrà nullum ius est. Iam verò si animorum propensio ad certas artes est in pueris, ea ferè ab eorum natura est. Quodd si etiam ab influxu cœlesti fingatur: ea omnis ad virtutē esset, & nulla plane ad vitia, cùm sit cœlum deorum sedes Aristoteli 1. de Cœlo, & rerum omnium diuinissimum, eidem 12. Metaph.

Quod si inferiora regantur à superiorib. quatenus elemētares qualitates miscent & temperant, eadem etiam conseruabuntur à stellis: potius quàm vt corrumpantur, siquidem beneficas illas omnes esse apud pios constat.

Figuræ denique artificiales non respondent cœlestibus quæ ferè ignoræ sunt, nisi fortasse totius cœli rotunda. Neque, si respondeant, ab illis

propriatatem vllam similitudinis ratione mutuantur. Sic enim orichalcum auro, stagnum argēto æqui polleret.

Neque Intelligentiæ & sydera audiunt magicas imprecationes, vt ad fictitias similesque eorū imagines è cœlestibus tanquam auiculæ stultæ aduolent.

Agricolarum opera rustica vno vtilius, quàm alio tempore obeuntur: ob aeris diuersam temperiem, quam ex solis lunęque mutatione præsertim agnoscunt, non ex vlla cœli figura. Ideoque ad edificacionem ligna ferè cædunt Februario mense sub lunæ silentium, quod tunc ligna exucca magis sint, & à putredine aliena.

Adhuc Magicorum argumentorum refutatio fuit, quæ deinceps aliis ratiunculis augenda, & roboranda est: tum à cœli natura; tum ab artificialibus figuris, imaginibus, & characteribus &c. tum denique ab arte ipsa depromptis.

Primū igitur Cœlū est causa vniuersalis; vt paulò ante dictū est; quare vires actionesque rerū particulares instillare non potest. Secundò cœlum non dat rebus materiam & formam: ergo neque proprietates. Tertiò actio passioque est inter res eiusdem generis, & in eadem confidentes materia: naturalia autem & artificialia toto genere dissident: Cœlum igitur cū sit physicum agens, figuras artificiales indere nequeat: si earum tantum materiam, primis qualitatibus quas excitare solet afficere possit. Hinc constat neque à planetis animi symptomata concitari: neque à signis Zodiaci certas corporis partes gubernari: Communium enim causarum cœlestium communes quoque sunt effectus. Ordo, figura, & compositio non sunt principia effectiua Aristotele
 authore:

authore; ideóque non agunt, neque rebus naturalibus quicquam addunt aut adimunt; sed earum tantum materię superficie tenus imprimuntur. Quinto artificialia à naturalibus non mouentur, cum naturę qua carent motibus, non sint obnoxia: sed ab artificibus tantum mouentur: vt scamni figura. Sexto ars non tollit qualitates naturales: ergo actionem naturalem non iuuat, aut peruertit, neque vlla materię impedimenta tollit, quę naturali, & spiritali vi cœlesti nulla abesse possunt. Septimò & ultimo de arte, sculptura & pictura, hoc ipsum constat, materię tantum ab ea effingi, efformari, & figurari superficiem, in qua tamen vires cœlestes non inhæreāt, vt quę abditissimas etiā partes penetrent.

Hactenus magorum argumenta de imaginū, characterum, & annulorum fascinatoriis virib. refutauimus: sola superest exemplorum expositio.

Medeę igitur & si qua talis aliorum sc̃iendi ratio legitur, ea quidem noxa non sculpturę, picturę, ue proprię: sed tota dæmonum piis sanctisque viris semper habita est, qui his figurarum &c. signis, tanquam certis pactis ad nocendum inuitantur à magis.

Salomon vt scribit Iosephus vtramque magię partē calluit, tum impiam (Goëtia dicitur) quę maiorum dæmonum euocatione constat. (Hanc enim cognitam facilius erat ex piorum cœtu profligare quàm incognitam) tum perpiam (Theurgiā vocant) etiā calluit, & verborum sacrosanctorum recitatione, Deiq; inuocatione exercuit, vt hominibus prodesset.

Eleazari exemplum dæmonem ex obseſſo homine per nares educentis non ad annulum eius, sed ad pietatem potius Deique inuocationem referen-

dū. Aut si forte ille impius fuerit, ad dæmonis fraudem sese coactum cedere hoc annulo fingentis, vt magicam hominis istius impietatem confirmaret. Gygis historia aut falsa est, aut dæmoniaca, illis dæmonum fraude aspicientium oculis. Tralliani remedium ex ægri confidentia est: aut dæmonis calliditate dolorem lenientis vel stupefaciēdo sensum, vel temperando causam doloris, vel eandem dissipando. Imperatori Constantino pietas, veraque in Deum fides, & deprecatio victoriam peperit. Eūdem artificium annulorum à Dæmonum commentis fluxit per seipsos molientiū, quod annulis superstitiosè tributum esse volebant.

Quamobrem neque rationibus, neque exemplis imaginum, figurarum, characterum, & annulorum facultas vlla fascinatoria, aliterue effectoria stabiliri potest. Sed si qua eiusmodi sit aliquando perspecta, tota est ad dæmonum nequitiam referenda.

De morbis Dæmoniis seu Diuinis.

Sed enim morbos Dæmonios, vel vt alij loquuntur, diuinos, clarissimis coniecturis suspicari & internoscere datur. Primum quidem ex ægrorum ipsorū diuinationibus, dum quæ ventura sunt præfigire, quæ præterierunt meminisse: quæque distantissimis locis pridem recensve gesta sunt, aut etiamnum geruntur, omnia tanquam præsentia sint & ob oculos posita præsentiscere, alienoq; sermone, quæ antea nunquā calluerint, didicerint, audiuerint, enarrare perspicuè deprehenduntur. Neq; enim ista rerū præsentio humano intellectui proprie & per se assigni potest: à quo nihil nisi quod à sensibus prius perce-

perceptum & renunciatum sit: nihilque omnino sine phantasmatum sensibilibus intuitu percipi unquam possit. Rerum autem venturarum, aut in distantissimis locis præsentium: ut & peregrini ignotique idiomatis nulla sine præiudicio, aut comite sensu mentibus humanis nota inhærere, nullaque præteritarum recordatio imaginationis munere carere, sicuti neque hæc sine sensuum ministeriis vigere potest. Nam animam per se rerum cognitionem capere quis Peripateticus fateatur, cum ipsa sit humani corporis non assecla tantum (quales cælorum Intelligentiæ finguntur) ut quæ ante suum cum isto commercio plurimam didicerit, noueritque, eadem postea dum corpori adhæserit recordari omnia possit: sed potius sit corporis verus primusque actus & ἐντελέχεια, parsque essentialis, cuius corporis ope, sensuumque externorum subsidiis rerum notitiam consequitur? Sunt enim actiones compositorum, non componentium: aliàs ex duobus actu existentibus tertium existere oporteat.

At dæmones res quidem præteritas, & præsentis quamlibet diffitas ob præcipitæ substantiæ suæ simplicissimæ celeritatem intelligunt, nunciantque: futuras perspectis solerter hominum temperamentis: & naturarum inclinationibus comprehensis, atque aded notatis acutissimè casibus omnibus, à quibus moueri mens humana possit, prudentissimè coniectant.

Est quidem bonorum angelorum, ut fuit olim quoque prophetarum, non minor quam cacodæmonum sagacitas & solertia: ut ab illis res omnes præiuderi & renunciari possint. Sed hoc discrimine, quod illorum diuinationis semper vera sit, quodque diuinationi eorum gloria Dei hominumque salus

semper proposita sit: horum sæpe falsa, cumque Dei contumelia, & hominum iniuria coniuncta sit.

Deinde alia quoque sunt præter diuinationem eorumdem morborum illustrissima indicia, ut cum ægri antea per sanitatem omnino rudes, rerumque & literarum omnium imperitissimi, nunc per ægritudinem repente scribendi, legendi, saltandi, numerandi, medendi, aliasque artes profiteantur, si barbaras & inconditas voces effutiant, aut si clamores belluinos, ululatus lupinos, & latratus caninos edant. Et quia sæpe muti sunt dæmones, & surdi, si ægri vires plusquam humanas tollendis oneribus, suisque vel alienis corporibus longius exportandis, impendant, si intestinos cruciatus perferant, vagosque & temerarios motus obeant: si sibi, aliisque mortem, aliaque detrimenta moliantur: si denique sacrosanctum Dei, & Iesu Christi nomen, piorumque hominum exhorrescant: inuitique & execrando audiant:

Hæc inquam omnia sunt intestini hostis, intusque corpus obsidentis dæmonis opera: cuius partes omnes arbitrio suo ad quascumque actiones, gestiones & elocutiones versat, rapit, torquetque. Itaque morborum dæmoniorum genus duplex omninò est, vnum metaphysicorum, tatumque dæmoniorum: alterum partim physicorum, partim dæmoniorum.

Genus utrūque Hipp. naturæ nimis fortasse additus è rerum natura proscripsit lib. de sacr. morbo, & de virginum morbis, totumque physicorum generi annumeravit. Quod autem diuinum quippiam morbis quibusdam ut apoplexiæ, epilepsiæ inesse dicitur, partim eorum magnitudini, & raritati:

ti: partim Medicorum ambitioni & avaritiæ ascript, qui vt ignorantia suâ apud vulgus celarent, saluo interim, & integro suo questu, morbos eiusmodi à diis iratis immisos esse: eosq; remediis nō physicis, quibus eos vincere non poterāt, quia causas ignorabāt, sed metaphysicis, vt expiationibus, numinumque obsecrationibus egere peruulgarent. Hippocrati Galenus astipulatur comm. in 2. progn. l. 1. multisque hāc Hippocratis sententiā fuisse tueri, nullos morbos esse diuinos. Ideoque quidquid diuini in morbis latere possit, à medico animaduertendum ex Hippocratis consilio idipsum ad aeris insolentem conditionem refert, morbosque epidemios inde natos, quos generatim Hipp. lib. 3. Aphorism. speciatim lib. epid. prosequutus est.

Cæterum morborum dæmoniorum genus vtrumque verissimis rationibus & exemplis cōprobari potest. Primū enim partim physicum est ex internis humorū vitiis, plethora & cacochymia, à dæmone tanquā procatactica causa suscitatis, dum eos vel improbabili victu cuius author ipse est: aut intēperatis visceribus, copiosè cumulari contingit, quos dæmō perturbet, permisceat, & corrūpat. Huiusce generis præclarissima extant exempla tum apud Luc. c. 8. cuiusdam Lycāthropiæ dæmoniacæ, & c. 13. inueteratæ epilepsiæ: tum apud Marcum cuiusdam conuulsionis diuturnæ.

Neque verò in philosophia nouum, & inauditum iure videatur, tetros & præsertim melancholicos humores (his enim inprimis gaudet dæmon vt mēti, rationi, & constātiæ aduersissimis) ab ipso cōmoueri: suisq; sedibus euulsos in nobilissima viscera cōcitari posse, cerebrum, cor, hepar, ventriculum &c.

vnde funestissimam symptomatū iliadem exacerbari contingat, vt spontaneas leipothymias, synco-
pas, palpitationes cordis, epilepsias, apoplexias, con-
uulsiones, paralyfes, maniam, melaneholiam, in-
cubum, aliósque calamitosissimos affectus, quo-
rum originem ne Aristoteles quidem à dæmonibus
remouerit, cū motrices corporum causas om-
nes ad incorporeas vsque & indiuiduas produ-
xerit.

Alterum genus ægritudinum est quascumque so-
lus dæmon nulloque interveniente humorum vi-
tio, tanquam coniuncta causa infligit. Quid enim,
an non aqueum oculorum humorem turbare, ne vi-
siles colorum imagines ad crySTALLINUM trans-
mittat (occæcato homine) versutus artifex potest?
Non crySTALLINO nubes, fictasue rerum figuras ob-
tendere, quibus æger terreatur? An non ab innato
aurium aere (si quis sit) neruoque auditorio exter-
ni aeris impressionem cohibere, sonorumque ap-
pulsus intercipere possit, sine quorum pulsatio-
ne aures obsurdescant? Non neruos, venas, arte-
riasque genitales comprimere, spiritumque & se-
men suppressere possit, ne partes obscenæ aut ri-
geant, aut rigentes etiam & tensæ semen per
coitum profundant? Vnde igitur nuptiales illæ
ligaturæ nisi à dæmonibus inuentæ & inuectæ
sunt, coniugiorum imprimis, fecunditatis, casti-
tatis, & maritalis beneuolentiæ acerrimis hosti-
bus? Verè enim simplicibus & incorporeis sub-
stantiis sublunaria corpora parere est antea pro-
positum.

Constat etiam ex lib. 2. Paraleip. c. 21. Morbos
quosdam verè diuinos esse & à Deo opt. max. im-
mis-

missos, impiam hominum & sceleratam vitam vl-
ciscientis. Talis fuit funesta illa diarrhœa de qua
nos quoque antea, qua regem Ioram ob idololatri-
am, fratrumque cædem diutius afflixit. Sed Deus ta-
met si causis omnibus prior sit, naturales tamen non
tollit, vt diætā prauā, & cacochymiam à Iorā
rege. Ab his autem diuinis morbis omnia opera
trans naturam exposita absunt. Porro ex morbis
dæmoniis, illi qui sunt physici, & materiales, phy-
sicis quoque remediis curantur noxiam humorum
materiam detrahentibus, viscerumque intempe-
riem demolientibus, diætā scilicet & pharmacia
congruenti & opportuna. Imateriales autem &
verè dæmonij, quique à solo dæmone excitantur a-
lunturque : hi quidem metaphysicis remediis per-
curantur: neque enim physici dæmones eorundē
causæ coniunctæ & authores profligari posse viden-
tur: Nam si illi incorporei, elementaris materiæ pri-
marumque qualitatum mixtionis expertes sint,
nullam profecto à qualitatibus manifestis, occultis-
ue vim aut molestiam perpeti possint. Contrario-
rum enim, quorum mutatio omnis propria est, eadē
sedes est, & subiectū. Sin corporeū qcquā, aëreū, a-
queū, igneū, & terreū in illis sit (qua de re paulò post
accuratius) dolore tamen etiam, aut voluptate affici
mutariue à causis externis physicis dæmones ne-
queant, nisi ipsi quoq; mutabiles sint, & caduci. Neu-
trū enim symptomatū istorū sensibus vacare (tactu
præsertim) potest, quorū instrumēta cum propriis
obiectis communi materia naturaq; participant, vt
ipsa sint sensibilibus instar corruptibilia, mutatio-
nique, iniurię, & interitui obnoxia. Neque vl-
lo modo probabile est, à rebus naturalibus &
sensibilibus vt dæmones prorsus spirituales

& incorporei laceffantur, fuisque fedibus explodantur. Eft enim diuerfa valde animarum, dæmonumque in corpore conditio. Illæ tanquam formæ corporum quibus coniunctæ funt, decentem primarum qualitarum apparatus, & idoneam structuram, figuramque requirunt, quam fi quæ vehementius impetant & labefactent cauſæ externæ, ipſæ ſuo veluti domicilio cedere corpore informato coguntur. Dæmones autem tanquàm motores quidam & reſtores corporibus quoquomodo habentibus infident, neq; perturbata illorum conſtitutione excedere inuiti & emigrare coguntur.

At verò tria ſunt ſacrarum literarum teſtimonia, quib. Phyſicorum remediorum facultas dæmonib^a aduerſa demonſtrari videtur. Primum eſt quod pſaltes Dauid ab obſeſſo Saule rege citharæ ſuæ ſono gratiſſimo dæmonem excluſiſſe 1. Sa. cap. 18. legitur. Alterum eſt quod Tobias minor hepatis, cordiſq; piſciculi cuiuſdam (ὁ παγιόσκοπος quidam interpretantur) ſuffitu monente Raphaële ſeſe & Saram coniugem ſuam iis dæmonibus liberaſſe, à quibus 7. mariti prius trucidati fuerant, cap. 7. & 8. narratur. Tertium apud Ioſephum de Antiq. lib. 8. extat de Eleazaro quodam Hebræo, qui coram Veſpaſiano, totoque eius exercitu dæmonem è narib. cuiuſdam dæmoniaci extraxit, quibus annulum ſubieccta eius ſignaculo radice quadâ à Salomone reperta obiecerat. Sed tamen iſtorum teſtimoniorum fidem vera facilisque interpretatio abrogat. Non enim citharæ Dauidicæ harmonia cacodæmonis ſæuitiam, tanquã obſequio deliniuit; ſed Saulis dolorem à dæmone illatum voluptate aliqua repreſſit, & ad tempus demulſit.

Neque

Neque etiã Tobia suffitus dæmonum discessus fugeq; ex coniugis thalamo causa: sed signũ tantũ fuit, vt scilicet eo accẽso discessisse Tobias agnosceret,

Neque deniq; Eleazari amuletum, radixue Salomonis dæmonum fugam ex dæmoniaco maturauit: sed diuina huiusce institutio hoc effecit.

Aliorum quoq; amuletorum physicorum à prophanis authoribus vulgatorum nulla in eiiciendis dæmonibus vis est: vt ruta, & hypericonis: quibus authore Aristotele crassos turbidosque flatus discutiendi à temperie eorum calida siccaque, tenuique substantia, non autem dæmones explodendi, facultas insita est. Suffitus quoque ingratos, vt gagatis, stercoreumque, accessiones epilepticas concitare, agitat in cærebro humoribus & in flatum calore suo versis: non tamen dæmonem despectum irritari, & fugitare censendum est.

Quod si nullum sit dæmoniorum morborum satis efficax remediũ physicum, metaphysicis confidendum omninò est, quorum insignem in hoc curationis genere facultatẽ omnis ætas semper experta est. Quid enim non Balachæ Mesopotamiæ regis nobilissimus quidam Magus apud Philonem Iudæum, & Iosephum de Antiq. ad Iudæorum perniciem adscitus respondit, fascinatorias & magicas artes huic genti quod Deo ob diuinæ suæ legis exquisitam obseruationẽ charior esset, nullomodo esse nocituras? Nonne D. Cyprianus cùm insignis Magus esset iuuenis, & à dæmone accepisset, Iustinam puellã quã deperibat, non posse magicis fascinis ad amorẽ flecti quod Christum D. singulari pietate coleret: magiæ cõfestim renunciavit, referente Gregorio Nazianzeno, seseq; Christianismo penitẽ deuouit, dica-

uitque? Nonne denique apud Tobiam minorem libidinosis cōiugibus insultaturos esse dæmones: piis contra parituros esse non necituros intelligitur?

Sunt autem metaphysica ista remedia è vera pietate & religione deriuanda: sicuti ex eiusdem contemptu & obliuione dæmonum violentia orta est, illis Deo impiorum hominum vexationem permittēte. Cōstat verò pietas illa religiosissimo Dei vnus cultu, & obsecratione, diuinæque legis assidua meditatione, frequentissima sacra Eucharistiæ celebratione, vitæ denique sanctitatē: & ingluuiei, crapulæ, otij, prauæ consuetudinis, sermonis obsceni & lasciuæ lectionis, voluptatum denique omnium turpissimarū declinatione. His enim expiationibus, iisque precibus placatus solus Deus dæmonum fracta vi hominum votis respondere solet.

Est denique aliud metaphysicum, sed omninò impium & scelestum remedium: vt cum Māgorum & Lamiarum diris execrationibus dæmō ex pacto suo cedit. Hac ratione Magi, Lamiæque etiā quotidie illatum à seipsis fascinum expungere & discutere videntur. Aut à dæmone alio eiicitur imbecillior. Hac ratione vsus est Apollonius Thyaneus scribente Eusebio. Hac eadem vsi quoq; apud Leonē Africanum quidā magi, à quib. post circulos quosdā ductos, effectosque in fronte dæmoniachi characteres, interrogatus prius dæmō exigi solitus est. Hanc deniq; impiam artem perfidi Iudæi Christo exprobrarūt. Est enim dæmonū inæqualis potestas, dignitas, & ordo, estq; potentiorum in imbecilliores imperium non violentum, horumque spontanea obsequentia.

Est porrò & aliud remediorum metaphysicorum genus ritu ecclesiastico, & pontificiis decretis vsur-
pari

pari solitum ab exorcistis: qui post similes prædictis expiationes in nomine Christi dæmonum expulsiōni incumbunt.

An dæmones immortales & incorporei.

IAm verò si remediis physicis cogi dæmones, fugari & alterari nequeant, eosdem corporea omni mole & cōcretione elementari carere oporteat, indeque immortales esse. Quæ de re tamen inter philosophiæ proceres non satis conuenit.

Aristoteles quidē nihil in rerū vniuersitate præter primā causā constās esse & diuturnū opinatur. Quodcūq; enim mouet, id ipsū vicissim moueri statuit ad primā vsq; illā causam, quæ mouere quidē, sed moueri non potest. Addit deinde, quicquid mouetur hoc ipsū esse corporeū, alterabile, & diuisibile. Quare si causa omnis præter primā moueatur: sitq; quæcūq; mouetur corporea, dæmones certè corporeos esse auctore Aristotele statuendum erit.

Itaque Platonis schola recentior totam dæmonum familiam in 4. veluti tribus distinxit, terreorum, aqueorū, æreorum, igneorumque, pro quadruplici elemētōrū numero, quib' cū maior naturæ affinitas, & corporeæ suæ naturæ similitudo intercedat.

Verumenimvero à summis illis philosophiæ dictatoribus non temere defecisse ex nostris plerique videntur. Nam si dæmonū corpora quædā ex mixtis 4. elementis conglomerata sint, eadem ab omnibus causis physicis contrariis (ob communem materiam) alterabilia esse, & corruptibilia oporteat. Sin ex singulis potius elementis conflata fingantur, ut ærea tantum, aquea, terrea, aut ignea sint, ea quoque à ceteris elementis, rerumque affinitatibus naturis (sicuti hæc vicissim mutantur à seipsis)

mutari certe necesse sit. Quod si dæmones non alia infra Lunæ orbem elementa, quàm vulgata hæc nostra quatuor incolunt, iisque fruuntur & victitant: cùm corruptibilia sint omnia, similes illis dæmonum naturas, à quibus incoluntur, corruptibiles pariter, & caducas esse contingit.

Ridicula igitur contradictione Platonici implicantur: nam si dæmones corporeos, indeque alterationis, doloris, & voluptatis participes iudicent: mortales quoque iudicare eos debent, quod à dæmonum natura alienum est.

Sin immortales, & inalterabiles censeant: omnis quoque voluptatis, doloris, & alterationis expertes censere oportuit: horum enim symptomatum utrorumque sensus quidam est, ille iucundus, hic molestus. Sensus verò omnis sensibilibus alteratione perficitur. Atque sic Platoni responsum sit.

Aristoteli autē quod non omnis motus sit successivus & continuatus, ut corporum, sed instantaneus formarum instar, ut postea. Dæmones autem tametsi sub stantiæ sint incorporeæ, omnisque magnitudinis, dimensionis, & figuræ expertes (cui soli locus convenit) illi tamen omni loco, tanquā nusquā sint, excludendi nō sunt. Genera quidem rerum à singularibus speciebus separata, neque per se subsistunt, neque quicquā agunt. At dæmonū substantiæ quædā sunt singulares, & singularibus addictæ subiectis: vnde agere, pati, que aliquid suo more possunt. Facultas quidem eorū Dei instar infinita non est, ut ubique & semper agāt moveantque: sed ita finita est ut alicubi tantū, & alicubi agant. Atque hic exercendæ facultatis ipsorū locus est, non corporis, quod eis nullum est, ut nec ulla dimensio aut figura: vnde quoque nullæ sunt dæmo-

dæmonum ex magnitudine & figuræ loci propriæ differētiæ, vt æqualis, inæqualis: quadratus, rotundus longus: vt maior, minorue dæmonum locus dicatur, cum ipsi sint incorporei, neque extendi, aut contrahi possint: sed accidentariæ tantum sunt ex magnitudine corporis circa quod negotiantur, & difficultatē operationis suę, cum finita eorū virtus in quātocumque corpore mouendo satis esse nequeat.

Itaque in loco minimo, nō tamen indiuiduali cōsistunt: neque vnus tantum, aut duo: sed plurimi in eodem loco diuersari simul possunt: cum eorū cœtui neque repletio loci à magnitudine corporea, neque actionum cuiusque varietas obsit, cum tamen numerus eorū sit permagnus, nec possit quisquā in pluribus locis esse eodē tempore. Neque etiā plures dæmones facilius procerum corpus, quā putillū obsidere possint: aliàs ex dæmonibus quosdā palmares, alios vlnares, aut cubitales fingi necesse sit, quorum tamen nulla magnitudo est, dimensio, aut circumscriptio. Quare dæmones sola proprię virtutis, & officij exercitatio, non corporis magnitudo, in loco verè constituit: vt in eo sint in quo operantur. Loci a. differentias, vt maioris, minorisque, corporum quæ ipsi mouent magnitudo, operumque difficultas, non corporea essentia distinguit.

Quòd si incorporei sint dæmones, verèque loci in capaces, quomodo tandem illi mouere, mouerique excurrere, quiescere, putantur? aut qua ratione qui in loco non sunt, mouere tamē mouerique, nisi per locum videantur? Motus quidem quæ propria corporum physicorum est affectio, à dæmonibus omninò incorporeis iure alienus esse videatur.

Sed dæmones tamen cùm neque ubique, neque nullibi, neque ibidem semper sint: immobiles sane non esse constat. Motus ergo dæmonum, corporumque diuersa ratione obiri solet: ille quidem triplici discrimine secatur, vt prima eius species successiua, & continuata loci mutatione constet, qui proprie motus dicitur. Secunda per accidens motus est, cùm alterius rei motû sequitur, vt nauta nauis, in qua est, quamque impellit. Tertia species motus mutatio quædã, quæ alio atque alio loco aliter fit; tum quæ res in priori loco desinit esse per primum sui non esse, tum in posteriori esse incipit per primum esse: quæ species motus formis omnib. quæ in instanti informare incipiunt communis est.

Primam motus speciem dæmones, vt pote incorporei, non subeunt. Secundam speciem tum demum experiuntur dæmones, dum hominum officia, actionesque imitaturi ex aere, aut igne, aliove elemento corpora sibi effingunt: aut animalium etiã cadauera assumunt, quæ nutu suo moueant, simulq; cum illis quibus inhererent moueantur. Atque hic quoq; motus, tametsi accidentarius sit, successiuus tamen & temporalis intelligitur, tametsi momentaneus: quod omnes medijs in via aëris partes agitët & trāsmittant: vt cùm Raphaël ad Tobiam, Gabriel ad Mariam properauit. Sic candela ad mota extremo fini totam stupam celerrimè percurrit, peruritque. Tertiam denique motus speciem dæmones suscipiunt, dum ex vno loco in alium sine tempore, & cum mutatione non quanta transiliunt. Si enim corpus per vacuû (authore Aristotele) in instanti ferri possit, quia omnis morë, tarditatisq; motus corporis causa à resistētia medijs oritur: cur substantiæ demonû, incor-

incorporeę sine tempore per plenum nõ ferantur?

Constat igitur demones, tametsi incorporeos, in aliquo tamen esse loco: non tamen simul in plurib. ex eoq; in alium in instanti transilire, atq; in eodem vel cõlistere, vel inde exire posse; nisi Dei iussualiter cogantur: sicut demon quidam religatus in solitudinibus *Ægypti* à *Raphaële* apud *Tobiam* legitur.

Cæterum morbos omnes tam phycos, quàm metaphysicos inferunt demones vel sponte sua, nullaque humana interueniente industria, non tamen iniussu Dei hominum iniustitiam, vt *Saulis* regis, demonũ opera & cruciatu vlciscentis: aut patientiam, vt *Iobi*, exercentis: vel magorum, aut lamiarum pro uocatione, quasi diriseorũ execrationibus, carminibus, imaginib. &c. coacti, aut deliniti demones miraculorũ effectricem vim iisdem impertiantur, quorum ipsi tamen soli demones sunt authores. Neq; n. tam facinorosi homines tot trans naturam mirifica opera, quib. gloriari solent, aut vi diuina, quam non implorant: aut propriis naturę suę viribus: aut vllis deniq; instrumentis, quorũ vires maiores non sunt quàm ipsorum artificum, obire possunt.

Sunt igitur ista magica instrumenta, sicuti *Lamiarum* pleraque alia initi cum demonibus pacti expressi, tacitiue symbola; quibus ad vota maleficorũ explenda sollicitantur. Est enim *Augustino* pactum hominum cum demonibus duplex: vnum expressum: alterum tacitum. Prius illud manifestis verbis, & mutuis hominum maleficorum, demonumque stipulationibus constat: eiusque ferè formula est, quod malefici Deum,

Deique cultum, & veram pietatem expressis clarisq; verbis abiurant; totosque dæmonibus, & eorum cultui sese vouent, deduntque; dæmones illis vicissim omnium consiliorum, votorumq; suorum optatos exitus pollicentur. Posterius obscurum est, ut cum aliquis, nullo etiã cum dæmonib' icto fœdere, nulloq; e Dei odio, & impietati addictus in inanibus tamen & inefficacibus per se instrumentis cogitationum suarum spem collocat. Sic enim cum dæmone instrumentorum istorum inuentore inscius paciscitur.

Isto igitur tam horrendo pacto adducti dæmones vel magos ipsos semper comitantur minuta aliqua specie, crystallis, speculis, annulis sua sponte inclusi (hos *παρῆσποι* Græci vocât, i. accessores & consiliarios) vel diris imprecationibus euocati conspicua quadam imagine sese ostentare solent, magorû que rogantium quæstiones voce, pictura, alioue modo soluere.

Hinc magicæ diuinationis cõplures differentię notantur. Vna Lecanomantia, cum tenui, exilique voce erumpente ex aqua in peluim diffusa, cui laminæ aureæ, vel argenteæ, vel lapides quidam pretiosi certis characteribus insculptis immerfi essent, accitus dæmon quæsitis respondet.

Altera Gastromantia cum dæmon puero impubere, aut muliere prægnante obseruante rogatus, à Mago iussus, flagitatus responsa sua expedit certis imaginibus in aqua limpidissima expressis; & per media vitrea vasa rotunda aspectabilibus, & cercis accensis albis.

Tertia est Catoptromantia cum in tersis, nitidis, & perspicuis speculis quæsitæ rerum euentus fi-
ctis

dis imaginibus dæmon renunciat. Hac frequenter
vſus eſt Iulianus Imperator.

Quarta eſt Cryſtallomantia cùm dæmon in cryſtallis affabrè expolitis impendentes rerum caſus
aptis quibuſdam figuris expreſſos præmonſtrat.

Quinta Dactylomantia cùm in annulis rerum ex-
petitarum à dæmone depicta ſigna obſervantur: qui
ſub certo cœli poſitu conſtati ſint. Talem referunt
hæſtoriæ Gygis annulum fuiſſe, quo in palmam con-
verſo alios videbat nec ipſe videbatur.

Sexta Onymantia oleo & fuligine vnguibus pue-
ri impuberis illitis, ſolique obuerſis conſtans, qua-
rum lineæ quædam rerum expetitarum imagines
reſerebant.

Septima denique Hydromantia duobus potiſſ.
modis exercebatur: tum annulo in cyathum aqua
plenum manu libratum qui filo ſuſpenſus eſſet: tum
coniectis in aquam tribus lapillis, indeque gyris a-
quæ diligenter notatis.

Taciti pacti rei ſunt Magi, Aſtologi, Augures, Ha-
ruſpices, Præſtigiatores, & divinatorū omne genus:
Non tamen quod alienis commodis, ſalutique inſi-
dientur (tum potius prodeſſe quam plurimīs futuro-
rum prædictione geſtiant) ſed quod impiam, veti-
tamque à Deo divinandi artem profiteantur: quam
neque diſcere, neque exercere ſine tacito cùm dæ-
monibus ſcædere poſſint, cùm ab illis coactis conſi-
liorum votorumque ſuorum fauſtos exitus expe-
ctent. Illi enim coacti aſtrictique Magorum ſervi-
tio videri volunt, ne fraudis, doliq; ſuſpecta ſit vo-
luntaria cum illis cōſuetudo, & familiaritas ſua. Er-
go illud hominum genus totum Deo non tantum
exoſum eſt, & execrabile: ſed eorum etiam conſul-

tores, quique occultarum rerū siue præteritarū siue præsentium, siue impendentium notitiam ab illis sciscitantur. vide caput 28. Deuteronomij, & 20. Leuitici.

Expressi pacti consciæ sunt Lamiæ & maleficæ omnes scæminæ quæ cum cacodæmone scientes, vigilantes, valentesque ea lege paciscuntur, vt bellum Deo indicât, veramque pietatem & religionem abiurent: dæmoni cōtra cultum fidemque iurent: eamque tum admissio, inūstoque eius caractere in abdita quandam suorum corporum particulam: tum sacrificiis eiusdem, conuiujs, choreis & libidinosis scortationibus frequenter celebrandis confirmant.

Neque verò Lamiarum pactum hoc cum dæmonibus tanquā delirantium, & somniantium falsum semper, & imaginarium habendum est: cum id ipsum sponte sua, beneque valentes, vigilantes, audientes, & videntes plerumque ineant: initumque constanter obseruent. Neque etiam naturarum disparitas inter paciscentes pacti huius vim eneruare potest, cum inter Deum & homines sanctissimū fœdus valeat: neque diuersa paciscentium voluntas, cum expressis & perspicuis verbis constet: non denique dolus, & fraus dæmonis, quem hominis prudentis piique est omni ratione cauere.

Fabulosa quidem pleraque sunt quæ supra naturam iactant opéra insipientes aniculæ: iisque vel dormientibus, vel melancholicis, & delirantibus persuasa à dæmone: cuiusmodi sunt, Sublimes ex baculis tanquam equis perniciosissimis ferri: In bruta mutari: Aercin à seipsis turbari: Tempestates, fulgura, fulmina cieri: morbos immitti: Homines, brutaque solo nutu, tactu, visu necari: sege-

tes sterni, agros vastari: multaque alia humanis viribus omnino maiora miracula, de quibus ait Poëta:

Illa carminibus promittunt solvere mentes;

Quas cupiant: aliis diras immittere curas:

Sistere aquam fluvii: & vertere sidera cœlo.

Permulta tamen etiam vera sunt, & agnisque hominum detrimentis, brutorumque cladibus cōprobata, benevolentibus interim & vigilātibz, nulloque modo desipiētibus Lamiis: nisi cōfortasse quod à seipsis illa pręstari putāt, quorum cacodemō solus ita iubente, aut permittente Deo, author est. Ideoque maleficia sua scelerata scēminę pœnarum meru cautiſſimē tegere, & constantissime pernegare solent. Norunt enim se impię acturas antequam agant, & dum agunt, aut postquam egerint, summum Deum capitaliter lacessere, vt dæmoni peruerſissimo obsequantur.

Exploranda itaque accuratissimē magistratui scēminarum fascini alicuius rearum sanitas est, & constitutio corporis, animique, ne fatuis, deliris, melancholicis, & somnio aliquo delusis aniculis temerē capitalem pœnam irrogent, quę euchymo potius victu, & idoneis purgationibus mentis integritati restituendę sint: Impia autem earundem benevolentium facinora, & maleficia manifesta impunē in repub. non ferāt. Horum enim tametsi solus dæmō author sit, earū tamen culpa excusanda non est, nec dissimulanda, à quibus dæmonum nequitia accendi, & stimulari solet. Quod Dei veri pręceptum est cap. 18. Deuteronom. & 20. Levitic.

Quid igitur? si iusta Magorum supplicia à Deo ipso decreta sunt: cur Lamiarum iniusta habeantur?

aut si illa concessa, cur hæc prohibita censeantur? Cur ferro, igni, cruce tam dira impietas non expiabitur?

Magi à Dæmone suis carminibus aliterue coacto responsa exprimunt: rerumque perficiendarum subsidia ab inuito extorquent (vt sibi quidem videntur:) Lamiæ à Dæmone volente, suisque libidinosæ illecebris delinito eadem accipiant. Magi longiori studio, librisque pluribus cogendorum & euocandorum Dæmonum artem perdiscunt: Lamiæ vnico præceptore, & nunquam deserente dæmone instituuntur.

Magi præstigias ambitionis causa, vtque cæteris hominibus antecellere videantur: Lamiæ fascinum in hominum, brutorumque necem, aut ad plantas & segetes vastandas moliuntur. Magi denique dæmones abhorrent, & execrantur, iisque tantum vt vilissimis mancipiis vtuntur: Lamiæ eosdem singulariter amant, colunt, & venerantur.

Quid, quod fœdissimos, & spurcissimos eorum amplexus, conuiuia, choreas, colloquia auidissime consecretantur miseræ concubinæ? Est igitur auctor, & iudice Deo iustissimo insanarum Lamiarum impietas deprehensa, acerbissimis, & capitalissimis suppliciis à Magistratu vindicanda.

Choreis fanè, lasciuis saltationibus, & obscœnis sermonibus cum suis clientibus siue cultoribus sub ficta humana specie, & conspicua dæmones vti possunt. Epulis & comotationibus nisi præstigiôsè non possunt.

De coitu Dæmonum cum Lamiis.

ARdua magis est de coitu dæmonum cum feminis humanis disceptatio: quem tamē vetustas

stas vt hominum, & cum deabus fœminis certissimum esse duxit, ex eoque congressu egregios viros prope omnes genitos esse prodidit, quos ab eiusmodi amore Heroas vocitauit, quasi Semideos ex Deo, & fœmina, vel ex Dea, & homine natos. Vt Herculem à Ioue, Romulum à Marte, Alexandrum ab Hammonē, Achillem à Thetide, Aeneam à Venere. Hinc quoque tam multa deorum, deorumque apud Poëtas (fortasse non mendaces) adulteria vera, certisque euentibus comprobata narrantur.

Quid, quod eundem dæmonum & fœminarum congressum fuisse fœcundum: ex eoque gigantes robustissimos, maximeque impios homines propagatos esse sacris libris vt Genes. c. 6. legimus? Sic enim filios Dei, à quibus hominum filias eximie pulchritudinis suæ causa amatas fuisse creditur, eo loco Dæmones Theologi plerique interpretantur, vt Iustinus Martyr, Clemons Alexandrinus, Tertullianus, Sulpitius Seuerus & alij. Nonne August. lib. 15. de Ciu. Dei, Siluanos & Faunos, quos Galli Dusios vocât, amoribus mulierum capi, iisque potiri tam certum esse affirmat, vt hoc negare impudentiæ proximum illi videatur? Augustino quamplures alij Theologi subscribunt Ioseph. Lactant. Isidorus, Giraldus, Franciscus Mirandulan. Ex quibus constat, Dæmonum libidinem non in maleficas tantum, & impias, sed probas etiam piâsque fœminas effusam aliquando esse.

Sed enim congressum eiusmodi philosophicæ leges manifestæ falsitatis condemnare videntur.

Primum enim statuunt, nullas naturas nisi

corporeas veneræ voluptatis, coitusque esse cupidâs, & egentes: Dæmones autē corporū, sensuumq; & sensibiliū alterationum omnium, ut voluptatis & doloris expertes esse, sicuti ex nostra disceptatione recenti constat.

Deinde in naturas omninò incorporeas, quales sunt dæmonum, neque amorem, aut odium, neque ullam animosæ facultatis perturbationem cadere. At sine amore muliebri, veneris & coitus cupiditatem extingui. Præterea sine cibo, & potu nullum esse semen: nullamque sine semine libidinem: dæmones neque esurire, aut sitire, neque esitare, aut potare quicquam, in confesso est. Huc accedit quod sine successione & propagationis necessitate nullū est coitus veneri desiderium: dæmonū sempiternæ & immortales naturæ sobolis propagatione non indigent. Denique sine partibus genitalibus nullū aliud est coitus instrumentum.

Quid igitur in tantâ fluctuantium opinionum varietate statuendum est? aut quid de tam dubio, incertoque concubitu sentiendum? Equidem dæmones incorporeos esse, nullaque veneræ voluptate frui posse opinor: amorem autem formosarum fœminarum, & deformium fastidium non ad dæmonum naturam: sed ad eorundem nequitiam referendam esse: ut ista e mentiti adulterij consuetudine, & oblatione libidinosas simplicesque fœminas à fide cultuque Dei, & vera pietate abducant improbas, probasque. Ita sit ut multis mulieribus præsertim maleficis dæmones nonnulli familiariter utantur, alij fœminarum instar viris subiiciantur. Sunt enim alij incubi, alij succubi inde vocati: deorumque, & deorum inde ducta opinio. Porro miscentur

ſcentur dæmones mulieribus virisque vel corporibus ex aere circumfuſo cōſectis: vel cadaueribus humanis aſſumptis: vel certè coëuntium virorum aut ſcæminarū ſpecie oculis obiecta, partibus interim genitalibus titillatione adhibita, aut ſeminis profuſione advenirem accenſis: vel denique eximię voluptatis cogitatione mente perturbata. Denique exiſtimo ſemen iſtud, partim dæmonis concubinarum eſſe, quodcumque per æſtum libidinis, & congreſſus incendium emiſerint: partim virile calidiſſimum, craſſiſſimum, & copioſiſſimum (quamquàm frigidiffimum plerumque ſentiunt Lamiæ) per nocturnas petulantiffimorum adoleſcentum pollutiones tanta ſedulitate à dæmone exceptum, tantaque celeritate, tamque idoneo ſotu adhibito in locellos muliebres immiſſum, vt ſcœcunditati eius, calorigue, æris obuij, & frigidioris noxa nullo modo obſit.

Ita tandem longiori digreſſione Magorum, & maleficarum mulierum nomen non eſſe inane docuimus: multosque morbos ab illis inferri, & coitus impotentiam, atque ſterilitatem, vtrique quidem ſexui, ſed virili frequentius conciliari demonſtraui-
mus, vnde ortum ius, ob frigidos, & maleficiatos coniuges, dirimendi diſſoluendique coniugij. Poſtremo ſalutaria magicorum morborum, & maleficiorum tam phyſica, quàm metaphyſica remedia appoſuimus.

Sed enim tertia ſterilitatis cauſa prætermittenda non eſt, obſcura valde vereque diuina, & à iuſtiſſimo numine vel piorum hominum fidem probante, vel impiorum nequitiam vlcifcente proſecta, vt ea nullis aliis præterquam diuinis auxiliis piisque

Sed dæmones tamen cùm neque ubique, neque nullibi, neque ibidem semper sint: immobiles sane non esse constat. Motus ergo dæmonum, corporumque diuersa ratione obiri solèt: ille quidem triplici discrimine secatur, vt prima eius species successiua, & continuata loci mutatione constet, qui proprie motus dicitur. Secunda per accidens motus est, cùm alterius rei motû sequitur, vt nauta navis, in qua est, quamque impellit. Tertia species motus mutatio quædã, quæ alio atque alio loco aliter fit; tum quæ res in priori loco definit esse per primum sui non esse, tum in posteriori esse incipit per primum esse: quæ species motus formis omnib. quæ in instanti informare incipiunt communis est.

Primam motus speciem dæmones, vt pote incorporei, non subeunt. Secundam speciem tum demum experiuntur dæmones, dum hominum officia, actionesque imitaturi ex aere, aut igne, alioque elemento corpora sibi effingunt: aut animalium etiã cadavera assumunt, quæ nutu suo moueant, simulq; cum illis quibus inherere moueantur. Atque hic quoque motus, tametsi accidentarius sit, successiuus tamen & temporalis intelligitur, tametsi momentaneus: quod omnes medijs in via aëris partes agitët & transmittant: vt cùm Raphaël ad Tobiam, Gabriel ad Mariam properauit. Sic candela ad motu extremo finis totam stupam celerrimè percurrit, peruritque. Tertiam denique motus speciem dæmones suscipiunt, dum ex vno loco in alium sine tempore, & cum mutatione non quanta transfiliunt. Si enim corpus per vacuû (auctore Aristotele) in instanti ferri possit, quia omnis morę, tarditatisq; motus corporis causa à resistētia medijs oritur: cur substantię dæmonũ
incor-

incorporeę sine tempore per plenum nō ferantur?

Constat igitur dēmones, tametsi incorporeos, in aliquo tamen esse loco: non tamen simul in plurib. ex coq; in alium in instanti transilire, atq; in eodem vel cōsistere, vel inde exire posse; nisi Dei iussu aliter cogantur: sicut dēmon quidam religatus in solitudinibus Ægypti à Raphaële apud Tōbiam legitur.

Cæterum morbos omnes tam physicos, quàm metaphysicos inferunt dēmones vel sponte sua, nullaque humana interueniente industria, non tamen iniussu Dei hominum iniustitiam, vt Saplīs regis, dēmonū opera & cruciatu vlciscentis: aut patientiam, vt Iobi, exercentis: vel magorum, aut lamiarum pro uocatione, quasi diriseorū execrationibus, carminibus, imaginib. &c. coacti, aut deliniti dēmones miraculorū effectricem vim iisdem impertiantur, quorum ipsi tamen soli dēmones sunt authores. Neq; n. tam facinorosi homines tot trans naturam mirifica opera, quib. gloriari solent, aut vi diuina, quam non implorant: aut propriis naturę suę viribus: aut vllis deniq; instrumentis, quorū vires maiores non sunt quàm ipsoꝝ artificum, obire possunt.

Sunt igitur ista magica instrumenta, sicuti Lamiarum pleraque alia initi cum dēmonibus pacti expressi, tacitiue symbola; quibus ad vota maleficorū explenda sollicitantur. Est enim Augustino pactum hominum cum dēmonibus duplex: vnum expressum: alterum tacitum. Prius illud manifestis verbis, & mutuis hominū maleficorum, dēmonumque stipulationibus constat: cuiusque ferè formula est, quod malefici Deum,

Deique cultum, & veram pietatem expressis clarisq; verbis abiurant; totosque dæmonibus, & eorum cultui sese vouent, deduntque; dæmones illis vicissim omnium consiliorum, votorumq; suorum optatos exitus pollicentur. Posterius obscurum est, ut cum aliquis, nullo etiã cum dæmonib' iſto ſcødere, nulloque Dei odio, & impietati addictus in inanibus tamen & inefficacibus per se instrumentis cogitationum suarum spem collocat. Sic enim cum dæmone instrumentorum istorum inuentore inscius paciscitur.

Iſto igitur tam horrendo pacto adducti dæmones vel magos ipsos semper comitantur minuta aliqua specie, cryſtallis, speculis, annulis sua sponte inclusi (hos *παρῆσποι* Græci vocât, i. accessores & consiliarios) vel diris imprecationibus euocati conspicua quadam imagine sese ostentare solent, magorû que rogantium quæstiones voce, pictura, alioue modo soluere.

Hinc magicæ diuinationis cõplures differentię notantur. Vna Lecanomantia, cum tenui, exilique voce erumpente ex aqua in peluim diffusa, cui laminæ aureæ, vel argentæ, vel lapides quidam pretiosi certis characteribus insculptis immerſi essent, accitus dæmon quæſitis respondet.

Altera Gastromantia cum dæmon puero impubere, aut muliere prægnante obseruante rogatus, à Mago iussus, flagitatus responsa sua expedit certis imaginibus in aqua limpidissima expressis; & per media vitrea vasa rotunda aspectabilibus, & cercis accensis albis.

Tertia est Catoptromantia cum in terſis, nitidis, & perspicuis speculis quæſitarum rerum euentus ſci-

tis

dis imaginibus dæmon renunciat. Hac frequenter
usus est Iulianus Imperator.

Quarta est Crystallomantia cùm dæmon in cry-
stallis affabrè expolitis impendentes rerum calus
aptis quibusdam figuris expressos præmonstrat.

Quinta Dactylomantia cùm in annulis rerum ex-
petitarum à dæmone depicta signa obseruantur: qui
sub certo cœli positu conflati sint. Talem referunt
historiæ Gygis annulum fuisse, quo in palmam con-
uerso alios videbat nec ipse videbatur.

Sexta Onymantia oleo & fuligine vnguibus pue-
ri impuberis illitis, solique obuensis constans, qua-
rum lineæ quædam rerum expetitarum imagines
referebant.

Septima denique Hydromantia duobus potiss.
modis exercebatur: tum annulo in cyathum aqua
plenum manu libratum qui filo suspensus esset: tum
coniectis in aquam tribus lapillis, indeque gyris a-
quæ diligenter notatis.

Taciti pacti rei sunt Magi, Astrologi, Augures, Ha-
ruspices, Præstigiatores, & diuinatorū omne genus:
Non tamen quod alienis commodis, salutique insi-
dientur (cum potius prodesse quam plurimis futuro-
rum prædictione gestiant) sed quod impiam, veti-
tamque à Deo diuinandi artem profiteantur: quam
neque discere, neque exercere sine tacito cum dæ-
monibus fœdere possint, cum ab illis coactis consi-
liorum votorumque suorum faustos exitus expe-
ctent. Illi enim coacti astrictique Magorum serui-
tio videri volunt, ne fraudis, doliq; suspecta sit vo-
luntaria cum illis cōsuetudo, & familiaritas sua. Er-
go illud hominum genus totum Deo non tantum
exosum est, & execrabile: sed eorum etiam consul-

tores, quique occultarum rerū siue præteritarū siue præsentium, siue impendentium notitiam ab illis sciscitantur. vide caput 28. Deuteronomij, & 20. Leuitici.

Expressi pacti consciæ sunt Lamiæ & maleficæ omnes fœminæ quæ cum cacadæmone scientes, vigilantes, valentesque ea lege paciscuntur, vt bellum Deo indicāt, veramque pietatem & religionem abiurent: dæmoni cōtra cultum fidemque iurent: eamque tum admissio, inuſtoque eius caractere in abdita quandam suorum corporum particulam: tum sacrificiis eiusdem, conuiujs, choreis & libidinosis scortationibus frequenter celebrandis confirmant.

Neque verò Lamiarum pactum hoc cum dæmonibus tanquā delirantium, & somniantium falsum semper, & imaginarium habendum est: cū id ipsum sponte sua, beneque valentes, vigilantes, audientes, & videntes plerumque inēant: initumque constanter obseruent. Neque etiam naturarum disparitas inter paciscentes pacti huius vim eneruare potest, cū inter Deum & homines sanctissimū fœdus valeat: neque diuersa paciscentium voluntas, cū expressis & perspicuis verbis constet: non denique dolus, & fraus dæmonis, quem hominis prudentis piique est omni ratione cauere.

Fabulosa quidem pleraque sunt quæ supra naturam iactant opera insipientes aniculæ: iisque vel dormientibus, vel melancholicis, & delirantibus persuasa à dæmone: cuiusmodi sunt, Sublimes ex baculis tanquam equis perniciosissimis ferri: In bruta mutari: Aerem à seipsis turbari: Tempestates, fulgura, fulmina cieri: morbos immitti: Homines, brutaque solo nutu, tactu, visu necari: sege-
tes

tes sterni, agros vastari: multa que alia humanis viribus omnino maiora miracula, de quibus ait Poëta:

*Illa carminibus promittunt solvere mentes,
Quas cupiant aliis diras immittere curas:
Sistere aquam fluviiis: & vertere sidera cælo.*

Permulta tamen etiam vera sunt, n. agnisque hominum detrimentis, brutorumque cladibus cōprobata, benevolentibus interim & vigilātibz, nulloque modo desipiētibz Lamiis: nisi eò fortasse quod à seipsis illa præstari putāt, quorum cacodemō solus ita iubente, aut permittente Deo, author est. Ideoque maleficia sua sceleratæ scēminæ pœnarum meru cautissimè tegere, & constantissime pernegare solent. Norunt enim se impiè acturas antequam agant, & dum agunt, aut postquam egerint, summum Deum capitaliter lacerare, vt dæmoni peruersissimo obsequantur.

Exploranda itaque accuratissimè magistratui scēminarum fascini alicuius rearum sanitas est, & constitutio corporis, animique, ne fatuis, deliris, melancholicis, & somnio aliquo delusis aniculis temerè capitalem pœnam irrogent, quæ euchymo potius victu, & idoneis purgationibus mentis integritati restituendæ sint: Impia autem earundem benevolentium facinora, & maleficia manifesta impune in repub. non ferāt. Horum enim tametsi solus dæmō author sit, earū tamen culpa excusanda non est, nec dissimulanda, à quibus dæmonum nequitia accendi, & stimulari solet. Quod Dei veri præceptum est cap. 18. Deuteronom. & 20. Leuitic.

Quid igitur? si iusta Magorum supplicia à Deo ipso decreta sunt: cur Lamiarum iniusta habeantur?

aut si illa concessa, cur hæc prohibita censeantur? Cur ferro, igni, cruce tam dira impietas non expiabitur?

Magi à Dæmone suis carminibus aliterue coactò responsa exprimunt: rerumque perficiendarum subsidia ab inuito extorquent (vt sibi quidem videntur:) Lamia à Dæmone volente, suisque libidinosis illecebris delinito eadem accipiant. Magi longiori studio, librisque pluribus cogendorum & euocandorum Dæmonum artem perdiscunt: Lamia vnico præceptore, & nunquam deserente dæmone instituuntur.

Magi præstigias ambitionis causa, vtque cæteris hominibus antecellere videantur: Lamia fascinum in hominum, brutorumque necem, aut ad plantas & segetes vastandas moliuntur. Magi denique dæmones abhorrent, & execrantur, iisque tantum vt vilissimis mancipiis vtuntur: Lamiæ eosdem singulariter amant, colunt, & venerantur.

Quid, quod fœdissimos, & spurcissimos eorum amplexus, conuiuia, choreas, colloquia auidissime consecretantur miseræ concubina? Est igitur auctor, & iudice Deo iustissimo insanarum Lamiarum impietas deprehensa, acerbissimis, & capitalissimis suppliciis à Magistratu vindicanda.

Choreis sanè, lasciuis saltationibus, & obscenis sermonibus cum suis clientibus siue cultoribus sub ficta humana specie, & conspicua dæmones vti possunt. Epulis & comotationibus nisi præstigiöse non possunt.

De coitu Dæmonum cum Lamiis.

ARdua magis est de coitu dæmonum cum fœminis humanis disceptatio: quem tamè vetustas

stas vt hominum, & cum deabus fœminis certissimum esse duxit, ex eoque congressu egregios viros prope omnes genitos esse prodidit, quos ab eiusmodi amore Heroas vocitauit, quasi Semideos ex Deo, & fœmina, vel ex Dea, & homine natos. Vt Herculem à Ioue, Romulum à Marte, Alexandrum ab Hammone, Achillem à Thetide, Aeneam à Venere. Hinc quoque tam multa deorum, deorumque apud Poëtas (fortasse non mendaces) adulteria vera, certisque euentibus comprobata narrantur.

Quid, quod eundem dæmonum & fœminarum congressum fuisse fœcundum: ex eoque gigantes robustissimos, maximeque impios homines propagatos esse sacris libris vt Genes. c. 6. legimus? Sic enim filios Dei, à quibus hominum filias eximie pulchritudinis suæ causâ amatas fuisse creditur, eo loco Dæmones Theologi plerique interpretantur, vt Iustinus Martyr, Clemens Alexandrinus, Tertullianus, Sulpitius Seuerus & alij. Nonne August. lib. 15. de Ciu. Dei, Siluanos & Faunos, quos Galli Dufios vocât, amoribus mulierum capi, iisque potiri tam certum esse affirmat, vt hoc negare impudentiæ proximum illi videatur? Augustino quamplures alij Theologi subscribunt Ioseph. Lactant. Isidorus, Giraldus, Franciscus Mirandulan. Ex quibus constat, Dæmonum libidinem non in maleficas tantum, & impias, sed probas etiam piâsque fœminas effusam aliquando esse.

Sed enim congressum eiusmodi philosophicæ leges manifestæ falsitatis condemnare videntur.

Primum enim statuunt, nullas naturas nisi

ſcentur dæmones mulieribus virisque vel corporibus ex aere circumfuſo cōſectis: vel cadaueribus humanis aſſumptis: vel certè coëuntium virorum aut ſcæminarū ſpecie oculis obiecta, partibus interim genitalibus titillatione adhibita, aut ſeminis profuſione advenirem accenſis: vel denique eximię voluptatis cogitatione mente perturbata. Denique exiſtimo ſemen iſtud, partim dæmonis concubinarum eſſe, quodcumque per æſtum libidinis, & congreſſus incendium emiſerint: partim virile calidiſſimum, craſſiſſimum, & copioſiſſimum (quamquàm frigidiffimum plerumque ſentiunt Laniæ) per nocturnas petulantiffimorum adoleſcentum pollutiones tanta ſedulitate à dæmone exceptum, tantæque celeritate, tamque idoneo ſotu adhibito in locellos muliebres immiſſum, vt ſcœcunditati eius, calorigue, æris obuij, & frigidioris noxa nullo modo obſit.

Ita tandem longiori digreſſione Magorum, & maleficarum mulierum nomen non eſſe inane docuimus: multosque morbos ab illis inferri, & coitus impotentiam, atque ſterilitatem, vtrique quidem ſexui, ſed virili frequentius conciliari demonſtraui mus, vnde ortum ius, ob frigidos, & maleficiatos coniuges, dirimendi diſſoluendique coniugij. Poſtremo ſalutaria magicorum morborum, & maleficiorum tam phyſica, quàm metaphyſica remedia appoſuimus.

Sed enim tertia ſterilitatis cauſa prætermittenda non eſt, obſcura valde vereque diuina, & à iuſtiſſimo numine vel piorum hominum fidem probante, vel impiorum nequitiam vlcifcente proſecta, vt ea nullis aliis præterquam diuinis auxiliis piis que

precibus summoueri possit. Sic Isaacus coniugi suæ sexagenariæ post viginti annorum sterilitatem perpetuam quotidianis votis foecunditatem impetrauit. Sic Abimelechi Gerarorum regis domus tota ob raptam Abrahami vxorem Saram sterilitate tantisper multata est, dum eam viro suo restituisset.

QVÆ-



QVÆSTIO DI- SPVTATA A IOANNE HVCHERO CANCELLARIO,

in Doctoratu D. Richardi Laurentij: an-
no 1588. die 14. Ianuarij.

QVÆSTIO hæc in arte nostra est
nobilissima & antiquissima (Viri Mon-
pelientes) Sitne in morbis humanis ali-
quid diuini, vel an vlli sint supra na-
turam hominum morbi à dæmonibus oriundi: sic
enim vetustatis exemplo, deorum nominibus dæ-
mones nominare modo libet.

De hac quæstione Hippocrates noster nequaquã
dubitauit, qui diuinam istam morborum originem
egregij medici prognosin decere præcepit.

At Galenus eandem pernegauit, illamque Hip-
pocratis sententiam ad communissimam epide-
miorum morborum causam, ex insolenti quadam,
& vehementi aeris intemperie, reuocauit.

Non defuerunt multi quidem grauissimi philoso-
phi, medicique, quib. nullos omnino dæmones esse,
nedum illas ab iisdem supra naturam ægritudines
suscitari posse, visum est.

Primum enim corpus omne animo, & intellectu
præditum, neque æternum, sensu quoque vigere dis-
putant, siue generabile, siue ingenerabile sit: quod
axioma ex Aristotele in libris de Anima arripiunt.
Huiusmodi autem præter demonum naturas, aliud

nullum fingi posse: cælestia enim esse æterna, humana verò nascendi vicissim, moriendique legibus iactari, traducique. Porro qui tangendi sensu valeat, eundem corpore ex quatuor elementis concreto cōstare: cum autē nullū tale corp⁹, scilicet intelligens, sentiens, ingenerabile, & caducum vsquam occurrat, ne dæmones quidem vllos inueniri posse constanter affirmant.

Deinde sanitatem addunt illi, affectum esse secundum naturam, causisque naturalibus omnibus & proximis constare. Eam itaque neque à Dæmone, neque ab arte quālibet excellēti, sine causarum naturalium aduersis viribus eueriti posse, cum rerum omnium à suis contrariis genere eodem cōtentis mutatio sit & corruptela.

Statuunt insuper æternorum æterna, caducorum caduca, esse principia: ac proinde æternis dæmonū substantiis opus caducum, (qualis est valetudo,) sine causis naturalibus, & cadutis adscribendū nullū esse.

Postremo emerferunt alij nuper artis nostræ proceres, à quib. tū dæmones ipsos huic mūdo inferiori vindicatos, tū plurima eorundē supra omnē naturæ vim, & portentosissima opera peruulgata, citatisq; exēplis cōfirmata, acceperim⁹. Hinc enim non solum occultissima consilia & facinorā retexta, & futuros, tum cōmunes gentium, & populorum, tum singulares hominū casus, multis ante dieb⁹, mensibus, annisque prædictos: sed frugū quoq; plantarumq; miserabiles calamitates, hominū, & iumentorū funestissimam stragem inuectam esse, profitentur.

Quamobrē in tanta huius quæstionis obscuritate illustrāda, rationū potius luce clarissima, & populari fide, quam magistrorum istorum tam anticipiti, & discre-

discrepante doctrina, nitar, ostendamque imprimis demones esse: deinde eorundem infinitis odiis, malorum genus omne, & ægritudinum naturalium hominibus comparari: postremo dæmonias istas, siue diuinas ægritudines explorandi, dignoscendi, curandique artem subiungam.

-- *Longa est iniuria, longa*

Ambages, sed summa sequar fastigia rerum.

Ergo post vnum Deum, & diuinas Intelligentias (de Angelis loquor) alias duas diuinitatis eiusdem, & immortalitatis participes substantias, in sublunari hoc orbe versari, à præstantissimis philosophis, Aristotele & Platone, demonstratum est: Vnam hominum, cuius proprium intelligendi munus supra naturam est, neque vlla eius offensione, & iniuria, violatur: reliquæ autem eiusdem functiones corporum sunt communes, quorum vitiis labefactantur. Alteram dæmonum (quasi felices eos, & sapientes dixeris,) quos in eudæmones, & cacodæmones partitus est Plato, eorumque vires, & proprietates omnes in Socratis dæmonio, exposuit: quem postea sequutus est Plutarchus.

Nostra quoque Theologia Christiana, eorundem naturas, & differentias omnes accuratissimè prosequuta est, bonos enim, & malos Angelos, seu dæmones, proponit: bonorum ordines tres, totidemq; singulorum ordinū choros, pro nobilitatis suæ discrimine, statuit, penes quos totius mundi potestati, & cuiusq; hominis, ciuitatis, gētis, reipublice, imperij, regniq; administrationē collocauit. Malos autē totidem ordinibus, chorisque distractos, & à summi Dæi intuitu, (quo boni omnes semper fruuntur) in tartarum, id est elementarem hanc plagam, prostratos abiectosque esse docuit.

Extant etiam feueriffimæ leges, non Theologorum tantum, (vt Moſis in Deuteron.) & philoſophorum, vt Platonis, in libris de Republica libris, ſed Iuriſconſultorum etiam Romanorum, in duodecim tabulis, item Imperatorum, regum, gentiumq; omniũ, in ſcleratiffima dæmonum mancipia, magos, & ſtryges vt vocant.

Hippocrates autẽ de diuinis, vel dæmoniis morbis, argumentũ probauit quidẽ, ſed prætermiſit tamẽ. q̃ ei phyſicũ, cui vni addictus erat, non ſatis videretur.

De Galeni errore equidem ſic ſentio, eum inde ortum, quod nullã diuinitatis ſcintillam in hoc orbe inferiori, aut dæmonibus, aut hominibus arbitratuſ fit ſupereſſe. Neque vero Ariſtoteles libro de diuinatione, ab hac de dæmonibus opinione, abhorruit, cui dæmonia quãdam ſomnia, non tamen diuina probata ſunt, quod ea ſtultorum magis, quã ſapientum propria videantur. Neque etiam idẽ philoſophus lib. citato de Anima, dæmones ipſos ſuſtulit: ſed dæmonũ corpora ex aẽre conſicta à Platone, tollere ſtuduĩt, quibus ſublunarem materiam totam promiſcue potius, quã certam eius particulam, vt aerem maluit eſſe tributã, qua inſtrumẽtorum potius, quam corporum vice vterentur. Deniq; in æternis dæmonum ſubſtantiis, ob mutabile operum conditionem, varietas nulla putanda eſt: ſic enim à motore primo immobili, & æterno, æternus quoque motus primus oritur, apud Ariſtotelem: ab hoc tamen finiti diuerſique reliqui propagantur: ſic humanus etiam intellectus, ex caducis phantaſmatis caducam elaborat ſcientiam.

Quamobrẽ ſi vniuerſas Theologorũ, philoſophorum, Iuriſconſultorum, & omnium prope gentiũ,

de

de natura dæmonum, sententias dispiciamus, equidem vehementer extimesco, ne aut desipere, aut veritati temere repugnare videamur.

Iam ergo dæmonum fraudes, nōxasque, aggredior (qui alter est huiusce disputationis locus). Nocent autem dupliciter, tum per se, tum per impios magos.

Atque hi quidē magi publicę securitati insidiari, quatuor modis solem: præstigiis, maleficiis, vaticiniis, & medicamentis: Præstigiis quidem magicis, videndi sensus bifariam deluditur: tum rerum absurdarum idolis, à dæmone intus, in ipso oculo, ob pupillam exaratis: tum specierum excipiendarum peruersione, vt obiecto visili commoto, ipsoque visio- nis medio personato, & ab inductis corporibus ali- enis perturbato, ne in sua figura & magnitudine res videndę cernantur. Priori illo hallucinationis mo- do fit vt sicut phrenitici suffusique, internis spectris quasi externis, forisque irrupētibus perterrentur: sic præstigiati à dæmone, furti, furesque in cyatho perspiciant; cum eadem prouectiores, qui adsunt viri aspicientes nequaquam inspiciant. Posteriori modo, alienę prorsus rerumque naturis repugnan- tes formę, pluribus obiectantur, vt Aëxonis illius in ceruū: & sociorum Vlyssis in suēs, canes, asinos: & alię id genus poëtarum metamorphoses. Simile est perditarum inagarum vmbraculum, quę felis, canis lupive speciei, in cunis infantes immaniter iugulant, aut venenis necant.

Maleficia instrumentis tribus grassantur, epodis, id est incantationibus, nodis, & imaginibus, quibus hominum corpora grauissimis implicant morbis, & animos efferatis odiis, amoribus, & terroribus sollicitant. Tum etiam pecorum gregem, peste, ab-

ortu, & lactis penuria, conficiunt: tum fruges deniq;
arboresque, & agros ipsos, nebulis, imbribus, grādi-
ne, & pruinis miserabiliter perdunt & depopulātur.

Diuinationis magicæ tripartita est materia: the-
sauri abditæ, cædes, furtaque occulta, negotia, &
consilia dubia: Prima species vanissima semper
fuit, & dæmonū ludibriis sæpe intermixta. Secunda
multipliciter à dæmone agitur, in annulo, vngue,
vitro, aqua, crytallo, furtorū species furumq; vultus,
gestus & habitus, impubi simplici que puero exhi-
bente, & aliquando corā eloquēte: cuius tamen vo-
cē cæteri audientes nō exaudiunt. Sic statuarum re-
sponsa, apud priscas quasdā gentes edita fuisse con-
stat. Tertia ex dissectis sparsisque, vltro citroque
punctis quibusdam, figuras effingit: quibus consilio-
rum, & negotiorum omnium initia, exitusque af-
fingit: Goëtia hæc vocatur. Quartum insidiarum
magicarum genus, in ficta quadam bonæ medici-
næ specie versatur, quod apud idiotas quosdam ho-
mines, & deliras aniculas sanctum, & venerabile
semper fuit, ob breues facilesque morborum diffi-
cillimorum curationes, qui maleficiis inflicti sunt:
ista enim aliæ construunt, aliæ destruunt: aliæ al-
terutrum tantum possunt. Atque quatuor illæ sunt,
magicarū insidiarū fraudumq; species fainosissima.

Sedenim flagitiosæ huius magicæ professionis,
nolite (quæso vos) artem aliquam, & præcepta
expectare. Tota enim ex familiaribus dæmonum
commerciis; mutuisque pactis conflata est publi-
cicis, priuatisque. Ex iis autem quædam tacita
sunt, cum diuinos ritus, gestu, verboque obscæ-
no profanare, tyrones suadentur: Alia expressa,
cum eisdem ritus, vt abiurent expressis, clarif-
que

que verbis monentur, aut à dæmone ipso, virilem vultum præferente, aut ab initiatis. Publica pacta sunt, cum in celebri magorum, dæmonumque concione, catholicam fidem, initiandi detestantur: perpetuam magisterulo (ita dæmonem vocant) præsentī, stipulantiq;e, obseruantiam, & omnem corporis, & animi potestatem promittunt: quibus vicissim versutus dæmon, præter portenta ista præstigiārū, maleficioꝝ, vaticiniorū, & sanationum, tantā in quæstionibus, & tormentis re promittit constantiā, vt ea non modo sine vllō dolore, & gemitu, sed cū voluptate etiam perferant. Quinetiam characterem alicui eorum parti affigunt, qui scelerum cōfessionem, donec euulsus sit, coram iudicibus, & tortoribus colibeat. Postremo horrendū, impiūq; & execrabile fœdus, nefariis ceremoniis sancit: raptosq; & discerptos inembratim pueros, dæmonibus immolat, eosq; diutius coquēdo in liquore resoluunt, in vtribus seruādum, cuius potu artē portentosam perdiscāt. Solidam autem partem in vnguentū concinnant, quo peruncti trāsformentur, & per aerē sublimes rapiātur. Hinc humane carnis Magorū auaritia, vel potius rabies tanta, vt alienorū puerorū penuria, aut putria è sepulchris cadauera diripiant, aut in proprios liberos manibus, detritibusque sœuiāt. Quid? quod iisdem nefariis cōcionibus, magica officia viritū à dæmone initiatis, distribuitur, segnesq; plectūtur: priuatim vero obstetricibꝰ præcipua cura mādatur, pueros nascētes necandi, aut eosdē dæmoni, ante baptismū deuouēdi. Quid? qꝰ epulātur ibidē, saltāt, scortantur etiā cū dæmone virgines, scēminēq; quæcūq; vetularū inagarū lenocinio, ad libidinosas eius illecebras deduci po-

tuerunt. Sic enim olim gigantes: sic heroës ex Iouis, aliorumque deorum, cum fœminis humanis coitur, natos quidam putât (*ēpos* enim amorē significat.) Sic deniq; quos poetæ faunos, satyros, syluanos, & nymphas vocarunt: Theologi nostri incubos, succubos vocant. Hæc astutissimi dæmonis insidiosissima œconomia est, ex qua flagitiosorum magorum infauista familia incredibiliter crescit.

Verum enim uero ridiculum, fabulosumque dæmonum cum hominibus, quantumuis scelestis, cōmercium vobis fortasse videatur, vt pote quorum negocia, consiliaque, aut intellectu, aut sensu capi nullomodo possunt: neque enim intellectus singularia tractat, sed cum substantia eius actus sit, in seipsum tatum, authoremque suum diuiniorē referitur: Sensuum autem subsidia, simplicissimis dæmonum naturis insita non sunt: At sane intellectus speculatiuus, vt angelorum, est æterna, & inuariabilis actio, est suiprius, creatorisque Dei contemplatio: Dæmonibus autem circa mutabilem hunc orbē occupatis, præter speculatiuum practicus adiunctus est, cuius propria est ratiocinatio, & ex vniuersaliū notiōe, singularium æstimatio, perceptioque. Deinde vniuersalia intelligentes, quæ singularibus semper connexa sunt, speculati phantasmata necesse est, vimque imaginandi dæmonibus esse attributam, quæ quod umbraculis corporeis offusa, oppressaque non sit, res externas omnes (excipio semper futuras, quæ quod non sint, imaginationem nusquam possunt mouere) sine sensuum adminiculis comprehendit: ea autem ignauissimo, tardissimoque animantium generi à natura tributa sunt, vt collectas in illis rerum intelligendarum species, indeque

que in spiritum, & mentem alius infixas; constanter asseruet, ne ciborum vaporibus excussæ, exoleſcât. Hinc matutina hominum somnia, cocto cibo, clara, rectaque magis, quàm eodem adhuc crudo, esse solent: Hinc specillis vitreis, collecta luce, visio: Hinc expansa ad aures manu, suppressoque somno, auditio iuuatur.

Postremo dæmones ipsi, quatenus magnitudini assident, communes quasdam coniuncti corporis affectiones subeunt, vt amorem, odiumque, mœrorem, & lætitiâ &c. vt quorum negocia, consiliaque intelligunt, iisdem prodesse, vel obesse, potius velint.

Neque verò idoneis operum suorum instrumentis Dæmones orbatî sunt, quæ vel ex sensili corpore, vel ex spiritu insensili, nutu suo, elaborant. Hinc illud quod de Socratis dæmone apud Platonem, & Xenophontem legitur. Illinc venerei dæmonum concubitus prædicantur, qui tamen sæcundi esse, sine semine, & corpore vegeto, vnde id ipsum defluat, nō possunt: nisi vero ab arte etiam animal excitari posse sentias, cum sit intellectus practicus eorum; quæ non à natura similium semper procreatrice, sed ab arte fiunt, & dæmone, principium. Illinc quoque brutorum, hominum, segetum, à dæmonibus per aerem facta translatio, & vectura: Omnis enim intelligentia motiua corporis est cui assistit, nullumque tam graue est, quod eius impetum remoretur.

Adhuc dæmonū, maiorūq; cōmunis clades exposita est: hæc vero dæmonū propria, cū acerbissimis læuissimorū morborū cruciatibus, vt epilepsiæ, cōuulsionis, palpitationis, leipothymix, delirationis,

vociferationis, obsessa hominum corpora exanimat: neque enim vnus tantum, vnaque corporum sede latitat dæmon, sed plures aliquando propèq; innumerabiles in variis partibus diuersantur: alias interna hominū supplicia incendiis externis alunt, fouentq;. Quāobré proximus disputationis locus nostræ est, an ægritudines illæ, dæmoniæ sint, siue diuinæ, secundū naturā, aut supra eandem habendæ sint.

Intellectus quidem practicus eorum est, quæ ab arte, & dæmone fiunt, supra naturam principium: Ideoq; maxime admirabilia vtriusq; opera obseruatur: neq; enim versutissimus dæmō minus, quā peritissimus artifex, expeditis instrumentis vtitur, cum in corpus quodlibet sese insinuat, ab eoq; cū libet, subducatur, cōmoueat, transferat, diuidat, componat. Dissident tamen inter se, quod artifex nunquā, dæmon cum natura semper operatur, neq;. Phœbas vaticinatur nisi Deo plena, & incitante foris, intusq; dæmone. Porro imaginatio cū corporea omnino sit, corpus ipsum vicissim cōmouet, immutatq;. saltē leuiorib. affectionib. vt leipothymia ex vulneris alieni intuitu, hæmodia ex asperi soni auditu, scœtuū maculis ex prægnātium vitio appetitu: neq;. tamē in propriū corp^s potest omnia imaginatio, nō enim melācholici minimā suorū somniorū particulā vel speciē suscipiūt, Illa certē in alienū corpus per seipsā nihil potest: itaq;. neq;. omni animatiū generi, neque toti eorundem alicui speciei, cōmunis est: sed paucis quibusdā indiuiduis magica, & tabifica imaginatio propria est, vel ex dæmone assentiēte, iuuāteq;. vel ex spiritu venenato emiss^s, vt à Magis iracūdis, & Lybicis quibusdā, & Illyricis populis, basilisco, lupoq;. neq;. enim eadē est mēti diuinæ similis, cuius nutu omnia obeuntur, vt sint res omnes, aut nō sint, quia

ita sentiat, neq. certe humano intellectu præstâtior qui tamen ab intelligibili tantum moueri potest.

Hactenus ægritudinum genus omne à dæmone cōtrahi posse, spiritu impuro & venenato, vel solo, vel dæmone inharēte, in corpus animātis inculcato, eoq; multipliciter versato, alterato ve, ideōq. ægritudines omnes dæmonias in naturalibus habendas esse satis accuratè demonstratū, arbitror. Quapropter vltimam huius disputationis particulā, de dignoscendis, curādisq. ægritudinibus istis dæmoniis, siue diuinis, breuiter perorabo. Earum autē species alias perspicua est, quæ à natura omnino degenerat, alias perobscura, quarū scilicet causæ, & symptomata natural. b. omnino respōdēt. Ratio autē istas demōstrādi bipartita est, vna superstitiosa, fallax, & execrabilis, quæ ex guttularū plumbi figura, liquati diffusi- que in aquā super ægrū corpus, maleficij speciē detegit: altera artificiosa, & erudita, tū in obsessis, tum in aliis maleficis prodēdis, versatur. Ab his. n. inductas ægritudines demōstrat, tū maleficij instrumētū repertū, tū efficacissimorū remediōrū physicorū irritus lōgusq. sine vllō fructu vsus: Obsessos autem indicant tū sacrorū rituū, verborūq. odium, tū particularū variarū terrificæ symptomata (mouetur enim cū spiritu quasi animal quoddam, vltro citroq. dæmō) Itē alieni ignotique sermonis elocutio, perceptioque: denique suffitus aromatū, quibus aut fugantur dæmones, aut vehementer exacerbantur.

Iam vero ægritudinū istarū curatio methodica edifferatur: Illa quidē est & physica, & metaphysica: hæc rursus duplex, Vna magica, quādo magi, aut dæmones, morborū à se illatorum, remedia cōferunt. Altera theologica, quādo sacerdotes diuinis nominibus, sacrisque, & abiurationib. in Ecclesia instituta

dæmones terrent, fugantque: Sed physicam, & artificiosam confectari magis placet, qua obsessi à Dæmone, & à Mago afflicti iuuari possint: Multa sane apud Dioscoridē, & Pliniū inter animalia, plātas, & lapides medicamēta annumerantur, quæ sub certo cœli sydere, & syderis aspectu, situq; collecta, reposita, & vsurpata, ægritudinibus dēmoniis, medeantur, quorū magna pars magica est, & superstitiosa, nihilque ægritudinibus istis refragāte dæmone, pioq; administrāte medico, opitulatura: talia sunt, scilla, betonica, ciclamini, moly, cētauriū, rhamnus, chrysanthēmū, quercus marina. Physica autē remedia, ex intima propriaq; facultate, nō ex cōditionibus illis superstitiosis, eadē ægritudines expugnāt, & demoliantur. Cū enim proxima eaiū causa sit spurcus quidā & venenat⁹ spiritus (vt ante expositū est) siue dæmone absēte siue præsente, illi sane spiritui causas naturales operibus suis proximas adhibet physica curatio: vnde cōstat, ægritudines dæmonias, in naturalib⁹ numerādas esse, quod ipsū pleni⁹ iā demōstro. Animæ humanæ functionū omniū princeps, minister, & adiutor est vitalis spirit⁹, tū maxime incorpore⁹, & ad motū omnē valde præceps, tū qualitātū expers, vt omniū ex æquo sit capax, tū deniq; naturæ diuinioris, quàm caduca elemēta, & æterno elemēto respōdēs stellarū, ex quo, & solis radiis coeuntib⁹, emergit illa magni mūdi, omniū quib⁹ vita cōmunis est, parēs, & author: Sic dæmonis officiorū omniū opportunissimū instrumētū, spiritus est, ex quocunq; corpore physico, vt veneno, cadauere, & inquinatis humorib⁹, medicarū distillationū, & infusionū instar illect⁹, vnde fere sulphureo, foetidoq; odore, aerē fugatus dæmō corrumpit. Huius autem spiritus, alias motu solo, quem ille nutu suo ciere

potest, opera sua præstat, & visile etiã aliquãdo, atque tactile corpus sibi architectatur: aliàs etiã hoc ipsum præstat alteratione per primas, secundasque qualitates gignēdis hominū affectibus simillimas, quas materia medica sedulo dæmoni subministrat. Porro spiritus hic aliquãdo cum ipsa dæmonis substantia, in corpus ægrū intromittitur, vt de obsessis constat, alias solus, vt in plerisque maleficiis, fouente etiam foris dæmone.

Agedum maleficiorū instrumenta perlustremus, ex quibus, quęcunq; intro in ventriculum, aliamque partem, (vt vitri, lapidis, ligni, aliorumque corporū fragmenta) condita sunt, lædunt quidē corpus naturalīū causarū instar, proximè, & semper omnia: Externa autē, alia signa sunt tantū, alia verò signa simul & causæ sunt, Rursus quæ signa tantū, ea vel manifesta sunt, vt cereæ imagines, nodi, carmina, characteres, syderum ortus, & figurę astronomicæ, in quibus sola sunt, aut pacti, aut temporis quo euocari, aut modi quo cogi videri cupit Dēmō, aut hominis certè lēdendi à Dēmone, monimēta: vel certe signa hæc occulta sunt, vt corpora quædam diuersis locis abdita: vtraque autem hæc omnem agendi vim à Dæmone, non natura sua, sortita sunt. Signa simul & causæ sunt, ea quæ affectiones corporeas, vt amorem, odium, sanitatem, ægritudinem inducunt, quæ spirituum motu, & alteratione (vt dictum est) constant. Itaque ex serpentibus, & ranis, rubetis plurima maleficiorum instrumenta comparantur, quod vel propius eorum spiritus sit venenatus, vel alieno veneno conseruando aptus.

Spirituum & instrumentorum istorum, quanta vis sit alterandi facillime, ex accuratissimo eorundē

apparatu, & repositione intelligas: ea enim ex peregrinis ignotisque medicamentis studiose elaborata iis ædium, vestium, supellectilis, lectique, & culictræ locis, astutus dæmon recondit, ex quib. proximum cor ægri laceffant, aut cerebrum variis imaginationibus percellant: Moueri enim imaginatricem animæ humanæ facultatem sine sensu posse, sônantium quorundâ ecstasticorum, sybillarum, bacchantium scæminarum, poëtarum, spontanei motus satis declarant, quorum vaticinia, & præstantia poemata imaginationis externis, & dæmoniis motibus, cum illa à sensibilibus obiectis maxime libera, solutaque est, non atræ bilis caliditati, cum Aristotele, tribuenda sunt: ideoque alexipharmaca illa & amuleta validissime obfistent, quæcumque spiritulosa substantia, maximeque odorata affluent, quæ venenati spiritus altissimas sedes promptissime subeāt, eūque mixtione sua alterēt, pervincāt, & dissoluant. Huius generis simplicia sunt balsam. mosch. ambræ, xylaloe, santala, cinnam. calam. aro. schœnāthos, styrax, benioin. fœnic. ruta: cōposita sunt electuaria mithrid. theri. athanas. alkerm. diamb. de gemmis, diamosch. dulce, & similia: maxime vero profutura sunt vtraque, si simplicia suffitu, cōposita potu vsurpētur ex aliquo tenuissimo, & odoratissimo, vt aquæ, vini aut citrâgulorū, aut similiū liquore dissoluta, qui alexipharmacorū spiritus multiplices, eosq. in corpus totū quoquo versū dispellat digeratq;. Quod si sumota causa egritudo tamē partiū, aut corporis totius aliqua sublit, eandē physicorū remediorū cōtrariis virib. abrogari quoq. deleriq. oportet. In quib. ædiū, vestiū, & supellectilis mutatio negligēda nō est in quib. malefici instrumentū sæpe latitat, sine quo prius detractō, sanitas curatiōe sperāda nō est. Dixi.



IOANNIS HV- CHERI TRACTATVS DE DIÆTA ET THERA- peia puerorum.

MEDICINAE partes duæ sunt principes diuersis officiis distinctæ: Vna sanitatē tuetur, *ὕγιεινὴ*: Altera morbos profligat, *θεραπευτικὴ* dicta. Sanitas duplex est; vnā partium similarium temperies: altera dissimilarium concinna cōformatio. Tertia quædam communis est vtriusque generis partium, vino scilicet. Temperies vel exquisitissima est & ad pondus (quæ raro vel nusquam occurrit) vel parum deficiens, ad Iustitiam vocata, quæ nondum tamen corpori grauis est: frequētissima quidem & nō solum pro naturæ & tēperamenti, sed pro ætatis etiā tēpestatis & victus discrimine multiplex. Noscitur vtraq; ex functionib. principū viscerum, hepatis, vētriculi, cordis, cerebri, testium: Quæ ad pōdus est ex perfectissimis omnib. atq; ex accidentium corporis mediocritate, vt illud neq. crassū aut gracile sit: neq; hirsutū aut glabrū, neq; mōlle aut durū, neq; nigrū aut cādīdum: neq; iracundū aut ignauū: neq; perui-gil aut somnolentum, neque hebes aut callidū, neq. libidinosum aut contra. Sed omnium istorum moderate particeps, quæ ad Iustitiam est & deficiens sanitas, tum ē functionibus viscerum istorum

paulo deterioribus : tum è propriis corporum accidentibus innotescit , vt quæ calida natura constat , ex tactu calidiori : venarum amplitudine : inedia difficili: gracili habitu: capillis nigris & hirsutie summa. Quæ frigida est ex tactu frigido, venarum angustia, inedia facili, habitus obesitate & glabritie. Quæ humida ex tactus habitusq; mollitie: quæ sicca deniq; ex tactu duro, asperitate & scabritie corporis.

Porro sanitas à duplicibus corrumpitur causis: naturalibus & contra. Illæ sunt congenitæ duæ, vna repugnantia elementorū per quam ætatum vicissitudine ex calidissima & humidissima (quæ infantie propria est) frigidissima tandē & siccissima tēperies adsciscitur, morsq; ineuitabilis inducitur. Altera est triplicis naturę, substantię spirituosæ, humoralis, solidæ, effluuium. Nō naturales aliæ sunt internæ, vt excrementorum ab alimentis, viscerumquē intemperie prouentus. Aliæ externæ partim necessariae & ineuitabiles, vt aer, somnus & vigilia, cibus, potusq; quies & motus, animi pathemata, partim non necessariae vt medicamenta, venena, venus, vulnerantia & contundentia tela.

Contra sanitas quæ optima est à similibus causis omnibus conseruatur, sicuti & quæ parum deficiens est: quæ enim à temperie iam longius desciiuit, vt in vitium prona videatur, contrariis iisdem causis sed omnino modicis reuocatur. Harum igitur omnium causarum congruum vsum penes quantitatis & qualitatis ipsarum corporumque seruandorum differentias, vna hygiene prima perdocet, quæ cū dignitate & tēpore therapeuticā antecellat: id circo infantiū puerorūq; diætā in primis prosequemur: deinde morborū pueriliū therapēiā subiūgem^{us}.

Est

Et autem ætatum partitio quadripartita, tēperamentū humani mutationib⁹ in tota vita quatuor respondens: Prima enim adolescētia calida humidaq; ad vigesimum quintum annum fere producit. Secunda iuventus calida, sicca, ad trigessimū quintum. Tertia cōstans ætas alijs declinans, siccior quā calidior, ad quadragesimū quintū vel quinquagesimū. Quarta senectū frigida siccaq; ad mortē vsq; naturalē propagatur. (quanquā candē excrementorū luxuries debilitatis viscerum & caloris virib⁹ humidā efficit.) Ultima hæc ætas tripartita quoque est pro varia frigiditatis & siccitatis exuperantia. Vna enim est crudiorum senum ad trigagesimū annū. Altera senū simpliciter ad septuagesimū. Tertia capulariū & moribundorū senum. Sic prima ætas tripliciter diuidi solet pro caliditatis & humiditatis ratione diuersa. In pueritiam ad decimum quartum annum. Pubertatem ad decimum octauum. Adolescentiam ad vigesimū quintum. Postremo pueritia quoque pro eadem caloris natiui varietate in quatuor distributa est partes. Primā ad septimum mensem extendūt, quo dētitio incipere solet. Secundam à septimo mēse ad secūdū annū, cū absoluta dētitio ab lactati pueri solidiorib⁹ vesci cibis incipiūt. Tertiam à bimatu ad septennium, quę adhuc infantia dicitur. Quartā ad duodecimum, vel decimum quartum annum deducunt, hæc q; propriē pueritia nuncupatur. Talis quidem est temperamentorum ætatumque vulgata distinctio: sed in genere tātum. Hę enim tametsi certis annorum spatiis sibi vicissim succedunt, nequaquā tamen certis omnino finib⁹. sed in latitudine tantū definiri possūt: vnde pro ut quis vel calidior, vel frigidior, vel humidior, sic

ciōiue est, ita feri^o citiusue pubescit, viget & senescit.

De signis salubribus infantis.

Infantis sani beneq; valentis, cuius à nobis educa-
tio suscipiēda est, ab ipsis vitæ sorib. ^oguria ca-
ptanda sunt, tum ex parētum ipsoꝝ natura salubri,
etate integra, victu moderato, matris reserctim præ-
gnantis, tum ex optima corporis conformatione, vt
si sensus incolumes omnes, si membra partium foris
patentium vt aurium, narium, oculorum, fauciu, po-
dicis, vrethræ expeditos: si articuloꝝ flexus liberos
artuumque motus robustos: si denique partium sin-
gularum decoram magnitudinem, figurā, numerū,
& connexum conuenienter sortitus sit (neq; enim
corpori tam aptè conformato aut facultatis confor-
matis robur: aut principiorum, seminis nepe mē-
struiq; sanguinis, obsequentem temperiem, & mate-
riam, aut idoneam eandem copiam defuisse eius-
modi infanti putandū est) denique sumenda est cō-
iectura ex editione tēpestiua in vitali mense, vt se-
ptimo, vel potius nono: ex prodeuntis ab utero iu-
latu clamoso, qui exquisitum eius sēsū moticēq;
facultatem robustam testantur: sicuti contraria om-
nia vel plerūq; infalubritatem & intemperiem
corrigendam, denuntiant.

Editi infantis cura.

Iam vero multiplex obstetricum erga infantem
mox editū cura propria est. Prima vt vmbilicus
quatuor ab abdomine digitis acuto scalpro præci-
sus, duobus sericeis filis, pollicis vnus ab abdomi-
ne distantia, studiosè reuinciatur, non quidem la-
xius ob funestæ hæmorrhagię aut refrigerationis à
frigidiori subeunte aura metum, neque etiam ar-
ctius

Atius, ne portio eiusdem à nexu extans eodem hæ-
morrhagiæ periculo citius cadat. Vulneri impo-
nantur, quæ oleo rosato, vel amygdalino dulci in-
succata sint diplomata: reliqua autem pars supra ne-
xum linoxiliis vel succida obiecta, ne alicui frigore
suo tormina excitet. Ita inuoluta leniter abdomini
iacumbat, donec tabefacta caloris & alimenti pri-
uatione obvinctas venas arteriasq; tertio quartove
die auellatur & decidat, tuncque post eius casum vul-
neri relicto testa cochlearum aut tali suilli aut plū-
bi vstorum cinis aspergatur; ipsumq; diligēter obli-
getur ne ex dehiscēte, hæmorrhagia subsequatur.
Postremo prominens umbilicus & extuberans fru-
stuli plumbei, instar denarij nostratis admoti graui-
tate deprimendus est. Hæc autem omnia exequi de-
bet obstetrix dummodo exclusa prius fuerit secun-
dina vel solo naturæ conatu, illico post partum, vel
si resistat cōtumacius & diutius cunctetur ab obste-
trice leniter ex tracta interposito vasorum um-
bilicalium, aut etiam adhibita manu, quæ prius o-
leo dulci delibuta in pudendum penitus immittat-
ur. Huius enim exclusionis difficultatē interiecta
mora plurimum auget, eò quod protinus ab exitu
infantis internum vteri orificium contrahitur.

Curato umbilico secūda obstetricū cura est in ex-
tergendis sordib. lentis & pituitosis, tū corporis to-
tius, tum singulorū eiusdē meatuum foris aut intus
patentium, vt narium, aurium, oculorum, oris, aspe-
ræ arteriæ, pulmonis, œsophagi, ventriculi, inte-
stinorum, podicis & articularum, in manibus, pe-
dibusque, cruribus & brachiis. Totius corpo-
ris abstergentia remedia sūt lotiones & balnea è
dissimili comparata materia pro vario obstetricū

consilio vel abstergendi tantum, vel adstringendi etiam modice, densandique rariorem habitum aduersus frigidi insuetique aëris appulsum, vel dissoluendi etiam contusiones artuum, vel denique delinendi lassitudines à laborioso nimis partu relictas.

Leuissima est lotio ex aqua dulci tepida in concha & nostratibus obstetricibus magis vñitata, cui tamen commodius vini albi & oligophori dimidiũ addatur asperso etiam subinde post lotionem salis marini polline, à nostratibus tamen neglecto. Magis detergit lotio ex sœnuigræci, hordei & florum chamæmeli decocto. Ab aliis vinum astringens solum aut incoctis etiam astringentibus vt rosis rubris cacuminibus myrti & pauco sale probatur.

Ab aliis post eiusmodi lotiones olea quoque astringentia vt myrtinum, lentiscinum, rosaceum & omphacinum allinuntur. Sed postrema hæc duo vtpote validius astringentia remedia neque necessaria videntur cœlo præsertim non valde inclementi vt nostro fere Gallico, quod puerorũ cutis per se densior sit, neque satis etiam tuta: quod humidiora infantium corpora facili perspiratione egeant.

Veteribus lotiones istæ frequentius diutiusque & per plures dies ante quotidianum lactis vñum reuocabatur non ad solam sordium absterfionem, sed ad natiuam humiditatem corporumque proceritatem augendam. Nostratibus autem semel aut iterum tantum vsurpantur.

Meatus externi hoc pacto expediendi liberandique sunt, nares quidem si digitis comprimantur aut linamētis tortis mucus ex iisdem proliciatur, sicuti & ex auribus. Podex si minimus digitus oleo dulci oblitus eidem inseratur vt inde meconium (quod alimen-

alimenti fœtus crassius & nigricans excrementum est, meconij veri instar eiiciatur. Oculi si per diductas palpebras lenissimum linteolum tractetur & oleum admodum dulce in eos instilletur, quo sint tū ipsi mobiliiores tum mēbranæ molliores. Oris cavitas si melle cocto vel electario diamoscho dulci, potius quam theriaca acriori, digitis obducto affricetur blandius. Aspera arteria pulmo ventriculus œsophagus intestina si cochlear vnū vel olei amygdalini dulcis vel potius mellis cocti exhibeatur, vnde humorum variorum viridium albicantiū aut nigricantium profusio prouocetur, quibus suppressis lac primum corrumpi, indeque tormina infantibus intolerabilia accendi contingat. Digiti quoque manuum pedumque leuiter mulcendi & explicandi sunt: articuli denique tibiæ & brachiorum frequenter & pluribus diebus contrahendi & expandendi, vt quicquid humoris excrementij intus illis forisue adheferit, id totum discutiatur. Tertia obstetricum cura (chirurgorum etiam communis) est, in paruis quibusdam conformationis emendandis vitiis. vt si cui naturalium ductuum vt puta aurium, narium, ani, pudendi membranula obducta sit, aut si digiti inter se cohæreant, protinus rescindatur, eorumque conglutinatio interpositis linamentis prohibeatur. Sextus quoque digitus amputetur, ligamentalis membrana sub lingua breuior incidatur. Maculæ denique varix ab ortu contractæ elidantur, sed à perito tantum chirurgo qui curabilia ab incurabilibus prudenter discernat.

Vltima obstetricum cura est, vt puerum bene lotum prius, intusque & foris purgatum, cunis mandet fasciis tam accuratè obuolutum vt rectus omni-

no sit cernicis & totius spinæ tractus, eumq; in spinam facie supina ad dentitionis vsque tempus reclinare pergat, à quo in vtrumque latus decubitus eundem sensim assuefaciat, ita tamen vt à capite corpus totum parum declinè sit excrementis cerebri hoc situ deorsum facilius deuoluendis: vt denique in cunis decumbens directum lumē (ne euadat lusciosus) nō obliquum aut trāuersum excipiat.

De victu recens editi infantis.

EDentuli infantis alimentum accommodatissimum lac est: quod sit euchymum, putum, ceptum, calidum humidumque, & naturæ infantum finitimum. Matris autem lac tanto salubrius infanti est, quanto sanguini menstruo vnde in vtero eius alebatur, similis est: quantoq; eiusdem in fœtu pro suo alendo, quam emptitiæ nutricis charitas & vigilantia maior esse solet. Præstat tamen per sex aut octo dies primos puerperij infantem à sinu & vberibus matris abdicare, tum quia febriculosa fere tūc illa est perturbatis humoribus atq; spiritibus recētis partus labore incensis: tum quia mammarū vitioso sanguine refertæ sunt: quem exhauriri prius admotis ad papillas puerulis vel virgunculis grandioribus decet, à quibus totus sugendo expuendoq; consumatur, nouique lactis materia & probe sinceriori deducto sanguine cumuletur. Si tamē puerpera imbecillior ætate, natura, aut ægritudine sit, aut nouæ etiam proles cupida: lactationis officio aliena nutrix adhibenda est.

De delectu nutricis.

Deligatur itaque nutrix iuxta infantuli tempera-

peramentum prout vel optimum est & simili lacte conseruandum: vel parum deficiens & contrariò lactis alimento reducendum. Nutrix igitur sana & temperata dignoscitur tum ex temperie eius optima, tum ex concinna conformatione. Temperies ex causis internis, partium functionibus & corporis accidentibus. Causæ illæ sunt natura sanguinea atque florens à vigesimo ad trigessimum annum. hæc enim conterminarum ætatum vitiis caret, adolescentiæ scilicet intemperantia & leuitate, & penuria lactis prouectiori ætati consueta. Tunc autem ob desinentem corporis accretionem roburque caloris & sanguinis copiam lac scæminis exuberat: sed tamen ad eam quoque ætatem accedere partus duplex triplexve debet, (ex quo venæ mammarum arteriæque repletionis consuetudine ampliores lactisque capaciores euaserint) isque maturus (Abortus enim sæpe est latentis viscerum humorumque vitij index:) sit quoque masculus: cuius calore maternum ingeminante ipsa robustior sit & ad omnia lactandi officia alacrior. Sit etiam nutrix habitu bono, *εὐκαρπὸς*, non obesa nimis aut macilenta, non ruffa & lentiginosa aut nimis fusca, sed ex albo rubescens; non dentibus cariosis & rubiginosis, non anima olida, non scabiosa aut pruriginosa cute, non deformi vultu, (turpes enim scæminæ sæpius iracundæ & rixosæ sunt, anima scilicet corpori consentiente) non rursus valetudinaria aut morbosis parentibus, vt arthriticis, epilepticis, asthmaticis, phthisicis, elephanticis prognata, quin potius cordata vigiliarum laborumque qui lactationem comitari solent, patientissima, iocosa &

hilaris arridens infanti, facunda in alloquendo, fit denique bene morata, non violenta & libidinosa, nec cum lacte morum probra infantulo propinet. Laudata nutricis conformatio colligitur, tum ex totius corporis magnitudine mediocri, vel potius ad paruitatem vergente, tum ex pectoris amplitudine, cervicis latitudine & mammarum substantia mediocri, nam laxiores & pendulæ lac coquunt minus, duriores & densiores ægrius permittunt lac sugi, naso interim compresso resumoque: papilla quoque intro contracta vix infantis suctum sequitur, crassior eadem labiis vix comprehenditur.

De lactis exploratione.

Postremo electarum nutricum lactis salubritas ex quantitate eius & qualitate exploranda est, illa quidem ne deficiens infantuli genium defraudet, aut redundans diutina in mamminis mora corrumpatur. Qualitates sunt constitentia, color, odor, sapor. E quibus constitentia media & optima noscitur si in ungue terso immotoque hæreat: si levis ter depressio promptius disfluat aquosius est, sicuti si cunctetur crassius est minusve caseosum. Color exquisite albus perfectæ coctionis, liuescens melancholici, flavescent biliosi, pallescens pituitosi, erubescens crudioris sanguinis index est. Sapor sit dulcis non acidus, austerus, amarus, acris, salsus: hi enim tres calidam, illi duo frigidam intemperiem denuntiât. Odor foetidus, aut ab humorum viscerumque corruptela, aut à ciborum putrium & corruptibilium usu esuque exhalat. Emergunt autem ex vitioso lacte permulta infantibus incommoda, ut ex acriori & bilioso pustulæ acerrimæ, ruborque & ardor oris
partes

partes infestans, lienterix fastidium & atrophix, ex crassiori & calido abscessus, furunculi. Ex crasso frigidoq; alui & vrinx suppressio, vnde linteolorum siccitas & grauis respiratio repleto ventre, fastidium cibi, vomitus pituitosi, decolor facies, sordes oculorum & ventris flatus. Ex liquosiori denique alui & vrinarum profusio, vnde linteolorum perpetuus mador, habitus mollis laxusque sensim flaccescens.

*De victu nutritrix, & lactis vitiosi
correctione.*

Temperata mater vel nutritrix salubrem & temperatum infantem lactatura, cibis vescatur in genere euechymis & temperatis, non falsis, acribus, amaris, frixis, aromate conditis, & in el. bano carnis coctis, non etiam crudis, vt acetariis & fructibus recentibus arborum, leguminibus & radicibus flatuosis, vt rapis, naxis, raphanis, tuberibus, neque castaneis: vino vtatur tenui, oligophoro, anniculo beneque diluto, abstineat a venere & vehementibus omnibus corporis animique motibus, vt ira, odio, vigiliis prolixioribus, vtatur exercitatione mediocri, partium præsertim superiorum, vt sanguis vberior lactis causa in mammas deducatur. Aere denique fruatur modice calido & temperato. Quod si mater vel nutritrix infantulum educatura videatur intemperatior, aut ableganda illa est: aut si non licet, victu temperanda contrario. Itaque pituitosa victui indulgeat calido siccoque modice & attenuanti, vt salsamentis, herbis calidis in iusculo elixatis, vt hyssopo,atureia, mentha, sceniculo, petroselino, cruce & nasturtio viridibus, ouis sorbilibus cum momento cinnamomi

aut nucis moschatæ pane similagineo probe fermentato falsoque & anisato carnibus recentibus tostis aut falsis, laboribus ante cibos ad coloris mutationem, breuiori somno, vino paulo minus diluto. Sed ante victum eiusmodi instituentum, pituitæ vomitio vel deiectionio phlegmagoga excitetur. Sin biliosa sit, otio & balneis sese dedat aëri frigido iusculis multis elixatarum recentium carniū cum herbis frigidis lactuca, acetosa, portulaca, borragine, buglossa, & endiuia, caseis recentibus & fructibus horæis, præsertim æeidis. Sed purgatio vna ex rhei infuso & syrupo rosato laxatiuo præponenda est, (neque enim vehementior in nutrice vacuatio probanda est) paucum lac augetur largiori victu, vini dulcis portione, sorbitionibus multis, mammarum & pectoris crebra confricatione, fotibus & cucurbitularum appositione. Redundans idem circumciditur tenuitate victus, exercitationibus pluribus, partium præsertim inferiorum, vigiliis, aëre sicco, & linteolorum in acetum merforum ad vbera frequenti appositione: crassum denique attenuante victu & frequentibus balneis. Quod si factus ipse intemperatus sentiatur, temperatæ matris vel nutricis lac victusque mutabitur pro puerilis intemperiei specie cui remedio esse debet.

De educatione infantium.

ERgo obstetricis arte perpurgatum fasciisque inuolutum & cunis traditum infantem, puerpera mater vel nutrix aliena salubri suo lacte quam primum alat expleatque papillis mammisque tepida ab-

da ablutis, crassoque lacte prius expresso.

Lactationis modum veteres in duas aut tres ad summum vices diurnas nocturnasque partiti sunt, neque id etiam ad sætatem infantis, tantumque vt auidius excipiat, spemque concoctionis probæ relinquat. Quod si ingluvie largiorique lactatione obrutus stomach⁹ sit, vnde somniculosior segniorque videatur, ventre tumido & flatuoso, atque vrinis aquosis; proxima lactatio ad cruditatis vsque concoctionem difficienda est. Spatium lactationis longissimum vetus quoque medicina biennio, eodemque opportunum ciborum exhibendorum initium definiuit. Quia enim nutricis lac, nutritioni & incremento hepatis per triennium satis esse compertum est, eo solo contentam esse infantem voluit. At Gallicanæ mulierculæ indulgentiori consuetudine; & sæpius & multò largius non lacte solo, sed pulculis etiam suis ingurgitant pueros nondum etiam trimestres: nedum anniculos, magna certe cum valetudinis ipsorum perniciæ, certoque ingluviei futuræ argumento, dilatatis supra modum alimentorum sarcina mollissimis ventriculi tunicis. Quibus nisi cibo expletis fames postea nunquam desitura est.

Lac igitur caprillum potius quam bubulum calens adhuc ab ubere (aliter enim acescit statim) aut igni modice recalfactum infantulo penuria lactis laboranti propinetur, aut ex farina & lacte pulculæ eidem comparentur, ita tamen vt farinæ triticeæ vel hordeaceæ flos in clibano percoquatur, rursusque cum lacte caprillo potius quam bubulo, vt dictum est. Sed omnino modicè elixetur. Cruda enim farina crassa est & viscida, si tantum præ-

lactis modo coquatur, atque viscera ipsa, mesenterium, hepar, lienem obfarcit. In intestinis tormina & vermes, in vesica calculos suscitatur, si ipsa tantum cum lacte coquatur, quantum substantiæ eius conueniat. Lac ipsum butyrosa sua substantia & serosa castratum (unica remanente caseosa) eadem inuehit incommoda. Lactis loco, quod improbant Narbonenses mulierculæ (credo ob penuriam) puliculas suas cum mica panis albi, (vnde panatellas vocant) & hydrelæo concinnant, minori certe obstructionum, lapidum, vermiumque prouentu, ob panis cocturam sal & fermentum, oleique fluxilem lubricitatem.

De ablactatione infantis tempestiua.

TEmpestiue ablactationis signa sunt duo, vnum dentium fere omnium eruptio, alterum cibi solidioris appetentia. Illa pro vario caloris natui modo in varia ætatis puerilis spatia incidit: vt in decimum octauum, vigesimum, aut vigesimum quartum mensem, post quem lac nutricis crassius & parcius esse solet. Nam latentes in gingivarum præsepulis veluti vaginis quibusdam dentes aliis citius, aliis tardius emergunt, ante quorum emersum pueros perdunt morbi multi à ciborum cruditate orti, quippe horum coctionem in ventriculo absoluendam, nulla in ore per manducationem præcedit præparatio, qua tamen carere ne viris quidem impune liceat. Appetentia quoque ciborum solidiorum coctionem iuuat, sicuti cruditatem eorundem fastidium in viris etiam commouet. Ille igitur appetitus præter menses, annos & dentes obseruandus est: si
puer

puer tamen dubia & tenui valetudine sit, aut insalubre hyemis aut æstatis tempus vigeat, protrahenda lactatio est ad salubriorem veris & autumnî tempestatem.

*De victu infantum ab lactatorum, &
ab lactationis modo.*

INstante ab lactationis tempore, vt eidem ferenda facilius infans assuescat, primum consuetam lactandi frequentiam nutrix sensim intermittat, tandemque papillas amaro aliquo succo, vt decoctione absinthij, infusione colocynthidos, fuligine diluta, aut aloë, aut sinapi etiam acriori oblinat, cuius horrore infantem ab vberibus suis summoveat. Interim iusculis caponum, veruecinarum & vitularum carnum, indeque pânatellis liquidioribus elixatis & saccharatis: gelatinis & colatitiis earundem carnum iuribus, vitellis ouorum mollioribus infantem sustineat, fontisq; aqua saccharata, aut cum pullo tenello, vel cum hordeo, passulis & liquiritia cocta (vulgus aquam ptissanæ vocat) sitim eiusdem identidem leniat. Adhuc de qualitate & materia victus infantum; nunc de quantitate, quæ & copiosa & frequēs instituenda est, sensimque grandescente ætate augenda ob nutritionis & accretionis necessitatem, caloris natiui robur, & habitus mollitiem. Ad qualitatem quoq; referuntur sequentia. Aër quidem vernus, & incuntis æstatis, ob temperamenti calidi humidique similitudinem infantibus & pueris est saluberrimus. Insalubrior circa medium & finem æstatis, & in autumnô, insaluberrimus hybernus ob maximam naturæ

puerilis dissimilitudinem, habitusq; puerorum penetrabilem maximeque alterabilem laxitatem, Non ergo illi aeris frigori Germanorum & Lacedæmoniorum veterum more statim obiiiciendi & exponendi sunt, sed eius tepore continendi fouendique.

Suppressio alui infantibus ob crassitiem lactis, corrigenda primum est victu nutricis emolliente laxanteque, ex multis olerum iusculis, somno, otioque & potione dilutissima, deinde podicis infantium irritatione, submissis glandibus ex vitellis ouorum cum paucis sale, indito lardi frustulo, radícula betæ, aut melle cocto. Venter quoque laxandus vel exhibita manna ad ʒ. j. in iusculo infuso dissoluta, vel melle rosato colato pari quantitate, vel denique impositione super vmbilicum cataplasinatis ex aloes ʒ. j. ellebori albi nigrique ana ʒ. ʒ. felle, bubulo dissolutis, & puliculæ instar super gossipium extensis ad magnitudinem palmæ.

Contra resoluitur aluus eorundem puerorum lactis aquosa tenuitate: cui medendum est tum victu nutricis incrassante, astringente & calfaciente, vinique rubri sinceriori parciorique potu, crassis iusculis oryzae, semolæ, panatellæ, exercitationibus maioribus: Tum linimentis induendis infantium ventriculi regioni ex oleo myrtino & mastichino, nardino, absinthino cum cera alba, vel addita etiam mastiche, bolo, thuris cortice & nucis moschata ut fiat vnguentum.

Infantium exercitatio, frictio levis est, statim a somno, agitatio blanda in cunis & lecto pensili, gestatio in vlnis: sed hæc ante lactationem omnia ne exceptum lac aut reuonatur aut corrumpatur.

tur. Ploratus quidem exercitationis vicem explet dilatando partes thoracis, calorem natium excitando, cerebrum & pectus pituitosis excrementis exonando. Effusior tamen fletus enterocoles periculum inferre solet. Vbi infans per se moueri potest, tum repere illi aut ingredi etiam licet, sed omnino leuiter, ne pondere motuque corporis violento molliora crura vitientur. Illis vero qui tertium aut quartum annum à natali attigerunt, ut vehiculis & nauigiis modicè agitentur, permittit Galenus libro primo de sanit. tuenda: idemque statuit septennes valentiores exercitationes perferre posse, ob maiorem corporum firmitatem, ut equitationem & ludum parvæ pilæ, per quem artus omnes quam longissime porriguntur.

Vicissitudo sit vigiliarum & somni: sed hic tamen diutius concedatur. Ploratus autem infantium aliquando ab iracundia prouenit, cum iam paulo grandiores sunt: sed sepiissime cum pusilli adhuc sunt, ab inedia, satietate, frigore, æstuatione, torminibus, linteolorum & fasciarum humectatione, astrictione, punctura, contorsione partium, denique trichiasi, ex quibus inedia ex longiori abstinentiæ spatio percepta oblati papillis continuo soluenda est. Satietatis signum est iactatio corporis & præcordiorum tensio: inediæ contra depressio ventris, & raritas, ut dictum est, lactationis. Frigoris & æstus causa euidens est, aut ab aere, aut à stragulis. Sic puncturæ & stricturæ: torminum verò signa sunt rugitus ventris & contorsio corporis cum eiulatu. Singulæ causæ suo contrario tollendæ sunt, ut inedia satietate, &

contra, strictura laxitate, & punctura pungente acu remotâ, tormina ventris fotu ex lana succida oleo chamæmelino vel alio magis digerête, vt rutaceo, laurino.

Trichiasis denique, quæ pilare malum est, remouetur pilorum euulsione cum vossellis, post leuem cutis frictionem à nuda manu, vel oleo illita. Excitantur autem pili veluti cetæ in poris habitus à pituita caloris impetu impulsâ, ibique præ lentore cohibita & in pili magnitudinem à calore efficta. Hisce pilis deinceps compuncta cutis grauius indolescit, præsertim circa nates, iûbos & dorsû.

Ploratus quacunque ex causa proueniat, communia remedia duo sunt, agitatio in cunis vel vlnis nutricis, vocisque modulatio, vtrumque enim conciliando somno dolorem lenit, corporis animique ægritudinem compefcit.

De differentiis morborum puerilium.

HActenus infatium diætetica, quæ salubrem eorum constitutionem tueatur, breuiter exposita est: deinceps eorundem therapeutica quæ insalubrem statum restituat clarissimè exponenda est. Sunt autem morbi pueriles, qui primam ætatis humanæ partem vsque ad decimum quartum annum vel solam vel frequentissimè exercent: vel certe si alias etiam ætates aliquando infestant, alio tamen modo in pueritia curandi sunt.

Diuiduntur pueriles morbi in externos & internos: & vtrique rursus in communes & particulares: Externi vniversales totique habitui cômunes sunt, scabies, pruritus, ex anthemata, & thymata. Externi particulares sunt vt capitis phthiriasis, achores, faui, meli-

melicerides, hydrocephalos, & capillorum vitia, streptophiasis, alopecia: sic colla, struma, glandulae: sic umbilici inflammatio est & extuberantia quolibet: scroti, ramicum species omnes & tali perniones. Interni communes sunt febres. Peculiares, ut puta capiti sunt siriasis, epilepsia, aurium humiditates, convulsio, vigiliae, pauores: ori verò, staphylomata, tonsillae, anginae, aphthae: pulmonibus obstructio ex destillatione à cerebro, tussis, dyspnoea, asthma, suffocatio: ventriculo peculiaris est ex cruditate lactis, nausea, vomitio, fastidium, inflatio. Intestina infestant ex eadem cruditate tormina, flatus, lumbrici, fluor aut suppressio alui: vesicam, stranguria, dysuria, ischuria, & lithiasis.

Pueriles morbos varie partitus est Hippocrates pro vario pueritiae spatio, in eos nimirum qui ad septimum mensem infantes impetunt: tum in eos qui toto dentitionis tempore eosdem lacerare: tum in eos qui dolicos & ablactatos ad septennium urgere: tum denique in eos qui ad pubertatis initium, id est decimum quartum annum fatigare pueros solent. Varietas autem haec morborum puerilium oritur ex varietate temperamenti, nutrimenti & humorum quae variis pueritiae partibus obtingere consueverunt.

Ex puerilibus autem morbis, sicut & eos qui aliis aetatibus peculiares magis sunt, illos tantum enumeravit Hippocrates libro tertio Aphorismorum, quos singulis pueritiae partibus molestiores indicavit, sicuti singularum anni tempestatum & mutationum magis familiares proximè recenserat. Proinde Hippocratico isti puerilium morborum

catalogo cōplures alios nos ipsi quidē annuerauimus, qui pueritiæ grauiores & frequentiores visi sunt, multis interim neglectis tum quia rariores, tū ne iustam libri molemi quod meditabamur compedium exæquaret. Eodem etiam breuitatis studio authorum nomina quorum præceptis, & remediis adiuti sumus, librorumque & locorum testimonia Galeni præsertim, Pauli, & Aetij à quibus hoc argumenti genus accuratè agitatū & elaboratum est, volentes scientesque prætermisimus.

Nos itaque Hippocraticam istam pueritiæ partium diuisionem vsque ad decimum quartum annum, deinceps ita sedulo sequemur vt morborum qui singularum eius partium peculiare sunt breuē facilemque therapeiam prosequamur.

Aphorismus Hipp. ex lib. 3. 34.

Secundum ætates ij morbi accidunt, paruis quidem & recens natis puerulis oris vlcera, vomitiones, tusses, vigilæ, pauores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates.

De aphtharum curatione.

EX puerilibus morbis prima occurrunt oris vlcera ἀφθαῖ vocata. Huius autem vocis significatio vna est generalior, pro exulceratione cuiuslibet partis, vt pulmonis apud Hippocrat. lib. 2. de morbis, & testium apud Paulum lib. 3. cap. 54. & aliquando ventriculi, vnde hienteria: altera quæ magis propria vulgataque est ad omnes oris partes pertinet gingiuas & linguam, à quibus fere incipiunt, palatum totum, maxillam vtramque, vuulam & fauces.

Aphtha-

Aphtharum causa duplex est, vna humor vaporue acrior & erodens : altera mollior tenuiorque erodendæ partis substantia.

Species duæ sunt, vna puerorum : altera adultorum. Illa sæpius à serosa biliosa nimisque abstergente lactis nutricum portione provenit, cum sit recens natorum os interius laxissimum: rarius excitatur à destillatione falforum putriumque cerebri excrementorum. Rarissime ab ascensu vaporum acrium ex nidoroso ventriculo corruptoque lacte manantium.

Quæ adultorum sunt tam virorum quam mulierum: sæpissimè à catarrho salso acriue vt per elephantiam & luem veneream : alias à vapore atræ flauæque bilis aut per febrem ardentem vltæ, aut putrefactæ per aeris constitutionem putridā, calidam humidamque, & sine ventis, cuiusmodi Hippocrati descripta est lib. 3. Epid. Puerorum aphthæ omnes quidem phlogosi & ignea quadam caliditate concitantur : sed aliàs minori tumque subalbidæ fere sunt : aliàs maiori tumque parum rubræ apparent. Adultorum vero sæpius rubræ sunt & aliquando instar escharæ nigricantes.

Pucriles aphthæ facile curantur, n' si vuam faucesque obsideant, quibus auxilium afferri nequit, tuncque pueri ipsi præ dolore lactis transglutitionem refugientes, ægerrimè conualescunt. Adultorum quæ nigrant aphthæ pessimæ sunt vt atrabiliaræ, malignissimæ, nec vllis cedentes remediis.

Aphthæ Gallicanis pueris & septétrionalib' raro molestæ sunt ob lactis nutricum frigiditatem & humiditatē: sed aphtharū loco, salivatione multa,

pustulis præterea & vlceribus circa totam faciem caputque serpentibus infestatur:hincque salubritatem illis conciliari tū ab Hippocrate proditū libro de sacro morbo:tum à muliercularum & nutricum vulgo creditum est:robustæ enim naturæ opus hoc esse concepta in vtero excrementa expellentis sine quo pueri insalubrem vitam agerent.Mater tamen prægnans salubris & temperans salubrem beneque habitum fœtum enititur:sin inualida eadem prauorumque ciborum vorax fuerit, gracilem eundem parturit, qui nisi vlceribus istis & pustulis scateat imbecillus & valetudinarius futurus est, vt qui excrementis in vtero matris contractis neque postea expurgatis opprimatur.

Curatio aphtharum puerilium.

Nutricum cura inprimis suscipienda est, lactis-
que vitium si infantis molestia inde est, delendum, tum diætâ refrigerante & humentante, tum purgatione cholagoga leniente minimumque acri, vt ex potione rhei & agarici trochiscati ana ad ʒ j infusorum in aquæ endiuivæ ʒ iij. syr.ros.laxat. vel de cichorio compositi ʒ j cum momento electarij diagrydiati vt diapr. solut. vel de succo rosar. ʒ ij. vel iij. vel bolo ex medullæ cassiæ ʒ x. mixto rhei puluere ad ʒ j aut ʒ iij. vel denique ex pilulis aureis & de agarico ana ad ʒ ss. Huic tamen purgationi clystere molli prius iniecto phlebotomia parciôr ex basilica vel mediana cubiti dextri vtiliter præmittatur, balneum verò eidem purgationi refrigerans & humectans subiungatur, quale est ex aqua dulci tepida cui plantarum frigidorum folia floresque prius

prius incoxerint. Seri quoque caprilli potus matutinus & menstruus, aut iusculorum pulli frigidis herbis alteratorum, additoque pauco omphacio vel acido mali citrij aut limonij succo, delendæ viscerum intemperiei calidæ siccæque plurimum conducet.

Deinde puerorum albicantes & simplices aphthæ gargarismo eluendæ & exsiccandæ sunt: primum quidem magis tergente minusque astringente sine frigidityte manifesta. Hoc in buantur linteola, quibus aphtharum locus molliter fricetur, digitis obstetricis.

℞. aquæ pedunculi, ros. plantag. caprifol. & mellis ros. colati an ʒij. misce. vel

℞. aquar. plantag. & acetosæ an. ʒij Rob diamorum ʒj. misce.

℞. vini albi ʒiij. sacch. ros. ʒj. aluminis vsti ʒβ. misce.

Aqua iuglandium immaturarum in aceto maccatarum & destillatarum, cum melle rosato mixta hîc quoque singularis est & eximia.

Quod si pueriles aphthæ ardore & rubore molestiores sint, iisdem aquis extinguantur quibus nonnihil succi acidi, vt malorû granatorum, limonio- rum, citriorum aranciorum permisceatur. Validiora ex astringentium decocto gargarismata respuit tenella ætas.

Iisdem puerorû aphthis ex cerebri sympathia & destillatione ortis, siue hæc calor frigusue externum, siue paucus multusue capitis amictus, siue dentium dolor & eiulatus, siue sola excrementorum copia commoueat, consulendum prius est, materiz destillationis tum reuulsione per clysteres mollis-

simos, potiones laxatiuas, mitissimas frictiones matutinas totius corporis deorsum versus : tum etiam auersione per emplastra leuiter attrahētia & discutientia toti sincipiti & occipiti, abrasis capillis inducenda, aut denique per cucurbitulas & phcenigmm (siquidem maior ruentis catarrhi impetus & strangulatus metuatur) collo & scapulis affigendum, cui etiam coercendo suffitus in cubiculo vel cunis etiam dormituri infatis valde profuturus est.

Exempla remediorum.

℞. hord. integri flor. viol. & ros. an. pug. j. prunor. dulcium paria iij. caricæ n. ij. semin. anili ʒ j. coquantur. In colatur. ʒ iij. dissolue mell. rosati colati sacch. rub. & olci viol. ana ʒ j. vitell. oui vnus fiat clyster.

Purgatio.

℞. mell. ros. col. ʒ j. lau. bat sensim ex digitis nutriticis per horas duas ante & post lactationem. vel

℞. mannæ granatæ ʒ j. capiat cum pauco lacte nutriticis. vel

Cum eodē lacte rhei puluerisati ʒ j. vtiliter misceatur, vel denique syrup. de cichor. composuit. cum rheo vel ros. laxat. ʒ j. per se & cochelari sumatur.

Exemplum emplastri.

℞. gummi ammoniaci ʒ j. spicæ nardi, calami aromat. grano. alchermes ana ʒ j. seminis pæoniæ, nucis moschatæ, macis & caryophyll. an. ʒ β cum terebintina magdaleon concinetur, ex quo emplastra prædicta duo super alutam bene rasam extendantur.

Exem-

Exemplum suffitus.

℞. mastich. cortic. thuris, seminis coriandi præparat. ana \mathfrak{z} β gūmi hedere rosar. balauft. sandal. citrini, gran. alchermes ana \mathfrak{z} ij. benioini & lad. puri an. \mathfrak{z} j. fiat pulvis, excipiatur mucilagine gummi tragacanthi extracta cum aqua ros. fiantque trochisci ad suffitum.

Iisdem denique puerilibus aphthis ex stomachi consortio emergentibus (quod è nidorosis puerorū ructibus facile detegitur) præ vitiosi lactis vaporibus: præter topica & gargarismata, corruptelæ ventriculi expurgatio per clysteres & potiones lenitivas modo expositas, lactisque ipsius per vitium nutricis cōtrarium & pharmaciā emendatio adhibenda est.

Faciei autem capitisque vlcera, pustulæ & scabies si quando ante spontaneam sanationem, qua fere desinere solent, fœtore suo & deformitate displiceant, tunc eorum curatio artificiosa topicis tergentibus mollientibus & siccantibus sine calore acri acceleranda est, in hunc exempli gratia modum.

℞. terebinth. decies lotæ cum aqua ros. \mathfrak{z} iiij. salis marini \mathfrak{z} j. vitellos ouorum duorum, olei ros. \mathfrak{z} j. β semin. limorum \mathfrak{z} j. fiat vnguentum. vel

℞. axungia suillæ insulsæ \mathfrak{z} iiij. resina abietinæ aqua ros. decies lotæ \mathfrak{z} ij. sulphur. vini \mathfrak{z} β cerusæ lotæ & tuthiæ diligenter præparatæ ana \mathfrak{z} ij. butyri recentis tosti \mathfrak{z} j. β albumin. ouorum duorum, moschi gran. iij. fiat vnguentum.

De vomitu.

Vomitibus lactis puerulis commouetur: tum ab expultricis ventriculi facultatis robore:

tum à retentricis debilitate. Illa sollicitatur vel à copia lactis copiosius ingurgitari, quàm sustineri ab illo nedum concoqui possit, vel à corruptela nidorosa lactis eiusdem acri & stomachum stimulant. Hæc vero debilitatur ab intemperie humidiori quam vel lactis aquosi cruditas; vel cerebri destillatio inuexit. Prima species vomitus, ipsarum etiam nutricum iudicio male tamen de reliquis duabus comminantium, salubris est beneque habitorum infantium familiaris; quorum robusti ventriculi idonea lactis portione expleti reliquam respuere & reiicere solent. Itaq; nullo illa alio auxilio præter diætam parciolem magisque frugalem indiget; ut scilicet parcius rariusque pueris sugendæ papillæ adhibeantur. Reliquæ duæ species insalubres, & infantium malè habitorum. & coloratorum communes, quibus idcirco opportuna non solum diætæ sed pharmacæ etiam auxilia conferenda sunt. Secunda igitur species, quæ à biliosa, flaua, viridique vomitionis materia detegitur, diætâ nutricis refrigerante & humectante, purgatione cholagoga viscerumque temporatione restituenta est, sicuti proximo de aphthis capite expositum fuit; deinde corruptela & cacochymia biliosa ventriculus infantis liberandus est, propinata sensim ex cochleari syrupi de cichor. compositi cum rhabarb. vel rosati laxantis, vel mellis ros. colati ℥j. vel rhei puluerisati ʒ ss. dilutique cum paucò nutricis lacte: mox verò intemperies ventriculi eiusdem calida, ex commercio diutino biliosi succi contracta, intus forisque obliteranda est topicis frigidis parumque astringentibus, ob visceris substantiæ laxitatem

tum

tum caliditatis, tum vomitionis comitem. Liniatur
itaque ventriculi regio ter aut quater ante lacta-
tionem eo qui sequitur modo.

℞. olei rosati, melini & myrtini an. ℥. j. cum ceræ
albæ inomento fiat linimentum. Addito pulvere
idoneo vnguentum euadat, vt

℞. sandal. omnium & ros. rub. an. ʒ. j. mastich.
corall. rub. balaustiorum & nucis mosch. an. ʒ. ʒ. fiat
pulis, misce cum ℥. iij. prædictorum oleorum, &
pauca cera alba: foris quoque super regionem ven-
triculi gestatus corallus certo auxilio est: intus au-
tē syrupi de rosis siccis vel cydoniorum vel de gra-
natis acidis cochlear vnum ante lactationem pro-
pinatum multum proffit, sicuti puluisculus etiam
coralli rubri, eboris, sapphiri, hyacinthi, margarit-
arum & cornu ceruini ad ʒ. j. cum lactis cochleari
ebibitus.

Tertia species curatur primùm abstergendo pi-
tuitosam ex ventriculo cacochymiam, eamque eua-
cuando cum ʒ. ʒ. vel ʒ. j. mell. rosati colati, vel an-
thos sensim transglutita, ex digito nutriceis bis aut
ter per singulas hebdomadas, duabus à lactatione &
ante eandem horis, vel cum rhei puluerisati ʒ. j. &
electarij diaphœn. ʒ. ʒ. cum paucò lacte dilutorum:
vel denique cum ʒ. ij. vrinæ pueri impubis paucò
saccharo aut melle conditæ. Deinde destillationis
materia aliò reuocanda est, vel ad collum per cu-
curbitulas aut cauterium, vel ad totum caput per
phœnigmon miçiorẽ excitatis apertisq; vesicu-
lis, vel etiam ex eodẽ capite digesta per emplastra
epispastica futuris & initio ceruicis admouenda.
Postremo viscera ipsa ventriculus & cerebrum re-
creanda & restituta in suam temperiem, roboranda

Bbb

sunt : ventriculus quidem intus sumptis syrupis de mentha , aut conseruationis corticis citri & myrobalanorum ad \mathfrak{z} . β . cum exiguo admodum cochleari, mane, ieiuno ventriculo, (syrupus absinthites nimis pueris ingratus, & abominabilis est) vel electarij diamoschi dulcis \mathfrak{z} . j. per se aut cum pauco lacte, vel pulueris sequentis \mathfrak{z} β . cum lacte mane suggerendi.

\mathcal{L} . corall. rub. fragmentor. sapphiri & hyacinth. rasur. eboris, cornu ceruini ana \mathfrak{z} . β . seminis anisi, nucis moschat. & cinnamomi ana \mathfrak{z} . j. moschi optimi gr. iij. ambræ griseæ gr. ij. panis sacchar. pondus duplum, fiat puluis. Foris autem roborabuntur tum fotu ex vippa vino generoso calidoque merfa & simili puluere aspersa, cui mastiches pars tertia admixta sit, tum litu ex oleo mastichino, nardino, absinthino & muscatellino, cum cera alba, tum vnguento ex eorundem olcorum \mathfrak{z} . iiij. pulueris præscripti \mathfrak{z} . β . & mastich. \mathfrak{z} . ij. tum denique emplastro à sterni cuspide ad umbilicum demisso, vt

\mathcal{L} . ol. myrtini & absinth. ana \mathfrak{z} . ij. pulueris mastich. & ladani ana \mathfrak{z} . ij. benioini, nucis moschatæ ana \mathfrak{z} . β . galliæ moschatæ \mathfrak{z} . iiij. cum cera alba fiat emplastrum. Cerebrum denique per cucuphas puluere cephalico factas & suffitū similē roborabitur.

\mathcal{L} . rad. & seminis pœoniæ & coriandri præparati ana \mathfrak{z} . β . spicæ nardi, calami aromat. schœnanth. sandal. citrini, baccar. alcherm. ana \mathfrak{z} . ij. nucis moschat. macis galliæ vel aliptæ mosch. ana \mathfrak{z} . j. fiat puluis, excipiatu paucogossiplo & serico rubro intersutis, siatque cucuphæ duæ: vna noctu, altera diu gestetur.

\mathcal{L} . eiusdem puluer. \mathfrak{z} . ij. excipiantur terebinthina.
ad suf-

ad suffitum operimentorum capitis, totius cubiculi & cunarum mane & vespere.

De tussi infantium.

Tussis symptoma est morbi organici, nēpe obstructionis fistularum asperæ arteriæ in pulmonibus, à qua expultrix thoracis facultas vehementi constrictione & expiratione commouetur, hæcque tussis est. Inducitur à pituitæ tenuis & aquosæ, vel crassæ lentæque destillatione, infantibus familiarissima ob humidiores eorundē constitutionem, maximè verò cerebri, excrementitiam pituitam deorsum præcipitantis, quocumque frigoris caloris dolorisue motu aut insitæ grauitatis. Duplex igitur tussis est, vna à tenui destillatione molestissima & frequentissima: sed tamen inanis & arida est, qua nihil aut parum admodum aquosi liquoris extruditur: altera à destillatione crassæ lentæque pituitæ bronchiis fistularum pulmonis inhærescente, à quibus ægerrimè magnaue contentione euellitur. Tollenda igitur tussis est quæ à destillatione pituitæ crassioris est reuulsione, deriuatione, & vacuatione. Reuulsio multiplex est tum per leues corporum puerilium frictiones, deorsum à ceruice ductas: tum per ventris frequentem resolutionem, si constitit, subditis glandibus mitioribus vt ex vitello oui cum salis momento, vel ex laridi falsi frustulo, aut ex betæ radice, aut ex melle cocto fictoque instar candelæ. Clyster quoque tergens molliensque vtiliter subiiciatur. Exempli gratia.

℞. hord. integ. furfuris valde macri, flor. chamem.

Bbb 2

& meliloti an. pug. j. caricæ num. 2. feminis anisi 3. j. coquantur & in colat. 3. iiii. dissolue mellis rosati col. & sacchari rubri ana 3. j. vitellum oui vnius, fiat clyster.

Quoniam verò descendens è cerebro humoris portio in ventriculum rapi solet, vomitio eius immisso digito ad radicem linguæ comodè cietur, sicuti purgatio ex mell. rosa. aliisve lenissimis medicamentis nuper expositis. liberato enim à pituita crassa & flatuosa ventriculo, tunc facilius spiratio est, & destillationis à thorace translatio reuulsioque promptior.

Reuulsioni deriuatio mox coniungenda est quæ ab intimis capitis partibus ad extimas, destillationis materiam remouet, vt per leues cucurbitulas ceruici & scapulis affigendas, per emplastra epispastica sincipiti & occipiti, rasis capillis imponenda, per phœnigmos ceruici & scapulis affigendos, si forte tussiendo labor immodicus & strangulatus metus puerulum exercent: denique per sternutationes leues, immissa in nares festuca aut linteolo instar pyramidis torto, incitatas. Vltima est vacuatio impactæ bronchiis pituitæ, quæ tum demum felicius est, cum eiusdem crassities, lentor & contumacia probe subacta fuerit, attenuata, deterfa, medicamentis internis, mediæ præsertim consistentiæ, qualis est syrupi & eclegmatis: nam duriorē abhorreat tenella ætas.

Exempla remediorum.

℞. mell. albiss. butyri recentis & panis sacch. ana pares portiones, fiat pasta.

℞. olei amygd. dulcium sine igne recens expressi, &

fi, & facchari candi puluerisati ana pares portiones.
fiat lood.

℞. syr. capill. vener. ℥. iij. saccha. candi ℥. β. pulu.
liquiritiæ, pulpæ pistaciorum & amygd. dulc. ana ℥.
ij. pulu. elect. diaireos simpl. ℥. iij. fiat lood.

℞. hord. mund. flor. viol. ana pug. j. passul. exaci-
natarum, nucleorum pini lotorum, pistaciorum ana
par. x. caricar. paria iij. summitatum hyssopi & fa-
tureiæ ana m. j. decoquantur : cape de colatura ℔. j.
mell. opt. ℥. iij. recoquantur diligenter despumando
in iulepi formam. Interea dum pituita intus
oppugnatur, foris quoque mitigabitur, si pectus
totum laxantibus pepticis & diaphoreticis munia-
tur, vt

℞. ol. amygd. dulc. liliacei, cheirini, iasminini &
chamæmelini ana quantum volueris, fiat embro-
chatio : addita cera noua fiat linimentum, ex quo
per idoneorum puluerum accessionem efficacissi-
mum vnguentum concinnabitur.

℞. ol. amygd. dul. liliacei & keirini ana ℥. ij. butyri
recent. axungię recētis gallinæ vel cuniculi, & me-
dullæ cruris vitulini vel veruecini ana ℥. j. rad. iridis
florent. ℥. ij. croci ℥. β. ceræ nouæ q. s. fiat vnguentū.

Litum quoque plantarum pedum, ex oleis cali-
dioribus, vt laurino, rutaceo, costino, anethino,
medicorum plerique celebrarunt, eorumque fa-
cultates à partibus istis nerueis & membraneis in
cerebrum ob sympathiam generis transmitti puta-
runt. Altera tussis species à destillatione tenuium
& aquosorum cerebri excrementorum iisdem re-
uulsionum & deriuationum differētiis anticipatur,
sed vacuationis apparatus est diuersus per incrassā-
tia eclegmata, & syrupos, à quibus etiam fluxionis

celeritas inhibeatur. Eiusmodi syru. sunt myrtinus, violac. iuiubinus, adiantinus, saccharum penidiatum & hypoglottides. vel

℞. trium florum communium & hord. mund. ana pug. j. iuiub. & baccarum loti arboris ana ℥. ij, feminis bombacis vel maluz ℥. j. coquantur, & in colatur. ℥b. ℞. dissolue sacchari penidiati ℥. iiij. recoquantur in syrupum. Item

℞. looth. sani & experti ℥. iiij. sacchari penidiati ℥. ℞. puluer. electar. diatragacanthi frig. & amyli ana ℥. ij. fiat looth.

℞. syr. de iuiubis ℥. iiij. sacch. penidiati ℥. ij. pulu. electuar. diatragac. frig. & amyli ana ℥. ij. fiat looth.

De vigiliis infantium.

Somnus infantibus maxime secundum naturam est maiori temporis parte salubriter dormientium, sicuti senibus vigilæ sunt familiares. Est quidem vtriusque cum secundum naturam est, anima effectrix causa natiuum calorem spiritumque aliàs ad cerebrum, neruos & musculos effundens, aliàs ad viscera & nutritionis instrumenta contrahens, vt hac motuum contrariorum vicissitudine caloris instaurata substantia sensibus motibusque & principibus mentis functionibus copiosè semper suppetat.

Humiditas infantium plurima ob temperiem ætatis huius humidissimam, lactisque materni consuetudinem, propensionem in somnum producit spiritu incrassato & calore veluti hebetato, viisque à crasso multoque vapore obsessis. Senilis contra ariditas, eadem omnia ad vigilias inclinat, promptioremque à præcordiis ad mentem caloris motum accelerat. Mediarum ætatum homi-

nes quoad somnum & vigiliam ambigunt, pro recessu ab infantia maiori vel minori, & pro causarum externarum varietate: hyeme enim cœloque frigido & humido somni longiores, sicuti post laborem, ebrietatem & crapulam. Contrariis ex causis contractiones sunt.

Ergo sicuti somni nō naturalis causa est humectatio & refrigeratio cerebri (illinc enim somnus longior, hinc profundior stupidiorque est) sic vigiliarum immoderatarū (moderatæ enim rectius nomine vigilantia designatur) causa effectrix est caliditas siccitasque cerebri idiopathica siue sympathica, & sc̄sum obiecta validiora præfertim dolorifica. Vigiliæ autem ab Hippocrate tanquā symptomata aliorum morborum hoc aphor. proponuntur, quorum prius habenda cura est, tum denu vigiliæ coercendæ: quamquam his etiam ante omnia occurrendum, cum metus est ne celeriter vires inde labascant. Illæ enim vigiliis importunis & prolixioribus adultis etiam nedum infantibus concidunt, facie illa Hippocratica protinus succedente, palpebris demissis & conuiuentibus, vixque sese attollentibus pulsu chordulæ extensæ instar duro. Quapropter affectibus earum authoribus mature succurrendum est, utputa, cum à frigore ortæ sunt, puerulorū & linteolorū ad ignem calfactione: cum à dolore lumbricorum, necce eorundē & expulsionē postea exponēda (quāquam somnus verminosis sæpe frequentior.) Si à destillatione, tussi aut vomitione, methodo ante exposita placantur. Si ab oppressione stomachi multique lactis crassiusque crudi & indomiti ingluvie, sedantur inedia auctaque exercitatione, & ventriculo foris roborato aut prius etiam vomitione

exonerato. Quare rarius parciusque lactabitur infans: atque interim nutricis vlnis gestandus sinuque fouendus est, & ante lactationem in cunis multum agitandus. Regio quoque ventriculi oleo modico calido & astringente riganda est, vt mistichino, nardino, absinth. muscatellino & de mentha: cotone etiam & linteolis eodem oleo insuccatis post rigationem munienda est. Quæ à fame & siti urgent, lacte vberiori alterius nutricis conquiescunt: inopia autem detegitur ex parco, duro, ærumnoso, luctuoso nutricis victu, amoribus & vigiliis, ex mammarū insolita attenuatione, & mollicie, ex mensium denique fluxu immodico & graui aliqua diarrhœa aut egritudine recenti. Quæ à colico dolore sæuiente molestæ sunt, siue dolor hic ex perfrigeratione, siue ex destillatione pituitosa capitis, siue ex cruditate ventriculi flatibus suscitatis & intestinum immaniter distrahentibus commotus sit, cum dolore colico eiusq; ablatis causis simul sedatur. Itaq; nutrix in primis victu calido siccoq; & attenuante alenda est: dolor autem infantis quamprimum leniendus est remediis laxantibus flatusque crassos dissipantibus, tum summittendis tum admouendis tum denique assumendis. Summittenda quidem sunt balanus acrior mixto sale trito cum melle cocto, clyster duplex, prior molliens & eccoproticus si stercore duro oppressam sit intestinum, posterior anodynus & digerens. Ille ergo constet communis decocti ss ß in quam mell. rosati colati, butyri recentis, axungia recentis vel cuniculi vel gallinæ ana ʒ j olei liliorum vel chamæmel. ʒ ij soluantur. Posterior huiusmodi sit.

℥ foliorum maluæ, violar. puleg. orig.
calami-

calamithæ, rutæ an. m. j. feminis lini & cumini ana quart. j florum chamæmeli, melilot. anethi, baccar. lauri & iuniper. contusarum ana p. j coquantur & in colaturâ lb ß dissolue mell. anthos. & ol. rutacei ana q. ß vitellos ouorum duorum fiat clyster qui iniiciatur.

Adinouenda sunt fots & vnctiones ventris. Illi constabunt decocto præscripto aut simili, cui vini generosi pars tertiâ post finitam coctionem addatur, indeque totus venter pueruli calidè foueatur filtris aut spongiis imbutis expressisque, vel filo cannabino lanæque succida in idem decoctum inersis, vel vesicis suillis eodem impletis, vnctiones autem ex simili oleo fiant.

℥ ol. communis & vini generosi an. lb ß puluer. feminis rutæ cumini stincos carui, cinnamomi, caryophyllorum zinzib. an. 3 j radicum cyperi, galang. baccar. lauri & iuniperi an. 3 ij coquantur ad vini consumptionem, & expressum oleum ad perfusionem ventris post fotum recondatur, moxque venter paucoglossipio eodem oleo imbuto tegatur. Simile est rutaceum, costinum, terebinthinum, laurinum.

Assumenda eiusmodi erunt. ℥ theriacæ vel mithridatij vetustissimi 3 ß quæ paucolacte dissoluta propinetur.

℥ puluer. testarum amygd. amar. corall. rubr. & cinnam. ana 3 j. nucis mosch. 3 ß croci gr. vj detur 3 j vel 3 ß cū lacte nutricis ex cochleari. Puluis hic flatuum materiam consumit absorbendo digerendoque. ℥ ol. amygd. recent. 3 j detur ex cochleari, hoc vere anodynum est.

Vigiliæ denique à febre inductæ cum ipsius causis

deleri solent. Ergo febris à dentitione non nisi præuia doloris lenitione dentisque eruptione desinit.

Curatio febrilium puerilium.

QUæ à putredine cacoehymia est, aut lactis vel cibi alicuius in ventriculo corruptione accensa est, siue in continuarum siue in intermittentium genere, diætam nutricis frigidam humidamq; insinuat abdicato vini potu omniūq; salsamētorū & aromatum vsu: tum purgationem cacoehymia eius ex qua vitiosum nutricis lac congestum est. Eodem tempore omnis cacoehymia putris & corruptela è ventriculo infantis primisque viis excludenda est. Primum igitur si alius pigrior sit, mollis clyster aut balanus mitior indatur, tum demum mamma dilutæ aut rheii infusi aut syr. ros. laxantis aut mell. ros. col. descriptæ antea doses paulo post lactationem exhibeantur: deinde febrilis calor internis externisque remediis temperetur. Ex illis iusculum sit herbis frigidis incoctis, vel earum loco mali limonij aut arancij pauco succo alteratum, & inter lactationis interualla ex cochleari exhibitum: syrupus etiam violac. adiantinus, Alexandrinus vel per se cochleari, vel cum pauca aqua graminis & acetosæ, iulepi specie multum conferat. Similis quoque erit hic iulepus.

℞ aquarum stillat. rosar. acetos. borrag. & mali limonij ana ʒ j sacch. quart. j fiat iulepus pariter exhibendus. Externa sunt topica refrigerantia & humectantia viscerum regioni cordis

cordis & hepatis totique spinæ frequenter impingenda : quibus tamen modica astrictio roboris viscerum causa , iungenda est , sine vlla tamen viscositate, ne transpiratio cohibeatur poris obductis. Ideoque ab horum topicorum catalogo conseruas vt ros.borr. &c. quæ solidioribus epithematjs ascribuntur, merito ob sacchari viscosum lentorem arceamus.

℞ mucilag. seminis psyllij extractæ cum aqua nenuphar. ℥ iij ceræ albæ parum , fiat linimentum applicandum toti spinæ cum pauco aceto albo. Similis est facultas & vsus vnguenti refrigerantis Gal. & vnguenti populeonis.

℞ aq. ros. acetos. nenuph. endiu. an. ℥ iij aceti albi ℥ ij pulueris elect. triasand. & diamarg. frig. an. ℥ ij trochiscorum de caphura ℥ iij sand. alb. rubrique & granorum alchermes ana ʒ iij fiat epithema inducendum regioni cordis & hepatis ex pāno coccineo imbuto, idq; vigente accessione.

℞ ol. viol. & nenuph. an. ℥ ij trochiscor. de caphura ʒ ij seminis acetosæ ʒj puluer. elect. diamarg. frigidi & triasandali ana ʒ ss ceræ albæ parum, fiat vnguentum post epithematis vsum applicandum. Simile est vnguentum rosat. & ceratum sandalinum cum succo cichorij vel aceto decies lotum.

Topicorum mistorum refrigerantium loco, vocantur aliquando in vsum remedia ista quæ leui blandoque calore vigent: à quibus laxata cute, febrilium vaporum quorum magna vis ex subiectis visceribus hepate & corde, magnaue vena & arteria exhalare solet, perspiratio inuetur, sicq; febris ex accidenti mitigetur, de quibus nostro libello de febris. Eiusmodi sunt catelli, pipiones, pulli, aliaq;

animalcula toto collo & artubus exectis, per mediam spinam diuisa non tamen exenterata sed integra apposita. Talia quoque sunt viscera, vt hepar & pulmones maiorum animalium vt capreolorum, veruecum, agnorum, quę omnia tantisper ibi contineantur, dum aut refrixisse aut putruisse cœperint. Pulueres cardiaci animalculis istis à quibuscū indid solēt, quibus ego libenter abstineo, ne tenuitate sua cutis poros subeuntes vaporum effluuium suppriment. Alij hæc ipsa topica ex refrigerantiū succo & hordeacea farina cataplasmatitis instar cōcinnāt, cordisque & hepatis regioni apponunt. *℞.* farinae hordei non cribrate (sic enim magis tergens & digerens est) lbj. succi foliorum acetosę, cichor. endiuie, portul. & olei violati ana q. s. fiat cataplasma istis regionibus super splenia inducendum &c.

Periapta & amuleta physica à classicis authoribus prodita quę manifesta qualitate calida frigida, vel mixta vaporem febrilem discutunt, vel intemperiem ipsam obtundunt, de quibus multa libello nostro de febribus, equidem nō refugiam, sicut nec magica nullaque vi elementarium qualitatum præstantia, penitus abhorream. Talia sunt pleraque verba barbara, aut aliud significantia, aut medicamenta etiam quædam. Sic personatę herbę foliis febrientem cinctum mirifice sanari testatus est Apuleius. Sic lactucę syluestris leporinę dictę folia sub puluino ægrotantis condita certum aduersus febres remedium esse perhibetur.

Extraordinaria vigiliarum curatio.

DVm hac methodo extinguendis infantiū febribus incumbit medicus, calamitosam vigiliarum

liarum importunitatē vincere interim studebit ea medicatione, quæ vapores à capite reuellat aut ab eodem retūdāt, aut certe obstipatis viis intercipiat. Primi generis remedia sunt lucis & strepitus fuga, sensuum blandities, vt susurri, vox demissa, aquæ leniter fluentis vel guttatim stillantis garritus, capitulenz suauēs, molles frictions brachiorum tibiarum pedumque. Secundi generis sunt refrigeratio & humectatio leuior cerebri, tum per lotiones pedum manuūque instante somni hora, ex tepido refrigeratium decocto vt folior. lactuc. cannar. vitiū, plantag. salicis, & trium florū cōmuniū: per odoratum aquæ rosatæ nenuph. lactuc. cū granis aliquot caphuræ: per vapores naribus exceptos ex nodulo lineo repleto cotone qui imbutus sit decocto seminis lactuc. papauer. albi, hyoscyami albi: tum denique fronti & temporibus applicanda vnguenta ex adipe austrino cum lumbricis terrenis decoctis & tabefactis. Nam frontalia anacollemata dicta, & vnctiones frigidiores, vt ex oxyrhodino, vnguento populeone, oleo mandragoræ, humidissimis maximeque catarrhosis infantium corpusculis sunt valde noxia. Tertij generis sunt tum iuscula frigidis plantis alterata: tum syrupus violatus, adiantinus & nenupharinus vel per se vel ex aqua simplici propinatus: frigidiores autem vt de papauere diacodij, sicuti & electarium requies puerulis nimis infensa sunt.

De paucioribus puerorum.

PAuores infantibus accidere solent ex ventriculi sympathia, maxime vero stomachi cuius est sensus exquisitissimus, vel à multo lacte oppressi, vel

à vitiosis & malignis humoribus ex corrupto lacte vellicati. Ab isto enim doloris sensu imaginationes terrificas sicuti ex morfu punctuque vermium concitari constat: sed & ex ascendentibus in cerebrum vaporibus caliginosis melancholicorum humorum circa præcordia stabulantium, horrenda spectra effingi solent, iisque non solum somnus turbatur: sed pueri quoque cum magna vociferatione, eiulatu & lachryinis excitantur, sicuti cōtra à sanguinis vaporibus incalescens puerorū mens exhilaratur, vnde in risum & cachinnum effunduntur. Pauores autem illi falsaque horrendorum spectrorum terribamenta pueris non tantum dormientibus sed vigilantibus etiam obrepunt, ob imaginatricis eorum facultatis vim maximā, nullo rationis quæ nondum adest imperio compressæ. Hoc ipsum in adultis per somnū tantum feriente ratione clarissime elucet ex nocturnis eorum ambulationibus iurgiis loquutionibus disputationibus. In vtrisque certe illa brutorum imaginationi similis est, cuius solo impetu sine ratione vlla aut causa manifesta calcitrare, saltare ipsa & cursitare videmus. Cum autem insomnia corporum humorumque cōstitutionem aut sensuum negotiationem diurnā sequatur, illud quidē primū eorum genus omni ætati nō solum infantie commune est: hoc adultorum proprium est, quartoque tantum aut quinto ætatis anno incipit, cum rationis vis maior, rerumque sensibus perceptarū cognitio perfectior est, quarū idolis per somnum imaginatrix facultas pulsatur. Curantur pauores mutata nutricis diætā in enchymam & attēnuantem, atque purgatione eius cacochymie, cuius species perspecta fuerit ex temperie,

æta-

etate, morib., cōsuetudine, colōre & habitu: deinde oppressio stomachi puerilis liberanda est redundantis lactis & alimenti proritata vomitione, digito vel penna oleo illita & in fauces inserta: tum lactis parcimonia & raritate, & retardato post lactationem somno supra horam cōsuetam: tum denique aucta ante lactationem exercitatione vt gestatione in vlnis, & in cunis agitatione lōgiori maiorique. Quod si à vitiosis humoribus vt pote pituitosis melancholicis atrabilaris ista puerorum terriculamenta orta sint, illi ex præcordiis infantium expellendi abstergendique erunt formulis purgantium antea sæpe propositis. Vermes denique si certa coniectura deprehensi sint, necandi & expellendi vt postea docebitur.

De humiditate aurium.

PVerorum corpora recens natorum tam humida molliaque sunt, vt ipsa eorundem ossa quæ adultorum durissima propeque lapidea sunt, veluti cerea sentiantur. Omnium autem partium cerebrū per se humidissimū est non tam prohibendæ inflammationis causa, in quam ob perpetuos cogitationū & spiritū motus aliter prouum fuisset, vt opinatus est Auicennas, quā, vt alij melius, ardoris eorundem temperandi gratiā, à quo tanquam ab ebrietate principes mentis functiones omnes perturbari aliter contigisset. Itaque cerebrū ipsum tum per se propriaque natura humidissimum, tum ob eximiā molem & alimenti necessitatem, & subiectorum viscerum assiduam expirationem multis circumfluere excrementis solet, serosis & pituitosis, in pueritia præsertim ætatum humidissima, & humidissimo

plurimoque vrente lactis nutrimento: maxime vero si lac ipsum serosius crudiusque sit, nutritrixque pituitosa & puerulus voracior. Prouectiorum enim cerebrum siccus est minusque excrementolum, non ob temperamenti tantum, sed victus quoque siccitatem, & laborum vehementiam atque emunctionis & excreationis industriam. Est autem vacuandorum cerebri excrementorum meatus naturalis duplex: palati & narium: sed ille maxime secundum naturam est, nullique alteri vsui dicatus, per quem non solum medij sinus, sed reliquorum etiam affluens illuies, nulloque obstante obice in os diffluit. Narium meatus odorum in cerebrum ferendorum proprium receptaculum est, tantumque prioribus cerebri sinibus expurgandis subseruire potest; idque per angustissimas vias ossis cribriformis & processuum mamillarum. At aurium meatus excipiens sonis mancipatus ab hoc vacuandarum cerebri fordium mittere alienus est, tum quod neque vicinus directusque sit: neque ad intimas cerebri lacunas exhauriendas peruius, Ideoque excrementorum cerebri per hunc aurium meatum tanquam non convenientem viam, tametsi à natura instituta vacuatio, ab Hippocrate tamen ut symptoma intemperioris cerebri statuitur.

Hæc cerebri excrementorum per aures spontanea vacuatio tametsi symptomatica, non est tamen protinus prohibenda: sed tãtis per sinenda dum totam cerebri colluuiem emisserit, ne ea importune suppressa epilepsia aut apoplexia infantem opprimat. Quocunque tamen tempore vlcerationis aut inflammationis periculum ex dolore imminere videbitur, (putrescere enim tandem solet pituitosa
effluxio

effluxio)tunc cohiberi eam vacuationem decet,primum quidem nutricis victu contrario,id est calido siccoque & purgatione redundantis cacochymia pituitosa: deinde mitioribus pueri vacuationibus, vt purgationibus ante expositis & particulis: siue eidentibus, vt per phœnigum collo & scapulis affigendum, & per vlcuscula in cute capitis vnguibus excitanda (hæc enim ætas aberrhinis & apophlegmatismis abhorret) siue obscuris, vt per fotum ex sacculo lineo milio torrefactio plenum & appositum toti capiti pluribus matutinis.

Postremo topicis aurium meatus sedulo tergendus siccandusque est eiusmodi formulis.

℞. succi agrim.& absinth. ana ℥.iiij. vini albi & mell.rosat. colat. ana ℥.j. bulliant leuiter, & deinceps instillentur sæpe, diu noctuque in aures, absterfis prius auriscalpio sordibus crassioribus: tum demum obturentur.

℞.vini albi ℥.iiij. mell.opt. ℥.j. bulliant simul; &c. vel eadem iniectio fiat ex aqua mulsa: postea linamenta melle rosato obducta intromittantur. Si tamen sordes contumaciùs hæreant, nonnihil vnguenti Ægyptiaci vt ℥.ß. præscriptis formulis dissoluendum erit.

Si dolor ab acri defluxu molestior sit, oleum ex vitellis ouorum mixto pauco melle infundatur, vel quod in mortario plumbeo tantisper verberetur dum nigrescat. Quod si iam vlceratio subesse sentiat post deterfionem præscriptam,epulotica validiora ob duriorem siccioremque partis cartilagineam substantiam vsurpentur,Exempli gratia

℞.vini austeri ℥.ß.aluminis rochæ ℥.j. in hunc

Ccc.

liquorem gossipium vel lana mergantur sæpius, & ex iisdem ad solem siccatis linimenta fingantur, eademque hoc vnguento obducta intromittantur, bis interdiu.

℥ butyri recentis ʒ ij, scoriz ferri decies infusæ in vino rubro siccataeque ʒ β. agitentur simul in mortario plumbeo pistillo plumbeo diligenter, & vtatur vt dictum est.

℥ succi plantag. & solani ana ʒ iiij. tuthiz præparata ʒ β aluminis vsti, sanguinis draconis ana ʒ ij bulliant simul ad consumptionem ʒ. ij & fiat iniectio.

Denique, si vehementissimus à phlegmone interna, & acri fluxu sine erosione tamē & vlcere dolor excruciet, hic primum demulcendus est iniecto in meatum auris liquore ex oui albumine recentis aqua rosarum & lacte muliebri diutius simul agitata, vel ex albumine oui recentis cum rosaceo legitimo diligenter subacto, vel ex rosaceo cum tantillo aceti & caphuræ, vt

℥ olei rosati ʒ j aceti rosati ʒ ij leniter bulliant, deinde adde caphuræ gran. iiij. Mucilago seminis psyllij & cydoniorum extracta ex aqua rosarum, per se & prædictis mixta prodest plurimum. Lenito leuiter dolore, lenientia & peptica foris circa auriculas & auris ambitum vsurpentur, vt ex mucilagine, seminis altheæ, maluz, lini, fœnugræ. extracta ex decocto florum chamæm. melilot. & ficuum ad ʒ iiij butyri recentis, axungiz gallinæ & anseris ana ʒ j axungiz porci sine sale ʒ ij. croci ʒ. j. iridis flor. ʒ β olei liliorum & chamæmel. ana q. s. fiat vnguentum. Nusquam autem narco-

ob mollitiem corporum puerilium, maxime alterabilem: hinc enim veternosi aut carotici evadunt (tamen si ab adultioribus impune fortasse sustineantur) ut si philonij Romani 3 ij olei rosati 3 ij diluantur & instillentur. Interea autem dum leniendo dolori & coquendæ phlegmonæ medicus studebit, molles clysteres & lenissimas purgatiunculas non omiserit.

De umbilici inflammatione.

Vmbilicus Latinis, ὀμφαλός Græcis pars est organica vasis umbilicalibus constans, binis scilicet arteriis totidemque venis & viacho. Tumor eiusdem partis præter naturam exomphalos dicitur, cuius multiplices ex causarum coniunctarum varietate differentiarum distinguuntur nomine imposito à materia quæ tumorem excitat & ab ipsa parte, sic ἐντερὸμφαλος dicitur ab intestino, epiplo-mphalos ab epiplooo per ruptum peritonæum finisque nerueos epigastrii muscutorum diuulsos in vmbilicum elapso, αἱματόμφαλος à sanguine venoso vel arterioso, coque vel rupta vena & arteria, vel alterutra vel utraque dehiscente & reclusa ob indecentem eorum vasorum nexum. sic hydromphalos ab aqua, πνευματόμφαλος à flatu concluso, sarcomphalos à carne subnata, ἀποστήμφαλος ab abscessu.

Differentiarum omnium propria signa sunt. Nam ab intestino & epiplooo tumor resupinato corpore subsidet: erecto verò & stante attollitur, estque mollis & inæqualis: sed magis ab intestino à quo etiam digitorum impulsu rugitus auditur.

Est quoque utroque concolor & indolens. Reliqui tumores sunt perpetui: à carne quidem durior & liuidus: à sanguine mollior & liuidior: à flatu diffugiens præ tactu, & confestim recurrens: à sero diffugiens quidem, sed tardius recurrens: Abscessus species propriis signis dignoscitur. Porro quæ ex his differentiis tumorum umbilici curabiles sunt, curantur ut enteroceles species ipsis affines, quæ curatio paulo post explicabitur. Inflammatio quidem umbilici accidere solet male præcisis secundinis vel colligatis indecenter ab obstetrice vasibus umbilicalibus, ideoque ad partem dolentem affluente sanguine neque represso, phlegmone cogitur. Itaque præscripto nutricis victu frigido humidoque topica imponantur modice astringentia & frigida, ut

℞. ol. rosa. vel myrtini ℥.ij. albumen oui vnus, cerus. lotæ ℥.ij. misce diligenter & applicetur: vel etiã ouum integrum, id est, albumen cum vitello commixtũ: vel fiat embrochatio ex oleo rosato admixto pauco aceto vel succo plantaginis. In augmento adde olei irini, vel anethini parẽ portionem cum rosaceo (detracta cerusa) vel

℞. ol. myrtini & ros. ana ℥.j. farinæ fabar. & lini an. ℥.ij. cerusæ ʒ.iiij. ceræ nouę parũ, misce & applicentur continuando, donec totus tumor subsederit dissoluta materia. Licebit tamẽ in statu olei chamę. & anethini par pondus cum rosaceo miscere, & cerusam detrahẽre. Quod si in abscessum mutetur suppurabilem, tunc pepticiis erit vtendum.

De dentitionis symptomatis.

DEntitio, dentium eruptio est ex suis alueolis, aliquando

aliquando etiam totum eruptionis eorum spatium. Dentes autem ossæ partes sunt masticationi dicatæ. Latinis ab edendo dentes: Græcis δὲ τὸ ἐδιδῶν ὁ δ' ὄντης dicuntur. Partium ossæarum naturam dentibus vindicat, substantiæ eorundem durities, albedo, temperies frigida siccaque, & insensibilitas. Durities quidem maior est quàm cæterorum ossium. Itaque exerti intemperiem aeris & potionis impunè ferunt, cùm alia ossa detecta nigrescant, liuescant & cariem ducant: dentes quoque ferri aciem & ignis vim cum respuant, sola tamen irrigatione destillationum cerebri humidioris & ventriculi impurioris expiratione corrumpuntur, quòd videlicet naturæ eorum aduersissima sit humiditas. Sic durissimi lapides flatibus austrinis expositi fiunt cariosi. Albedo quoque dentium maior est hominibus quàm reliquis animalibus, sanis præsertim visceribus & victu temperanti utentibus. Eius tamen gratia perire solet ingrauescente ætate, sicuti in reliquis animalibus, exceptis equis. Frigidior quoque est dentium quàm aliorum ossium temperies: neque tamen à frigore mediocri, siue actuali siue potentiali tam celeriter lædi solent, ob insignem substantiæ ipsorum densitatem, & intemperierum aeris & potionis consuetudinem: quin potius eo conservantur per crebram lotionem aquæ mediocriter frigidæ, aut vini. Verumtamen ab exuperanti tandem frigore insigniter læduntur ob extinctionem exigui admodum ipsorum caloris. Sensus denique dentium proprius nullus est, sicuti nec aliorum ossium, quorum omnium securitati contra causarum externarum impetum, abdito situ,

carnis tegumento & substantiæ duritiæ consuluit natura, neque sentire ea voluit ne corporis totius vectura illis molesta esset, sicuti neque dentes, ne mutui per mansum attritus esset ipsis dolorificus. Dolor itaque circa dentem dentis non est, sed nervi proprius radicem eius cum vena & arteria subeuntis exiguo foramine, aut partium vicinarum ut perioestij & gingivarum. Itaque euulso dente dolor eiusdem cessat vacuata scilicet doloris materia aut diuulso nervulo. Pulsatio quoque est arteriolæ nervum venamque comitantis & ferientis in radice dentis ubi inflammata est: ab eodem nervulo sentitur vehementior alteratio dentis ad quem per poros directos pervenit. Non sentitur autem limatura aut fractura eius quæ nervo non adigitur. Sic ergo dentes ossa esse constat à quibus etiam in multis dissident: tum quod non videantur cum aliis ossibus oriri in prima conformatione: tum quod eorum incrementum perpetuum sit (multis tamen mutuo attritu consumuntur & conficiuntur) aliorum verò ossium desinat ad vigesimum quintum annum: tum quod excidere & renasci putentur: tum quod ut reliqua non cremenur: tum denique quod omni medulla & pinguedine careant quia durissima, ideoque à canibus sicuti alia non roduntur.

Dentium procreatrices causæ sunt quatuor (omnium naturalium instar.) finalis triplex: Masticatio & comminutio ciborum solidorum: distinctio sermonis & vocis articulatio: discrimen saporum una cum lingua & palato. Falsus enim est & brutorum tantum proprius armorum usus dentibus humanis attributus

attributus. Triplex illa dentis vtilitas tanti veteribus Belgis æstimata est vt in templo Æsculapij ἐδὲ τὰς τρυγὰς plumbeum appenderent, significantes non esse euellendos dentes nisi tam vacillantes cariosos & corruptos vt hæreere suis sedibus amplius non possent.

Formalis causa est anima qua generantur simul cum reliquis ossibus, aluntur augenturque. Materialis causa duplex est, Vna veris dentibus omnibus communis, semen scilicet, ex quo in vtero cum reliquis partibus omnium finguntur rudimenta, sicuti & brutis omnibus: sed iis in ortu manifesta: homini sæpius obscura & in alueolis sub gingiua tegente latitantia, cuius rei causa est discrimen temperamenti quod in brutis siccus, in hominibus humidius est, vnde horum dentes non nisi probe siccata ante ipsorum substantia peruadere gingiuam nequeunt.

Altera materia epiphysibus dentium anteriorum propria est ab excremento viscido tertie coctionis adhærescente siccatoque. Itaque epiphyses illæ excluduntur sine vllis radicibus, quæ veris dentibus accedunt: de his igitur epiphysibus audiendus est Hipp. lib. d e carnibus cùm ait, In vtero dentes ex menstruo, extra vterum lactentibus ex lactis calidiori & sicciori portione, ablactatis ex ciborum solidorum materia vesci.

Causa efficiens calor natiuus est, conformationis nutritionis accretionis, vt & reliquarum partium author, cuius varietas dentium exortum in diuersis pueris variare solet, vt citius tardiusue pro eius modo emergant. Quinetiam accretio

perpetua est dentium ob ipsorum usus necessitatem, ne mutuo conflictu ante animalis interitum deterantur prorsusque exoleant. Differentiæ dentium tres norantur ex officij, figuræ & compositionis varietate. Prima est octo incisorum qui Græcis *τομαῖς* & *τελασινοί*, Latinis primores dicuntur, quod inter ridendum diductis labris appareant. Secunda est caninorum quatuor: *κυνόδοντες* Græcis dicuntur, comminuendis frangendisque durioribus cibis destinati: alij vocant ocularios quod oculis è regione respondeant: sed tamen sine vlla inter se peculiari sympathia imperito vulgo leuius credita & decantata. Tertia est molarium, viginti vt plurimum, qui ita dicuntur, quod cibos molant & alterent, quod facilius in ventriculo concoquantur. Singulæ differentiæ congruam muneri suo figuram sortitæ sunt: incisores quidem latam basim & extremitatē tenuem: canini basim quoque latam sed extremitatem acutam: molares superficiem latam sed asperam & inæqualem. Denique compositio varia singularum differentiarum est. Nam incisores vna radice præditi sunt, vt & canini, longiore tamen multo & robustiore. Ex molaribus superiores radicibus tribus sæpius, aliquando etiam quatuor: inferiores sæpius duabus, & aliquando tribus nituntur.

Hæc varietas figuræ dentium homines decuit, ad maiorem sanguinis & spirituum elaborationem principibus humanæ mentis functionibus seruientium, cùm alioqui reliqua animalia vnâ dentium figuram sortita sint. Numerus dentium est triginta duorum vt plurimum vtrique humano sexui: molares tamen aliquando pauciores sunt

sunt, duoque defunt utrique maxillæ ob earum breuitatem. Rarissimum exemplum olim legitur vnius dentis toti gingiæ æqualis vt Prusiæ regis filio. Dentes quidem veri omnes simul generantur, non simul emergunt & extant: Incisores enim vel potius eorum epiphyses quinto aut septimo fere mense: canini nono, decimo aut duodecimo: molares tres utrinque primo biennio: reliqui omnes septenario primo annorum, exceptis ultimis in vnaquaque maxilla duobus, qui genuini latinè, Græcè *σωφρονισῆτες*, id est sapientiæ dentes vocantur, quorum ortus esse solet tertio ætatis annorum septenario, aliquando tricesimo aut quadagesimo anno, aut etiam tardiores vt centesimo Zancli cuidam Samothracio. Rari sunt casus dentatorum nascentium semperque inauspicati ominis in scæminis, auspicati & fortunati in hominibus crediti sunt. Locus alueoli sunt in maxilla vtraque quibus per gomphosim infixi, vel pendent, vel insident, iisque tam arcte cohærent, vt sæpe vnà auellantur magna interim hæmorrhagia. Atque cohæsiō hęc ligamento radices dentium cum vasis subeunte confirmatur.

Est igitur dentitio tum eruptionis dentium totum spatium, tum ipse exitus ex gingiua, quæ cum naturalis sit morbum tamen duplicem infert: solutionem continuitatis gingiuarum & inflammationem earundem ex spiritu & sanguine præ dolore illectis. Symptomata sunt grauissima ab Hippocrate aphorism. 25. proposita sectione tertia, vt pruritus gingiuarum, qui mediocris do-

lor est incipientem dentium eruptionem, primamque in obuiam gingiuam incurfionem committatus: dolor vehemens, dente iam gingiuam perrumpente, configente & diuellente, moxque exituro foras; vehementior tamen est caninis acutis & rotundis erumpentibus, eo quod velocius gingiuam penetrant, minor est ex molaribus, ob lentum magis eorum exitum, qui tamen maior est quam incisorum. Proponitur tertio febris orta ex dolore, vigiliis & inflammatione gingiuarum. Quarto conuulsio, vel ex sympathia cerebri cum dolente proximo dentis neruulo, vel ex defluente aquosa pituita ab eodem, quæ à febre liquata fit, vnde etiam tusses graues, dyspnœæ, asthmata: commouentur appetitis fluxu thoracis partibus. Meminit & diarrhœas, quæ nascitur vel ex copiosa lactatione ob sitim, lactisque per febres corruptione, vel ex auctione excrementorum cerebri. Istis Hippocraticis dentitionis symptomatis, hæc quoque iungenda sunt: ciulatus, vigiliæ, somnus subitis clamoribus interturbatus, præ dolore: papillarum constrictio frequensque morsus ob doloris impatientiam: sitis orisque incendium, præ inflammatione gingiuarum, ex qua etiam saliuatio multa, attracto à gingiuis inflammatis sero, manuum ad os delatione crebra, aphtæ denique ex feri acrimonia.

Prognosticum est ex libro Hippocratis de dentitione, primùm quod ea per hyemem tutior sit à dolore aliisque symptomatis grauib, quàm æstate, qua humores sunt acriores. Alij tamen contra

tra gingivarum substantiam hyeme duriores, & consolidationem difficiliorem; ideoque dolorem vehementiorem dentitionis: sed vere citissimam minimumque molestam esse putant. Secundum est quod dentitio cum diarrhœa à conuulsione tutior est, sicuti quæ cum febre acuta est, à qua humores fluxuri liquatique digeruntur. Tertium est, quod dentitio cum tussi superueniente tardior magisque infesta est. Quartum, quod dentitio obesorum & somnolentorum puerorum magis est conuulsioni opportuna. Quintum, quod conuulsio ex dentitione non est semper lethalis.

Curatio.

MOrbus hic (solutio continuitatis) curandus non est, cum naturæ motu excitetur: sed symptomata tantum lenienda, & in primis dolor, ex quo reliqua defluunt: extinguenda quoque intemperies & phlogosis doloris comes. Lenientia sunt modicè calida humidaque gingivam laxantia: ut denti prodeunti facilius cedat. Talia sunt oleum amygdalarum dulcium, liliaceum, violat. adipēs hœdi, gallinarum, butyrum recens, vel lotum cum succo maluæ vel violæ, cerebrum cuniculi; leporis, hœdi, gallinarum vel illitum gingivis vel mansum: lac nutricis aut caniculæ. Ex iis linimenta fiant, ut ex butyri & mellis paribus portionibus. Item medullæ ossiculorum. In pedibus veruecinis eadem vis est. Physica sunt remedia: dens apri, lupi, viperæ, vulpis, leonis, de collo pueri suspensus,

radix quoque syluestris colocynthidis, ex canali aureo vel argenteo suspensa. Item rubi radix, iaspis lapis de collo super stomachum gestatus. Item si infans equi rostrum basiarit dolorem dentium non sentit, sicuti qui lupi aut lupæ dentem dextrum circumferat.

De diarrhœa.

Sed enim eruptio ipsa dentium momentanea non est, ut eius dolores aliaque symptomata protinus conquiescant. Ideoque dum anodyna dolori febrique & vigiliis idonea opponuntur remedia, quæ paulo ante exposita sunt, diarrhœæ quoque occurrendum, vel potius lienterix, quæ dentitionem ut plurimum subsequitur, quæ diarrhœa vel à falsæ pituitæ in ventriculū descensu præ dolore dentium est, vel à corrupto per febrem lacte. Occurrendum inquam: primum quidem post suppressum catarrhi impetum per topica quæ capite de humiditatibus aurium proposita sunt deriuantia & vacuantia, deinde ventriculo à serosis & phlegmaticis excrementis expurgato per mellis rosat. colati ℥ ss vel puluer. rhabarb. cum lacte miscendi bibendique ℥ j vel 3 ss vel per syrupi de cichor. compositi cum rhabarb. ℥ ss vel 3 vj: postremo per eiusdem ventriculi & intestinorum astringentem, leuem tamē & sine insigni caliditate, ne febris inde inuale scat vehementius: foris quidem per litum ex oleo cydoniorum, lentiscino, mastichino & absinthino, addita ceræ albæ parte tertia: vel per unguentum ex iisdem oleis & tertia parte pulueris santalorum omnium, rosarum, mastichis, seminis, corian-

Coriandri & plantaginis. Tale est vnguentum Comitissæ. Efficacissimum etiam est quod ex paribus portionibus mastichis, cerati stomachici & cydoniati inter se iunctis cum oleo absinthino concinnatur. Intus autem syrupi myrtini vel melini cochlear vnum sæpius iteratum, longè à lactatione aptissimū est, sicuti puluis corall. rubei, cornu ceruini & terræ sigillatæ ad ʒj cum lacte exhibitus. Quæ à lactis corruptela est diarrhœa, vel potius lienteria siue ob febrem adurentem, siue ob copiosam lactationem, siti febrili excitatam, ea quidem: sed omīssa catarrhi suppressione iisdem remediis vacuantibus & astringentibus intus forisque comprimenda est. Circa dentitionem tamen præcipitanda ventris compressio non est, ne cruditas & cacochymia dolore & febre diutius perseverante nimis multiplicata febrē ipsam ingeminet, putredine aucta, aut conuulsionem adsciscat cerebro neruisque affectis. Quæcunque autem causæ puerilem diarrhœam proferant, contrarius nutriti victus & modicè astringens decernendus est.

De procidentia ani.

IAm diarrhœam longam nimis, aut difficilem ani procidentia subsequitur. Ista verò vocatur intestini meatus inferior cohibendis & transmittendis suo tempore non tamen expellendis sæcibus destinatus.

Est enim eius intestini finis duobus instructus musculis, vno quidem circulari & rotundo, siue pari, per transuersum extremitati eius intestini

circumsusus, idque tam constanter occludens ut nihil intempeltive & præproperè ex illo excidat (ideoque σφιγκτηρα ab astrictiōis officio Graci vocant) donec premente copia vel acrimonia vellicante relaxetur ad transmissionem quidem non excretionem ut dictum est. Anus dicitur quasi vetula à rugarum senilium similitudine. Alter musculus tergeminus est, qui oblique supra sphinterem effusus anum sursum reuellit. Ille moribundis hiat animali facultate extincta: hic ex magna egerendi contentione & conatu per diarrhœam acrem præsertim, tantopere enervatur ut anum prociduam & prolapsam relinquat, neque in locum suum reuocet aut retrahat: quanquam eadem prolapsio ex mollitie aliquando sola, sine prægressa diarrhœa accidit, infantibus & pueris magis quam senibus. Rarior causa est paralytis ex perfrigeratione immodica, siue ex natatione in frigida, siue fessione supra saxum frigidius. Hoc quoque modo vteri procidentia accidit sicuti & illo in partu difficili. Ergo procidentiam ani ex violenta per diarrhœam deiectione curat, primum quidem blanda intestini per manum nutriticis & indolens repositio. Quod si ex mora extra locum & refrigeratione ab aere extumuerit, tum primum fouenda est vino in quo coxerint folia salix, organi, calaminthæ, summitat. laur. hederæ lauendulæ, semina anisi & fœniculi, ameos & carui, flores chamæm. anethi.

Reposita anus confirmanda est per astrictiōem, tum musculi eius, tum membranarum quib. ossi sacro

cro

cro lumbisque anne&itur. Topicorum formæ sunt
fotus, puluis, suffitus.

℞. foliorum saluix, plantag. tapfi barb. absinth.
summitat. myrti & oleastri ana m. j. rosar. rubr.
pug. j. balaust. nucum cupress. gallar. ana ʒ j. ma-
stich. & seminis coriandri præparati, coquantur in
aqua ferrata & vino rubro tortiuo: foueatur inde
anus cum spongia. Fotum supplebit in se&us in ea-
dem materia.

℞. mastich. corticis thuris, nucum cupress. cha-
rabe, baccharum myrti & boli armenæ, balaustio-
rum ana ʒ ij. gallarum vstarum corall. rub. & se-
minis coriandri ana ʒ j. fiat puluis, qui à fotu as-
pergatur parti: firmitus tamen hæreat oleo astrin-
genti vt myrtino, lentiscino, aut mastichino iun-
ctus.

Ex eodem puluere cui picis aridæ & resinæ co-
lophonix pars tertia addita sit cum terebinthina,
trochisci ad suffitum comparentur, quem per sel-
lam perforatam excipiat.

Sin eadem ani laxitas ex mollitie partium ea-
rundem obtigerit, topicis prædictis præmitten-
da erit ventriculi & intestinorum leuior abster-
sio crassæ & viscidæ, vel aquosæ pituitæ ex melle
rosat. aut rhabarb. puluerisati momento, aut certe
per clysteres ex hydromelite.

Denique si à paralyfi nerui in eum muscolum
inserti præ casu, ictu, refrigeratione, aut destillatio-
ne externa in regionem ossis sacri contigerit, tunc
topica attrahētia & digerētia sunt adhibēda, qualia
sunt oleum laurinum, costinum, de spica, terebin-
thinum, vnguenta quatuor calida vocata cum aqua
vitæ diutius applicanda. Emplastra denique quale

est de baccis lauri : sed hæc topica post forum simili facultate constantem ex decocto florum anthos stachados centaurii minoris baccarum lauri, iuniperi, foliorum hederæ, lauri, lauendulæ, saluiæ, verbenæ, polij montani.

De tarditate alui.

Diarrhœæ contrarius affectus est alui tarditas, ignavia, & suppressio : sæpe quidem ex crassiori sicciorique lacte & melancholico : sed aliquando etiam ex intemperie sicca intestinorum siue natiua sit, siue ex vicini hepatis sympathia, cuius ardore fæces omnino exsiccentur. Lactis nutritricis crassities siccitasque corrigatur multis iusculis herbisque incoctis humidioribus, ut beta, spinacio, lactuca, multaque potione vini dilutissimi usuque copioso fructuum recentium prima mensa assumptorum. Temperies autem intestinorum puerilium siccior post victum nutritricis humidior lenientibus quoque remediis abigenda est, ut clysteribus pinguioribus, ex decocto emollientium herbarum, multoque oleo vel butyro, aut medulla cassiæ. A quacunque tamen causa hæc suppressio sæcum inducta sit, dum sensim prædictis remediis emendabitur, earundem subductio sollicitanda est acutioribus glandibus & melle sæpe deglutiendo.

De conuulsione.

INter dentitionis symptomata, acerbissima est conuulsio : non ea quidem ab inanitione ; sed à repletione neruosi generis ; eius enim causæ prin-

principes sunt illæ duæ à seroso crudoque humore ex cerebro puerorum humidissimo per febrem liquato effusæque. Itaque pueris familiaris magis esse solet, qui pleno obesoque habitu & aluo tardiori sunt: obesitas enim & plenitudo habitus à voracitate est multique lactis ingluvie, sicuti alui durities & tarditas ab eisdem non copia tantum: sed crassitie etiam ut potè pituitosi & melancholici, quod ægrius seriusque concoquitur. Ex ea enim voracitate aluique tarditate, & quotidianorum excrementorum excretionis raritate, serosorum humorum magna vis in cerebro ætatis causa humidissimo sensim congeritur, ex vaporum multitudine à lacte diutius morante eiusque excrementis: illi autem à febris calore liquati in nervos mollissimos alienique humoris capaces defluunt. Febris autem vehementia doloris qui dentitionem comitatur sævitix respondet: præsertim in caninorum dentium egressu, ad nonum decimum & undecimum mensem. Præcautio convulsionis huius quæ ex vitio lactis est crassitie scilicet & copia, diætâ nutriticis constet attenuante magisque tenui maturè ante dentitionem præscripta: puerique quoque rariori parciori que lactatione: sed exercitatione crebriori per cunarum agitationem, gestationem in vlnis, somnoque contractiore, utantur.

Sic enim tenuius parciusque lac facilius citiusque dum concoquitur, fæces sæpius prodeunt cum vaporibus in cerebrum aliter ascensuris, à quorum fluxu tutior est spina per febres.

Iam verò præsentis eiusdem & urgentis con-

Ddd

uulsionis curatio à doloris lenitione inchoanda est de qua satis multa antea, moxque ad fluētis humoris reuulsionem producenda per frictiones totius corporis, balanos & clysteres acriores, mitioresque purgationes, quorum omnium exempla antea sunt apposita. Reuulsioni deriuatio postremo iungenda est idque per errhina & apophlegmatismos, nisi contraindicaret puerilis imprudētia. Proinde vacuatio ista humoris ab occipite totaque spina & neruorum propaginibus molienda est per olea digerentia, forasque euocantia, partibus illis sicuti axillis inguinibus cæterisque articulis diligenter inducenda: qualia sunt anethinum, vulpinum, muscatellinum, laurinum & lumbricorum: deinde validiora, vt rutaceum, costinum, de spica, petroleum, terebinthinum, ex quibus etiam cum adipibus taxonis, gallinæ, anseris, paucisque aromatis mixtis, vt piperis cinnamomi zinziberis, castoreo: fiant linimenta applicanda cum aqua vitæ. Similis erit vnctio ex mithridatio & theriaca veteri, cum eadem aqua vitæ earundem partium, quæ tandem lana succida eodem oleo imbuta tegantur. Balneum denique naturale sulphureum, bituminosum, aut artificiosum simili facultate concinnatum profuturum est: sed omnia in puerulo modice vsurpanda.

Atque ita conuulsionis puerilis infantium dentientium therapeia ex Hippocratis sententia expedita videtur, de qua tamen subdubitare mihi contingit, num à nerui dentium radicem subeuntis phlegmone moueatur ob sympathiam cerebri viciniore (sic enim fauciatorum vulneribus si ante tempus cohibeatur hæmorrhagia, conuulsio sequitur

tur nervi inflammationem) Huic autem conuulsionis speciei sola lenitionis remedia comparanda sunt antea capite proprio exposita, nisi fortasse phlegmones dolorisque inuicta magnitudo & conuulsionis funestus cruciatus ad gingivæ per scalpellum apertionem medicum cogat, sicque crudele malum crudeli remedio depellatur, à quo tamen nisi certissima mors immineat, temperandum omnino est, ne à sectionis dolore nova fluxio & phlegmone immedicabilis proritetur. Idem autem anodynorum ante expositorum genus non capit tantum regioni, sed spinæ etiam toti & articulis omnibus admouendum est, quibus locis nervi vasaque à carne magis detecta nudaque sunt: iisdem deinde lana sordida continuò imponatur.

De epilepsia.

Conuulsionis species quædam est epilepsia, neque vniuersalis & per intervalla recurrens cum mentis sensuumque oblæsione. Hæc igitur quia non est perpetua non solum ab aliis tribus conuulsionis vniuersalis speciebus differt tetano opisthotono & emprosthotono: sed & particularibus etiam brachiorum & crurum, ἀγκύλις vocant, tam rigidè extensorum aut contractorum ut inflecti nullo modo queant, quodque in utrisque mentis & sensus integritas persistat.

Epilepsia varia sortita nomina est, tum à symptomate: hinc enim morbus caducus vocatur quod ægri per insultum & accessionem concidant: & epilepsia quod sensum mentemque protinus occupet & apprehendat: tum à loco: hinc comitalis,

eò quod in comitiis hominumque cœtu , vel ob terrorem si quid publicè exponendum est , vel ob habitus densitatem , quo liquata diffuset pituita, maxime inuadat, tum à causa efficiente; hinc lunaticus, vel quod motibus lunæ humores excrementitios variantis, vel quod qui interlunio nati sunt huic morbo sint obnoxij quo tempore scilicet cœli frigidioris nascentium capita percelluntur : tum à magnitudine, hinc sacer morbus : *ἱερός* enim apud Græcos magnum significat , & Hercules quasi inexpugnabilis. Eodem sensu veteribus elephantiasis dicta aliquando est: tū ab iis qui hoc morbo sæpius ægrotare solent, hinc Hippocrati *παιδίων νόσος* puerilis morbus dicitur. Est autem epilepsia alias verus cerebri affectus & idiopathia, aliàs affectio eiusdem ex sympathia. Illa obstructio quædam est dimidiata duorum cerebri sinuum postremi & medij, ab humore frigido, tum pituitoso, tum atrabilario: sed utroque flatuoso in eodem cerebro collecto: hæc mordicatio quædam est & vellicatio à vapore acri, maligno & venenato, ex sympathia duplici: tum ventriculi ex lacte & alimentis corruptis & intestinorum vermibus: tum aliarum partium internarum externarumque, à quibus ascendens vapor vel nuda qualitas venenata sensim in cerebrum eiusque membranas obrepit.

Prognostica.

SI epilepsia primis mensibus & annis inuaserit, Silla quidem soluetur mutatione pueritiæ in pubertatem, cuius initium est à decimo quarto anno

anno, cùm mares hircire & semen emittere incipiunt, fœminæ verò semen mensesque excernere incipiunt. Hac tamen ætate ex seminis excretionem magis fœminæ quam mares iuvantur. Puerilis igitur epilepsiæ materiam pituitosam, cerebri humida intemperie lactisque ingluvie & motuum importunitate collectam, pubertas calida siccaque incidit, terget, attenuat & resoluit. Est autem totum pubertatis spatium à decimo quarto anno ad vigesimum quintum aut trigessimum, ut adolescentiam etiam complectatur, prout citius seriusque pro caloris modo pueri pubescunt. Epilepsiæ solutio duplex est, alia proprie dicta per ætatis mutationem & temperamenti: alia per metastasim ut in quartanam, hæmorrhoides, varices crurum & podagram. Ista mutatione ætatis, si non sanetur, consensescere & commori solet, nisi mutatione loci in contrarium id est calidum siccumque solvatur. Nonnulli enim Arabum doctrina eruditi, septentrionales homines rariùs, meridionales sæpius epilepticos fieri contendunt, quòd illi calore interno magis circumfluant, hi verò minus: tametsi causa probabilior mihi videatur ex varietate cerebri substantiæ, & excrementorum eius quibus septentrionalium capita ex cœli frigiditate magis quam meridionalium abundant.

Mutatione quoque victus in calidiorem sicciorisque solutio hæc accidere potest, quæ calfaciat, tenuet & dispergat pituitam, sicuti & frictiones, labores, inedia, animique symptomata: venus tamen epilepticis nunquam conducatur

reditaria est; quæque incipit à parte dextra cum clamore, stridore dentium, seminis eiectione, concussionem vehementi, obliuione, spumaque circa os obhærescente. Contra, breuitas paroxysmi, paucitas leuitasque symptomatum eiusdem sine spuma, cum recordatione & verecundia, facilique accessionis solutione, per odorem plantarum acrium facilem curationem significat.

Pueris igitur epilepsiæ species vtraque, idiopathica & sympathica familiaris est: illa quidem ob pituitosi humoris flatuosique in cerebro redundantiam, ex ingenita eiusdem temperie humidiori lactisque voracitate: hæc tum ob dentitionis laborem, tum ob lactis corruptelam & cruditatem nidorofam, tum ob vernium morsum viuorum aut putrescentium etiam acrem expirationem. viui autem non solum intestinorum aut ventriculi morsu, sed materiæ etiam putris agitatione epilepsiam commouent.

Puerilis epilepsia idiopathica desinere ætatis in pubertatem mutatione solet: eius tamen curatio nequaquam in hoc mutationis tempus differenda est: sed à prima quoque eius origine prohibenda curandaque est. Prohibetur autem vel præseruatur inter accessiones, tum nutricis victu modicè calido siccoque instituto, vinique & verneris vsu interdicto, iracundia, & mœrore declinato, purgatione denique humoris pituitosi qui abundare in eadem videbitur: tum pueri victu parciore adhibito, rariore lactatione, maiori exercitatione per agitationem in cunis & vlnis, si ingluuius sit: tum denique pharmacia quæ balanis utcunque

acribus si venter piger sit, clysteribus modice tergentibus & purgatiunculis antea expositis pituitam excludat: tum denique setonibus, vel potius cauteriis ad ceruicis ortum admotis: sed illa omnia reuulsionum genera iustis interuallis sunt vursupanda: hæc deriuantia continuanda diutius sunt, sic enim quibus in capite vlcera etiam sponte fiunt, ab epilepsia tutos esse comperitum est.

Postremo cerebrum roborandum est, & expungenda eius intemperies humidior topicis modicè calfacientibus siccantibusque, quales sunt cucuphæ idonco puluere farctæ, & suffitus, aliaque assomenda vt pulueres cum lacte nutriticis, aut melle. Clysterum autem balanorum & purgationum puerilium materia formaque sapius est antea proposita. Nunc topicorū materia proponenda est.

Puluis pro cucupha.

℞. radic. & seminis pœoniæ maris, galang. & cyperi, visci quereini ana ʒ ij. corticis citri, granor. alchermes, sandali citrini & calami arom. ana ʒ ij. folior. siccor. beton. verbenæ, saluiæ, maioranæ, florum anthos & stœchad. ana ʒ j. nucis mosch. macis, & caryophyll. ana ʒ ss fiat puluis cotone moschato & serico rubro excipiendus, vnde cucuphæ duæ concinnentur quas vicissim diu noctuque puer gestabit.

Puluis pro suffitu.

℞. mastich. corticis thuris, nigellæ Romanæ torrefactæ & seminis coriandri præparati ana ʒ ij. cortic. citri, granor. alcherm. radic. & seminis

nis pœoniæ maris, calami arom. & schœnanthos
ana ʒj. nucis moschatæ macis & cinnam. ana ʒß
trochiscor. galliæ vel aliptæ moschatæ ʒiiij. fiat pul
uis redigendus in trochiscos ponderis ʒj. singulos,
cum terebinthina ad suffitum, quem naribus & o
perimentis capitis excipiet.

Puluis sumendus.

℥.craniij humani, visci quercini, vngulæ alces
siue asini sylvestris ana ʒij. radic. & seminis pœ
oniæ maris, rasuræ eboris, cornu ceruini, frag
mentorum sapphiri & hyacinthi, coralli rubri ana
ʒj. nucis moschatæ, macis & cinnam. ana ʒß mos
chi optimi ʒß panis sacchari pondus triplum, fiat
omnium puluis tenuissimus, de quo capiat bis
aut ter per singulas hebdomadas ʒj. cum pauco
lacte nutricis vel potius ex melle.

Hæc igitur est methodus prophylactica epilepsiæ
grassantis à prima infantia ad pubertatem vs
que quæ nisi tum curetur, consensescere & com
mori solet: eius tamen incrementum ista me
thodo præhibendum est.

Curatio accessionis epilepticæ propria est
constatque causarum eius subtractione, & pitui
tosi flatuosique humoris è ventriculis cerebri
eductione: tum per reuellentia remedia confe
ctim adhibenda, vt frictiones validas totius cor
poris vnctionesque colli præsertim & spinæ, ar
ticulorum omnium axillarum, & inguinum, ex
oleis neruosum genus roborantibus, calidis nem
pe parumque astringentibus vt laurino, nardi
no, lumbricorum, terebinthino: tum per cly
steres & balanos acres: tum per deriuantia vt

errhina & apophlegmatismos, continendo interim corpus fortiter & artus, ne vehementi concussione, aut lædatur aut debilitentur. Errhini materia est

℞ rad. pyrethri, semin. staphidis agriæ & zinzib. an. ʒ j piperis longi ʒ β fiat pulvis in nares per pennam insufflandus. Apophlegmatismi quoque materia est. theriaca aut mithridatium vetus, vel medicamentum purgans, vt diaphœnicum palato obducendum, diductis interim dentibus inserto bacillo, ne etiam linguam violent. Phœnigmus quoque in acerbiori accessione scapulis & collo sæpe applicandus est.

Epilepsia puerilis ex dentitionis dolore necessario præcaueri non potest, curari autem à natura sola potest excluso ex gingiuis dente: placatur tamen à medico remediis anodynis mollientibus & dentitionem accelerantibus.

Epilepsia à vermium vel viuorum punctu morsuque intestinorum & ventriculi tunicarum, vel mortuorum putridis vaporibus cerebrum conscendentibus, eiusque tunicas pungentibus curatur vermibus ad sedem illectis, per clysteres dulces, vel iisdem necatis per vnguenta olea & emplastra amara acriaque ad vmbilicum non ad os ventriculi admota, & subinde expulsis medicamento purgante. Sua etiam assumendis remediis ad vermes necandos præcipua vis est, de quibus postea capite de vermibus. Epilepsia denique ex corruptela lactis nidorosa vel bilis flauæ & æruginosæ copia, curatur proritata primum

num vomitione (quæ alioqui noxia sit cerebro imbecillo) idque appresso ad linguæ radicem nutritis digito, vel titillatis penna anserina oleo illita faucibus, deinde frictionibus, ligaturis artuum, clysteribus & balanis acribus: denique post solutam accessionem potionibus intemperiem ventriculi calidam extinguentibus, ut syrupi de granatis acidis, de limonibus, myrtino & melino. Foris quoque regioni umbilici ceratum sandalinum & unguentum rosaceum lota cum aqua rosarum vtiliter inducentur.

De tonsillarum inflammatione.

Adhuc duarum pueritiæ partium morbi ex aphorism. duobus vigesimo quarto & vigesimo quinto lib. 3. expositi & percurati sunt: tum eius quæ ab ipso natali die ad septimum mensem primumque dentitionis rudimentum excurrit: tum eius quæ à prima dentitione ad secundum aut tertium ætatis annum producit: deinceps ex aphorism. 26. lib. eiusdem morbi interiectæ ætatis ad pubertatem usque, id est duodecimum, decimum tertium, vel decimum quartum annum, exponendi curandique sunt. Eius initiû antea suis signis definitum est prima lanugine in maribus conspicua, & in fœminarum pudendo: voce hircescente & libidinis titillatione: in fœminis præterea mammarum extubercantia mensiumque fluxu: Est autem varium ipsum tempus pro varietate temperamenti & caloris natiui discrimine, ut ante scriptum est.

Aphorismus 26.

Ipsis vero grandiusculis tonsillarum in-

flammationes; veræbræ in occipitio introrsum luxationes: asthmata calculi, lumbrici rotundi, ascariæ, verrucæ pensiles, satyriasimi, stranguriæ, strumæ, & alia tubercula, præcipuè verò prædicta.

Paristhmia glandulæ duæ sunt valde fungosæ & spongiosæ in faucibus (qui interior est oris locus, ubi gutturis gulæque extrema conueniunt, pharynx aliter dicitur) ad radicem linguæ, inter gulam & laryngem velut isthmus quidam, sibi inuicem oppositæ, & in utroque latere singulæ conditæ sunt: Ideoque paristhmiorum nomen sortitæ sunt: aliàs Græcis *αιριάδες*, Latinis tonsillæ, quibusdam etiam amygdalæ dicuntur. Illæ porro copiosam saliuam asperæ arteriæ toti; ori irrigando suggerunt. Eodem nomine vocatur eandem glandularum & vicinarum partium, ut membranæ ventriculo, gulæ, faucibus, totique ori communis inflammatio, potus spiritusque vias impediens astringensque. Huius signa sunt tumor, rubor, respirandi difficultas, dolorque ad fauces in deglutiendo lacte, quod sæpe per nares refunditur, cum alioqui cibi crassiores viam cibi aperiant.

Prognosticum.

Hinc aliquando suffocatio aut præclusis obturatisque grandiori sua mole œsophagi & arteriæ asperæ initiis, aut suppuratione rupta pureque affatim effuso: proinde eius incrementum omni genere reuulsionum & deriuationum prohibendum est, quarum puerilis infirmitas particeps esse possit. Itaque clysteres & balani paulo acriores ab initio summittantur: potiones laxatiuæ mox propinentur:

tur: frictiones molles totius corporis subinde iterentur: cucurbitulæ paræ collo & scapulis affigantur: emplastra epispastica etiam occipiti & collo rasis capillis imponantur (horum omnium remedium materia & formula ante sæpius proposita est.) Intus quoque reprimenda interim fluxio est, gargarismis ex liquoribus astringentibus proximè ad fauces cum imbutis linteolis & digitis nutricis leuiterque & frequenter admouendis. Exempli gratiâ

℞ aquar. plantag. pedunculi rosa. matrissyluz ana quart. j. syr. de ros. siccis vel de granatis acidis ℥ij vel rob. diamorum ℥j. externam cōtra faucium regionem laxandā esse præcipiunt, vt repulsa fluxio foras euocetur discutiaturq;. Ad hoc cōfert litus ex oleis chamæm. lilic. amygd. dulcium & similibus. Quod si breui tempore tumor subsidere, ruborque & cætera eius symptomata mitescere sentiantur, tunc omissis reuellentibus & deriuantibus omnibus remediis digerentium tantum vsus intus forisque retineatur, vt

℞ hord. integr. p. j. flor. chamæm. & aneth. ana tantundem; decoquantur, & in colatur. ℥j dissol. mell. rosati colati vel sacchari rosati ℥ij vtatur vt supra.

℞ mellis optimi ℥iiij. nidi hirundinum ℥ij iris florentiæ ℥ss. stercoris canis ossibus per biduum nutriti ℥ij spicæ nardi ꝑ iiij croci ℥ss. concorporentur cum pauco vino albo, & fiat cataplasma faucibus extrinsecus & tepidè applicandum bis in die. Potest etiam ex solo nido coctio in oleo chamæm. efficacissimum cataplasma concinnari. Si tamen defluxionis impetum coercere reuellentium,

deriuantium & repellentium remediorum omnia genera nequeant, iamque suffocationis imminētis periculum metuatur, idipsum arcendum est erecto thorace & stragularum onere sublato, aere refrigerato, loco lucido & perspirabili, deinde auctis etiam deriuantium & reuellentium viribus per clysteres acriores, cucurbitulas maiores, & cum maiori flamma per phœnigium sincipiti inducendum, per gargarismos magis digerentes, vt ex hydromelite, incoctis in eodem hyssopi, origani & calaminthæ foliis, collo interim & thorace vel oleo liliorum, vel butyro recenti, aliisque pinguibus identidem delinito: atque interim suppurationio iuuanda est, eodem litu pingui circa fauces & collum, & intus simili gargarismate.

℥ caricar. ping. paria quatuor. passul. purgat. paria decem. flor. chamæm. sambuc. ana pug. j. coquantur, & ex residua contusa & cum mucilagibus mixta radic. althææ & liliorum, vitell. ouor. polline farinæ triticæ & croco fiat cataplasma suppurans, & pariter ex decoctionis liquore gargarisma. Suppuratus abscessus quamprimum aperiendus est vel vnguibus vellicantibus, siquidem obuius sit & manifestus, vel scalpello per mediam cannam immisso adactoque: sed prono interim capite, oreque hianse, vt sanies defluat foras, neque in pulmones deriuetur ægrum suffocatura: Deinceps detergentibus gargarismis pus eluendum, vlcusque pereurandum est. Non est autem ea apertio diutius protrahenda, quia suppurationio eâ oris parte calida humidaque multisque perflata vaporibus citius expeditur.

De .

De luxatione vertebrae.

Secunda ægritudo est organica, nempe vertebræ quæ in occipitio est ad anteriorem colli partem luxatio, & à propria sede dimotio: Huius luxationis causa est multiplex, aliàs à paristhmiis & tonsillarum inflammationibus, & membranæ quæ communis est ventriculo, tonsillis, totique ori, atque musculorum huic membranæ subiectorum, tum qui gulam gutturi coniungunt, tum qui œsophagum eandemque gulam spinæ annexunt. Ab iis enim musculis, nervis, tendinibus & ligamentis phlegmone tumefactis contractisque attracta intro vertebra infert λόρδωσιν & perversiōem colli in partem interiorem, aut σκολίωσιν & distortiōem colli in latus, ubi altera tantum parte partes prædictæ contrahuntur. Secunda autem intelligenda est, vertebra colli aliàs Hippocrati magna dicta, ut tertio de articulis; aliàs dens à processu eius vertebræ, qui similis est denti. Luxatâ itaque vertebrâ istâ magna ad interiorem cervicis partem, apparet quædam cavitas in ea cervicis parte qua dens est, neque sine dolore attingitur. Eam autem luxationem puerorum potius quam infantium propriam Hippocrates statuit, quod infantibus ex inflammatione faucium citius mors obrepat quàm ista luxatio aut phlegmone communicetur ad cervicem vsque: vel certe quod infantium nervi, tendines & ligamenta sint molliora quam ut validam ab inflammatione contentiōem perferre possint. Atque hæc luxatio quintam anginæ speciem constituit, quam Hippoc. 2. epid. Galen. 4. de loc. aff. accuratissime explicat,

camque scribit Aetius veteribus anginam propriè appellatam fuisse, quòd è suo loco depulsâ istâ vertebrâ laryngem plurimum coangulet, spirationemque intercipiat, vnde ægri canum more linguam exerere hantique ore respirare coguntur. Alia luxationis eiusdem vertebræ causa est siccitas tanta per febres ardētes omnium oris partium prædictarum, vt fiat colli peruersio, intro adductâ vertebrâ, voxque clangosa, id est sonora & ad raucedinem accedens, cum strepitu inter bibendum. Vtraque anginx species est incurabilis & suffocatione immedicabili funesta: sicuti quæ à casu, ictu, grauique impulsione aliquando accidit.

De asthma.

Asthina morbus est & obstructio fistularum pulmonis, eiusque cauitatum cuius symptoma est frequens & difficilis respiratio sine febre quidem: sed cum sono & strepitu, vnde nomen traxit asthmatis, id est anhelationis, qualis eorum est qui velociori & longiori cursu aut vehementiori exercitatione vsi, valida inspiratione indigēt. Quâuis enim laborantium thorax plurimum dilatetur, minus tamen quam pro necessitate refrigerandi cordis ob viarum angustiam aeris inspirant, proinde inspirationis frequentia defectum eius supplere coguntur, rectaque ceruice & surrecto thorace suffocationis periculū declinādi causa respirant, vnde & orthopnææ nomē morbo inditum est. Asthmatis causa, vna quidem rarior est, tuberculum scilicet in pulmonum fistulis sensim exaggeratum: altera frequentior humoris crudi lentique in pulmonis bronchiis infarctus. Porro humoris huius descensus è

sus è cerebro est humidissimo per foramen palati, isque vel spontaneus, copia opprimente, vel acrimonia vellicante, aut frigore exprimente vel fundente liquanteque, calore concitatus. Neque tamen inter infantium morbos asthma ab Hippocrate recensitum est, tametsi ipsis humidius magisque excrementosum cerebrum quam pueris, quia in illis lethale omnino & incurabile est ob aëris insuetudinem, alimenti nouitatem, vmbilici inflammationem, ob recentem denique dentium eruptionem, quibus omnibus laboribus pueri iam dudum defuncti sunt, ideoque ad coquendum, expectorandum & respirandum infantibus multo robustiores sunt.

Curatio.

PVeris asthmaticis diæta imperetur frugalis, tenuis & attenuans, calida modicè siccaque & dulciuscula, à qua arceatur omnia edulia & obsonia refrigerantia & astringentia: quin nutriatur potius carnibus recentibus tostis, hordeatis, amygdalatis, auenatis, panatellis, furfuris cremore, vitellis ouorum, amygdalis & auellanis tostis, nucleis pineis, dactylis, earicis, pistaciis. Deinde in therapeia primus sit reuulsioni locus: secundus deriuationi è cerebro: tertius vacuationi è thorace: postremus corroborationi tum pulmonis tum cerebri.

Reuulsionis primum instrumentum sit clyster acrior abstergens & phlegmagogus, vt

℞ rad. enulæ campanæ ℥ ij folior. betæ, mercurial. absinthij organ. & calaminthæ ana m. j seminis cumini ℥ ss florum anethos p. j coquantur

Ecc

& in colaturæ ꝑb j dissolue mell. anthosati & olei anethini an. ʒ ij electuar. diaphœnicon. & hierę picr. an. ʒ ß fiat clyster, iniiciatur inani ventriculo. Alterum instrumentum reuulsionis est purgatio phlegmagoga cui præmittenda est ventris lenitio & postmodum coctio humoris purgandi. Illa constet potione, quæ recipiat elect. diaphœnici ʒ ß cum decocti cicer. rubrorum hyss. & tussilag. ʒ iij vel ʒ iij fol. senn. coctorum cum foliis hyss. & cicerib. rubr. In quo decocto agarici trochiscati ʒ j infusa sit & in expressione dissolutæ electarij diaphœn. ʒ ij vel iij. Coctio quoque humoris peccantis suscipietur iulepis vel apozematis tergentibus, attenuantibus & modicè calfacientib. in plures dies ob humoris contumaciam protrahendis. vt

℞ syr. de hyss. de prass. & capill. veneris, vel

℞ mell. anthos. oxymelitis simpl. & syr. de tussilag. ana ʒ ij dissolue in hydromelitis ꝑb ij addendo cinnamomi ʒ ij fiat iulepus pro sex dosibus matutinis.

℞ rad. polypod. quercini & enulæ camp. ana ʒ ij rad. liquir. & seminis carthami ana. ʒ j folior. hyssop. satureiæ, tussilaginis cum radicibus capill. ven. scabiosæ, pimpinell. ana m. j caricar. pinguium paria iij, seminis bombacis & anisi ana ʒ ß pasfular. purgatar. & nucleorum pini lotorum & baccar. loti arboris ana paria xv. hordei integri & florum anthos ana p. j decoquantur in hydromelite omnia suo ordine & in colaturæ ꝑb j ß dissolue cinnamomi ʒ ij mellis optimi & panis sacchari ana ʒ ij fiat apozema clarificatum pro vj dosibus matutinis & vespertinis.

Postea

Postea in vltima dosi infunde rhab. opt. & agarici trochiscati ana ʒ j. spicæ nardi ʒ β in expressione dissolue electuar. diaphœn. & syr. capill. ven. ana ʒ β. fiat potio, detur mane cum custodia. vel

℥ mass. pill. aggregatiuarum maior. & de agarico vel cocciar. ana ʒ β. cum aqua hyssopi vel scabiosæ fiant pillulæ vj vel vij deauratæ, quas deuoret horis duabus post mediam noctem, leui cœna præcedente. Deinceps aliud reuulsionis instrumentum comparandum erit per hidroticam potionem matutinam multorum dierum vt quindecim aut viginti.

℥ radic. falsæ parillæ electæ & diligenter præparatæ ʒ iiij rasuræ ligni Indici ʒ ij infunde in lb̄ vj aquæ fontanæ per spatium viginti quatuor horarum: deinde coquantur igni luculento ad mediæ partis consumptionem addendo sub finem coctionis folior. tussil. & summitatum hyss. ana m. j. liquiritiæ & seminis anisi ana ʒ β: postremo colentur bis aut ter per cribrum laneum, capiat ʒ iiij calidè mane prouocando sudores iniectis pluribus vestibus.

In medio & fine huius potionis hidroticæ reiterentur pillulæ præscriptæ cum clystere quoties venter erit tardior. Diætæ quoque præscripta obseruetur & hydromel bibatur ex lb̄ x. aquæ fontanæ cum lb̄ β mell. opt. percoctæ & despumatæ, vel saltē vinum potet dulciusculum & prisana dilutum.

Toto insuper sudorum spatio expurgationi pulmonum medicus incumbat per topica attenuantia laxantiaque : foris quidem vt va-

guentum refumptiuum aut fimile, ex butyro recenti lotove, mucilagine feminis lini, extracta ex decocto ficuum, medulla cruris vituli vel veruecis, axungia gallinæ & anseris cum cera lutea & oleo liliorum vel keirino & irino: intus autem per syrup. de tussilagine, de praffio, de liquiritia, per looch sanum & expertum, de pinis nucleis, vel fimile ex tempore confectum, vt

℞. mell. albiff. butyri recentis, panis facchariana partes æquales, fiat pasta.

Eodem tempore cerebri excrementorum derivationem accelerabit, non per apophlegmatismos, ne affluentia eorum pulmones obruat: sed per errhina, caustica etiam brachio aut initio ceruicis potius admouenda, aut phœnigmos occipiti raso totique collo impingendos, de quibus omnibus antea sæpius. Postremo vbi viscera duo cerebrum & pulmo sordibus suis exonerata sentientur: tum eadem sequenti suffitu & cucuphis antea præscriptis corroborabuntur.

℞. mastichis, cortic. thuris, feminis nigellæ roman. ex acetō torrefactæ & auripigmenti rubri ana ʒ ss ladani storacis calamit. benioini, calami arom. ana ʒ ij. nucis moschatæ, macis, cinnam. & caryophyll. ana ʒ j. trochisc. galliæ moschatæ ʒ iiij. fiat puluis, ex quo cum terebinthina trochisci concinnentur ad suffitum ore & uaribus excipiendum in introitu & exitu lecti.

De acrochordonibus.

EX verrucarum genere acrochordones sunt, tumores scilicet duri & scirrhusi ab excremento

titio humore pituitoso vel melancholico in superficie corporis sensim concreto & obdurato. Latium nomen metaphoricum est ab editiori montis parte: Gallicè vocantur *des porreaux*, à filis quæ in se continent porrorum radiculis similima. Est autem verrucarum genus duplex, figura ac materia dispar & distinctum, vnum genus est pensilium basi angusta summitate lata, vt tenui quodam pediculo pendere ex cute videantur: alterum sessilium basi lata & summitate acuta, vt cuti ipsi insidere videri possint, tametsi radicibus altis nitantur. Prioris generis species sunt duæ, *ἀκροχορδῶνες* & *θύμος* vel *θύμιον*, ex quo, ficus. Est autem *ἀκροχορδῶν* pustula quædam in palmis quidem puerorum frequens, in digitis pedum rarior, cacumine suo latior, durior, asperior, cutique concolor: sed ima parte ad cutem velut tenui pediculo pendeat. Hinc *ἀκροχορδῶν* dicta est, vel à similitudine maiusculæ chordæ per summa resectæ (Arabibus verruca botoralis) excitatur à pituitoso humore, à natura in cutem deposito sensimque concocto.

Thymus autem vel thymium acrochordone minor pustula est, neque cuti concolor: sed thymi veri & Cretensis candicantibus floribus, quæ si minor est thymus simpliciter vel thymium vocatur: sin maior, ficus Latinis, *θύκωσις* Græcis, Arabibus verruca porralis dicitur. Atque hæc fere ex atrabilario sanguine est.

Prognosticum.

A Crochordones fere plures ex inopinato apparent subitoque disparent, in manibus præ-
Ecc 3

sertim & aliquando in pedibus puerorum. Thymi
 sæpius, & usque in adultorum pudendis & ano: ma-
 riscalæ alæ, vocantur.

Posterioris verrucarum generis, sessilium nem-
 pe species totidem sunt, *μυρμηκία* & clauus, qui-
 bus alæ etiam duæ tametsi improprie annume-
 rari solent, cornu & callus. Myrmecia igitur est
 verruca dura, stabilis, radice alta, vixque vnquam
 lupino maior, in palmis manuum plantisque pe-
 dum frequens, ita dicta quod per frigora aut etiam
 contrectata, mordentis formicæ sensum & dolorem
 inferat. Arabibus verruca moralis dicitur à grano-
 rum in moris similitudine. Clauus verruca quoque
 est sessilis, alba, prædura, solida, rotunda, radice al-
 ta, quasi ex ossium membranis erumpat. ita vo-
 cata à figura & duritie qualis est clauorum capi-
 tis, aliis partibus rarius: sed digitis plantisque
 pedum frequentissime infesta: idque ex calcei con-
 fusione pressuque cum dolore acuto, & inceden-
 di difficultate.

Callus autem nihil aliud est quàm summa cutis
 obdurata non sponte: sed labore sine radice & do-
 lore, vnde à clauo differt. In palmis manuum pe-
 dumque plantis frequens est. Cornua constant ea-
 dem cutis obdurata compactaque substantia, &
 frequenter in iisdem manuum pedumque partibus:
 sicque appellata sunt quòd cum sint instar cor-
 nuum oblonga, recuruentur. Cæterùm acrochor-
 donum tantum in puerilium morborum censu
 meminit Hippocr. quòd reliquarum specierum
 sint expertes, cum pituitoso humore solo affluant,
 non etiam atrabilario & melancholico, neque
 labore vllò manuum pedumque, neque venere aut
 equi-

equitatione importuna defatigentur.

Prognostica.

A Crochordon & thymium maximè quod benignum est, omniū verrucarū mitissima sunt, deinde cornua & clauī (nisi forte ambulādo molestant) postremo myrmecię: thymus præsertim malignus omniū molestissimus est, quique in cancrū sæpe degenerat. Vtraq; pēsilium species vt ante dictū est, sæpe per se sponteque sanatur, sæpius quidē quę minores sunt: sessiles vix vnquam sineremediis.

Curatio.

Communis myrmeciarum curatio, acrochordonum & thymiorum est, per excisionem: alter modus per *καταψαλτινὰ* & exsionem atque erosionem: in quorum vsu hoc singulariter obseruandum est, vt partes vicinæ astringente & refrigerante aliquo remedio, cohibendæ fluxionis causa præ dolore accersendæ, muniantur, vt vnguento ex bolo armena, terra sigillata, albumine oui, oleo rosato & paucō aceto. Illo cathæreticorum multæ species Paulo Æginetæ referuntur lib. 4. vt elaterium cum sale infricatum admotumque: vt thuris cortex cum aceto, farina & nitro: succus tithymali & fici arboris illitus: ærugo cum sulphure viuo: liquor ex sarmentis viridibus vltis destillans: fimus ouillus cum aceto: hircinum fel illitum: ruta cum pipere: capita salsorum piscium decocta in liquore sarmentitio viridium vitis sarmentorum dum vruntur: denique vnguentum ex ærugine, sulphure, & aqua illa sarmentorum, quibus omnibus addi potest aqua

fortis secunda vocata; vitrioli aut sulphuris oleum. Tertius denique modus est per causticum actuale ut ignis flammam, vel candens ferrum decenter appositum per laminam ferream in medio perforatam ut nihil sanæ partis appareat, quæ ferro violetur. At post adustionem crustamque butyro, aut aliquo alio pingui ut vnguento basiliconis resolutum vlcus & detersum aliorum ulcerum instar deinceps curabitur.

De satyriasi.

Satyriaseos vel satyriasini multiplex est apud medicos significatio, vna est, quando sumitur pro elephantia, quod consumptis temporum musculis ossa circa tempora ita emineant ut cornuta elephantorum capita, satyrorum instar videantur: vel certe quod libidine insatiabili satyrorum simili penem rigidum multoque calido & flatuoso spiritu turgentem gerant.

Altera est cum usurpatur pro inflammatione vasorum spermaticorum & penis ipsius tentigine perpetua cum dolore, lipothymia, sudore frigido, & morte repentina. Tertia significatione sumitur pro tumoribus adenosarum colli partium duplicibus quidem oblongis & rotundis, quorum hi fere iuxta guttur sparsi sunt, illi longiores sub auribus, quæ ubi euacuata sunt, Satyrorum effigies exprimitur, ideoque satyriaseos nomine significantur. Sunt autem illi tumores aliàs frigidi & strumosi, aliàs calidi & phlegmonosi: hique parotides priuata vocantur, sicuti in axillis & inguinibus phymata subito nascentia, crescentia & resolubilia vel suppurabilia. Parotides autem aliàs critica sunt, febrili materia

ria à victrice natura in glandulas circa aures transmissa, ex sympathia totius corporis, aliàs ex idio-
pathia capitis, ex vulnere, vlcere, contusione dolitantis. Illarum criticarum repercussio tētanda non est: sed si fortasse materia crassior, lentaque nimis & maligna, vt in febribus pestilentibus, aut natura debilior est, curantur primùm laxantibus & emollientib. topicis vt foras à natura facilius amandetur, vt puta cataplasinate ex polēta cocta in hydrelæo, additis mucilagimbus seminum lini, althææ, vel si calor dolorque vrgeat psyllij & cydoniorum, aliàs litu oleorum chamæm, lilior. aneth. quibus lana succida vtiliter imponatur.

Euocatâ vel expulsâ foras materia, digerentibus oleis aut cataplasmatibus descriptis capite de tonsillis digerenda est. Simile est cataplasma ex magmate decoctarum herbarum seminum & florum modice calidorum tenuiumque, vt

℥ quatuor folior. remollit. orig. calaminth. absinth. ana m. j. flor. chamæmel. meliloti, anethi ana p. j seminis lini & scœnug. ana quart. s̄ coquantur omnia: materia exprimatur, contundatur & cribretur, eique adde farinam hordei, orobi & lentium ana ʒ ij adipis anseris & gallinæ, & axungie suillæ sine sale ana quart. s̄ croci ʒ s̄ olei anethini, lilior. ana q. s̄. fiat cataplasma.

Ex iisdem oleis adipibus & cera noua vnguenta conformentur. Quod si parotis ad suppurationem vergat neque digeratur, cataplasmate peptico suppuratio iuuetur. Tale est hoc. ℥ ceparum & rad. lilior. sub cinerib. coctarum an. ʒ iiij farinæ triticeæ ʒ ij axung. gallinæ & anseris an. quart. s̄ vitellum oui vnus, croci ʒ s̄ fiat cataplasma vel loco e-

ius imponatur tetrapharmacum mouēdo puri effi-
cacissimum ex resina, pice, cera noua & adipe. Si
denique in scirrhusam abeat duritiem parotis, val-
de mollientibus tergenda est: tale est ceroneum,
de mucilagibus, de hyssopo, aut aliud recēs com-
paratum, vt,

℞. gummi ammon. & bdellij pinguis solutorū
cum vino albo ana quart. β axung. porci, gallinæ &
medullæ cruris vituli, vel veruecis & celypi ana
℥ β mucilagin. feminis lini extractæ cum decocto
ficuum & olei lilior. ana ℥ ij. ceræ nouæ parum,
fiat linimentum.

Iam si ex sympathia capitis vulnerati, vlcerati,
contusi, parotis emerferit, instar criticæ curāda om-
nino est, præmissa tamen reuulsione fluxionis præ-
sentis aut imminētis per clysteres acres, purga-
tiones & phlebotomiam, siquidem puerilis ætas
eam ferat, cuius reuulsionis in critica parotide
vltus nullus esse potest, non solum ne motus na-
turæ turbetur: sed quod vacuationes idoneæ præ-
cesserint. Hæc verò ex cerebri sympathia œde-
matodes fere est, ideoque digerentibus & siccan-
tibus topicis validioribus digerenda est, de quibus
antea. Quod si suppuratio instare videatur hoc
cataplasmate acceleretur.

℞. radic. althææ & liliorum in brodio pingui
gallinæ sine sale coctarum ana ℥ iiij. contundantur
& cribrentur, iisque adde farinæ pistrinalis ℥ ij. bu-
tyri recentis & axungia suillæ liquefactę ana quart.
β vitellos ouorum duorum, croci ℥ j. cum oleo li-
lior. fiat cataplasma. Maturatus denique aperiatur
& abstergeatur vlcus mundificatiuø vnguento de
apio aut syrupo de rosis siccis.

De calculo.

Calculi siue lapides concrefcere solent in omni fere corporis parte, capite, pulmone, corde, liene, cystide fellea, hepate, colo intestino, vtero: sed frequentissime in rene & vesica. Materia est crassa, lenta & viscida pituita, aliàs syncera, aliàs pluribus arenulis mixta, quæ à calore exassatur co-giturque in lapideam duritiem. Calor autem hic in iuuenibus acrimonia, in pueris & senibus mora & cunctatione magis materiam exsiccat. Causa si-ne qua non, est loci materiam continentis angu-stia. In pueris autem ob edacitatem motionumq; importunitatem, in senibus ob caloris & coctionis infirmitatem, in iuuenibus etiam ob intemperantiã prauamq; diatã multa succrescit cruditas & pituita: sed pueris magis in vesica, senib. & iuuenibus in re-nibus, quòd cum succus ille crassus pituitosus cum sanguine ad renes per emulgentes venas delatus sit, hinc quidẽ robusta puerorum facultate in vesicam facile depopitur, (vbi diutina mora à calore etiam moderato excoquitur) per molles laxasque & lu-bricas vreterũ vias, quæ in senibus & iuuenib. sunt astrictæ, magisque siccæ & asperæ. Quæsitum est de generationis loco, aliis in solis renib. calculorũ om-niũ rudimentũ, etiã eorum qui in vesica cõtinentur, statuẽtibus: aliis in vesica, ob capacitatem eius: aliis in vtroque loco. Sæpius tamen in renibus quam vesica coagmentari mihi videtur, ex quo arena cras-sior in vesicam delapsa accedente mucosa pituita membranatim agglutinata in iustam lapidis mo-lem coeat. Sunt autem vesicæ calculi fere duriores, albidiores, asperiores, maiores: renum verò ma-gis friabiles, arenosi, minores, & vt plurimum

rubefcentes, aut flauescentes, aut mixti.

Signa loci demonstratiua.

Signa calculi in rene certissima sunt, dolor gra-
uis & acutus, aliquando ad nothas costas & ad
testiculum reni respondentem exporrectus, cum
stupore cruris directi, ob consensum neruorum &
venæ emulgētis: vomitus primum pituitosus: mox-
que inualeſcente dolore, per communes tunicas à
peritonæo ductas ad ventriculum, prouecto, bilio-
ſus & æruginoſus: deinde lapide in veſicam & vre-
terem descendente dolor acerbissimus, nephriticus
dictus: postremo arenæ rufæ, flauæ, aut rubræ, tan-
quam detorti calculi portiunculae cum vrina emit-
tuntur: dolorem tamen fere præcedit vrina rubra,
liuida, nigricans, sanguinea, auulſo à parenchymate
calculo, & venulis attritu lapidis auulſis. Vrina are-
noſa non poteſt fidum eſſe ſignum. Calculi eius, qui
infixus eſt ſubſtantiaë renis, aut in capacitae veſicæ
vagatur, vel eiufdem tunicæ obhæreſcit ob indifſo-
lubilem eiufdem duritiem. Quare axioma hoc fal-
ſum eſt. (Arena eſt in vrina, ergo calculus in rene:
vel, Non eſt arena, ergo nec calculus.) quia are-
na tenuiſſima ſanguinis in hepate & venis vt per
febres, vſtionem, non renis calculoſi vitium ſigni-
ficat. Calculi veſicæ ſigna ſunt difficultas meiendi,
id eſt dyſuria, vel ſtranguria, & aliquando iſchuria,
dolor circa pubem, miſtio conſeſtim inter mei-
endum intercepta, calculo meatui obiecto: catheter
inmiſſus per vrethram, & in omnes veſicæ partes
circunductus repulſo lapide miſtionem prouocat:
digitus in anum ſubmiſſus calculo ſit obuius: fre-
quens adeſt pruritus glandis, & mentulae erectio.

vrina

vrina tenuis est & alba.

Præseruatio à calculo, & curatio.

PRæcaueri calculi generatio in pueris suspectis potest diætâ tenuante, calida siccaque, euchyma & frugali, vitata satietate ciborû crassorum & glutinosorum, & vehementi exercitatione post paltus, somno prolixiore, tarditate in deiciendis fæcibus, ne mucosa pituita in vesica, calore ipsius percoquatur. Quinetiam suspectis, balani & clysteres acres & lenientes, atque purgationes anniuersariæ plurimum conducât, sicuti & adultis. Quod si præsentis in rene calculi certa ex doloris specie, situq; aliorumque signorum fide coniectura sit, mox laboranti puero ita succurrendum est, vt exonerata priùs aluo, & ventriculo, lapis comminutus quamprimùm excludatur medicamentis lenientibus & laxantibus vias vrinarias, vreteres & vrethram: tum tergentibus & attenuantibus duriorẽ lapidis substantiam tam sumendis intus, quàm foris admouendis: sic enim morbi ipsius, obstructionis scilicet renum, vretcrum vesicę, & meatus vrinarij causa, crassities nempe lentorque lapidis oppugnabitur, & symptoma, id est dolor prodituri calculi incurfione accensus sensim restinguetur. Cæterùm calculus omnis medicamentis tenuis substantię ad exclusionem ob viarum angustiam indiget: sed qui solidior est & inueteratus, vt in vesica & renibus aliquando modice calidis: qui leuiter concoctus adhuc est ex arenularum cohesione in renibus calidioribus. vincit enim partis indicationem aliquando affectus ipse, ideoque vesica distantior, leuiora aliquando: ren propinquior efficaciora sustinet, pro calculi sci-

licet substantiæ discrimine.

Exemplarum mediorum.

℞. rad. althææ, lilior. eryngij, raphani & bardanæ
an. ℥ ij ꝑ folior. maluę, bismal. violar. pariet. bran-
cæ vřlinæ, vřticæ cum radic. creffon. berulæ, saxifra-
gię, cynoglossi, pimpinellę ana m. iij. semin. cumini,
lini ana ℥ β bacchar. lauri & iuniperi contusarū ana
quart. j. florum sambuci, maluæ, genistæ, tamarisci,
chamæmeli, melil. ana p. ij. decoquātur in aqua dul-
ci, cape de colatura ℥ j in qua dissolue butyri recē-
tis, olei liliorū vel chamæmelini ana ꝑ iij benedi-
ct. laxatiuæ ꝑ j hieræ picr. ꝑ β mellis anthos. ꝑ ij vitel-
lum oui vnius, fiat clyster.

In reliqua decoctionis parte balneabitur quoti-
die, mane & vesp̄ri, post liberatas primæ regionis
à vitis omnium humorum vias, exhibito exempli
gratia hoc pharmaco:

℞ medul. cassiæ recens extractæ ad vaporem fo-
liorum maluę vel cum oleo amygdalarum dulcium
ꝑ x. vel xij. fiat bolus cum puluere ducis, detur ho-
ris duabus ante pastum. vel si cruditatis in ventri-
culo suspicio sit,

℞ terebinth. perspicuæ ꝑ iij bened. laxa. ꝑ ij con-
corporētur cū puluere ducis, fiatq; bolus, detur ho-
ris 4. ante prādiū. liberata hac ratione prima regio-
ne, tunc ex decocto p̄scripto, fetus instituatur re-
num & vřterum & perinæ, iisque partibus à fotu
cataplasma ex magmate decocti contuso concinna-
tum, adipibus recentibus additis gallin. cunicu-
li, anseris, butyro recenti, polline seminis lini &
puluere seminum lithospermi, cumini & seseleos,
& quamprimum applicandum, moxque fiat illi-

tus

tus earundem partium ex oleis scorpionum, lilior. amygdalarum amararum, terebinthino, laurino, quibus si adipēs prædicti cum medulla vituli, cerui aut veruecis cum momēto feminis cumini, ameos, dauci, paliuri & cera noua iungantur, vnguentum euaserit efficacissimum. Tale est oleum amygdalarum dulcium, keirinum, de lino & commune, in quo radic. althææ & semen lini ferbuerint. Denique frequenter balneum subibit tepidum & sine sudore. Ita enim externus dolor sedabitur, viæ laxabuntur, & calculi substantia nonnihil deteretur. Porro præter externa remedia prædicta & balneū præscriptum, excludendo frangendoque calculo accommodata remedia interna medicus adhibebit. Ex his autem quædam proprietate occulta calculū dispellere credūtur, cuiusmodi sunt os humani crani, cornu cerui, ossicula persicorum, mespylorum, cinis scorpionum, cinis leporis integri in olla combusti, postea aceto submersus & extinctus, cinis cicadarum, scarabeorum, cinis vitri combusti, testarum oui detracta interiori tunica, puluis lapidis Iudaici, spongiæ, corall. rubr. electri, sanguis hircinus & anserinus mixti & lento igne cocti: horum tamen multorum effectus ad asperitatem substantiæ eorundem referri possunt. Alia manifesta qualitate calculum deterunt & profligant, vt dum tenuitate substantiæ suæ & caliditate, aliàs miti, aliàs insigni calculum eradunt & obliterant, aliàs verè diuretica. Illorum prior vsus est, horum posterior: sunt tamen occulta illa priora vtrique speciei permiscenda.

Inter leuiora est ex gr. hic iulepus.

℥ aquar. graminis, acetosæ & agrim. ana ꝑ iiii.

syropi capillor. vener. oxymel. simpl. & de duabus rad. an. \mathfrak{z} ij pulue. lapid. spōgiæ, lapidis Iudaici, cieadarum ana \mathfrak{z} j fiat iulepus pro dosibus tribus matutinis: valior reddetur affuso oxymel. scyllitico syru. de quinque radicibus & syrupo di. cathartico, puluere quoque additoleporis & cātharidar. vstarum atque cranij humani.

Pueris tamen aptius fuerit iusculum in plures dies galli decrepiti flagris verberati, iugulati, coctique cum radic. eringij, olusatry, apij, petrosf. sceniculi, herbis capillarib. vt ceterac trichomanes, capill. ven. summitat. sceniculi & lupuli petrosf. sceniculi marini & hylf. ana ad m. j expressis omnibus detur t̄b β in die, addito pauco saccharo & cinnamomo. Talis sit potio aquæ stillatitiæ ononidis cum pauco saccharo & cinnamomo.

℥ ossa nucleorum persicorum numero quinquaginta, ossa nucleorum ceraforum numero centum, flor. samb. m. j. vini generosi t̄b iij. includantur omnia fictili recenti, & sepeliantur fimo equino per dies decem: postremo destillentur ex alambico vitreo, capiat huius aquæ \mathfrak{z} iij vel

℥ mell. rosati & terebinth. ana t̄b β. iuiubar. sebelten, nucleorum pini ana \mathfrak{z} ij granorum alkekengi, cucurbit. apij, lithospermiana \mathfrak{z} j destillentur omnia ex alambico vitreo in destillationis \mathfrak{z} iij dissolue cinerum prædictorum vel lapidum \mathfrak{z} j detur bis in die.

Potio quoque olei terebinth. cum aquis malu. althææ, borrag. & flor. sambuci destillatis ad \mathfrak{z} ij efficacissima fuerit, sicuti potio olei communis cum vino hippocratico, aut vini infusionis rotularum vnus raphani, vel olei chalcanthi \mathfrak{z} j cum vino albo aut

bo aut alicuius gummi vt ceraſorum, amygdal. amarar. & perſicorum cum vino cretico, vel ſucco raphani cum vino.

℥ lapid. ſpong. & Iudaici & cineris cicadarum ana ʒ ſiſce cum aqua ſœniculi aut ononidis.

℥ puluer. rad. ononidis in autumnno collectæ ʒ ſiſ radic. liquirit. & cinnamomi ana ʒ j ſacchar. candi ꝑ iiij miſce detur ʒ j cum vino albo diluta aqua ſtil-
latitia radic. eiufdem.

Alius puluis.

℥ rad. galangæ, cubearum & caryophyll. ſemi-
nis milij ſolis dauci petroſ. lapid. ſpongiz & lapidis
humani, liquiritiz, ſacchar. candi, ciner. vitri & ci-
cadarum ana ʒ ij fiat puluis ſumendus in balneo
pondere ʒ ij cum iuſculo diuretico vel vino al-
bo.

Alius.

℥ ſeminis dauci, milij ſolis & ſaxifragiz ana ʒ ij
lapidis Iudaici, cineris ſcorpionum & pil. leporis
ana ʒ j liquir. ʒ iiij cinnamomi ꝑ iiij fiat puluis,
detur ʒ j cum decocto folior. ſaxitrag. ſeminis milij
ſolis & vino albo.

Vtriuſque generis remediorum tam internorum
quam externorum vſus ſimul tantisper permixcen-
dus & continuandus eſt, dum lapis in veſicam ex-
cuſſus, indeque foras excluſus fuerit, appoſitis per
interualla poſt ſotum aut balneum ſubtus renem
& doloris ſitum cucurbitulis ſecundum productio-
nem vreteris. Quod ſi lapidis in veſica exturbandi
ob molem & duritiem eius nulla ſpes affuſerit, pe-
ritis lithotomis calculoſus puer committatur. Et ſi
quando interim vrinæ exitus in fiſtulam vrinariam
intruſo lapide præcluſus ſit, tunc modis in iſchia

exponendis vrina euocabitur.

De lumbricis.

Vermis est animal viuum in ventre genitum. Animalis naturam detegit motus, sensusque duplex, gustus & tactus: os enim habent obscurum hirudinis instar, & amara refugiunt sicuti & asperiores tactum: partus nullus, nullum sexus discrimen, nullaque partium genitalium informatio est.

Causę procreatrices vermium tres tantum sunt: (neque enim finalis vlla cū sint præter naturam) formalis, anima sentiens est: materialis, pituita excrementitia: (nam putredine in gluten resoluuntur & secti rursus vniuntur) non stercus sincerum, cū sit ficius, neque quodlibet excrementum vt bilis & melancholia: illa quidem quia sicca & amara, hæc quia sicca acida: non rursus sanguis putrescens in venis ob angustiam loci, aut alibi ob prauitatem putredinis deleteriam. Varietas autem colorum, vel ex alimentis cibisque corruptis, vel humoribus quibus aluntur & perfunduntur prouenit. Mediata materia est victus intemperantia etiam in pluribus cibis euchymis, aut imprudentia in frigidis humidis, vt fructibus horęis, vel frigidis & siccis terrenis & flatuosis, vt leguminibus, caseo, lacticiniis, radicibus vt rapi, napi, tuberum, & castaneis. Effectrix causa & immediata natiuus calor est partium continentium materiam: putredo enim causa est per accidens, quæ priorem materię formam delet eamque præparat ad nouam à calore natiuo excitandam. Effectrix mediata est tum interna, vt natura, ætas, sexus: tum externa, vt regio, anni tempus, victus, & causa sine qua non, id est locus. Natura enim pituitosa,

pituitosa vermibus aptissima est cumulandis, deinde sanguinea: sed biliosa & melancholica alienissima est: omnis tamen errore vitæ fieri apta potest. *Ætas* quoque puerilis à biennio ad decimum quartum annum, & senilis aptissima iisdem gignendis est: vtraque ob pituitæ excrementitiæ copiam quam congerit: illa quidem ob voracitatem, hæc ob caloris languorem. *Ætates intermediae*, iuuenilis nempe & consistens magis alienæ sunt, tantumque ob ingluuiem aptæ redduntur. *Lactantium ætas* cum solo lacte vtuntur vermibus caret: sed pabulo duriori intermixto ab iisdem torquentur. *Muliebris sexus* magis est obnoxius. *Regio* quælibet humidior, tum frigida tum calida vermium feracior est, quàm contraria. Item tempus autumnale, & vernum ob pituitæ copiam collectæ ex aeris frigore, vel ex fructuum fugacium ingluvie: Pestilēs quoq; cōstitutio vermib. pullulare solet, quia putredinosa ex collecta antea pituita.

Intestina sunt locus aptissimus gignendis & continendis vermibus, tum ob capacitatem & inanitatem: tum ob pituitæ excrementitiæ copiam, quæ chylostos est excrementum crassum, sicuti vrina tenue. *Ventriculus* ineptior est, non quidem ex robore caloris natui putredinem prohibentis, cum sæpe inde olidus fiat halitus: sed ob ciborum & condimentorum variorum salforum, acidorum, acriūve vsum putredini repugnantium, & ob partium ventriculi laterumque inter se distantiam, nisi in eum ex intestinis subeant. In reliquis partiū cavitatibus & angustiis vermium quoque proventus est: sed angustior. Vermium differentia ex figura sunt quadruplices, partiū continentium figuræ respō-

dentes. Prima minimorum est, qui à punctu molestissimo ascarides vocantur, in rimis sphincteris musculi rectum intestinum claudentis frequentes sunt, præsertim iumentorum. Secunda est cucurbitinorum in cellulis coli. Tertia longorum & teretum in gracilibus intestinis. Quarta est latiorum toti intestinorum gracilium crassorumque ductui æqualium, qui ob amplitudinis & longitudinis similitudinem vocati sunt fasciæ & ταινίαι, id est vittæ, quorum eadem origo est, quæ reliquorum ex pituita lenta, crassa, putri: non ex superficiali intestinorum tunica putrefacta.

Aliæ vermium differentię sumuntur à colore diverso, albo, rubro, flauo, nigroque: aliæ à magnitudine, numero, exitu, eiusque modo & tempore.

Signa vermium.

Vermium signa demonstratiua, quædam sunt communia omnibus eorum differentiis: alia singulis propria. Ex communibus recensentur omnes causæ mediatae internæ externæque: alia sumuntur ex omni genere symptomatum, ut actionum læsione, excrementorum alui, & qualitatum corporis mutatione, ut in intestinis per idiopathiam laborantibus solutione, vnitæ, ex vermium morfu punctuque, obstructione, aliquando & cruditate. Hæc præcipue fatigare solent lienteria, retentrice facultate debilitata: ilcos, obstructo prorsus intestino: tumor ventris, ex flatu, in tunicis intestinorum coercito: sicuti ex eodem per cavitatem vagante rugitus: tormina ex morfu punctuque vermium: excretio viuorum aut mortuorum.

Sunt etiam sublimiorum partium plurima per
sympa-

sympathiā inſlicta ſymptomata, vel ſubeuntibus ſurſum vermibus iſſis, vel acerbis & putridis comotis vaporibus ex pituita putri in inteſtinis reſidua. Inde ventriculi nauſea, vomitio, lipothymia, ſyncope cardiaca, aliquando etiam mors, commorſo acriter ſtomacho: ſaſtidium, βουλιμία inſaturabilis, deuoratis à vermibus cibis & chylo, oppreſſio œſophagi, & ſtrangulatus periculum, preſſa ab eorum aſcenſu ſubtus aſpera arteria: eruptio vermium ex ore vel naribus: tuſſicula, labri inferioris tremor, & pruritus narium, ob tunicæ quæ œſophagum & ventriculum intus veſtit cum oris partibus continuitatem, dum à vermibus lancinatur: cerebri epilepſia, conuulſio muſculorum temporalium, vnde maſticatio inuoluntaria, ſtridorque dentium, paralyſis artuum, deliratio, pauor, vociferatio, peruigilium & ſopor:

Prognostica.

Prognostica ſigna ſunt quòd aſcarides & cucurbitini vitæ periculo vacant, magisque ſunt curabiles: teretes ſæpe peſtiferi ſunt: albi rubrique minus quam nigri & lutei: parui minus quam grandiores: pauci minus quam multi funeſti ſunt. Exitus viuorum & mortuorum per ſanitatē tutus eſt, optabilior tamen eſt viuorum, quia pituitæ & alimenti inopiam ſignificat. In febribus tamen peſtilentibus, & tribus temporibus principio augmento & ſtatu, excretio mortuorum viuorumque ſignum lethale eſt prauitatis & malignitatis: ſed in declinatione ſignum ſalutare eſt. In aliarum febrium ſalutarium quocunque tempore

exitus naturæ robur indicat. Denique vermis mor-
bifica est causa continens alicuius intestinorū mor-
bi, vtpotè obstructionis, solutę vnitatis, & intem-
periei: morbus tamen non est cum sit substantia:
ab eo mente tantum separatur, cum sit causæ con-
tinentis morbiq; eadem essentia.

Præseruatio.

PRæseruationis vermium quæ in naturis, ætati-
bus & temporibus suspectis vsurpanda est, duo
instrumenta sunt, diætæ & pharmacia. Illius ad de-
clinandam cruditatem scopi duo sunt, qui quanti-
tatem & qualitatem victus idoneâ spectant, vt fu-
giatur omnis intemperantia & ingluuies, vitetur
motus corporis & animi vehemens per duas horas
post paltus, crassique visceri & terreni nimis cibi
fugiatur, somnus quoq; & alui tarditas declinetur.

Pharmacia aliàs alterans sit, eaque duplex, cali-
da & amara acrisue in hyeme: frigida in æstate, ea-
que in lunæ silentio per triduum vel quatrimum
cōtinuò & mane adhibita. Exempli gratia ℞. syr.
de absinth. ʒ j. aqu. menth. vel hyssop. ʒ ij. coralli-
næ vel cornu ceruini ʒ β fiat potio hyemalis. vel
syr. eiusdē synceri ʒ j. exhibeatur. At verò tēpore
æstiuo, præscribatur in hunc modum.

℞. aquæ portul. ʒ j. vel ij. succi mali limonij ʒ β
olei rosati ʒ ij. cornu ceruini ʒ j. agitentur &
dentur mane.

Pharmaciaz purgantis materia sunt medicamenta
phlegmagoga aut eccoprotica tantum, ita indicā-
te vernium sede vicina: Talia sunt aloe & quæ in-
de prostant pilulæ & confectio rhabarb. agaricus,
senna vel puluere vel diluto cōueniēti: At vehemē-
tissima

tissima illa scammoniū, colocynthis, succus ireos pueris infestissima sunt, tantumque adultis & robustioribus naturis idonea.

Cogendi sunt pueri vt assumant neque reuomant medicamenta, diductis dentibus, & immisso cornu argēto, per cuius cavitatē liquor infundatur: & deficiente cornu, cum melle aut saccharo aut lacte mixtus puluis idoneus iisdem exhibeatur, vel denique ventritantum imponantur vnguenta, olea, cataplasmata, subiectis interim clysteribus dulcioribus.

Curatio.

Vermes, res scilicet cōtra naturam & causa cōtinens prædictorum morborum sui ablationem indicant: sed post præparationem tantum, per medicamenta alterantia vel calida vt amara, acria, falsa: aut frigida, vt acerba, acida, austera: vtrumque enim genus vermes hebetat, vt medicamento purganti facilius cedant, aut ad sedem promptius impellantur: vel quòd illa quorum meminimus, esculenta non sunt, ideoque fame vermes perimant: vel quia recessu suo immodico à temperie & calore viuentium animalium lethifera sunt: & præterea pituitam excrementitiā crassā lentamque ex qua vermes geniti sunt & aluntur, attenuant, abstergent, & exsiccant, vt aut consumatur aut facilius simul cum vermibus necatis expellatur, qui alioquin viui & grandiores medicamento purgātis tēdio irritati intestina ipsa crudelius seriant, aut obnitentes appetant partes sublimiores.

Est autem præparantium istorum genus duplex: vnum simplicium, alterum compositorum.

Simplicia calida acria & amara fere hæc præcipua sunt, radix aristoloch. rotundæ, enulæ camp. gentianæ, raphani, zedoariæ, cortex mori, lignum guaiacinum, absinthium, tanacetum, abrotanum, mentastrum, calamintha, orig. hyssop. ruta, agrimon. chelidonium maius, scordium, marubium album, polium montanum, scabiosa, persicaria utraque, folia persicæ arboris, lupini, melanthij, semen cumini, colocynth. fel taurinum, myrrha, & miraculi instar muscus marinus corallina dicta, seminis etiam nigellæ; apij, nasturtij, erucæ, cardam. securidacæ, absinthij, seriphij, piper. Calida composita sunt interna quidem mithridatium vetus, theriaca, syr. de absynthio, de mentha, de prassio, opiata Salomonis, confectio de hyacintho, emplastrum contra vermes. Frigida simplicia sunt radix graminis, acetosæ, cichorij, lapathi acuti, earumque aquæ stillatitiæ, folia portul. semen plantag. end. cichorij, lactucæ sylvestris earumque succi & aquæ stillatitiæ, acetum, omphacium, acetosa, mali citrij, limonij, & aurancij succus: omnia denique acida. Frigida composita sunt, syr. de cichorio, de agresta, de limonibus, de acetositatē citri, de granatis acidis, acetosus simplex, oxysaccharum simplex, oxymel simplex & compositum, scylla, syrapi de cichor. & de fumaria. Sunt præterea alia duo genera, vnum lenientium lubricantium vias, vermesque suffocantium, vt oleum rosat. omphacinum, decoctum sebesten: alterum quod proprietate totoque temperamento & antipathia deleteria vermes enecat. Eiusmodi est cornu cerui, rhinocerotis, astraga-

astragalus bouis, lūbrici terreni & humani vsti, coralliū, medulla cerui perinæo, lūbis & vētri iniūcta.

Ex simplicibus omnium generum formulæ con-
cinnantur remediorum, tum internorum, vt apoze-
matum, puluerum, electatiorum dulcium & du-
rorum, & aquarum: tū externorum vt linimentorū,
vnguentorū, cataplasmatum & emplastrorū. Porro
calida efficaciora sunt vbi febris abest, qua vrgen-
te frigida tutiora. Quod si iuncta sit lientēria, pauca
astringentia miscebuntur, quale decoctum est plan-
taginis & portulacæ in brodio, puluis lumbricorū
cum melle, vel aqua portulacæ: foris vero bolus ar-
mena, cortex mali granati, balaustia, magmatis rhei
puluis & similia.

Quantitas remediorum indicatur, tum à grandi-
tate vermium, tum ab eorum situ. Lato igitur ver-
mi ob granditatem & repugnantiam vehementia:
Ascaridibus vehementissima interna externaque ob
distantiam: tum quod eorū ascensus & excandescē-
tia non metuatur. Teretibus mediocria omnia cō-
ueniunt: neque sine dulcium permistione, plurium
quidem in assumendis, pauciorum in submitten-
dis. Utendi tempus erit dum vermes enecari & he-
betari possunt, idque bis quotidie, ieiuno ventricu-
lo, mane & vesperi, circiter prādiū. Forma interno-
rū liquida fere erit, vt iuleporum, puluerum & opia-
tarū dissolutarū in conuenienti liquore. Externa e-
runt fodus, embrochatio & suppositorium: prius e-
nim necandi quam expellendi.

Regio denique assumendorum & immittendo-
rum eadem est in omnibus os & podex. In lato qui-
dem verme par est commoditas vtriusque partis. In
ascaridibus potius per podicem. In teretibus per os

vsurpantur. In omni denique specie ventri & podici commodè applicantur: ventri quidem ad vmbilicum, tum vnguenti, tum cataplasmati & emplastri specie, si teretes sint molesti, aut etiam tæniæ, qui cum firmitus adhæreoant vehementiora desiderât intus forisque. Ascarides requirunt suppositoria ex veteri lardo in podicē immisso cū filo pendēte & sæpe repetēdo: hoc enim vermes vehemētī delectat, idcōq; sequūtur. Sic gossipij lanugo melle lacteq; imbuta & immissa ascarides secū deducit.

Purgantium materia & vsus ante exposita sunt in præseruatione, vbi prætermissi sūt scopi tres vel potius indicationes, vt pote pueris & senibus minus vehemētia, tantumque ascaridibus & lato vermi necessaria esse, vt scammonium & colocynthidem, singula ad gr. iij. vel vj. Nā teretes viui mortuiq; tutius eccoproticis & lenioribus medicamentis cum phlegmate excludūtur, quibus dulcia quædam semper permiscenda sunt: nunquam in ascaridibus, neque in tænia, quibus amarissima & acerrima tantum aptanda sunt. Clysteres quoque vtrisque acerrimi conueniunt, vt ex sola muria aut amurca vel ex decocto prassij, absinthij, centaurij in lixiuio: sed dulces in teretibus euocandis præstant, interim dū necantur, viuiq; tamen adhuc sunt, vt alliciantur deorsum. Post exclusos vermes roborādis intestinis incumbendum est, per medicamenta frigida & astringentia, tum ore tum ano recepta ad tollendam intemperiem calidam à dolore, & ad laxitatem & solutionem constringendam. Exhibebuntur autem iuleporum & syrupor. specie.

Haftenus vermiū curatiua methodus & curationis materia exposita sit, ex qua remediorū interiorum

rum & externorū formulæ concinnati à medico perito possint, quas de industria omisimus breuioris compendij causa.

De stranguria.

Mictionis sicuti alterius cuiuslibet functionis tria sunt symptomata, ischuria abolitio, dysuria diminutio, stranguria deprauatio. Per ischuriam vrina omnino supprimitur: per dysuriam minuitur, & cum difficultate quadam magnoq; conatu, aliquando etiā dolore, vrina redditur: per stranguriam guttatim & maturius quam pro consuetudine parumq; & frequenter, atque cum dolore redditur. Hinc stranguria stillicidium vrinæ Latine vertitur. Porro ischuriæ causa, affectus est vel vesicæ ipsius, vel ceruicis eiusdem: Vesicæ quidem aut repletio immodica vrinæ per meiendi obliuionem collectæ, aut intemperies, eaque vel frigida, vt à natatione in gelida, destillatione à cerebro in spinam, & os sacrum, vnde paralyssis hebesque sensus ipsius vesicæ, vt non sentiat quantitatis molestiam: vel calida siccaque, vt per febres ardentes, vnde retentrix roboratur expultrice debilitata. Fit etiā paralyssis vesicæ ab ictu, casu, contusione lumborum aut luxatione vertebræ. Ceruicis vesicæ affectus, est obstructio eius à lapide grandiori vel minori, à pituita multa & mucosa, ab arenis multis. Vrethræ, hoc est meatus vrinarij, morbi sunt restrictio & obstructio: Hæc quidem fit à tuberculo vel caruncula genita post vlcus relictum per gonorrhœam virulentam, vel per difficilem scabri gradisque lapidis descensum, vel ab arena & lapillo intus hærente. Illa nascitur à tumore ingenti vicinarū partiū, vt phlegmone, scirrho, vteri, recti intestin,

parastatarum aqua oppletarum (vt in meo socero Iacobo Dauide iurisperitorum sapientissimo & æquissimo videre mihi contigit, victis nostris præfidiis.) Dysuria ab iisdem omnino causis, sed leuioribus nascitur, nisi quod cum dolore est, vlceratione & inflammatione. Stranguria aliàs à debilitate retétricis facultatis & laxitate sphincteris, tum secundum naturam, vt in senibus, puerulis & sceminis grandioribus, tum præter naturam ex robore & irritatione expultricis facultatis, idq; vel ex acrimonia vrinæ ob mixtā bilem flauam, pituitam salsam, & pus acre, vel ex lapide ceruicem vesicæ vellicante, vel ex vlceratione ceruicis vesicæ & vicinarum partium, vt vteri phlegmone.

Prognosticum.

ISchuria & dysuria ab obstructione pueris sæpe infensa est ob voracitatē & importunas exercitationes: ab intemperie & paralyfi rarior, sicuti à repletione. Stranguria pueris ex facultatis expultricis irritatione ab humore acri aut à lapide rarior est: ab intemperie humida frequentior. Quæ ab ætate senili est, incurabilis est: quæ à iuuenili, à natura sanatur, sicuti & quæ à grauiditate est. Quæ ab humidiori intemperie est interiectarum ætatum, curatione eget: primùm quidem per victum calidum siccumque & parum astringentem atque frugalem, qui scilicet vrinæ copiam somnique profunditatem & longinquitatem minuat. Sit ergo panis asisæ conditus, carnes recentes tostæ, caryophyll. vel cinnamomo confixæ: esitentur cū condimentis calidis & aromatis. Vinū rubrum, crassum, bibatur (bibacitate vitata) pomaciū, pyracium, aqua sola, vina alba,

alba, aquosa, tenuia, aut minus lymphata fugiantur, sicuti & omnes fructus horæi, vernique, vel diuretici, vt peponum, melonum, cucurbitæ, citruli, carnes eorumque semina, radices apij, petrosi fœniculi, tātumque autumnales vsurpentur, vt corna, mespila, castanæ, auellanz & amygdalæ tostæ, mala coto-neæ, cortex mali citrij & arancij saccharati: pulueres digestiui vltima mēsa. Denique coercenda est somaolentia vigiliis & aliquando verberibus, deinde intemperiei humidioris medicamentosa curatio inchoanda est, à causæ antecedentis, id est ab humoris pituitosi vacuatione, per deiectoria medicamenta & hidrotica (vomitoria enim raro hanc ætatem decēt: phlebotomia certe in hac specie nunquam.) Porro deiectoria sunt phlegmagoga pluribus ante exemplis exposita. hidrotica consistēt decocto radicis chynæ, salsæ parillæ, & ligni sassafra, saccharo & cinnamomo cōdito ad voluptatē vten-tis. Quod si hidrotica respuat, eorum loco electaria & pulueres siccantes & sine sensu digerentes am-plectatur. Talia sunt theriaca, mithridat. ad 3 j. quo-tidie mane cum vino rubro epota: Talis est condi-tura sequens.

℞ conseru. flor. saluiæ & stœchad. & cymarum absinthij pontici ana ʒ j β conditura cortic. citri & zinzib. viridis ana ʒ β myrobalanor. & nucum iu-glandium conditarum & carnis cydonior. sacchara-tæ ana 3 ij cinnamomi, caryophyll. fimi columbini & mac. ana 3 j cum syrupo conseru. cortic. citri, fiat opiata, capiat 3 iij cum vino diluto aqua saluiæ, vel melissæ.

℞ radic. cyperi, galangæ, bistortæ, tormentillæ, an. 3 ij cerebri & renū leporis vstorum, membranæ

interiores castanearum & glandium assatarum ana
 ʒj β seminis apij & rad. pyrethri ana ʒj testarum
 amygd. dule. & auellana. nucis moschatae & macis
 ana ʒ β fiat puluis, excipiatur melle, fiatq; opiata, de
 qua capiat ʒ ij singulis diebus horis tribus ante pa-
 ctus cum vino rubro. Ex eodem puluere excepto
 saccharo ros. fiant tabell. ponderis ʒ iij quibus uta-
 tur vt supra. Confert etiam aqua stillatitia sorbo-
 rum, vel consolidæ mediæ, vel malorum granato-
 rum recentium & integrorum contusorum expres-
 sus succus quotidie mane ad ʒ iij. Interea internis
 remediis humidior ceruicis vesicę intemperies op-
 pugnatur. Eadem topicis roborantibus calid. siccif-
 que & astringentibus profliganda est.

℞ radic. bistortæ & cortic. ligni guaiacini ana
 quart. j. foliorum absinth. abrotani, saluiz, tanacetii,
 consolidæ maioris, summitat. oleastri, lentisci, ru-
 bi & sumach ana m. j. nucum cupressi, balaustior.
 gallar. & calycum gladium ana ʒ j flor. stœchad. v-
 triusque, salu. ana p. j. aluminis quartar. j. coquantur
 in lixiuio cineris sarmentorum vitis, addendo post
 coctionem vini rubri tortini partem quartam. hoc
 decocto spōgiis excepto foueatur regio perinæ &
 pubis quotidie bis aut ter per horam integram.

℞ olei omphacini, laurini & nardini an. ʒ. ij. olei
 de spica ʒ j mastichis, charabes & corticis thuris
 ana ʒ ij boli armenę, sanguinis draconis, lap. dis he-
 matitis, castorei ana ʒ j finii columb. ʒ iij zinzib.
 cinnamom. & caryophyll. ana ʒ β cum cera alba fiat
 vnguentum applicadum cum pauca aqua stillatitia
 vini post fotum eidem regioni.

℞ rad. cyperi & galangæ ana ʒ j foliorum absin-
 thij, saluiz, mentastri, verbenæ, caudæ equinæ ana
 m. j.

m.j. nucum & corticum cupressi, balaustiorum & seminis anisi ana ʒ ʒ decoquatur in aqua fabrorum & incolat. ʒ j dissolue mastichis & thuris torrefacti myrtillor. ana ʒ ij vini rubri & austeri ʒ ʒ. fiat clyster, retineatur diutissime, semel in die.

Postquam per decem vel quindecim dies ista topica celebrarit, tum iisdem omissis emplastrum sequens eidem regioni applicetur.

ʒ ol. omphac. & myrtini ana quart. j. mastichis, corticis thuris, acacia & hypocystid. boli armenae & radic. bistortae ana ʒ ij radic. cyperi, galangae, zinzib. & caryophyll. ana ʒ ʒ picis naualis ʒ ʒ moschi optimi ʒ ʒ fiat emplastrum: extendatur super alutam adinouendum eidem regioni, & continenter gestandum. Reliquae causae stranguriae, ut acrimonia urinae, vlcus vesicae & cervicis eiusdem, phlegmone alicuius vicinarum vesicae partium ut vteri, recti intestini, quod à pueritia sint alienissimae, idcirco in hoc compendio iure omittuntur, ut deinceps de ischuria & dysuria breuiter transigatur, quarum omissis pariter & neglectis reliquis causis, in vnam obstructionis, repletionis, intemperiei & paralyseos sphincteris vesicae curatione incumbemus.

Curatio ischuria & dysuria.

Repletio immodica vesicae, quae ab obliuione meiendi est, neque ab humoris vitio nata, primū emollitione & relaxatione sphincteris nimium contracti eget, idque per clysterem, fotum, inesseam, litū, vnguentum & cataplasma, à quibus omnibus sphincter laxat ad profundēdā urinā dehiscat. Ergo clysteris materia vel solo oleo simplici cōstet (eductis primū balano acriori facib. ex diutina mora durio-

ribus) vel decocto communi & butyri recentis, axungia alicuius insulsæ & olei lilacei dissolutione ana ad quart.ß. cum ꝑ ij medull. cassiæ. Ex eodem clysteris decocto, totus pubis, perinei, & inguinum, femicupium & infessus comparentur. Litus fiet ex oleo lilaceo, amygdulcium, catellor. cum momento ceræ nouæ & luteæ, quibus si iungatur butyrum, adipēs gallinæ, anseris & anatis, cuniculi, cum mucilag. seminis lini & althææ extractis ex decocto ficuum & cera noua, vnguentum concinnabitur. Sicuti ex tusa cribrataque decoctionis prædictæ materia, & admixtis prædictis axungis, butyro, cassiæ medulla, mucilag.ibus & oleis cataplasma accommodatissimum fiet. Laxato & emollito sphinctere manuum leui compressione, vrina exprimenda est, ac denique cathetere immisso foras prouocanda, immissoque in glandis foramen vel pediculo vel grano salis vel raphani succo proritanda.

Ischuria à paralyti quam induxit intemperies frigidior, id est à natatione in aqua gelida, aut simili causa, vel ex destillatione cerebri in lumbos, & os sacrum (sæpe enim vesicæ nervuli integris & intactis sphincteris in motoribus nervis ita resoluuntur, vt sensus vesicæ omnis hebetetur, neque opprimentis copiosæ vrinæ sarcinam persentiat) continuo post clysterem acrem, validamque purgationem aliquam, & hidroticum poculum plurium dierum, topicis calidis & digerentibus oppugnabitur fotibus, scilicet litibus, vnguentis, emplastris regioni ossis sacri, & perinei, & inguinum, & pubis ad mouendis: quæ enim paralytis ab ictu est, casu & luxatione vertebræ orta in pueris rarior est, & ab hoc

hoc compendio remouenda.

℥ radic. enulæ camp. & pœoniæ ana ℥j folior. orig. calaminth. pulegij, absinthij, sambuci, saluig. summitatum lauri, hederæ, sabinae, rorismar. & la- uendulæ, folior. ereffonis, berulæ, vrticæ ana m. ij baccarum lauri, iuniperi contusarum, florum cha- mæm. stœchad. vtriusque & centaurij minoris, sal- uia & anthi. ana pug. ij decoquantur, deinde cape de colatura ℥j in qua dissolue mellis anthos. & o- lei rutacei & irini ana ℥ ij benedictæ laxatiuæ & hieræ picræ ana ℥ j fiat clyster iniiciatur. Similis est facultas eius qui constat vino decoctionis fo- lior. saluia, baccar. lauri & flor. iuniperi vel ex tenui lixiuio sarmentitio & fermento veteri ad ℥ iij disso- luto.

℥ elect. diaphœnic. ℥ vj hieræ picræ ℥ ij fiat bo- lus. vel ℥ terebinthinæ Venetæ ℥ ss benedictæ la- xat. ℥ iij misce, capiat mane cum custodia.

℥ huiusce decocti ℥ partes tres, vini generosi partem vnam, ex mixtis foueatur regio vescicæ pe- rinæ inguinum imi ventris & ossis sacri cum lana, filtris aut spongiis imbutis ter aut quater in die, & per horam singulis vicibus. A fotu, cataplasmate ex magmate decoctionis frixo cum oleo rutaceo vel contuso cribratoque additis vnguentis arego, mar- tiato, pulueribus baccarum lauri, iuniperi, cumini cum oleo rutaceo, laurino, costino & de castoreo, partes eadem muniendæ sunt.

Ex iisdem oleis cum ceræ nouæ momento fiat litus, & vnguentum, additis præterea pulueribus idoneis, vt baccarum lauri, iuniperi, cardamomi maioris eu- phorbij. Interea morbo quoque oppugnandus est po- tionibus medicatis vt aquæ stillatitiæ vini aut eius

quæ cœlestis & imperatoria vulgo vocatur : electariis præterea , tum mollibus vt theriaca & mithridatio veteri : tum solidis vt aromatico rosato , diagalanga &c. Intemperies autem ficior & calidior ex ardore febris continuæ contracta, curatur topicis emollientibus & laxantib. antea descriptis in repletionē vesicæ curanda, dummodo illorum speciebus omnib. refrigerantia quædam sine astrictione permisceantur, vt clysteribus tres flores communes, & in dissolutione oleum viol. rosat. nenuphar. In litib. & vnguentis, tum olea illa, tum mucilagines seminis psyllij, cidoniorum cum cera alba. Denique euulsiones quatuor seminum frigidorum maiorum, hordeata, amygdalata, pullorum iuscula herbis frigidis alterata, pruna, pyra, malaque cocta plurimum conducant.

Obstructionem à crassa lentaque pituita, vel ceruici vesicæ hærente , vel in capacitatem eiusdem urinæ permixta, expediant, intus quidem clyster detergens, attenuans, calfaciens modicè siccanque (hæc enim est humoris, id est causæ continentis indicatio vt ita subactus facilius prodeat:) purgatio phlegmagoga, iulepi, aque, electaria eadem facultate: foris fofus, vnguenta, litus, cataplasmata, balnea.

℞ rad. brion. cucum. agrest. & enul. camp. ana ʒ ij folior. orig. calaminth. absinth. berulæ, cressonis, vrticæ, saxifrag. ana m. j seminis cumini ʒ j flor. genistæ & centaurij minoris ana p. j. decoquantur & in col. tb j β dissolue mellis mercurial. ol. anethini & rutacei ana ʒ ij bened. laxat. & hieræ picræ ana ʒ β fiat clyster. Potio phlegmagoga sit ex infusione fol. sennæ ʒ iij agar. trochiscati ʒ j in aqua betonicæ & in expresso , dissolutione elect. dia-phæn.

phoen. ʒ iij mell. rosati ʒ β. Bolus quoque sit eiusmodi loco potionis.

℥ elect. diaph. ʒ β hier. picr. ʒ ij cum puluer. ducis fiat bolus. vel

℥ therebinth. Venetæ lotæque cum aqua scabiosæ ʒ β benedict. laxatiuæ ʒ ij misce & fiat bolus.

℥ syr. de quinque radic. mell. rosati col. & oxymelitis scyllitici ana ʒ ij cum aquis beton. mellisæ ad ℥ j vel cum decocto foliorum hyssopi, fatureiæ, cicer. rub. seminis apij vel petros. & florum genistæ, fiant iulepi. Iuleporum vires assequuntur, apozemata ex eadem materia decocta dissolutaque, sicuti & electaria, tum mollia vt mithridatium vetus, theriaca per se deuorata vel in portione cum vino albo transglutita: tum dura vt diagalanga & trochisci de capparib. tum aquæ stillaritiæ, Eiusmodi est hæc:

℥ rad. ononidis in fine autumnii vel initio veris collectæ ℥ iij. infunde in ℥ viij. vini albi generosi & destillentur. aqua stillaritia seruetur in usum: tum puluis vt

℥ rad. ononid. ℥ ij pulueretur & cribretur, deinde adde sacchari cand. quart. j liquiritiæ & cinnam. ana quart. β fiat puluis, capiat ʒ j mane & vesperi, horis duabus ante pastus cum vino albo & tenui diluto aqua prædicta in plures dies, donec mictio expediatur. Omnium efficacissima est aqua terebinthinæ destillata cum foliis buglossi berraginis acetosæ capillor. veneris. Dum autem internis hisce præsidiiis obstructionis causam, id est pituitæ crassitiem lentoremque medicus tergendō & dissecando aggredietur, externis quoq; topicis simili facultate valētibus eandē oppugnabit. Tale est istud.

℥ rad. eryng. ononidis enul. camp. & brionia
 ana ℥℥ β fol. verbenæ parietariæ, betæ, mercurial.
 absinth. cressonis, berulæ, vrticæ, summitatum fœ-
 niculi & petros. ana m. j. seminis cumini, baccar. iu-
 niperi, seminis lithospermiana quart. β flor. geni-
 stæ chamæm. ana pug. j. fiat decoctio addendo sub
 finem eius partibus tribus partem vnam vini. ut-
 tur pro clystere ut antea pro fotu & infessu vel se-
 micupio. Ex magmate quoq. tuso cretoque fiat ca-
 taplasma additis oleis scorpionum amygdal. amara-
 rum, axung. gallinacæ & cuniculi, seminis litho-
 spermi, raphani, cumini, quod regioni prædictæ ad-
 moueatur. Fiet quoque ex radic. coctis raphani, vr-
 ticæ, petrosel. & cum vino & oleo frixis & apposi-
 tis. Iniectio quoque in mentulam per siphonem fa-
 cta vel oxymelitis simplicis, vel scillitici, vel per se,
 vel aqua fœniculi & ononidis diluti, tenuando ter-
 gendoque mucori plurimum prodest, quem mox ad-
 missus catheter foras euocat: similis est petrolei
 facultas, succi raphani, olei scorpionum, stercoreis
 columbini diluti in lixiuio sarmentorum: titillatio
 quoque glandis indito in eius foramen grano salis
 aut cimice, aut pediculo, vel allij caput, aut radix ra-
 phani eidem glandi admota, vel denique suctus pe-
 nis mictionem prouocat, pituitamque hærentem
 foras protrahit. Obstructionem à grandiori lapide,
 succussatio corporis sublatis clunibus curat: sed mi-
 norem solus catheter dimouet à vesicæ meatu, cui
 insertus est (de propria lapidis curatione antea
 actum fuit). Quæ à grumo est obstructio, ut post
 ictum casumque, dissolutione grumi primùm eget
 per incidentia tenuantiaque, tum immittenda tum
 admouenda, quæ mox exponebantur, neque diutius
 in

in vesica finendus, est ne putredine sua lipothymias asphyxias, mortemque tādē accersat. Obstructio meatus vrinarij à tuberculis, sicuti astrictio à vicinarum partium tumoribus, quod in pueritiam rarissimè incidant, iure à nobis neglecta videntur.

De strumis.

Strumæ sunt ex tumorum frigidorum genere quos vulgaris chirurgia phlegmaticas excrescentias vocat. Illæ autem nihil aliud quàm adenæ sunt indurati, propriaque cystide seu membranea ut steatoma & atheroma conclusi, & in collo præcipuè, alis & inguinibus sparsi, quibus partibus ad vasorum reductiones & stabilimentum adenæ frequentissimi conditi sunt: plerumque tamen oriuntur in anteriori cervicis parte, aut in altera, aut utrinque una vel plures. Strumæ latinis, græcis *χορδαίς* id est scrophæ vel sues dictæ sunt vel à similitudine symptomatis, quod sues etiam colla gerant glandulosa & strumosa, vel à similitudine partus multiplicis, cum earum in collo longa series disposita sæpe cernatur.

Differunt à glandulis tenuioribus pariter phlegmaticis & à partium subiectarum nomine vocatis, substantiæ suæ duritie non resolubili & insuppurabili, pituitæ scilicet gipsæ cœcretæque & verè scirrhosæ, cum glandulæ ipsæ minus inueteratæ & ex pituita magis conflata digerere & dissipari, atque adeo suppurari aliquando possint. Vtriusque affectus vel tumoris causa externa est, pueris fere intemperans prauaque viuendi ratio & cœlum humidius. Interna & antecedens sunt humores frigidi crudiq; & pituitosi, toto corpore & præsertim puerorū capite humidissimo redūdātes, ex cuius regio-

ne externa in adenes ceruicis defluunt molliores & fluxionibus excipiendis opportunos, vbi sensim & sine sensu digesti caloris vi, partium concretione in scirrhum obdurantur. Causa continens glandularum est pituita serosa, liquidior, recenti fluxione congesta: strumarum verò gipsea & durissima & iamdudum collecta. Vtraque tamen, aliàs pura est, aliàs mixta cum sanguine simplici vel atrabilario.

Prognostica.

Hinc glandularum, aliæ resolubiles sunt, aliæ etiam suppurabiles facta sanguinis & caloris accessione. Sic ex strumis, quædam sunt simplices, quædam compositæ ex mixto sero pituitoso, biliosoque: vnde etiam aliquando vlcerae euadunt, vlcere maligno serpente, sæpe etiam cancroso subsequente. Cystidis siue pelliculæ obuoluētis, signum est mobilitas & à circumpositis partibus separatio. Contra stabilitas & ad cutem carnemque adhæsiō. Alia prognostica ex differentiis strumarum ducuntur, vt à tempore, substantia & subiecto: recentes enim mollesque vt glandulæ sunt resolubiles: duræ & iuncturatae vt strumæ nequaquam. Rubræ calidæque & dolentes sunt suppurabiles, nisi ad cancerum vergant. Strumæ externæ locoque mutabiles, si plures sint, internarum soboles sunt, ideoque incurabiles per externa topica.

Pueri propter voracitatem & habitus raritatem strumis frequentius fatigantur: Senes ob contrarias causas rarius. Interiectæ ætates, aliquando ex eodem victus errore, & aquarum montanarum quæ crudæ sunt quotidiana potione iisdem obnoxie sūt. Qui breui angustaque sunt frōte, cōpressis lateribus capitis,

&

& maxillis amplis sunt obnoxij strumis: illis enim ob loci in cerebro angustiam promptius pituita ad collum deriuatur. Strumæ curatu difficillimæ sunt, cum neque digestionem neque suppurationem exolefcant: sed excisione vitioneue sola, propter vasorum insignium neruorumque recurrētium vicinitatem periculōsissima, cuique lethalis sæpe hæmorrhagia, aut aphonía, morsq; succedere solet. Aliæ sunt strumarum differentię magis propriæ, à quibus etiam earundem euentus & medicorum indicia commutantur. Aliæ enim à magnitudine desumuntur, vnde maiores ægrius quàm minores curari statuuntur. Aliæ à natura, vnde simplices facilius, quàm inflammatæ, cancrōsæ nunquam curantur. Aliæ à loco, vnde superficialiæ facilius quàm profundæ, deinde in collo, quàm in aliis emūctoriis curationem admittunt. Aliæ denique à numero: sic pauciores facilius quàm plures. denique ab ortu: vnde suspensæ facilius quàm insertæ & implicatæ sanantur.

Curatio.

Curationis strumarum præsertim blandarum, superficialium, & sanabiliū, primū instrumentum est diætę genus euchymum, tenue & attenuans, calidū siccūque modicè. Hoc enim morbus eiusque causa indicat, ne vberius in corpore colligatur.

Alterum instrumentum est pharmacia vacuans & alterans, quę indicatur à cacoehymia illa causaq; antecedēte, & quidem multiplex, nempe purgatio, mictio, sudatio: deinde attenuatio & deterfio. Purgatio igitur phlegmagoga esto, qualis est ex puluere Auicēnē ad 3 ij. vel 3 j β. pro singulis dosibus cū pauco hydromelite, qui puluis recipit turbith optimi,

zinziberis, hermodactylorum, diacrydij & faechari
ana partes æquales. Talis est hiera picra, benedi-
cta laxatiua, diaphœnic. discarthamū, pillulę coccig
de agarico, & de hermodactylis maiores. Huius
familie sunt agaricus, senna, turbith, hermoda-
ctyli, aloë & colocynthis, quorum omniū iusta fre-
quensque dosis vt syrupi laxantis specie, & per sin-
gulas hebdomadas verno præsertim & autumnali
tempore decernenda est, vt per epicrasim cacochy-
mia illa penitus exhauriatur. Vomitus quoque à
cœna semel aut bis in hebdomade aptissima est.
Interea coquetur materia & eductioni compara-
bitur hydromelitis matutina & quotidiana portio-
ne, iulepi instar, in quo folia hyssopi, satureię, & ori-
gani, calaminthæ cum semine anisi & coriandri
præparati coxerint, mixto pauco cinnamomo.
Atque dum sic ex toto corpore mucosa pituita sen-
sim detrahatur, eadem matutinis & vespertinis pa-
stus horis ex capite commodissimè deriuabitur a-
pophlegmatismis & errhinis, phœnigmis collo, &
occipiti appositis, cauterio denique alterutri
braccio, aut vtrique, aut potius ceruici infixis
crebra denique capitis rasiōne fricationeque, ac tan-
dem cucupharum quæ puluere cephalico consent
gestatione.

Altera eiusdem antecedentis causæ vacuatio i-
donea fiet per phlebotomiam, siquidem plethora
iuncta sit, neque tenella nimis ætas dissuadeat.

Tertia vacuationis species aptissima est sudatio,
quæ tum præcordia, tum habitum reliquiis humo-
ris excrementitij exhauriat. Est autem hidroti-
ca potio instituenda, ex salis parillæ, ligni
sassafras, & radio chynæ, omnium scilicet
vel

vel singularum decocto exhibito per spatium quindecim vel decem dierum.

Quarta vacuationis species est mictio prouocata vel puluere vel aqua stillatitia sequenti.

℞ cortic. rad. capparum ℥ β seminum apij petros. sceniculi, carui, cinnam. & liquiritiæ ana ℥ ij cicadar. vel grillorum vstorum ʒ iiij misce, detur ʒ j cum cochlearibus duobus vini albi diluti aqua stillatitia sceniculi vel sequenti.

℞ rad. quinque apertiuarum ℥ j cortic. rad. capp. ℥ ij folior. scrophulariæ, pimpinellæ, filipend. pilosellæ ana m. j seminis apij petros. spicæ nardi ana ʒ ij infundatur in ℥ iiij vini albi, clari, & tenuis per spatium viginti quatuor horarū super cineres calidos: deinde destillentur ex alembico vitreo: aqua stillatitia saccharo & cinnamomo condiatur, eiusque quotidie mane ʒ iiij propinentur.

Quinta vacuationis species est coniunctæ materiæ per topica emollientia & digerentia, quale est emplastrum de mucilaginis. ceroneum, diachylum ireatum, & præsertim Ioannis de Vigo cum mercurio emplastrum efficacissimū. Similia topica ex tēpore à perito medico concinnabuntur. Quod si frigidior duriorque materia contumaciùs digestionem repugnet, iisdem topicis paulo calidioribus ad supurationem ducitur, cui si neq; locus sit, ad ferrum & ignem recurrendum est. Incidenda itaque cutis recta quidem in collo: transuersa verò in alis & inguinibus ob rugas cutis, idquæ vel vniuersim vel partitè pro magnitudine maiori vel minori strumæ; deinde diductis vulneris labris à vasis & membranæ vel capulo scalpri, vel gladio ligneo, struma separabitur: atque tum demum cum sua cy-

stide excindetur, aut si forte vasis maioribus innexa sit, funiculo reuincta eius radix computrescet, vt sensim tabefacta decidat. Quod si diuulsis minoribus vasis modica hæmorrhagia inciderit, ea quidem medicamentis siccantibus astringentibus & agglutinantibus sistenda est, vt puluere rubro cum albumine oui, & stupis, oxycrato imbutis: Profusorem autem hæmorrhagiam vinculo iniecto, extremis basis oris comprimi prius decet, deinde vasis ipsius inter vincula illa incisione, nisi fortasse grandius fuerit.

Vltio ad immobiles pertinet, prorsusque venis & arteriis radice lata implicatas: fit autem aperta prius cute caustico imposito: deinde diuiso per mediam crustam abscessu, vsque ad profundiorē eius partem: tum pulueris exedentis & caustici tantillo, vt sublimati linamento penitus immisso, vt puta ad grani triticei pondus dimidium: Tandem post tres dies, intra quos vim suam totam excernit, funditus eximitur, atque escharę casus butyro dulci aut aliquo pingui insulso neque rancido procuratur, post quem reliquię strumarum si quę sint, eodem asphodelorum aut simili puluere absumendę sunt. Relictum vero vlcus aliorum more curandum est. Interea autem inter vrendum dolor calorque vicinę partis cum rofaceo vel vnguento populeo sedandus est.

At verò quę tenui radice sunt & infiltratę strumę & basi in angustum directę, curentur deligatione sensim augenda per vinculum sericeum, donec cum eodem concidant. Quę denique vlceratę sunt aut vlcerationi proximę, habentur vt incurabiles,
aut

aut ad cancri vlcerati integriue therapeiam re-
gantur.

De phymate.

Φυμα generali vna significatione quoslibet tu-
mores cōtinet, calidos, frigidos, latos, acutos,
molles, duros in quacunq; corporis parte, ex-
tra superficiem extuberantes sine causa externa. Ita
dicuntur ἀπὸ τῆ φύσεως, quod propriè omnibus sua
sponte è terra nascentibus conuenit. Eiusmodi sunt
furunculi, verrux, glandulæ, strumæ, atheroma,
steatoma, meliceris, ganglia, lupia, testudo, tal-
pa, bronchocele, vel botium. Speciali significatio-
ne, phlegmones aduersarum partium sponte sua
emergentes citoque augescences & suppurantes
designat. Hoc genus igitur à priori discrepat, mate-
riæ genere & qualitate, quæ illic melancholica est,
aut pituitosa: hic sanguinea vel biliosa: item duri-
tie, quæ illic insuppurabilis est. Differt quoque ἀπὸ
τῆ φύσεως, quod est earundem partium aduersa-
rum erysipelas, phlegmonodes, ideoque latius in-
star erysipelatis: sed non altius extuberans, ne-
que profundius, vt vera phlegmone, sed car-
nis tantum aliquid occupans, dolore & distensio-
ne magis cruciante quàm magnitudini tumoris
conueniat, idque cum pustulis quibusdam, vt in
herpete, ob bilis copiam, tardè denique maleque
suppurans.

Cæterum posterioris huiusce generis phlegmo-
nes bubones vocitantur, vel ab ingenti sua mole,
vel à partis laborantis nomine, quo non solum in-
guina tametsi frequentissimè: sed axillæ quoque
& regio iuxta cubitum designantur. Cùm enim

glandulæ omnes ob insitam substantiæ suæ laxitatem excipiendis fluxionibus tumoribusque opportunæ sint, tum maxime in his partibus, & præsertim inguinibus ob declivem situm, motumque validum, & redundantem humiditatem ob maiorum vasorum in femora tibias & pedes directionem.

Est autem horum bubonum vel phlegmonarum origo omnino duplex, vna naturalis planeque critica, altera non naturalis, & à causa morbifica evidenti & externa, vt defluxione præ dolore, vlcere, contusione, vulnere, sanguinis fluxum cum spiritu commouente ad partem affectam, quem istis adenū locis collocatæ glandulæ ad stabilitatem & munimentum maiorum vasorum in artus vicinos delatorum intercipiunt, combibuntque, vnde extumescunt. Sic affecto cerebro & dolente capite in collo: sic manu & brachio, in axillis: sic pede, tibia & femore in inguine glandulæ inflammantur. Aliquando interior latensque ex viscerum intemperie cacochymia in proxima emunctoria decumbit.

Prioris generis phymata, verrucæ, strumæ, satyriasis antea curata sunt: posterioris generis bubones seu phlegmone adenum supersunt.

Prognostica signa.

IN febribus critica periculo vacant, sicuti & quæ à causa externa sunt, tātumque febres diarias accendant. Quæ ab interna & spontanea fluxione oriuntur, periculosæ sunt, & affectæ principis partis alicuius indices, cuius cacochymia excipitur, eiusque putrescentis vaporis pars ipsa mandans vicissim per refluxum deterius afficitur. Illius verò fluxionis

xionis materia vel pestilens est cum vomitione, delirio, vrinis prauis, languido pulsu, lipothymia, carbunculo & bubone, cæterisque febris pestilentis symptomatis: vel est sæpe venenata, vt in morbo Gallico.

Curatio.

Phymata critica curantur sola causæ coniunctæ curatione, nulla antecedentis ratione adhibita. Vacuatio illa primum per digestionem tentetur, mox per suppurationem, siquidem digeri materia præ copia aut lentore aut crassitie nequeat. Digestio quoque, quò vehementior fluxio fuerit, eò leuior comparanda est, ne à calidioribus remediis impensius aucta, dolorem, febrem & vigilias ingeminet, robore partis dissoluto: sicuti si tardior parciorque eadem fluxio fuerit, digerentium caliditas & efficacia augeatur, mixta tamen emollitione, quæ omnino modica fiet, ne partem enervatam laxatamque, commota fluxionis multitudine opprimat: nisi forte durities inuicta dolorque acerbior emollitionem insignem efflagitent.

Exemplum digerentis debilis.

℞. farinæ hordei ꝑ iiii. coquantur cum hydrelæo, fiat cataplasma: Fouetur quoque pars oleo liliorum, vel chamæmelino, vel irino, vel oleo simplici, in quo parum salis bullierit, & supertegatur lana succida.

Exemplum validioris.

℞. radic. alth. & lilior. ana quart. j. folior. maluz, violar. origani, calaminthæ, summitatum al-

theæ,ebuli & sambuci an.m.j.flor.chamæ.meliloti,
anethi an.p.j. caricarum pinguū paria iij.seminis
lini,& cumini ana quar.ß.coquantur: resistentia te-
ratur & cribretur, eique cribratæ adde farinæ hor-
dei,lentium & orobi ana ʒ ij axungię recentis gal-
lin.anseris & anatis ana ʒ j olei liliorum, anethi, &
chamæmelini ana q.s.fiat cataplasma.Similis est fa-
cultas emplastri diachylonis ireati,& ceronei,&vn-
guenti de althæa, & resumptiui. Si dolor ab initio
ex calore vrgeat, huic ante digestionem validam
leniendo prospiciendum est, addendo primo ca-
taplasmati seminis psyllij & cydonior.mucilagines,
aut fotu ex hydrelæo,aut litu ex oleo violar.& lacte
mixtis.

Fluxio tardior,euocanda est topicis quidem ma-
lacticis seu attrahentibus mixtis:tandem etiam cu-
curbitula apposita.

℥ gummi ammoniaci, bdellij pinguis & galba-
ni in aqua vitæ dissolutorum ana ʒ j axungię cæri
vel vituli, styracis liquidæ, stercore columb.& sul-
phur.viui ana ʒ ʒ.ß.mucilag. caricar. pinguum cum
decocto flor.chamæmeli & meliloti extracta ʒ ij.
olei liliacei & keirini & ceræ citrinæ ana q. s.
fiat ceratum. Quod si fluxio tota in partem exce-
pta digeri non possit: sed obdurescere potius in
scirrhum videatur, tum ad malactica efficaciora
recurrendum est, à quibus vel digestionem vel sup-
purationem comparetur. Tale est proximum ce-
ratum, attrahentibus vt stercore columbino &
sulphure validioribus subductis. Denique dige-
stione desperata, suppuratio calidis humidisque
& emplasticis topicis mouebitur & tetraphar-
maco, vel tripharmaco ex farina sinceris-
sima

sema tritici , oleo & aqua in pulvem percoctis
vt

℥ radic. lilior. sub cineribus coctarum ℥ iij. ce-
parum pariter subactarum ℥ iij. axungia porci &
gallinae ℥ ij. croci ℥ β vitellos ouorum duorum:
fiat cataplasma. Purgato abscessu vlcus reli-
ctum carne impleatur, tandemque cicatrice ob-
ducatur.

Phyma non criticum, sed ab externa excita-
tum causa dolorem extremis partibus, vt capiti,
bracchiis & cruribus inferente, quod genus lasci-
uiantibus, pueris sæpe molestum est, vltro citroq; &
temerè cursitantibus, prophylaxim in primis exi-
git, tum per victum tenuem frigidum siccumque,
tum per doloris in vlcere sedationem, tum deni-
que per reuulsionem ex purgatione & phleboto-
mia. Illa quidem leuior sit, mixtaque ex phlegma-
gogis & cholagogis, vt rhei & agarici expresso
cum syrupo rosato laxatiuø, cique clyster mollis
& leniens præmittatur. Phlebotomia in grandio-
ritate plethora, aut si hæc absit doloris modo
respondeat. In puerili, phlebotomiæ omittendæ
vicem multa duraque frictio & arcta deligatio par-
tium aduersarum: cucurbitulae quoque suppleant
cum scarificatione, si fluxionis impetus & tumoris
moles metuatur.

Dolor sedandus est anodynīs topicis, vt lini-
mentis, cataplasmatibus, pultibus apponendis,
tum ad sedem affectus cruciantis, tum ad glandu-
las fluxione appetitas: his tamen anodynīs re-
pulsio quædam lenior ab initio, fluxus in-
hibendi gratia, præponenda est, vt ex oleo

rosato, omphacino, myrtino, lentiscino, cui siquid chamæmelini aut liliacei iungatur, topicum euadet partim repellens, roborantique, partim leniens & paregoricum. At ipsi doloris sedi, lenientia sola, olea, ut liliaceum, chamæmelin. sambucinum, catellorum ex lana succida tantisper imponantur, donec delinito dolore, affectus glandularum propria curatione seorsum obliteretur.

Post prophylaxim eiusmodi causæque antecedentis reuulsionem, atque adeo ruentis fluxionis compressionem, tum demum propria curatio inchoanda est vacuatioque causæ coniunctæ, per digerentium & suppurantium remedium vicissim vsurpandorum formulas ante expositas, ita tamen ut digerentibus prior locus sit, quibus non proficientibus posterior suppurantibus decernatur.

Phyma denique symptomaticum & ab interiori suscitatum cacochymia, siue pestilenti & maligna, siue venenata, idque vel comitante vel subsequente febre putrida, eget quidem prophylaxi ante exposita per victum tenuem, purgationem & phlebotomiam, aut vicariis phlebotomiæ vacuationibus: sed ab omnibus repulsio absit, & astrictio topicorum, non quod criticum sit: sed ob corruptelam amandatæ materiæ, partis principis propinquitatem, vaporumque communiū amplitudinē, per quam regeri in eam possit. Itaque resolutionem solam aut suppurationem post prophylaxim tumor admittit, & cruciantis doloris lenitionem, cunctantisque humoris attractionē, sicuti paulo antè exponebatur, expositumque est antea in febrium pestilentium therapeia, quā delibare tātum mihi hoc loco visum est, quod pueros exercere rarissimè consueuerit.

Quod

Quod autem non à caco-chymia, sed à plethora sola sponte expullulauit phyma; id vero post causæ antecedentis reuulsionem, causæ quoque coniunctæ vacuationem, tum per repulsionem primùm, tum deinde per resolutionem, tum postremo per suppurationem insinuat.

Sic ergo colliger

Phymata oriuntur, vel à causa externa dolorifica, vel ab interna vt caco-chymia aut plethora. Illa febrem accersunt ephemeram. Hæc aliàs putridam sequuntur, suntque vel critica vel symptomatica, aliàs præcedunt eandem tanquam morbi. Est autem omnis à phymate febris, excepta ephemera, periculosa ex Hippocrate.

De pernionibus.

HActenus frequentissimos infantix & pueritiæ morbos & symptomata grauissima percurauimus ab Hipp. aphor. tribus comprehensa. Superfunt complura alia minus quidem frequentia: sed tamen valde pueris infensa, quorum methodum curatiuam iam iam aggredior.

Perniones frequentes quidem in manuū pedumque digitis: sed in talis vel calcaneis puerorum frequentissimi ab hyberno frigore oriundi, vnde Gr. χιμθλα ἀπὸ τοῦ χειμῶνος, Gallis (les mules) Illi autem inter vlcera Celso numerantur: sæpe tamen tumores sunt cum liuido colore partium laborantium, quibus molestissima vlcera nisi occurratur succedere solent.

Nascuntur verò illi ex sanguine in superficiem partis frigidæ doloris vi à frigore externo vehementi allecto, perfrigerato, tandemque putrefacto

H h h

(neque enim extincto calore suo sanguis suppurationem subeat) vt acrimonia sua obfessam partem cutemque erodat & exulceret.

Horum curationis scopi sunt, laxatio densatæ à frigore partis, concretique sanguinis attenuatio, deterfio, resolutio. Perfundatur itaque vel foueatur in primis pars aqua simplici, egelida, vel decocto foliorum betæ, malux, parietariæ, orig. calaminthæ, flor. chamæmeli, meliloti, sambuci, seminis lini & cumini: mox à fotu vnguentum inducatur huiusmodi.

℞ axungia recentis gall. & anseris ana ℥ ij œsipi ℥ j mucilag. seminis lini extractæ cum decocto flor. chamæmel. meliloti, terebinth. & olei chamæm. vel liliac. ana ℥ ij ceræ citrinæ parum, fiat vnguentum. vel

℞ olei anethini, chamæmelini & liliac. ana ℥ ij mucilag. seminis lini & althææ ex aqua lilior. extractæ ℥ iij irid. Florent. ℥ vj seminis cumini ℥ iij cum cera noua fiat vnguentum. vel

℞ mell. opt. ℥ iij salis vel sulphur. ℥ j misce & imponatur.

Duo hæc vltima validius exsiccant absorbentque ichores, & prohibent partem exulcerari.

Perniones exulcerati curantur topicis mixtis exsiccantibus & suppurantibus (ita indicante vlcere, vlcereisque coniuncta causa, id est sanguine corrupto) quale est vnguentum sequens.

℞ vnguenti tetrapharmaci & vnguenti de minio ana partes æquales misce. vel

℞ olei de semine lini, butyri recentis, pinguedinis porcina, seui vitulini ana ℥ j thuris, lithargyri, auri, & argenti ana ℥ ij tuthiæ diligenter præparatæ
℥ iij.

℞ iij cum cera alba fiat vnguentum. vel

℞ ol. myrtini ℥ iij adipis suilli ℥ ij spumæ argenti, & cerusæ lotæ ana ℥ iij cum cera alba fiat vnguentum. vel

℞ mycilag. seminis cydoniorum & tragacanth. ex aqua rosarum extract. ana ℥ j olei ouor. & nenuph. ana quart. B. misce in formam linimenti. Multo plura in fine cap. de adustione addenda sunt.

De intertrigine.

Intertrigines pueris frequentes & molestæ sunt excoziationes & superficiariæ cuticulæ erasiones, vt ex equitatu duriori, infessu longiori, & scalptu inter dormiendum acriori, in femoribus, cruribus, pedibus manibusque & natibus. Curantur valida ficcatione vt ex puluere aspergendo rosar. fol myrti. gallar. balaustior. sanguin. draconis, boli armenæ, terræ sigillatæ.

De fissuris labiorum.

PVerorum labia soluuntur aliquando, findunturque aut acri vapore nidorosa cruditis, corruptique caliditate in ventriculo lactis; aut flatu aquilonio squallidoque muscutorum fibras impensius ficcante & veluti torrente.

Fissuris istis humectantia sola, vel paucis astringentibus mixta medentur. Illius generis sunt olea lini, nucum, de vitellis ouorum, thuris & ceræ nouæ quod Iacob nomine circumfertur, spuma lactis postquam resederit collecta & cum adipe suillo ad ignem in vnguenti speciem subacta. Huius generis est vnguentum hoc.

H h h 2

℥ ol. de semine lini ℥ j vitellū oui vnius cum suo albumine, lithargyri ℥ ij fiat vnguentum. vel

℥ mucag. feminis lini cum decocto florum chamem. & melil. extractæ ℥ ij butyri recentis vel adipis suilli insulsi ℥ j boli armen. & terræ sigil. ana ℥ ij ceræ ciurinae q. s. fiat ceratum. Hæc eadem sunt mammarum, talorum & manuum fissuris accommodatissima remedia. Lamina plumbea per medium diuisa, iussu reginae Catharinae de Medicis apposita labiis fissis nobilissimæ puellulæ Margaritæ de Monmorantio, noctesque aliquot gestata celeriter ea percurauit.

De adustione puerorum.

Sæpissime flamma, prunis, oleo & aqua feruidis aduri lasciuiantibus pueris contingit. Est igitur calida intemperies adustæ partis in primis summouenda, cuius comites sunt impatibilis cruciatus, febris, vigilæ, pustulæ & vlcera. Summouetur autem illa remediis topicis, tum per se, tum per accidens contrariis & refrigerantibus. Cuius generis sunt quæcunque tepido calore cuticulam ab vstione densatam laxando empyreuma iniustamque caliditatem foras reuocant. Huiusmodi sunt ignis, vel ipsa flamma ambustæ parti proxime admota, fons ex aqua calida, vel ex oleo rutaceo, quod ex foliis rutæ in aqua & oleo coctis constet, vel ex oleo de tartaro: sambuci & ebuli folia contusa & tepidè imposita: item allij porrique illita folia, cepa contusa eiusque succus illitus per se, vel cum vernicis liquidæ parte dimidia, fricatio partis

partis vſtæ cum larido, vel potius cum guttulis laridi antiqui in lamina ferrea candente liquati & in aquam frigidam exceptis. Illius generis ſunt frigida omnia, humidaque, non etiam ſicca, ne aſtrictione immodica cutem aſtringendo empyreuma intus conſtringant. Eiufmodi ſunt oxycratum ſucci, vel aquæ ſtillatitiæ ſemperuiui, vmbil. vener. acetofæ, lenticulæ paluſtris, lactucæ, oui albumen. Compoſita ſunt, oleum roſatum & myrtinum, vnguentum roſat. populeum, album rhaſis, diapompholygos, nutritum, emplaſtrum de ceruſa. Vtraque tantisper applicanda ſunt donec calorem alienum omnino obliterent, idque vel frigida actu, vel potius tepida, vt propria & aſcitiua ſiue accidentaria refrigerandi facultate empyreuma eliciant extinguantque.

Interim excruciantem dolorem admixto topicis iſtis opij momento ſedare licet. Exempli gratia

℥ olei & aqu. roſ. ana ꝑj β albumen oui vnus, commiſceantur diligenter & diutius, moxque linteolis inſuccatis inducantur.

℥ vnguenti albi, rhaſis ꝑ iij aq. & olei roſat. ana partes æquales, fiat vnguentum.

℥ olei roſati ꝑ ij olei ſeminum cucurb. ꝑ j ceræ albæ parum, fiat linimentum.

℥ pomatæ ꝑ iij olei roſati ꝑ ij fiat vnguentum.

Frigida hæc anodynis & modice calentibus aliquando miſcentur eadem vtilitate, & tepidè admoventur. Tale eſt vnguentum populeum cum vitellis ouorum ſubactum.

Simile eſt vnguentum ex olei roſati ꝑ ij vitell. tribus, croci ꝑ j vel ex mucilagine ſeminis cydonio-

rum cum aqua rosar. extracta & olei lini ana \mathfrak{z} iij. vitellis tribus, cerulæ \mathfrak{z} ij. croci \mathfrak{z} β cum cera alba. Item \mathcal{L} . rad. lilij. tostarum, vel cum oleo rosato mixtarum ana q. s. vel folia eiusdem decocta pariterque mixta. Sic \mathcal{L} . cortic. mediani sambuci \mathfrak{z} j. ol. ros. \mathfrak{z} ij. mastiches, thuris ana \mathfrak{z} j. ceræ albæ \mathfrak{z} ij. bulliant simul in aquæ font. lb iij. ad consumptionem dimidiæ partis & cum refrigerit, colligatur quod supernatabit, & applicetur.

Licet denique pustularum eruptionem mixtis paucis siccantibus remediis, à quibus ichor cuticulam attollens absorbeatur, opportunè cohibere. In hunc finem

\mathcal{L} . succi solani & plantag. ana \mathfrak{z} ij. cortic. mediani ebuli & sambuci ana \mathfrak{z} j. olei rosati \mathfrak{z} β coquantur in vase duplici ad consumptionem succorum: tum adde cerulæ aqua rosar. lotæ & lithargyri ana \mathfrak{z} j. cortic. thuris \mathfrak{z} iij. tuthiæ præparatæ \mathfrak{z} β axungiæ suillæ insulsæ \mathfrak{z} ij. albumina ouorum duorum, ceræ albæ parum, fiat vnguentum. Sic

\mathcal{L} . succi plantag. & olei ros. ana \mathfrak{z} j β . calcis lotæ in aqua rosar. \mathfrak{z} ij. misce. Item \mathcal{L} . cerulæ lotæ in aqua rosar. \mathfrak{z} j. calcis decies lotæ in succo solani & vnguenti citrini ana \mathfrak{z} β mucilag. seminis cydoniorum extractæ cum aqua rosar. \mathfrak{z} iij. ducantur omnia in mortario ad formam linimenti, addendo parum aq. solani inter agitandum.

Quod si pars adusta euaserit iam pustulosa aut etiam exkoriata: tunc frigidis illis inflammationis remediis siccantia validius miscenda erunt, quæ intemperiem simul deleant vlcusque conglutinent.

nent. Tale est vnguentum album camphorat-
tum, vnguentum de calce, vnguentum diachal-
citeos, vnguentum de fimo columbino & pau-
co limeolo combusto, cum oleo rosato subactis.
Talia quoque componuntur ex metallicis vstis
lotisque, vt cerusa, tuthia, lapide hæmatite, ostreo-
rum cinere. vt .

℞. olei rosati ℥ iij. calcis lotæ ℥ β cum cera
alb. fiat vnguentum. ℞. vnguenti ros. ℥ iij. cin-
eris sarmentor. vitis & vinaceorum ana ℥ ij. mi-
sceantur cum oleo rosato : pulvis denique galla-
rum, sanguinis draconis, folior. myrti aspersus, eius-
dem facultatis est.

De casu.

PVeri cursu incessuque temerario & ascēsu præ-
cipiti sæpiissime corruunt. Casus autem diffe-
rentiæ sunt multiplices, tum ex loco ex quo, & in
quem fit, vt humili, sublimi, duro, molli, me-
dio: tum ex offensæ partis substantia, vel molli, vt
ventris, vel dura, vt capitis, crurum, brachiorū, tho-
racis, spinæ: tum denique ex consequentibus affecti-
bus & symptomatis, vt fractura, luxatione, paralyfi,
contusione, obmutescencia, deliratione, hæmorrha-
gia interna, externaque. Ab his omnibus casus diffe-
rentiis indicationes curatiuæ variantur. Qui enim
humilior leuiorque est in partem locumque mol-
lem & sine alterius affectus implexu, sola sanguinis
timore pueri cadentis agitati compressione indi-
get, vt per potionem aquæ frigidæ, vel sinceræ
vel mixtæ cum paucissimo aceto, vel cum sy-
rupo de granatis acidis vel myrtini ℥ j. vel ij.
Sin sublimior grauiorque casus in quamcunque

partem vel mollem vel duram locumque fuerit, vitu primum eget prætenui, frigidoque & sicco, deinde repentina reuulsione sanguinis per suspectâ anatomosim, vel potius rhexim venarum, in viscera, aut ventres effluxuri, graui interim & pestifera eorum phlegmone. Reuulsio fiet per frictiones & deligationes aduersarum partiû, vt brachiorû, crurumque, per balanos & enemata aciora, cucurbitulas femoribus, natibus, dorso & scapulis admouendas. Phlebotomiæ autem eximia quidem promptaque ad reuellendum vis est, sed pueritia eius fere incapax est. Eius vicem subeat scarificatio post cucurbitulas.

Postremo confirmanda sunt protinus intus viscera vasaque ne quid sanguinis effluat, astringentibus potionibus vt ex ʒ j. pulueris mummiæ, boli armenæ & terræ sigillatæ cum ʒ iij. aquæ plâtagin. vel bursæ pastoris & ʒ j. syrupi de granat. acidis vel de rosis siccis, vel myrtini, vel

æ. rhab. tosti, seminis nasturtij, tosti, terræ sigill. boli armen. an. ʒ j. fiat puluis, detur ʒ j. cum prædictis aquis & sypis, bis quotidie toto principio, id est per quatuor vel quinque dies primos. Quod si totus habitus grauius contusus sit, tunc quidem post reuulsionem & corroborationem internarum partium vngendus est oleo rosato vel myrtino, vel omphacino, moxque aspergendus puluere myrtillorum, sandalor. omnium, mastichis, balaustiorum, rosar. vel obuelabitur pelle arietina recenti adhucque calente, eodem puluere imbuta, tantisper dum sudor emanarit: sic enim qui in habitum effluxit digeri, qui fluxurus est suppressi constrictis venulis poterit.

Atque

Atque hæc quidem remedia toto principio, id est quinque aut sex dierum spatio, ex usu sunt: quibus exactis, iam grumi suspecti sanguinis tenuantibus & tergentibus dissoluendi sunt, ut hoc puluere.

℞. rhab. torrefacti, radic. costi, aristol. rotunda, rubiæ maioris & centaurij maioris ana \bar{z} β fiat puluis, capiat \bar{z} j. cum syrupi acetosi simplic. \bar{z} j. aquæ symphyti maioris \bar{z} iij. fiatque potio, detur sex vel octo diebus perpetuis, mane. vel

℞. vini lb. j. mell. opt. quart. j. radic. ari, filicis masculæ, & caudæ equinæ ana \bar{z} β coquantur omnia simul, diligenter despumando colandoque: dentur quotidie in introitu lecti \bar{z} iij. vel iij.

Postremo contusus habitus omni lassitudine & reliquiis sanguinis sub cutem expressi concoctique per stuphas & balnea per triduum iteranda liberabitur, in quibus cum paucis astringentibus ad venularum robur, ut symphyto maiori, plantagine, equiseti, plura digerentia incoxerint, ut absinthium, melissa, orig. calami. salvia, artemisia, cymæ lauri, hederæ, lauendulæ, flor. cham. meliloti & anethi. Eiusdem generis remedium est si corpus ægri intra finum equinum calidum condatur, sudoribus abundanter mouendis.

Quod si qua pars durior priuatim læsa sit, sitque contusio modica, hæc quidem sine reuulsione vlla præuia curabitur, primum astrictione, deinde resolutione. Illa enim clausis venulis sanguinis effluuium cohibet per duos vel tres dies: hæc effluxum dissipat. Astrictionis materia sit vnguentum album rhasis camphora.

tum aut sæpius aceto albo ablutum. Digestionis materia erit cera noua aniso vel cumino mixta, aut frustulum carniū arietinarum tostarum. Si grandior fuerit contusio tumorque inde eminentior, præmissis reuulsionibus prædictis astrictio validior tentanda initio est. vt,

℞. olei rosati & myrtini, vel omphacini ana ℥j β. pulueris myrtillor. sumach, gallæ, & boli arm. ana ℥ij. ceræ albę parum, fiat vnguentum. vel

℞. phaseolorum & oryzę ana ℥. j. boli arm. fol. sumach siccorum ana ℥β aloes aluminis gypsi, calcis viuę extinctę ana ℥ij. fiat puluis omnium, concorporetur cum albumine oui & applicetur partē Post quartum diem, id est principium fouebitur pars hoc aut simili decocto digerente, & parum astringente.

℞. fol. symphyti vtriusque absinthij melissæ, saluie, summitat. lauend. & lauri ana m. j. seminis scœnugr. & cumini ana quart. β flor. stœchad. vtriusque & salis marini ana p. j. coquantur in vino & melle, & foueatur pars.

℞. residentiam contusam cribratamque, eique adde butyri recentis & vnguenti resumptiui ana ℥iiij. farinæ scœnugr. oryzæ & fabar. ana ℥ij. succi absinthij ℥ij. fiat cataplasma. Digesto & dissipato sanguine pars ipsa deinceps apponendo emplastrū ceroneū magis magisque exonerabitur. Sin ad suppurationē contusio nō resoluta vergat, hæc ipsa remediis pepticis antea expositis accelerabitur. Quod si pars ipsa cōtusa liuore cōtracto sēsūq; stupido gāgrēnā minitari videat: tū verò appositione cucurbit. cū leui scarificatione prohibebit, cui subinde admoue-

admouebitur fort^r ex aceto decoctionis folior. orig.
calam. absinth. hyssopi, thymi, satureiç, sum. mitatum
lauri, hederç & lauendulç, vel ex vino decoctionis
radicum aristol. ari, serpentar. gentianæ & similium.

Cùm grauior è sublimiori loco casus deliracionē
vel obmutescentiam asciuit, tunc explorata prius
ægri vita, (neque enim mortuo remedia profint)
vt tractato pulsu, vallis temporum & pūdendo-
rum pilis, nomine proprio conclamato, cotone
aut lana ad nares admota, & cyatho aqua pleno
ad stomachum inducto: tunc, inquam, à cerebro,
cuius hæc sunt propria symptomata ex commo-
tis vehementer spiritibus animalibus, & sangui-
ne effuso humores omnes deducendi sunt, vt fri-
ctione externorum duriori, hæmorrhagiæ pro-
uocatione per setas, paleas, vel iuncos penitus na-
ribus insertos, sternutationis & masticationis: tan-
demque vbi clariora vitæ indicia fuerint, clysteri-
bus acrioribus & phlebotomia in cubito, ex cepha-
lica, vel in fronte & lingua, siquidem ætas viresque
omnino non abhorreant. Postremo capiti ipsi ro-
borando cōsulendum erit vel puluisculis aromati-
cis & discutiētibus atque roborantibus, qui vel in-
spurgentur capiti rasō tonsōue per plures dies, vel
cucupha diutius circumferenda ex cotone & serico
rubro excipientur, non neglectis etiam lotionibus
similib. sub æstatē & ætate. Si forte ex casu grauiori
fractura ossis alicuius inciderit: tunc præter reuul-
sionum prædictas species præmittēdas, iunctę pro-
tinus ossis fracti orę emplastro oxycroceo munian-
tur, vel cataplasmate ex farina fabarum cum oxy-
melite coctis & probè subactis.

Luxationis quoque propria curatio est per repo-

sitionem subitam ante reuulsiones ipsas.

Denique distensionis articulorum per quam ligamenta sine ossiū fractura aut luxatione, in pedibus, genibus, manibusque tantum elongantur, curatio est per blandam repositionem partis, dolorisque & caloris sedationem repentinam, ex linteolo in frigidam immerso, vel ex cataplasmate astringente ex boli armenæ, sanguinis draconis, gallarum & myrtillorum puluere, ex albuminibus ouorum ij vel iij excepto cū oleo rosato & aceto rosato. Post principium autem, id est post quartum vel quintum diem, nouum cataplasma priori omisso, astringēs, leniensque & digerens articulo læso inducendum est, quale est hoc:

℞ folior. absinthij, verbenæ, tapsi barbati, plantag. ana m. j. ros. rubr. flor. chamæm. anethi, centaurij minoris ana p. ij. aluminis & balaustiorum ana quart. s. coquantur in aqua simplici, addendo post finitam coctionem vini rubri austerique partem tertiam. Hoc decocto foueatur pars dolens bis in die, & tepide cum spongiis nouis, & per horam singulis vicibus.

& residentiam contusam & cribratam, eique adde farinæ fabarum & hord. ana ʒ ij radic. iridis Florent. ʒ j olei myrtini & rosati ana q. s. fiat cataplasma ad mouendum tepide post fotum. Simile est emplastrum oxycroceum.

De achoribus & fanis.

MEliceris tumor est insignis ex abscessuum genere. Melicerium tuberculum est, cuius species duæ sunt, ἀχὼρ & κελίον, id est fauus. Illius foramina magis sunt exigua, sanies tenuior, tumor magis

gis pusillus, indolens & inflammationis expers. Hinc illius nomen vel à tenuitate excrementi ischorosi quo constat, vel ab angustia sedis seu foraminum. Huius, id est faui foramina ampliora sunt, excrementum crassum magis & melli simile, estque inflammationis dolorisque particeps & crustosus. Latini vocant has species vlcera manantia capitis, Galli tinea; sed ultimam speciem quæ deterior est fauum appellant, Monspelienſes la Rasque. Affectus est compositus utrobique, nempe vlcus cum tumore: sed fauus etiam cum inflammatione & dolore: Sedes est cutis capitis: Causa proxima, humor crassus, cum sanie magis minusve tenui mixtus, qualis est pituita falsa & quasi atrabilaria, & melancholia cum bile mixta. Origo, aliàs est ex contagione propter magnam putredinem foetoremque exhalantem, aliàs ex impuri mēstrui reliquiis, aut ex prauo lacte corruptisque alimentis. Distinguuntur à psydraciis quæ pustulæ sunt duræ, subalbidæ, siccæ, in ambitu rubræ, quibus expressis sanies sola redditur, in lue Hispanica frequentes. Differentiæ sunt utriusque speciei, tum ex tempore, ut vel recentia vel inueterata sint hæc vlcera: tum ex situ, ut superficiaria vel profunda: tum ex spatio, ut exigua vel magna: tum à symptomate, ut sint dolentia, inflammata, crustosa, vel contra.

Prognosticum est quod recens utraque species facile curabilis sit. Achor tamen celerius, fauus tardius, quod huius crassius sit minusque dissipabile excrementum: illius tenuius. At confirmata utraque est incurabilis, locumque glabrum ob cicatricem sequentem relinquit.

Curationis scopi sunt duo, vnus ne augeantur ista

duo nascentia tubercula: alter vt nata genitaque fannentur. Prior scopus attingitur, tum vñtu nutritis & infantis cacochymia contrario: tum cacochymie vniserfalis purgatione melanagoga vel phlegmagoga potius: quæ præfcribatur tum nutriti, tum infanti: fed in hoc frequēs magis fit, quàm vehemēs & efficax ob ætatis infirmitatem & mollitiem.

Phlebotomia autem omnis ante feptenniũ interdicitur, à quo finito, in pulpis auriũ, vel pone aures nullo fterilitatis metu tentari poteft, nifi cucurbitulæ cum fcarificatione ceruicis & fcapularum, eius vicem fuppleant. Alter scopus reliquorum quoque vlcerum communis eft, fcilicet exficcatio attenuatione & deterfione comitata, quæ vel fimplex fit, vt in achõribus, vel mixta cum repellentibus, vt in fauis.

Medicamentorum topicorum efficacia variatur, tum ex origine, tum ex fitu. Porro adinuẽdum illud quidem capiti eft liquida magis & media, quia penetrantiori, quàm folida forma. Talis eft fofus, lotio, linimentum, & vnguentum, idque poft crebram capillorum rafionem, vel auulfionem, etiam per dropacem & pileum ex pice applicatum & violenter detractum bis in die, & per multam ex afperis linteis friccionem.

Ergo incipientes achores curant repellentia exficcantiaque mitiora, vt folia falicis, myrti, fructus & cynæ lentifci, rubi, cortex pini, ex quibus in oxycrato coctis lotiones & fofus concinnentur, fpuma argenti, cadmia, creta, cimolia terra, lemnia & famia: hæc puluerata affricantur, vel oleo rofato & myrrino, paucoque aceto excepta illinuntur.

Auge-

Augescentes curât parum repellentia magisque digerentia, vt oleum lentiscinum, myrtinum, radix cyperi, lentes, ex quibus linimenta.

Perfectos curant siccantissima valideque discutientia omnia sine repellentium mixtione. Talia sunt sulphur viuum, chalcitis, sandaracha, charta cōbusta, fœx vini arida, sal vstum, fella animalium calidorum, & anium rapacium: quæ omnia vel aceto diluuntur, vel terebinthina, vel pice liquida excepta, linimenti instar admoventur.

Exemplum leuioris topici in principio.

℞ succi fumar. scabios. enulæ camp. oxylapathi ana ʒ iij tuthiæ præparatæ ʒ j axung. porci antiquæ ʒ iij ol. nucum, & ceræ ana q. s. fiat vnguentum.

*Exemplum vehementioris topici in statu
& declinatione.*

℞ olei nucum & iuniperi ana ʒ ij olei ex lucerna sordidiore ʒ j nutes cum suis nucleis vstas num. vj. myrrhæ, æruginis rasilis, fuliginis furni ana ʒ ij lithargyri ʒ β argenti viui ʒ ij fiat vnguentum applicandum post lotiones ex lixiuio cineris tithymali & brassicæ.

Aliud.

℞ auripig. rubri, calcis nouies lotæ ana ʒ j β fuliginis furni ʒ j vitrioli & aluminis an. ʒ β tartari vsti ʒ vj argenti viui & axungie veteris ana ʒ ij cū prædictis oleis nucum & iuniperi fiat vnguentum. Mihi tamen mercurij vsus valde improbatur & suspectus est, maxime in puerorum capite, tanquam neruis & cerebro aduersissimi ob insignem frigiditatem eius & humiditatem cū tenuitate penetrabili.

Rusticum est illud ex melle, baccis iuniperi & aceto: sicuti & aliud ex sulphure, vrina pueri & oleo nucum. In fauo, cuius inflammatio dolorque comes est, topicum mixtum est ex refrigerantibus & discutientibus, qualia sunt ad incipientes achores præscripta, vbi iuncta crusta est ex malacticis & discutientibus, vt semine lini, manna thuris, resina, terebinthina. Sunt enim crustæ maturè auferendæ, sub quibus retenta sanies cutem magis erodit, semperque cicatrices glabras excitat. Auferuntur autem vel dropace prædicto, vel vnguibz, vel malacticis remediis: sed si mucosus humor multus emanet, discutientibus & siccantibus validioribus vnguentis præscriptis miscenda erunt valide detergentia, cuiusmodi sunt aloë, myrrha, gentiana, crebræque lotiones vsurpandæ, cuiusmodi sunt prædictæ. Denique quatuor vnguenta calida maiora vocata, mixta mercurij parte duodecima, his affectibus plurimum conferunt.

De tineæ faciei puerorum.

Altera tineæ species est minime mala & contagiosa, infantium faciei frontique sæpissime infensa, cuius origo est ex reliquiis menstrui impurioris, vel lactis crudioris. Causa efficiens est calor natiuus, vnde excrementitia materia musti more effervesceat, in capite præsertim suapte natura humidissimo & cerebro. Ex eadem cerebri pituitosa illuue & intemperie fiunt nares mucosæ pueris, auresque purulentæ, quæ tametsi symptomata sint omnia intemperiei humidioris, infantes tamen à grauissimis affectibus vindicant, vt epilepsia, asthmate, catarrho, tussi, lienteria, scrophulis & gibbositate. Fiunt enim
ex decur.

exdecurrente pituita secundum spinam infantis vel obstripi vel repandi. Qui magis nitent foris sapius sunt valetudinarij, collecta intus in capite multorum malorum materia, quæ sese tandem proditura sit.

Curatio.

Medicamentæ sint vacuatiæ, & yniuersalẽ caco-
chymia, & particularẽ è capite: vtraq; sanẽ tã-
to leuiora, quãto infantium corpuscula ob mollietẽ
sunt magis dissipationĩ propriẽ substantiẽ & excremen-
torum opportuna. Illa sint exẽpli gratia mel rosat. \mathfrak{z}
 \mathfrak{j} pondere, propriã vrina ad tria aut quatuor co-
chlearia, manna & syrupus ros. laxatiuus \mathfrak{z} \mathfrak{j} pon-
dere. Hæc topica sint, tum mollientia durã asperãq;
scabiẽm vt facilius decidat, tum detergentia cras-
sam lentamque pituitam & falsam cuti faciei &
fronti impactã, siccantiã deniq; digerentiãq; serosã:

Exemplum.

\mathfrak{z} terebinth. nouies aut decies lotã in aquã ro-
sar. \mathfrak{z} iij butyri recentis \mathfrak{z} ij salis vsti \mathfrak{z} j lithargyri
vel cerusæ \mathfrak{z} ij vitel. ouor. duorum, olei ros. & succi
mali citrij, vel limonij vel arancij acidi, ana \mathfrak{z} j β
fiat linimentum. vel

& axungia suilla \mathfrak{z} iij terebinth. abietinã vt su-
pra lotã & butyri recentis ana quart. β salis albi &
sulph. viui ana \mathfrak{z} β albuminã ouorum duorum, fiat
unguentum.

Huic etiã curationi deriuatio pituitæ à capite
per phœnigmm scapulis & collo inductum mul-
tum conferat, sicuti & recta nutriceis dixta atque
purgatio phlegmagoga.

De hydrocephalo.

Hydrocephalos tumor est capitis sapius aquo-
sus, aliquãdo etiã feculentus & cruore liue-

scēte dilutus, nomen à parte affecta & frequētissima causa fortitus. Oritur aliàs à causa euidenti, vt dura tractatione capitis ab imprudenti obstetrice, cū infantulus in lucem proditurus est, vnde venulæ vel diuelluntur vel dilatantur, aliàs ab intēna tantū & serosa sanguinis substantia plurima, per diapedesim sensim effusa.

Quatuor sunt ex sede diuersa desumptæ differentię. Prima cū est sub cute: secunda sub pericranio: tertia sub crānio: quarta inter membranas. Mihi quidem anno 1597. interiorem hydrocephalum in puero trienni videre contigit, qui ingenti aquarum mole futuras capitis longo inter se dissidio distraxit, ideoque ab obitu plures quam libræ quatuor aquarum purissimarum apertō crānio ab egregio Doctore Turqueto dimanarunt.

Interiores hydrocephali incurabiles sunt: externi curabiles, tum pharmacia, tum chirurgia. Medicamenta quidem sunt calidā siccaque & tenuis substantiæ & parumper astringentis, ob venarum laxitatē, & cerebri principatum, eaq; vel liquida vel media, vel solida forma. Ad liquidam refertur lotio, vel fottus, cum spongiis recentibus ex decocto calidarum plantarum, in lixiuio cineris sarmentorum, vel thymali. Media constet ex oleis calidis & digerentibus & mixto similium puluere. vt

℞ olei laurini & costini ana ℥ ij olei de spica & de lateribus ana ℥ j sulphuris viui, salis communis & aluminis vstorum ana ℥ ss cineris ilicis ℥ ij terebinthin. ℥ ij fiat vnguentum, & aucta puluerum dosi emplastrum.

Chirurgica remedia sunt, tum cucurbitulæ cum scarificatione, tum phœnigmi, tum cauteria potentialia,

Galia, vt ad occiput & ad sinciput, in coitu futurarū coronalis & sagittalis, sed pharmacia pueritiæ feretior post leuē vacuationē, qualis antea exposita est in achoribus.

De phtheiriasi.

Phtheiriasis est affectus pedicularis, ^{pediculi} enim pediculi sunt, scilicet bestiolæ parvæ, in cute altius nascentes præsertim pilosa vt capitis, superciliorum, ciliorum, axillarum, pubis, sicuti in cutis superficie excitantur pulices nigræ salaciores acrius ferientes.

Affectus autem est symptoma secundi generis, nempe excrementum totius substantiæ. Pediculorum differentiæ sunt tres, à loco & figura. Omnes quidem fere albi sunt : sed quidam magis teretes in capite & barba nascentes, qui pediculi priuatim dicuntur : hi cum parui sunt, lendes vocantur : Alij latiusculi sunt, hinc lati nuncupantur, in pube & axillis frequentes, à quibus ægerrime cum auellantur, feri vocati sunt. Alij denique exigui peneque imperceptibiles, cutemque sinuosis cuniculis fodientes, cirones appellantur.

Porro symptomatis huius morbus author, est cutis obstructio exigua, ex qua putredo generationis eorum proxima materia est. Nam fuliginosis cohibitis excrementis, alienus in humoribus accensus calor easdem putrefacit. Vnde in venis febris, in cute, pediculi.

Tres sūt generationis pediculorum causæ: vna est materia, scilicet sordes redūdās ex tertia coctione, porosque cutis obfarcians. Porro colligitur sordes

hæc, vel ex humore calido humidoque vt sanguine pituitoso, aut ex pituita insipida dulciue, qualis puerorum est sæpius & mulierum, non ab acri bile aut acida, acerbæ melancholia. Propria tamen magis materia teretibus pediculis, est sanguis pituitosus, latis pituitosa & glutinosa, cironibus serosa caco-chymia. Causa remota est, vel victus calidus humidusque & excrementitius vt ex fructibus horariis, præcocius & ficibus, vel ex crudioribus cibis vt leguminibus, caseo, lacticiiniis, castaneis: vel certe intemperies viscerum humidior similem proferens sanguinem & aliquando cachexia partis allapsam etiam vtile alimentum corrumpentis, Vnde duplex origo symptomatis huius colligitur, vna rarior per idiopathiam: altera crebrior per sympathiam totius corporis.

Causa efficiens putredinis est calor putridus & obstructio pororum cutis à sordibus istis putrescentibus. Symptomata phtheiriasim consequentia sunt, molestia & scalptus ex morfu, indeque vigilæ & aliquando virium collapsio, marcor & interitus.

Signa demonstratiua causarum, ex temperie propria, & antea acta vita ducuntur, vt ex vitiosis esculentis & potulentis, neglecta corporis munditie, cultuque & vestium mutatione, vt in pauperibus & mancipiis in triremibus vinctis, iisque qui lanca veste religionis causa vtuntur.

Prognostica signa sunt salutis: nisi forte cachexia adsit totius corporis & viscerum, quæ mortem tandem inferat. Breuis quoque curationis sunt, si ex idiopathia: longioris si ex sympathia hoc symptoma ortum sit.

Curatio-

Curationis pediculorum ex idiopathia triplex est indicatio, relaxatio pororum cutis, deterfio sordis, & pediculorum genitorum necatio: hæ indicationes tres sub iisdem remèdiorum formulis lotionum & linimentorum coniunguntur, quæ rasæ prius pilis vsurpètur. Porro lotiones illæ & linimenta cōstant medicamentis salsis, acribus, amaris communiter privatim tamen necant pediculos capitis semen staphidis agricæ contusum & affricatū capiti: latos argentum viuum siue parti affectæ siue distantiori appositum: cirones muria & acetum.

Exemplum lotionis sotosque relaxantis poros detergentisque pituitam purem, & pediculos necantis.

℞ radic. aristol. rotundæ, gentianæ, enulæ camp. quart. s. folior. betæ, absinthij, tanacetij, abrotani, sabina, calamint. nepitæ & persicariæ vtriusque an. m. j flor. centaurij minoris p. j lupinorum; seminis staphidis, & raphani an. ʒ j coquantur in lixiuio cinerum brassicæ, in quo dissolue salis & aluminis ana quart. j hoc decocto lauetur aut foueatur caput tōsum, vel pctius rasum, bis quotidie & ante pastum.

Exemplum linimenti similis.

℞ ol. amygd. amar. absinth. & persicariæ an. ʒ ij ligni aloës magmatis rhabarb. agarici villioris pulpæ colocynthidos; salis vsti, staphidis agricæ, coralli, scordij ana ʒ s fiat linimentum sine cera instar nutriti, quod applicetur multum & duriter fricando, & statim post frictionem. vel

℞ aloës & myrrhæ ana ʒ s dissolue cum sufficienti quantitate aceti instar linimenti.

Vnguentum pro feris pediculis.

℞ ol. communis vel amygd. amarar. ʒ iij axung.

I i j 3

veteris & rancide ꝯ ij mercurij depurati: misce diligenter & applicetur parti rase, vel illinc potius cingulum lineum quod circumferatur caræ nuda.

Lotio pro cironibus.

Ꝛ aquæ decoctionis piscium salitorum vel muriæ q. s. fiat crebra lotio.

Quod si cacochymia iuncta sit, vel ex prauitate viæ, vel ex viscerū intemperie, præcautio illius præponenda, primū ex victu euchymo cacochymia contrariio, cutis deterfione per balnea, frictiones, & vestiū linearū crebræ mutationes: deinde per purgationem humoris pituitosi crudique: postremo ex viscerum intemperiei curatione. Diætæ autem & purgationis materia atque alterationis mox exponenda est capite sequenti de alopecia & ophiassi.

De pilorum vitiiis.

Pilli, corporis humani partes sunt, (non quod uiuant: sed quod in eo naturaliter contineantur,) terræ, frigida siccaque ob materiam, graciles & longæ ex cute erumpentes. Pilorum generatrices causæ sunt tres: efficiens duplex, tum calor naturalius singularum corporis particularum, nutritio- nis, eiusque excrementorū secretionis author: tum spirituum calorisque fluētis impetus eadem excrementa in cutem exigentis. Materia est duplex, una excrementū fuliginosum nutritionis crassius: tenue enim facile transpirat: altera glutinosus humor, qui cuti subest, & glutinis instar fuliginem connectit, quæ alioquin non conglutinetur in pilorum materiam, porosque obfarcit, ne eadem fuligo tota digeratur. Causa sine qua non, sunt meatus occulti cutis temperatæ. Nam in molliori, sicuti in recenti,

recenti caseo facile & repente conuiuent: in duriori non aperiuntur, vt in vola manus & planta pedis. Sic squammosi pisces & serpentes, ostrea, & testacei pisces pilis carent, sicuti neque hyemalis neque palustris humiditas herbosa est: sed veris temperies vbi iam hyemalis humoris redundãtia absorberi coeperit. Cæterum, ex pilis alij sunt congeniti à facultate procreatrice vt in capite, ciliis & superciliis, ob maiorem ornatus & integumentum necessitatem: Alij materiæ & temperamenti humidi in siccius acriusque mutatione sequuntur, vt qui in mēto, pube, axillis, ano, crurib', brachiis & thorace succrescunt. Sic ex stirpibus aliæ agricolarum industria, aliæ sponte sua & solius naturæ vi ex terra prodeunt.

Differentiæ pilorū triplices causas sequuntur. Nā in calida siccaque natura multi magnique & crassi pili nascuntur: minus in calida humida, minus adhuc in frigida sicca, minimum in frigida humida vt muliebri. Color quoq; variat ex varietate materiæ & temperamenti. Niger enim fit à deusto vapore omninoque in fuliginem verso: flauus à vapore minus tosto: ille nigræ bilis, hic flauæ est excrementum: albus fit à pituitæ vapore. rufus à mixto pituitoso & bilioso: hic enim medius est inter flauum & album. Figura aliàs recta, aliàs crispa est. Hæc nascitur ob siccitatem vaporum materiæ, eiusque ab aëre exsiccationem, vel ob eorundem vaporum paucitatem cutem ipsam non nisi obliquis foraminibus aperiendum: vel certe ob cutis ipsius duritiem prohibentis rectam eruptionem materiæ: vel denique ob vtramque causam: tum imbecillitatem seu paucitatem exhalationum, tum duritiem, & densitatem ipsius cutis. Hæ sunt

triplices pilorum differentia ex discrimine materiae & efficientis causae, id est temperamenti, caloris nativi & meatuum cutis. Itaque eadem differentia variant pro ætate & regione, à quibus potissimum temperies mutatur. Sic habita ætatis ratione pueri pilis illis aduentitiis sunt nudi, quod nec meatus in cute illorum sit peruius ob mollitiem, nec fuliginosum excrementum insigne, ob calorem mitiorem. Puberibus ad 14. annum parui & exiles: iuuenibus multi validi magni sunt, ob meatuum amplitudinem præ caliditate & siccitate, indeque vaporum copiam. Pueris etiam insiti, sunt magis rufi: iuuenibus nigri: Ex regionibus quoque discrimen sumitur. Incolæ enim calidarum & siccarum, & meridionales fere omnes ut Æthiopes, Arabes, Indi, Ægyptij, Hispani nigros, breues, & crispos edunt. At qui frigidas humidasque incolunt, ut Ilyrij, Sarmatæ seu Poloni, Germani, Scythæ, Angli, Flandri, graciles, longos, rectos, rufos. Qui verò temperatas, plurimos longissimos & robustissimos edunt.

Vitia pilorum sunt quantitatis & qualitatis. Illud defectus siue diminutio & raritas, hoc coloris mutatio dicitur. Defectus principes differentia duæ sunt. Vna secundum naturam, Græcis φαλάκρωσις, Latinis caluitium dicitur: plerisque senescētibz & in sinipite familiare. Aliæ contra naturam sunt tres: vna sine area effluuium vel profluuium pilorum dicitur, Gr. vocāt τεχάρ πείουλας, cum ex capite aut mento aliisque partibus pilosis, exceptis ciliis & superciliis, pili sensim decidunt & æqualiter rariores euadunt. Aliæ duæ cum area fiunt, quæ si sine certo ordine & figura serpat, alopecia

pecis vocabitur, à vulpe huic symptomati in cute obnoxio: Sin certum ordinem & figuram seruat, ophiasis dicitur. Incipit enim hæc ab occipitio duorum digitorum latitudinem non excedens, serpitque per tempora ad frontem vsque, vbi fines eius serpentis instar committuntur. Atque hæc duæ contra naturam differentia menti & capitis sunt propria: sicuti effluuium harum partium & reliquarum quæ pilosæ sunt, cōmunes. Vtræque species differentias habet non solum à diuersa cacochymia specie, pilorum radices erodentis (de quibus postea) sed à tempore etiam, vt vel incipiens tantum vel facta iam sit vel etiam iaueterata. Isti pilorum affectus morbi non sunt (cum pili partes non sint viuentes, sicuti neque folia aut fructus arborum) neque etiam causa morbifica: tametsi enim pilorum casum in ciliis superciliis & capite morbus ex accidenti sequatur, nullus tamen in barba & pube axillis fit. Symptoma igitur est tertij generis in qualitate scil. mutata. Pilorū quidem symptoma quod effluuiū dicitur, oritur, tū à laxitate pororum cutis, tū ab inopia alimēti, idq; ob calidā siccamque intemperie simplicē partis, poros aperientem & digerentem humorē lentum & viscosum, qui cuti substratus radículas pilorum effingit (vt per febres acutas longasque) vel ob siccitatem temperamenti cerebrique contractionem, & recessum à cranio, vnde caluities. Aliæ duæ species, alopecia & ophiasis oriuntur ab intemperie calida siccaque capitis, humoribus acris humorem lentum absumentibus scatente. Tales sunt sanguis corruptus, pituita falsa, bilis flaua, æruginosa, atra. Porro colliguntur hi vel per sympathiam totius corporis, idque

ex prauis cibis, aut ex viscerum intemperie, vt per luem veneream & elephātiāsim: vel per idiopathiā propriamque capitis mentiue cachexiam, vtile etiam alimentum corruptentis.

Signa.

Effluuiū noscitur ex casu æquali & sine area. Causa quoque eiusdē, laxitas scilicet & penuria alimēti, ex prægressa febre lenta longæue. Ophiaxis & alopecia ex area deteguntur: hæc quidem incerto eius ordine, illa ex certo & figura. Causa ex colore cutis glabrata: ex antecedente victu: ex temperamēto totius corporis & capitis innotescit. Cōmune signū vtrique est, quod pili primū maximè extenuentur, deinde excidant. Tum si locus acu cōfigatur, sanguinem aut liquidum aut crassum aut etiam nullum reddit, sed pingue quiddam, lentumque ichorem.

Prognosticum.

Calus pilorum ex se nunquā funestus est, etiam si morbos sequatur: sed indecorus tātum. Defluuium à morbo vt febre sæpius, sine morbo rarius accidit, vt in caluis. Illud omni ætati cōmune accedentibus causis, hoc senili est proprium. Ophiaxis pueris magis est familiaris, & sponte sua sæpe, vel leuioribus remediis curatur. Alopecia adultis, magisque contumax est. Vtraque fit in barba & capite: aliquando etiam ciliis & superciliis tametsi firmitus hærentibus.

Defluuium pilorum curabile est, etiam spōte sua ex bona renutritione, nī sit adsit caloris natui infirmitas, vel ob ætatem senilem, vt in caluitio: vel febrem hecticā, vt in tabidis. In vtrisque enim materia non reponitur. Ophiaxis & alopecia curabilis vtraque.

utraque est, nisi cacochymia ex viscerum intemperie confirmata & incurabili, vt elephanticorum genita sit. A cutis fricatione rubor velox faciem: tardus difficilem: nullas nullam curationem promittit. Quæ enim inueterata est, neque fotu neque frictione erubescere potest.

Therapeia.

DEffluuium pilorum, quod nõ à natura & senio est, vt caluitium, neq; à marcore, vt in tabidis: sed à laxitate pororum est & inopia alimenti, propter febres acutas longasve, curatur duplici scopo, vno astrictionis leuiusculæ pororum relaxatorum, altero deductionis alimenti & sanguinis ad partem cutis glabrata, vnde pilorum restituendorum materia exuberet. Posterior hic scopus comparatur primùm quidem victu sanguinem multiplicante, vt ex alimentis euechymis & temperatis, aëre temperato, exercitatione mediocri, somno longiore, vita hilari & secura, balneis crebris & tepidis, sudore raro, aut nullo: deinde topicis sanguinem ad caput allicientibus, modicè calidis, (ne à calidioribus attenuata allectaque materia discutiatur) hyeme tamē paulò validioribus, vt oleo nardino. Prior scopus expeditur medicamentis astringentibus quidem: sed non validis, cuiusmodi sunt galla, acacia, nux cupressi, balauftia, ne materiam gignendorum pilorum & sanguinem acutè repellant: neve poros viasq; cutis nimis coangustent, per quas excrementa tertiaræ coctionis exhalât, sicq; cumulatæ excrementis illis, cephalalgie & fluxiones in nares, fauces & reliquas partes internas externasq; capiti subiectas cõ-

moucant: sed leuioribus, qualia sunt oleū myrtinū, rosat. omphac. lētiscin. Mixta igitur topicorū facultas sit calfacientium, ad deductionē alimenti: astringentiumq; ad densitatem pororum siue in diuersis, siue in iisdem formulis. Talis est facultas absinthij, tanaceti, abrotani, capillar. omniū, verbenæ, cymarū & granor. myrti, lauri, & hederæ, flor. stœchad. vtriūque, cinerum sarmentorum vitis, brassicæ, radic. cannar. testæ, auellan. & amygdal. mastichis & ladani. Vsurpantur autem commodiūs forma liquida, vel media, qualis est mellis, quæ tamen neq; hæreat neq; obfarciat poros, neq; disfluat: mane & vespere applicanda, idq; ieiuno vētriculo, ne ciborū vapores in cerebrū attrahātur, capillitio per hyemē tantum tōso, ne caput aëris frigore laceffatur & obstupetur: per æstatem etiam raso. Liquida forma vt fots & lotionis cōcinnatur ex decoctione prædictæ materiæ in æqualib. partibus aquæ & vini rubri additi (si pita coctione: fames enim mittit.) Forma media posterius applicanda conformetur ex pulueribus mixtis quadrupla proportione ex oleis prædictis, vt

℥ ladani cum vino rubro in mortario dissoluti: vtrūque. n. calfacit & astringit, & mastich. an. ʒ j ol. myrtini, vel lētiscini vel nardini, in hyeme, ʒ vj fiat vnguentū à quo cera quod emplastica sit abesse debet, vel ʒ pulueris absinthij, abrotani, granor. myrti & iuniperi an. ʒ j olei myrtini triplū, fiat linimētū. vel ʒ cineris sarment. vitis, cortic. cannar. vsti, testæ amygd. & auellan. vstæ an. ʒ β. excipiatur triplo olei alicuius prædictorum. Vstura tenuitatem substantiæ conciliat, repressa interim immodica. astrictione, ideoque ex infusione & decoctione eiusdem materiæ vstæ olea sunt efficacissima, vt

℥ fol.

℥ fol. absinth. abrotani, capillar. omniū, summi-
 atum myrthi ana m. j. baccar. myrti, rosar. flor. stœ-
 chad. vtriusque ana p. j. seminis coriandri præparati
 ℥ β coquantur contusa leuiter omnia in olei & vini
 rubri æquis partibus, ad consumptionem vini. De-
 nique fortiter oleum prædictum exprimatur, &
 seruetur ad linimenti vsum.

℥ ladani, absinth. mastich. ana ℥ β baccar. iuni-
 per. ℥ ij. contusa omnia infundantur quatuor aut
 quinque dierum spatio in oleo ad solem, deinde ex-
 primatur oleum fortiter per linteolum.

Curatio alopecia & ophiaeos.

CVratur utrūq; hoc symptoma diætā, chirurgia
 & pharmacia. Diætā opponatur cacochymia
 quæ ex colore cutis deglabrata & depilatæ, antea-
 cta vita, & ex temperamēto totius, aut partis depre-
 hensa sit. Pharmacia alterās vacuansq; decernatur,
 cum sit intemperies humoralis: vel particularis, si
 capitis idioꝑathia sit, eiusque intemperies cache-
 ctica, frugi sanguinem corrumpens: vel vniuersalis
 etiam cum sympathia est totius corporis, aut ex vi-
 ctu prauo, aut ex viscerum intemperie. Vacuatio
 vniuersalis constet primum quidem phlebotomia,
 cuius infantia incapax est, etiam si plethora pura im-
 puraque adsit, deinde purgatione cacochymia, id-
 que per pilulas potius, ob capitis distantiam à quo
 humor reuellendus est: à quibus tamen pueritia ab-
 horrere solet. Biliosa cacochymia remouebitur per
 pilulas aureas, addito diacrydio, electario de succo
 rosar. diapruno solutiuo, rhab. syr. rosato, vt atrabi-
 laria per pilulas de fumaria, & de lapide lazuli; ad-
 dito veratri nigri momēto, vt ℥ β electar. diasenna,

diacathol.& confect. hamech. Pituitosa purgabitur per pilulas coctias & de agarico per electar. diaphenic. Præmittenda est eiusmodi validæ purgationi præparatio duplex, vna intestinorum per clysterem mollientē, & per lenitium bolū superioris vētris: altera humoris per alterates syrupos & apozemata contraria: Sed validæ purgationis vsus fit in adultiorib^{us}: at in infantib. clemētioris per infusum rhei, agarici, sennæ aut per syr. ros. & de cichorio cōpositū cū rhabarb. His purgationibus vniuersalib. hidrotica decocta vtiliter subiungantur, vt guaiaci in pituitosa, chynæ, falsæ parill. & ligni sassafras in calida vel biliosa vel atrabilaria cacochymia. Est altera quoq; vniuersalis akeratio post vacuationem necessaria ad tollendā viscerū intemperie per balnea contraria, tū naturalia, tū artificiosa, & electaria solida mediāq; assumenda (tabellas vocant & opiatas.) Particularis vacuatio, siquidē intemperies fiat per sympathiā, multiplex est pro variis affectus temporib. Nā in principio & augmento deriuandus est humor affluēs per os & nares, & repellendus leuiter, atq; digerendus qui iā affluxit, per topica in defluuium mox dicta. In statu autē sola resolutio vsui est, (sicuti etiam vbi idiopathia est) per medicamenta tum pharmaceutica, tum chirurgica. Hæc sunt ratio pilorum, frictio dura capitis, cōpunctio, scarificatio cucurbitulæ, ex quibus ratio quidem vel crebrior sit vt quotidiana, matutina & vespertina: vel rarior pro affectus magnitudine varia. Frictio fiat ex rebus asperis durisq;, vt ex linteo nouo, osse sepię, pumice, foliis vrticæ: mollior in leuiori, durior in cōtinnatiori affectu vsurpetur, & donec inde cruor moueatur; eaque quotidie duplex, mane & vespere.

Compun-

Compunctio fiat per plures acus simul alligatas ubi tenuis magis est materia: at in crassiori scarificatio & cucurbitulæ vsurpētur. Remedia pharmaceutica sint acri natura in tertio gradu & tenui substantia; quæ altam partem subeant, indeque caco-chymiam tenuando in vapores versam discutiant: vitanda tamen sunt acriora in quarto gradu, quæ cutem vrant & præter modum exsiccant, pilorumque gignendorum materiam dispellant. Sic imbecilla quæ nihil iuvant, remouenda sunt, moderata retinenda, quæ cutem modicè calfaciant, & veluti quandam pruriginem excitent. Sunt tamen horum gradus tres, tribus horum affectuum differentiis aptādi. Nam malignis, vetustis & contumacibus fortissima: leuioribus & recentibus leuiores: mediocribus media adhibenda sunt. Harum differentiarum signa captanda sunt, tum ex colore partis affectæ, post frictionem. Nam si erubescat, & post punctionem, sanguinem emittat, leuior est: contra si color non mutetur, aut sanies pinguis emittatur: tum ex tempore durationis: postremo ex caco-chymix specie colligenda, vt ante dictum est, ex antea acta vita, temperie ægri, & ætate. Leuiores sunt adeps asserinus, gallinarum, ranarum axungia vetus, aut de-rasa ex axibus rotarum, sæx ampullæ lucernarum aut candelabri, pix liquida aut oleo soluta, oleum anethini, de stœchade, thus aceto solutum, testæ vstæ auellandarum & amygdalarum amararum, arundinis cortex & radix vsta, diachylum ireatum, & ceratum de Vigo oleo soluta. Mediocria sunt cortex vstus vtriusque ellebori, radix ari & serpentar. semen eruce, cinis muscarū, apū, muriū, scarabeorū, ostreorum, pisium salforum, stercora volatiliū,

olea laurinum, anethin. terebinthinum. Vehementissima sunt sulphur, euphorbium, cantharides, thapsia, semina nasturtij, sinapi, tithymali cineres.

Horum omniū puluerabilium pulueres miscētur proportione tripla vel quadrupla prędictis pinguibus, vt oleis & axungiis. Vsurpātur enim forma duplici tū liquida, vt lotionis & tū solida: sed magis inefficaci quia celeriter diffluit: & media, vt vnguentorum. . . Dura autem ineptior est quod emplastica sit, potiusq; offarciar, quā subeat aut aperiat poros: denique vtraque bis in die illinenda, pręgressa toties rāsione & fricatione.

Exemplum leuium topicorum.

℥ olei anethini, vel de stœchade, vel de amygd. amar. & axungię veteris suillę an. ʒ j β puluer. rad. cannar. & testę amygd. amar. & auell. vltę an. ʒ ij seminis erucę ʒ j misce, & fiat vnguentum.

Exemplum mediocrium.

℥ ol. tereb. & laur. an. ʒ j β picis naualis oleo liquatę ʒ j seminis erucę, ciner. muscar. vel apum, & capitū pisciū salitorū an. ʒ j β stercoris colūb. & muri an. ʒ j fiat vnguetum sine cera, quia emplastica.

Exemplum vehementissimorum topicorum.

℥ ol. de laterib. & de petra, vel costini, vel de castoreo ana ʒ j axungię veteris, ad solem lotę ex aqua vitę ʒ ij gummi eleuni ʒ β. liquefactis omnibus, probeque super cineres calidos mixtis, adde euphorbij & thapsię, sulphuris & seminis sinapi ana ʒ β cantharid. ʒ j fiat vnguentum. Quod, si a vehementioribus topicis cutem exulcerari contingat, lenibus medicamentis illinatur, modicè exsiccantibus & astringentibus, vt cerusa & lithargyro solutis oleo rosato, & aceto instar linimenti.

De ramicum differentiis.

RAmicis vel herniæ duo sunt genera, bubonoccele, & oscheoccele. Vtrique tum à parte affecta, tum ab affectu ipso inditum nomen est: *βουβων* enim inguen, *ὄρχις* scrotum Latine significat, sicuti *κῆλη* tumorem, earum præsertim partium. Ergo bubonoccele inguinis, oscheoccele scroti tumor est. Vtriusq; speciei multiplices sunt differentiæ, pro discrimine causarum coniunctarum & substantiarum tumefacientium, quæ vel aliunde illapsæ sunt, ut est intestinum & epiploon, aut ibidem genitæ ut est aqua, flatus, caro, varix; Bubonocceles autem duæ tantum sunt, epiplocele & enteroccele: oscheocceles verò sex, enteroccele, epiplocele, pneumatoccele, sarcoccele, & cirrocele. Ex his tamen quatuor primæ propriæ sunt scroti: reliquæ impropriæ & incurabiles, sed bubonoccele à tumore testiculi sursum in inguē reuulsi distingui debet, sicuti oscheoccele à duplici vel triplici in singulis scroti lateribus testiculo, quibusdā hominibus gēilitio iure proprio, & ab unico etiam sed multo semine turgente.

De causis.

Herniæ specierum causæ antecedentes diuersæ quoque sunt: nam bubonoccele, fit à sola ruptione peritonæi interioris, appareretque tumor in lateribus ossis ischion sensim ex pusillo augescens. At oscheocceles species duæ (epiplocele & enteroccele) præter ruptionem illam, fiunt etiam à relaxatione apophyseos exterioris peritonæi in scrotum descendentis ad deductionem vasorum deferentium & eiulantium. In reliquis duabus, hydrocele & pneumatoccele, nulla ruptio aut relaxatio est.

K k k

Vtramque ruptionem & relaxationem peritonæi mollities & humiditas immodica, vt fere semper in pueris, adiuuat. Causa externa est vehementior quilibet motus corporis vt ploratus puerorum, distensio abdominis, in adultis verò sarcinæ grauioris vel sublatio, vel gestatio, vociferatio, fœtus grandior aut multiplex in scæminis. Hydrocele autem & pneumatocèle ex crudiori sanguine est & nutricum lacte intemperatarum & intemperantium. Stillat enim sensim per diapedesim ex vasis deferentibus, vel ex sublimiori ventre, aut etiam in nutritione testium redundat.

Signa demonstratiua.

Signa diagnostica sunt, enterocèles quidem & epiploceles tumor spõte recedit resupinato corpore, reditque eodem surrecto; sicuti per ventris saginam acrem humidam cibumque flatuosum crescit. Ex intestinis autem solum ileon ex parte dextra & cæcum ex sinistra in scrotum illabitur; sed intestini facilis est reductio leui pressu manus blandoque & cum rugitu, ob inclusos flatus. Epiploï ægra magis est & sine murmure repositio; estque tumor eius magis inæqualis. Contra hydrocèles & pneumatocèles tumor perpetuus est sensimque augescēs. Distinguuntur etiam inter se, quòd hydrocele mollis quidem leuisque sit, nisi ex copioso admodum humore constet, quodque perspicuus sit opposito lumine, nisi sedes eius inter membranas testium abdita sit, aut in scroto propria cystide cōclusa; quòd quidem ex magnitudine & figura internoscitur, vel rotunda in cystide, vel oblonga & ovali in teste: sed pneumatocèle leuior multo est molliorque

molliorque & ex impulsu resonans. At tumor ex sanguine effuso per attritas venas maiori duritie, nigritie, & causa externa contundenteprehenditur: sicuti sarcocoele quoque colore fusco aut simili. Cirsocele denique ex flexibus duris venarum nodosisque & rotundis in scroto & inguine agnoscitur.

Signa prognostica.

HIs omnibus speciebus pueritia omnium ætatum maxime infesta est & præsertim primis quatuor mēsis. ob eiulatus clamosos, mollitiæ tunicarum peritonæi, & crudioris aliquādo lactis vsū. Bubonocoeles species duæ enterocoele & epiplocœle, mulieribus virisque sunt communes: illis tamen rariores ob maiorem peritonæi firmitatem & duritiæ continendo foetui à natura destinataim: sed oscheocœles differentiæ omne sviris sunt propriæ.

Accidūt tamen etiā pudēdis muliebrib. eorumq; ripis hydrocœles. Sinistra enterocœle grauior est dextra, eò quod cæcum crassum sit, & fecibus repletum, neq; omēto ligatū: sed incūbentib. tenuib. intestinis pressum. Omnium funestissima est enterocœle, vbi intestinū aut reduplicatū est, aut fecibus duris obstructū, vt violētius reponendū sit: hoc enim etiam reposito remanens gangræna febrisque singultuosa ægrum rapere solet. Sarcocœlem præsertim insignem & cirsocœlem curari non expedit, neq; pharmacia, neque chirurgia. Enterocœle & epiplocœle in pueris ad pubertatem vsque pharmacia curabilis est: in adultioribus non nisi chirurgia. Hydrocœle denique & pneumatocœle semper quidem pharmacis curabiles sunt, nisi earum materia aut testium inuolucris aut propria cystide circumscripta

fit, vnde chirurgia sola euocari possit.

Therapeia & victus.

IN quatuor primis herniæ differētiis diætā sit calida siccaq;, præsertim in hydrocele & pneumatocele; interdicto omni grauiori corporis motu vt ambulatione, cursu, saltu, ascensu, descensu, statione, clamore, tussi, sternutatione, risu effuso, & ploratu, deiectione violenta alui: manus etiam inter dericiendum si reductum sit intestinum, ad inguina fortiter apprimenda est. Reprimatur etiam animi motus, vt iracūdia, iurgia, vociferationes. Denique decumbat puellulus vel æger lecto molli per spatium quadraginta dierum, quo topicis mox describendis curabitur, ad pubertatem vsque: nam lactantib. sola topica ex vsu erunt, instituto prius nutricum victu, humiditatis & cruditatis experte.

Curatio.

Curatio enterocèles & epiploceles, siue ad bubonocelem, siue ad oscheocelem vtraque pertineat, tribus præcipuis indicationibus expeditur. Prima est repositio intestini vel epiploi in suam sedem, à mutatione situs vtriusq; ducta. Secunda est astrictio dilatati in inguine & scroto peritonæi. Tertia rupti peritonæi vnio & agglutinatio. Porro reponēdū est intestinū vel epiploon corpore resupinato, clunib. sublatis, fœcib. præmollitis idoneo fotu, & manu leuiter & frequenter impellente. Repositū continendum est perisomate, id est subligaculo ex panniculis cannabinis cōparato, inter se ita compactis vt ad inguen durum sit, aliquo ligno vt buxco vel subere aut ferro interposito. Relaxatio coangustatur remediis astringētib. vt fotib. vnguētis, cataplasmatibus, emplastris. Ruptio vnitur tum victu temperato

perato non nimis crasso, ne sit flatuosus, neq; tenui; & medicamentis emplastricis. Vtrumq; tamen medicamentorū genus, tum agglutinātium, tum abstergentium miscendum est in implicitis hisce affectib. ruptione scilicet & relaxatione.

Alstringētiū generis sunt radices symphyti, bistortę, tormētillę, osinundę regalis, folia siagorū, millefolij, pentaphylli, prunellę, polygoni, tapsi barbati, equiseti, bursę pastor. plātag. sumach, lysimachię vtriusque, rubi, lētisci, ligustri, semen rhois obsōniorum, plantago, portulaca, spongia bedegaris, balauſtia, cytini, psidia, gallę virides, calices glandiū, nuccę cupressi, acacia, hypocystis, terrarum genus omne, lanugo salicum & rhei magna, rubigo ferri, & scoria eiusdem, lapis hæmatites, magnes, sorba, mespila, prunella, acini vuz, acetum, oxycratum, vinum tortium, aqua fabrorum.

Agglutinantia sunt, gummi arabicum, ammoniac. tragacantha opopanax, mastiche, thus, manna & cortex eiusdem: aloë, iēthyocolla, pix sicca, terebinthina larigna lota, & abietina: gypsum, farina pistrinalis, amyllum, cochlea cum domo sua trita, lumbrici terrę.

Vsus.

ITaque ex decoctis eorum quę decoqui possunt in oxycrato, vel aqua ferrata fiant fots per splenia inducendi, vel potius per spongiā nouam.

℞ rad. prædictarum ℥j aut s folior. & cymarum prædictarum m. iij nucum cupress. gallę viridis, balauſtior. psidia ℥j ros. rub. pug. j coquantur vt dictum est.

Hoc decocto foueatur pars scroti & inguinis mane & vesperi finita ventriculi coctione & exonerata aluo.

℞. residētia cōtusam & cribratā, eiq; adde farinæ oryzae & fabarum an. quart. ℥ boli armen. sanguin. draconis, mastiches, thuris & gūmi arab. ana ℥ j. ol. lentiscini, omphacini & myrtini ana ℥ ij. fiat cataplasma applicandum tepidè post fotum eidem regioni super stupas cannabinas bene pexas. & vino tortiuo imbutas, expressasque.

Olea quoque balsamina vocata post fotum ante cataplasmatismis appositionem, vel etiam per se validissimè agglutinant rupta vulsasque: quale hoc est,

℞. folior. viridium vtriusque symphyti, plantagin. equiseti, millefolij, pentaphylli, verbenæ, hyperici an. m. j. contusis omnibus adde aquæ vitæ ℥ viij. macerētur dies quatuor: quinto exprimatur succus ex iisdem prius tepesactis illico dissolu. olei optimi loti cum aqua ros. ℥ ij. coquantur in vase duplici ad consumptionem dimidiæ partis: ac tum adde terebinthinæ bene lucidæ ℥ j. percoquatur ad consumptionem succi: coletur & recondatur in ampullam vitreā, qua locus affectus mane & vesperi perfundatur. Ex hoc oleo vnguenta & emplastro in priinis efficacia addita puluerū dosi idonea comparantur.

℞. olei vel balsami præscripti ℥ j. thuris mastichis ana ℥ j. sanguinis draconis, scorix & rubig. ferri, lapidis magnetis ana ℥ ij. ceræ albæ & resinæ ana ℥ ij. fiat vnguentum loco cataplasmatismis applicandum post fotum: aucta verò puluerum dosi fiant emplastra, quale etiam hoc est,

℞. lumbricor. terrestrium vino albo lotorum & contusorum ℥ j. contusarum cochlearum cum suis bolutis

bolutis \bar{z} iij. macerētur diebus quatuor in olei optimi fb j. deinde ebullitione facta, exprimatur oleū, cui adde seui arietini & picis nigre ana quart. j. resinæ \bar{z} ij. gummi ammoniaci & opopanac. aceto solut. ana \bar{z} β thuris mannae, & corticis mastichis, sanguinis draconis, boli armenae, spongiae bedegaris, rubiginis & scoriae ferri, lapidis magnetis ana \bar{z} ij. postremo coquantur in emplastric. cera addita. Simile est in pharmacopoliis emplastrum dictum contra rupturam. Emplastrorum autem usus post finitos fatus olea vnguenta cataplasmata, à quindecimo die ad quadragesimū cum subligaculis & sine mutatione cōtinuabitur. Interna remedia astringentia in pharmacopoliis prostant, trochisci de terra sigillata de charabe, quibus uti licet \bar{z} j. pondere, cum vino tortiuo. Similes sunt conseruae symphyti, rosar. absinthij, & cydonior. ex quibus, & mixtis pulueribus fiant condita & opiata. vt

\mathcal{R} . conser. antiquae rosar. & radic. symphyt. ana \bar{z} ij. conditae carnis cydonior. \bar{z} j. gummi tragacanthi, mummiae coralli rubri, terrae sigil. ana \bar{z} j. limatur. chalybis preparatae lapidis magnetis ana \bar{z} ij. cum sacch. rosato fiat conditum : vel addito syr. de rosis siccis fiat opiata, capiat \bar{z} ij. singulis matutinis si paulo grandior sit puer, superbibendo parum vini tortiui.

Potiones hae laudantur à peritioribus ex succo vtriusque iaceae ad \bar{z} j. vel ij. cum momento vini albi : ex succo rad. symphyti maioris, sigilli Salomonis cum eodem vino. Omnium est efficacissimus succus herulae herniariae dictae aliquoties vino albo affuso expressus, nouemque dierum spatium percurare proditur affectum nunquam redi-

turum. Ex iisdem succis addito saccharo, iulepi fiant aut syrupi pueris gratiores, sicuti & pulueres eiusdem materiæ ꝑj. pondere pueris dantur iucundissimè cum lacte nutriticis ex cochleari, vel cum pulicula iisdem grandioribus.

Hydroceles & pneumatocces diætâ calidior sicciorque dolicis & ablaetatis pueris primum remedium est (fere enim hydropis imminentis vtraque index est) ideoque præter reliquas duas species ante curatas, his duabus motus omnes corporis conueniunt augendi caloris natiui causa. Vtriusque curatiuæ indicationes duæ sunt, vna causæ antecedentis, altera causæ coniunctæ, id est morbi. Illius reuulsio debet esse prior, tum per clysteres & purgationes hydragogas puerorum vt dictum est non amplius lactantium, tum per decoctum hidroticum vt guaiaci in adultioribus & salsæ parillæ vel chinæ, vel ligni sassafras in iunioribus, tum per balnea naturalia vt sulphurea, nitrosa, bituminosa & similia arte comparata ex liquato sale marino, sulphure, bitumine, sale petræ in decocto plantarum calidarum. Altera vacuatio est causæ coniunctæ, constatque resolutione & exsiccatione per medicamenta insigniter siccantia. Tale est acetum præsertim coctum cum plantis calidioribus vt organ. calaminth. pulegio, hyss. baccis lauri iuniperi, floribus roris. stœchados. Tale est sal vstum, nitrum, & loco eius sal petræ, alumen vstum, sulphur præsertim viuum, cineres plantarum vstarum præsertim siccarum vt brassicæ, fabaceorum truncorum & siliquarum, ilicis, sarmentorum vitis, præsertim plantarum causticarum vt tithymalorum, & lixiuia ex illis cineribus confecta,

confecta, stercora animalium, olea de lateribus, de petra, de lauro, de spica, de costo, de euphorbio.

Hæc autem vsurpantur, fofus, litus, vnguenti, cataplasmatibus & cerati specie. Fofus duplex est, ficcus & humidus, ille aptior, vt

℞. fufuris macri, feminis miliij, falis, auenæ ana quart. j. sulphuris, baccarum iuniperi laurique ana p. j. contundantur omnia, & includantur facculis lineis duobus quibus foueatur sæpe & diu calidè scrotum, & facculi viciffim apponantur dum refrigerato vno alter recalefcant: fed materia hæc cum pauco aceto frixa in sartagine multò fit efficiacior, lidem facculi vel fabulo vel arena vel cineribus calentibus farcti parti vtiliter applicantur. Fofus liquidi potentia, actusque calidi & maxime ficcantes ita comparantur.

℞. aceti fortiff. ℥ ij. in quibus bulliant rad. pyrethri, semen staphis agricæ, viticis, baccæ iuniperi, lauri ana ʒ β fol. lauri, hederæ, summitat. thymi, lauendulæ, rorism. ana p. j. hoc decocto foueatur cum fpongia pars affecta. Idem decoctum fiet ex lixiuio vt ex cinerib. farmentor. in quo fimilium plantarum partes coxerint, falque, sulphur, aut alumen liquatum fuerit. Linimenta ex oleis prædictis post totum admouenda aut ex iisdem vnguentis, addito puluere metallicorum vstorum aut cinerum hoc pacto.

℞. olei rutac. & laurini ana ʒ ij. ol. petrol. ʒ j. axungie veteris & falis ʒ ij. ceræ parum, fiat vnguentum. Hinc quoque emplastra concinnantur, vt.

℞. olei de terebinthin. de costo & de spica

ana ꝑij. terebinth. ꝑij. salis petræ & ciner. ficuluci ana quart. ꝑ ceræ albæ ꝑiiij. fiant magdalia.

Catasplamata denique concinnantur tum ex residentia plantarum calidarum coctarum, tusa cretaque: cui farinæ digerentes vt orysæ, lupinorum, lentium, cineres prædicti, axungia vetus & olea prædicta admisceantur. Vtilissimum est ex stercore vaccino mixtis cineribus digerentium plantarum aut seminibus vt baccis lauri, iuniperi, seminibus rutæ, cumini, viticis, cubearum. Quod si curatio hæc irrita sit quia materia cystide comprehensa, vel membranis testium coercita sit, tum ad chirurgiam decurrendum est, quam Paul. lib. 6. Celsus & Guido de Cauliaco accuratissime persequuntur.

De pustulis & maculis cutis.

Complura sunt cutis vitia, partim ex pustularum, partim ex macularum genere variis distincta nominibus Græcis, Arabib. Latinis, barbarisq; quibus anceps & dubia sit affectuum intelligentia & curatio. Maculæ igitur vitioso colore constant supra cutem non extâtes: pustulæ verò cum minuto tumore. Omniū causa proxima est vitiosus humor, qui que assimilari nequit, aliquâdo etiâ contagiosus magis minusve pro putredinis & corruptelæ modo.

Antecedentes causæ sunt, per quas huiusmodi succus vitiosus vel colligitur in corpore, vel ad cutem transmittitur, vel ad eandem attrahitur, vel sub eadem retinetur. Colligitur autem, vel ex cibis caco-chymis, vt post annonæ caritatem & famem: vel ab intemperie viscerum, hepatis lienisque & vetriculis & ab

& ab interiori cacochymia frugi succos corrūpente. Transmittitur à viscerū facultate expultrice, quæ vel copia vel qualitate lacescit, maximè in vere, cuius tepore fusi, liquatiq; sponte sua cōmouentur. Attrahūtur ab eodē veris tepore. vnde vernis morbis pustulæ ab Hipp. ascribuntur tertio aph. aph. 20. Eadem vis est exercitationis balneique. Retinentur aliàs ob astrictionem à frigore, vt per hyemem: vel propter obstructionem à sordibus, neglecta munditie & vestium mutatione, sensim pullulantibus.

Signa.

Macula Græcis ἀλφός, Latinis vitiligo in cutis superficie, sine squama, asperitate & exulceratione excitatur. Estque duplex, vna alba, altera nigra. Illa alba rursus duplex est (Albaras Arabib. vtraque dicta) vna ex pituitoso sanguine prouenit, subaspera, similis quibusdā lactis guttis dispersis, colore albicāte, sine pilorū mutatione, quia superficiaria est, generisq; nomē retinet, & vitiligo dicitur. Altera fit à pituita lenta & viscida, ideo albidior, & quia profundior est cū albedine pilorum, λεύκη priuatim dicitur. Nigra autē μύλας Græcis, & Arabibus morphea dicta, colore nigro & vmbre simili, ab humore melācholico fit. In macularū genere sunt lētigines à lentis similitudine, & ἐπιλείδες inustæ à sole, & rubra macula faciei, vulgo chirurgorum dicta gutta rosæ. Pustularum differentiæ principes sunt, quod aliæ humidæ, aliæ siccæ, aliæ exiguæ exanthemata dicuntur: aliæ maiores ecchymata vocantur. Illius generis sunt hidroa: huius verò variolæ, morbilli, pruritus, scabies, impetigo, phora, lepra, elephas, & his quoque leniores, psydracia, epinyctides, phlyctænæ. Huius generis complures

pustulæ infantibus plurimum molestæ esse solent.

Therapeia vniuersalis.

Communis therapeia macularû & pustularum, cû si sint criticæ, in præseruatione & curatione diuidatur. Illa incrementum prohibet numerumq; hæc factas obliterat. Illa. n. tum diætâ instituit interiori cacochymia contrariam, tum eandem vacuat & per phlebotomiâ in adultioribus tantum, & per purgatione in omni fere infantia & pueritia parte.

Curatio cõstat vacuatione causæ cõtinentis, cãq; vel obscura, vel manifesta. Illa resolutio dicitur, per relaxãtia poros, attenuãtia & tergentia humorem crassum lentumq; & digerẽtia. Eiusmodi sunt fots & lotiones ex decocto plantarum calidarum. Manifesta fit per apertionem pustularum maiorum, quarum est copiosa materia. Quod si pustulis iuncta sit phlegmone, refrigerãtia: sin maturãda eadẽ sit, peptica vt tetrapharmacû & thus, topicis iũgẽda sunt. Si vlcuscula deniq; iũcta sint, siccantium mixtio erit necessaria, vt metallicorum vstorum lotorumque.

Particularis curatio macularum.

In hac particulari therapeia hoc obseruandum, quod ex maculis istis ἀλφες & μέλας semper curabiles sunt: at λευκὴ si acu puncta non sanguinẽ, sed humorem albidum lentumque emittat, & si durius perfricata nõ erubescat, incurabilis est: indicat enim partis λευκὴς seu propriũ alimentũ corrumpentem.

Vitiliginum, id est albarum macularum præseruatio duobus instrumentis constat, diætã, redundãti pituitæ cõttraria, id est calida siccaque: & vacuatione pituitosæ interioris cacochymia, atque viscerum intemperici, vt ventriculi hepatisq; temperatione.

Vacuatio

Vacuatio autem illa, aliàs sola purgatione constat, aliàs phlebotomia, etiam si pituita sanguini mixta est, etatque huius remedij non impotens. Purgatio phlegmagoga est, ex pilulis de hiera, de agarico, ex electuar. diaphœnic. & ex agar. trochiscati & senarum infusione. Curatio absoluitur vacuatione causæ coniunctæ per cutem & partem ipsam, non manifesta quidem vacuatione (non enim humor per substantiam part. s. foras transfundi potest.) sed obscura per digerentia, attenuantia tergentiaque topica, pituitam crassam & lentam, cutisque poros laxantia: validiora quidem in inueteratis, inualidiora in recentibus: leuiora quoque in alba macula & nigra: validissima in *λδκκ*: sed antequam vsurpentur topica hæc præseruationis remedia vsurpanda, locus quoque frictione incalescat prius & relaxetur, pilis tonsis vel potius rasis, vt profundior promptiorque sit topicorum penetratio.

Leuiora sunt farina hordei, fabar. cicer. lentium, lupinor. rad. cucum. agrest. anchusæ, dracunc. serpentariæ, erythrodani, cyclamini, veratri vtriusque, cepe. amygd. amararum. Media sunt, semen sinapi, nasturtij, crucæ, vrticæ: validissima sunt metallica, vt sulphur, atramentum sutorium, arsenicum, sandaracha, alumen, nitrum, calx.

Quibus omnibus vti licet forma tum liquida, vt lotionis & fots; tum media, vt vnguenti: vtraque enim penetrantior est quàm solida.

Exempla topicorum compositorum.

℞ seminis raphan. crucæ, sinapi an. ʒ β contusa omnia concorporêtur cū acetò, & applicêtur parti post fotum aut lotionem relaxantem: vel cepa cō-

tusa applicetur post frictionem ad solem. vel

℞ aurip. rub. ʒj β, excipiaturo succo fumariz, & applicetur. vel

℞ tartari & fuligin. furni ana ʒj salis nitri, sulphuris viui ana ʒ β auripigmenti, aluminis sicci, & veratri vtriusque ana ʒ ij cum succo fumi terræ, fiat lini nentum.

Decoctiones & fots fiat ex decoctione rad. prædictarū in lixiuio sarmentorū & fol. absin. tanacetu, abrotani, fumariz, mercurial. betæ, fol. centaur. minoris, chamæm. Omnia sunt bis in die nocteque applicanda, & toties abluenda eodem decocto. Quod si his topicis nō sanetur locus, applicetur cātharides cū fermento & aceto, & vesicularū fluxus alatur superpositis foliis caulium. His phœnigmis nō proficientibus scarificari locus possit, nisi cicatricum deformitas metuatur. Idem sunt scopi curationis, eademq; remedia eius quæ *μῆλας* dicitur, topica nempe: nam purgatio melius instituatur ex longo vsu epithymi in aqua casei, utpote illius ʒ ij vel iij. huius lb β. Quod si curatio desperata sit, ut in leuce, locus fucandus erit hoc linimento:

℞ lithargyri, calcis, alcanne gallarū, tragacāt. an. partes æquales: puluerata excipiātur melle & aceto, & fiat lini mētum. Hæc curatio esto vitiliginis albæ vtriusque & nigre, raro in pueritia necessaria, sicuti neq; vitiliginis rubræ quæ dicitur gutta rosæ, cuius curandæ duo sunt scopi, præseruatio ne incalescat, & abrogatio eius quæ genita est. Est autē rubor alienus aut totius faciei, aut nasi aut malarū: estq; simplex vel cū inflatione à vaporibus malignis: aut crustis etiā & vlcusculis, si mixta est salsa pituita: sæpe cum pustulis. Causa proxima est sanguis vstus, aliàs simplex

simplex, aliàs cum pituita salsa aut atra bile mixtus. Ægrè tardèque curatur ob raritatem faciei ad recipiendum aptissimam, & ob hepatis mādantis calorē.

Præseruatio constat victu frigido humidoque, & fuga rerum omnium non naturalium quæ calfaciunt, deinde cacoehymix interioris purgationē per electar. de succo ros. & confect. hamech. syr. de fumar. & de cichor. compositum: sed purgationem præcedat missio sanguinis ex vena cephalica. Reuulsiones quoq; frequentes ex vsu sunt per frictiones, ligaturas extremorum, & clysteres molles. Intemperies denique viscerum, præsertim hepatis, calidiori temperentur balneo, epithemate & vnguento frigidis humidisque sæpius antea expositis.

Curatio quæ causæ cōiuncta est, cōstat deriuatione & evacuatione. Illa fiet per cucurbitulas cum scarificat. in scapulis & collo: sectionem venarū frontis & nariū, phicnigum in collo & faucibus. Vacuatio in principio & recentis mali origine constabit percussione & astrictione cutis faciei per crebrā lotionem fotumq; ex linteolis oxycrato madefactis, aut aqua aluminosa quæ cōstat succis acetos. plantag. agrest. cum albuminibus ouorum & alumine destillatis: In antiqua autem cum detergentibus & repellētibus mixtis, vt aqua rosat. sulphurata, ex vnguento albo mixtis sulphure & mercurio, ex vnguento de cerusa cum acetositate citrij & paucō mercurio, ex lacte virginali; quod constat ꝑ ij aceti albi, & ꝑ ss litharg. præparati, ad solem sæpius versati, deinde per filtrum destillati, & vsus tempore cum aqua salsa pauca commixti.

Deniq; cæteris non prōficiētibz locus erit cantharidibus, post quas idem locus foliis ciclæ deter-

gebitur. Adhuc de vitiliginis speciebus quatuor.

Aliæ maculæ sunt leuiiores, vt lentigines & ephe-
lides, leuioribus detergentibus curabiles.

Deniq; ecchymoma est pueris quoque frequens,
macula scilicet nigra ex paucò sanguine sub cutē effu-
so cōcretoq; idq; ex minimis venis, vel ob internas
causas referatis, per anastomosim ex copia, diapede-
sim ex tenuitate: vel diaurosim ex acrimonia sangui-
nis: sepius ob externas vt contusionem ex ictu casu-
ue. Effusus autem sanguis ex perfrigeratione pri-
mum liuescit, liuores Latini vocant has maculas,
Græci *πυλιδάματα*: deinde cōcrefcit & nigrescit, hinc
μυλιδάματα & nigrities. Vtraque Latinis suggilla-
ta dicuntur. Quæ si minora sint & vibicibus flagel-
lorū similia, *στίγματα* vocātur. Nigrescit itaq; in me-
dioeribus poris vt sub cute: suppuratur in minimis
vt poris, nō solum musculorū sed ossium, sicut cor-
rūpi solet in maioribus capacitatibus vt vteri, ven-
triculi, intestinorū, thoracis. Ecchymoma igitur ab
internis causis, præseruatione eget, per phlebotomiā
& purgationem. Quod ab externa causa est, sine præ-
seruatione curari debet: præsertim si tumor adsit, de-
tergentibus scilicet topicis mixtis cum astringētib.
Hæc enim indicātur à venæ affectu ne noua sangui-
nis effusio à calidis digerentib. alliciatur. Illa à ma-
teria crassiori concreti sanguinis. Tales sunt lotiones
fotusque ex decocto foliorū plantag. bursæ pastor.
orig. calam. thymi, summitat. olcæ, rubi, lentisc. ro-
sar. flor. anethi, chamæm. &c. Tale est emplastrum
ex cera noua mixto semine cumini & anisi.

Adhuc de propria macularum therapeia. En-
narranda deinceps ea, quæ pustularum propria est,
rariorum in primis, deinde earum quæ sunt fre-
quentiores

quentiores. Huius generis sunt scabię, phora, lepra, (nam elephas ad tumorum maiorum genus pertinet) variolę, morbilli, serpigo, impetigo: Illius verò hidroa, psydracia, epinyctides & phlyctenę.

Hidroa igitur sunt minima exanthemata & pustulę similes vestigiis verberum vrticę, sub quibus cutis minimis pultul. s exasperatur, ita dicta à sudore cuius retentę reliquię similes pustulas excitant. Causa proxima est serum acre vel bilis vtriusq; vel pituitę salsę, q̃ tamen si sit tenue, sub cuticula tamen cohibetur densiori. Causa antecedens cacochymia est collecta vel ex prauo victu, vel ex intēperie viscerum. Therapeia duplex est, vna pręseruatiua, ne scilicet crescant aut multiplicentur, constatque dicta contraria & vacuatione per purgationem & per phlebotomiam, si adsit multitudo sanguinis cacochymi, etasque & vires consentiant. Altera est curatiua factorum hidroum, constatq; astrictione modica, ne cutis clausis foraminib. cacochymia nouam admittat: tum digestionē. Illius instrumenta sunt, aer frigidior, ventus & flabella: item summitates lentisci, myrti, rubi, balauſtia, cortex malorum granatorum, rosę: Huius materia est ex leuioribus abstergentibus vt farina hordei, fabarum, erui, lupinor. oryza, cineres myrti, folior. Vtriusque generis materia commiscenda est: forma convenientior liquida est, vt balnei, fots, lotionis, & media vt vnguentorum. Frictiones quoque & sudores conferunt.

Psydracia, sunt ex cęthymatum, id est maiorũ pustularum genere, & parum supra cutem eminentia, albida, in ambitu rubra, duriuscula, lata, quę compressa sanieꝝ quandam fundunt.

Post præſervationem per purgationem phlegmagogam aut phlebotomiam, curantur ſolis digerentibus attenuantibus & detergentibus validioribus, qualia ſunt ſotus & cataplaſmata ex foliis viridibus vel coctis vel contuſis lauri, hederæ, rutæ betæ, & ſimilium, & vnguento ex ſulphuris & ſalis ana ζ j cum ceræ & olei idonea quantitate.

Epinyctides, puſtulæ ſunt paulo grandiores ita dictæ à nocte qua frequentius exoriri & infeſtare ſolent, maximè vero crura, pedes, & manus, ſuntq; humide ex rubro liueſcentes, cum vehementi ardore, quæ apertæ ſaniem cruentam effundunt. Poſt præſervationem ex victu refrigerante & purgationem viſtorum humorum, & phlebotomiam, curatur, partim refrigerantibus ob ardorem leniendum, partim digerentibus mixtis vt cataplaſmate ex hyocyami foliis cum melle contuſis, vt ex braſſica, apio & farina hordei ſimul commixtis, vt denique ex coriandro viridi cum cymis oleæ coctis.

Phlyctænæ, ſunt puſtulæ lucidæ, inſtar veſicæ aqua repletæ, bullis ab igne excitatis ſimiles. Cauſa proxima eſt ſerū bilis feruētiffimæ, & propemodū igneæ ſub denſiorē cuticulā effuſum ab aliquo vehementi animi corporiſue motu: vulg^r vocat ignē ſylveſtrē. Curatur triplici ſcopo. Vn^a eſt, vt effūdatur humor ſerumq; ſubſlauū per perforationē bullarū ex acuta factam filo laneo pendente, relictaque ſemper tuticula, donec exulceratio cutis verè perſanata ſit.

Alter eſt, vt exulceratio cutis ſubiectæ exſiccetur & inflammatio reſtinguatur. Vtraque hæc indicatio (exſiccationis & refrigerationis) comparatur exempli gratia cataplaſmate ex lēte decocta, vel ex emplastro diachalciteos diſſoluto cū oleo roſato.

Prurigo

Prurigo, vel pruritus Latinis, ex genere est pustularum siccarum, *κνησμός* Græcis, nempe asperitas cutis parua cum sensu acris humoris vellicantis. Est igitur symptoma sensus tactus deprauati ex intemperie calida & solutione cōtinuitatis obscura in cute. Prurigo duplex est, vna simplex & leuior, altera grauior cū rosionis & morsus molestia. Causa proxima vtriusq; excrementū est tertiz coctionis, nēpe serū acre vel falsū ex pituita putri, vel amarū ex bile flaua atrāue: sed in illa minori est quantitate, magis tenue, aquosū quietūq; in hac cōtraria omnia. Ideoque ex motu vel horror vel rigor etiā oritur. Cause antecedētes sunt cacochymia vel pituitosa salsa, vel amara collecta vel ab intemperie viscerum simili, vel à victu cacochymo. Ea vero vel emittitur ad cutem robore viscerum, vel ab eadem allicitur ob calorem ab aere, exercitatione & verno tēpore. Causa sine qua nō, cuticulæ densitas est, vel aliena vt ob astrictiōē à frigore, vel obstructionem à sordibus reliquis: vel natia, vt in senibus.

Curatio constat vacuatione humoris acris sub cuticula cōcreti. Vacuatio hæc interdū obscura est per discussionem vt per scalptum & cutis frictionem ex linteolo molli, vel blādā manu vt in prurigine simplici, vbi humor paucus & tenuis est. Aliàs manifesta est, vt per sudorē à balneo tepido illectum, q̄ refrigerandi humectandique, laxandi tergendique facultatem sortitum sit. Sic enim acrimonia humoris & prurigo mitigatur, intemperies cutis calida tollitur, eiusque astrictio obstructione aperitur. Balneum tale conficitur ex decocto in aqua dulci quatuor remollitinarū betę, mercur. ciclę, scariolę, fumar. lupul. lapathi acuti, rostri porcini, sōchi, agri-

monie. Talis quoque frictio est balneatis, ex sacculis lineis furfure macro repletis, aut farinis lentium erui, oryze, hordei, fabarum. Hec quoque frictio sola sine balneo hyeme proderit. Talia sunt linimenta quoque ex oleis frigidis humidisque vt violato, rosato, de nymphaea admixto triente vel quadrante tergentis alicuius amarique succi, vt apij chelidon. scabiosa. Tale vnguentum ex iisdem oleis, aloë, sale, ammoniaco & alumine, quod cum sit vehemētius, inueterata prurigini & contumaciori materiae aptari debet: sicuti validiora balneis misceri vt origan. calamint. absinth. prass. tanacetum, scabiosa, agrim. melissa. hæc curatio ordinaria est. At symptomatice est, quæ relicto excremento acri, eius acrimoniam & pruriginis molestiam compescit, vel anodynorum vsu vt balneo aquæ tepidæ simplicis, aut lactis, fotuque: vel stupefacientibus linimentis ex papaueris semine trito cum aceto, addito etiam opij momento, vt oleis illis frigidis admixta aqua rosacea, vel endiuia parte quarta.

Præseruatio denique constet purgatione cacochymia adultiorum, aut nutricum in pusillis, & conuenienti diætâ vtriusque.

De impetigine.

Impetigo ex pustularum quoque genere est, cutis nempe asperitas rosioq; maior & profundior, quàm in prurigine quæ solius cuticulæ affectus est, sicuti illa etiam veræ cutis.

Symptoma est in qualitate mutata: morbus interperies cutis calida & solutio continuitatis. Causa proxima est humor quilibet acris crassusque vt pituita falsa, atra bilis, corruptus sanguis, bilis flaua, vitellina, aut magis vsta, sed mixtus cum tenui & aquoso

quoso sero, à quo cuticula exasperatur, sicuti ab illo cutis roditur.

Causæ antecedentes sunt vel contagio euchymis humoribus acrimoniam contrahens, vel intemperies viscerum, vel prauitas victus vel vtraque. Transfertur in cutem à viscerū robore, vel allicitur à cutis calore ob insolationem, aut exercitationem: retinetur tenue præsertim serum à cute vel astricta frigore, vt per hyemem, vel obstructa à sordibus.

Differētiae sunt duæ: Vna leuior est, recentior sine exulceratione cum minoribus pustulis & rosione miciori (hæc serpigo vocatur, ab aliis volatica, vel ignisvolagius, vulgo enderbis) Altera grauior feræque magis cum maioribus pustulis, rosione cutis, vlceribus squammosis & furfurosis, aliàs oculcis, aliàs apparentibus. hæc Græcis *λεχλω*, Arabibus *assaphiati*, in facie mentagra dicitur.

Signa.

Dignoscitur impetigo ex sensu duplici, visu quidem quoad pustulas, & tactu quoad rosionem & pruritum. Causæ proximæ dignoscuntur ex colore partis & rosionis specie, & præterea à causis externis vt victu, & internis vt natura & ætate.

Quæ leuior est & recens, quia à tenuiori humore magisque superficiali est, citius persanatur. At grauior difficilior, sæpeque deformitatem relinquit, aut transit in lepram.

Therapeia præseruatiua prohibet incrementum & multiplicationem, tum vitata contagione, tum victu euchymo, tum vacuatione cacochymiae internæ, tum denique viscerum intemperatorum temperatione. Therapeia curatiua causam coniunctam

summouet digestionem per medicamenta attenuantia & detergentia crassum lentumque humorem, & poroscūtis relaxātia, quorū tamen gradus & efficacia in leuiori impetiginis specie minor erit, in grauiori maior, vt aliquādo etiam causticorū aut fermentorum candentium necessitas vrgeat.

Curatio symptomatica est quæ pruritus delet alteratione cutis & excremēti, vt cum succo portulac. & cucumer. & mucilagine seminis psyllij aut succo expresso ex semine maluæ. Ordinarię curationis quæ ad leuiorē speciem refertur, remedium exemplum hæc sunt: frequens frictio cum salua hominis ieiuni, item triticum morsu multo tritum & cū salua subactum: panis masticatus, esitatio radiculæ, aloë dissoluta aceto, olca de tritico de ouo de myrrha de iunipero, de tartaro, farina lolij aceto excepta, sapo cum succo chelidonij, lotio ex aqua rosata sulphurata & insolata per xx. dies & ex lacte virginali: succus denique lacteus tithymali efficacissimus est sæpe illitus.

At vero inueteratæ impetiginis remedia aciora sint, magis attenuantia & tergentia. Talis est lotio ex aqua sublimata. Tale linimentum ex facce vini cum succo cucumer. agrest. Tale cataplasma ex foliis viticis & cappar. tritis cum aceto. Vtiles quoque sunt sanguisugæ, frictiones asperiores, ad cruoris vsque fluxum. Quod si cutis sit corrupta, causticis detrahenda est: sed in eorum vsu partibus vicinis medicamentum ex bolo armena cum oleo rosato & aceto subactum imponendum est. Tale fuit Pamphili remedium Mentagræ Romanæ olim apud Galen. 5. κατά τή-

℥. squamæ æris 3vj. auripigm. rubr. & flauiana 3ß æris vlli, veratri albi, ventris cantharid. ana 3jß. trita omnia misceantur cum cedria aut terebinthina ad mellis crassitudinem, & reponatur in pixyde ænea: apponatur pluribus vicibus, vesiculæ excitentur phlyctenarum modo curandæ.

Quod si impetigo altius descenderit vt non possit auferri à medicamentis causticis, ad ferraamenta ignita decurrendum est, vt quicquid substantiæ cutis subiectæ vitiatum est, id totum aduratur, ad os vsque, & in crustam vertatur.

De scabie.

Scabies ex pustularum quoque genere est, nempe asperitas & scabrities cutis pruriginosa, rodens eum exulceratione manifesta vel occulta. Nas citur ex pustulis ruptis quæ saniem, vel pus, vel sordes emittunt recentes (& scabies humida dicitur) vel crustas colligunt ex resiccatis crassioribus sordibus post saniei vacationem (scabies sicca vocatur) Ad hanc etiam referuntur phora, lepraque: illa quidem mitior, minus pruriginosa rodensque & tantum fursurea: hæc contra & magis squamosa.

Est igitur scabies omnis symptoma in qualitate mutata tum intemperiei calidæ siccæque, tum solutionis continuitatis. Causa proxima est acris & crassus lentusque humor, vt biliosum flauum excrementum atrumue & pituitosum falsum, & sanguineum corruptum. Ab hoc scabies humida: ab illo scabies magis sicca, phora lepraque oritur. Causæ antecedentes sunt tum intemperies viscerum, tum caeochymia cruenta, vel ab eadē intemperie, vel à prauitate victus

& intemperantia, vel à contagione scabiosorum.

Dignoscitur causa coniuncta ex accidentibus partis vt colore calore dolore prurigine.

Prognostica sunt, quòd scabies bona est vt signū, mala vt causa: Scabies curabilis est facile quæ à prauitate victus, vt in pueris & iunioribus, incurabilis est quæ ab intemperie confirmata viscerū oritur, vt in senibus: mortifera etiam, vbi ex prurigine intolerabili, vigilię corporisque marcor consequitur.

Cyratio.

Therapeia præseruatiua cacochymiam interioream amolitur purgatione & phlebotomia nutriticum, optimaque diætā & puerorum leuiori purgatione. Sudorifica quoque decocta minimum calfacientia vt salsæ parillæ, radic. chinæ & sassafras multū profutura sunt. Intemperiem quoque viscerū alteratione contraria temperat therapeia curatiua: causam proximam vacuat insensiliter per medicamenta topica digerētia, id est attenuantia tergētiaque, indicatione sumpta ab humoris cōditione: itē modicè refrigerantia, si comes sit inflammatio calorque, tum siccantia si vlcus sit madidum: emolliētia denique si crustosum sit. Debet autem remedium vel toti corpori vel partibus obsessis tantum aptari pro varia scabiei sede: debetque in lepra validissimū, in phora paulo minus, in scabie tantum esse validum pro varia humoris & excrementi cōtumacia, crassitie & lentore.

Forma liquidior, aut media vt penetrantior, est aptissima, qualis est balnei foci lotionis linimenti & vnguenti.

Sint igitur balnea hæc tum naturalia, vt ferrea, aluminosa, nitrosa, sulphurea: tum artificiosa, quale est

est descriptum antea pro pruriginē contumaci. Tales quoque fots & lotiones particulares: talis litus ex oleo refrigerante & digerente, vt rosat. in quo sulphur. viui quarta pars dissoluta sit, vel ex styrace liquida cum succo limonum & sulphure. Tale vnguetum amicorum Galeni lib. nono simplic. cap. de sulphure: scilicet ex oleo, sulphure, terebinthina & melle. Tale quoque est hoc ex terebinthine quart. j. axung. suillæ tñ ß sulphur. viui ʒ j. mercurij ʒ ij. Tale denique hoc est præstantissimum.

℞. radic. asphod. enul. camp. lapathi acuti, veratri nigri ana ʒ ij. axungie suillæ, vitulinæ ana tñ ß olei mastich. & laurini ana quart. ß olei ros. quart. j. terebinthinæ puræ ʒ ij. folior. chelid. fumar. scabiosæ, agrim. ana m. j. contusis quæ contundi possunt omnibus, bulliant simul omnia, tandemque percolentur exprimendo, & expressioni addantur spumæ argenti ʒ ß cerusæ, si vlcus adsit ʒ iij. butyri recentis si durities & crusta adsit quart. ß. mercurij extincti salua ʒ ij. misce & fiat vnguentum.

De variolis & morbillis.

Variolæ morbillique ex pustularum genere sunt. Illæ quidem maiores, profundiores & tanquam stellæ quædam inter se distinctæ ad phlegmonem: hæ minores, densiores & superficialiæ ad erysipelata referuntur, vulgoque vocantur purpura. Materia omnium proxima sanguis est, non quidem scædatus reliquiis materni menstrui, vt vulgo medicorum & Arabum placet, menses muliebres statuentium insalubres, cuius opinionis vanitatem clarissimè deteximus nostro de causis

sterilitatis libello: sed crassior magisque pituitosus variolarum: tenuior & biliosus morbillorum. Causa efficiens feruor est sanguinis, vel simplex vnde synochos, vel putris etiam vnde febris ardens. Vtraque sane contagiosa est. Feruoris causæ, aliæ externæ sunt vt cōtagio, æstus cœli, prauitas victus: aliæ internæ vt plethora.

Signa.

Comitantur vtramque speciem prurigo totius corporis, maximè verò dorsi, cephalalgia, vel grauis, vel erodens: artuum distensio, raucedoque, tussis, ariditas linguę, dyspnœa, somnolentia. Differentiæ vtriusq; speciei sunt, quæ alię leuiores vel grauiiores: alię exquisitę vel spurie: alię maiores vel minores: aliæ plures vel pauciores: aliæ in paucis vel pluribus partibus.

Signa prognostica sunt, quòd vere magis, sicuti cœlo & constitutione calida humidaque à plethora: autumno verò à cacoehymia emergant.

Quod infantibus pueris & adolescentibus frequentius, iuuenib' rarius, senibus rarissimè cōmoueatur.

Quod leuiores sint quæ rubent aut albicant, quàm violaceæ, flauæ, liuidæ, aut nigræ: itē superficiariæ, quàm internę, ob multitudinē vitij os, fauces, arteriā, pulmones, œsophagum, ventriculum, & intestina obsidentis.

Quòd grauiores sint quę vlcerantur & sanie fūdūt: Itē quę intro recurrūt, præ imbecillitate scilicet naturæ reuocatę aut frigore externo repulsæ: tum illę quę cruditis perseuerantibus signis apparēt, & sine leuatione febris eiusque symptomatum, & ægri facili tolerantia.

Grauiores deniq; sunt quæ pluribus symptomatis

tis ſcuiunt, vt vomitu, diarrhœa, epilepſia ſub eruptionis tēpus: febre æſtuofa & arſus, vrēte ſiti, lipothymia, prauis vrinis, dyſpnœa, aliisq; ſignis criticiſ pro partium conditione ab eruptione materia appetitarum, ſicuti capitis cephalalgia impatibili, rubore faciei, fulgore oculorum, lachrymis, ſomno.

Exitus deniq; præuidetur ſalutaris vel funcſtus, nō ſolū ex illis differētiis affectuū: ſed etiā virium egri, ex ætate & temperie, tanquam ex cauſis proximis, & ex regione atque tempore anni colligendarum, atque ex propriis earum functionibus, vt conſtantia mentis, appetentia cibi, facilitate tolerantia, eruptione veloci & integra variolarum, & contra.

Therapeia.

Therapeia in tria tempora diuidatur: Aut enim imminent iſti affectus: aut iā apparēt: aut omnino facti ſunt & emerſerunt. Imminentes & ſuſpecti præcaueri poſſūt reſtincto ſanguinis ſeruore, idq; ſi ab internis cauſis, per phlebotomiā, niſi eius puſilla ætas ſit impotērior, & purgationē: ſi ab externis frigido & aſtringente viſtu, vt aëris refrigeratione, frigidis ſiccisq; cibis, acidis & aſtringentibus, aquæ ſinceræ potu, cōtagionis fuga, & viſcerū corroboratōne, & refrigeratione per electaria cardiaca, vt diamargaritū frigidū, triaſandalum, diarrhod. abbat. & ſyr. acidus, vt de granatis, de limonibus, de agreſta, acetosū ſimpl. oxyſacch. ſimp. & de ribes, ex quibus cum refrigeratibus aquis fiāt iulepi mane & veſperi ſumendi, vel cū aqua ſimplici tēpore ſitis hauriēdi.

Quoad eos qui iam emicant, ſive critici ſint, ſive ſymptomatici, præcaueri non debēt neq; phlebotomia neq; purgatione, niſi aut ſtrāgulationis periculū

vrgeat, aut vitij multitudo expultricem naturæ facultatem opprimat. Nam vbi plethora grauis est, tum ad transpirationem corporis naturæque leuationem, aliquid moliri licet per phlebotomiā primo, secundo aut tertio die, illis etiam iam apparentibus, cūque vehementior febris ardor est, & dyspnœa præfocans. Quamquam phlebotomiam tuto suppleat hæmorrhoidis fluxus, mensium, & hæmorrhagia è naribus, aut cucurbitulæ dorso & scapulis cum scarificatione affixæ. Eodem consilio purgatio quoque leuior decernatur ex rhei & agarici infuso cum syru. viol. vel rosa. portione iusta: Sed si leuiora hæc symptomata sint, incitandi potius sunt habitu ægri relaxato modica calfactione (maiores enim respuit febris comes) per vestes & stragulas præsertim rubras (harum enim intuitu imaginatricem facultatem moueri, indeque sanguinis excretionem putant) & per vaporem aquæ feruentis lecto proximæ, denique per quemlibet conclauis teporem.

Victus sit temperatus, nisi naturæ motus sit seignior, qui aperiente cibo potius incitandus quàm eodem astringente retardandus sit, & somnus breuior frictioque mollis.

Quæ iam eruperunt, curantur materiæ per habitum euacuatione vel insensui & discussoria: si materia pauca est tenuisque, vt in morbillis & exiguis variolis: vel manifesta, per effusionem puris in variolis maioribus acu aurea apertis, postquam maturatæ sunt, quod fere 7. die accidit, quo & maximæ & mollissimæ sentiuntur. Quod si eodem tempore etiamnum duræ crudæque persistant, maturitas earum acceleranda est vapore aut fotu lenientium medicamentorum in facie sola, quæ subinde linteolis tepidis,

tepidis admoueantur, donec maturatz aut sponte sua dissoluantur, aut acu aperiantur, vt dictum est, ne diutius morata sanies foueas deformes in vultu effodiat, quæ præcauendæ sunt non solum opportuna saniei vacuatione & deterfione: sed pulueris etiam sarcotici aspersione detergentis & modicè siccantis.

Quæ tamen maculæ relictæ sunt, deleantur lotione ex lacte virginali, liquore ex ouo, dum coquitur exudante: aquis destillatis florum fabar. rad. serpen-
tar. & ari, mellis, terebinth. myrrhæ pedum vituli, porcellorum & veruecum vnguine.

Dum sic materia in habitum deducitur: ante maturationem grauiora symptomata à partibus quibusdam arcenda sunt, vt ab oculis quibus vlcerus & *ulceratio* accidere interdū solet. Instillabitur liquor astringens, vt albumen oui agitatam cum aqua rosacea aut decocto foliorum sumach, corticis granatorum, rosarum, sandalorum, addito pauco croco. Iisdem etiam iam affectis & vlceratis imponenda sunt siccantia & tergentia, leuiter sarcotica, ne cauea & cicatrix relinquatur, vt

℞ farina hordei tosti & sarcocollæ lacte mulieris nutritæ an. ʒ j β cerusæ lotæ ʒ ij tragacanthi ʒ β opij grana ij fiat puluis albumine oui excipiendus, vt euadat vnguentum mollissimum. In ore & guttute variolæ maiores & densiores transglutitionem & respirationem impediunt: aut apertæ pus in pulmonem affatim refundunt suffocando ægrum, aut vlcera maligna inurunt, vt etiam in intestinis. Ab ore igitur eruptio earum prohibenda est gargarismo crebro, vel ex oxycrato, vel ex rob diamorum, aut dianthum cum aquis ros. & plantag. solutis, vel ex

succo granatorum, vel ex decocto folior. plantaginis, acetos. solan. A pulmone verò, ex syrupo myrrino, de granatis acidis sensim lambendo: vel ex suffitu rosar. sandalor. cort. thuris, mastich. tragacanth. Sed & partibus iam vlceratis hæc ipsa conueniunt curando vlceri, deterfione leui præmissa per decoctum hordei, addito paucò melle aut saccharo rubro. Ab intestinis arcebuntur clystere astringente, tandemque leuiter detergente, cum iam suppurant, postremo astringente & sarcotico. A naribus denique errhino ex oxycrati aut similis liquoris haustu & aqua stillatit. pedunculi rosar. plantag. caprifolij, mixto etiam syrupo de rosis siccis, vel myrrino, vel denique vapore & suffitu ante descripto.

Ita tandem & diætã quæ pueritiæ conuenit, & morborum ac symptomatum quæ hanc ætatem infestât, historiam medicam, partim Hippocratis doctrinâ & autoritate, partim multiplici nostra experientia per triginta annos confirmatam, breuiter complexi videmur. Hunc sane laborem nostrum, vt eruditioribus displicuisse doleam, ita rudioribus in quorum gratiam susceptus fuit, non infrugiferum fore, vt sperem facit singulare ipsorum desiderium, quod etiam me impulit, vt opus hoc vnâ cum altero illo de sterilitatis causis & reme-

diis, propter argumenti similitudinem, in vulgus emitti paterer.

F I N I S.



f



